



EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

INFORMATIKAI KAR

NUMERIKUS ANALÍZIS TANSZÉK

I. éves

Programtervező informatikus

Analízis 1

Kovács Sándor gyakorlata

(Csütörtök, $8^{15} - 9^{45}$: DT-0.220)

(Csütörtök, $12^{15} - 13^{45}$: DT-0.311)

2023. tavasz

Tudnivalók

I. A tárgy követelményrendszere

II. Segédanyagok:

- A görög ábécé és a fraktúra
- Valós-valós függvények határértéke
- Hiperbolikus függvények és inverzeik
- MacTutor History of Mathematics archive

III. Ajánlott olvasmányok:

- Kovács Sándor: Matematikai alapozás
(<https://numanal.inf.elte.hu/~alex/MatAlapKonyvtar/SzintrehozKS.pdf>), ill. <https://numanal.inf.elte.hu/~alex/hu/matalap.html>)
- Schipp Ferenc: Analízis I. (https://numanal.inf.elte.hu/~schipp/Jegyzetek/Anal_1.pdf)
- Simon Péter: Bevezetés az analízisbe I., egyetemi jegyzet, ELTE Eötvös Kiadó, 2016.
(<http://numanal.inf.elte.hu/~simon/cimlapanal1.pdf>)
- Szili László: Analízis feladatokban I.
(http://numanal.inf.elte.hu/~szili/Okt_anyag/an_fel_I_2008_2016.pdf)

IV. A félév gyakorlatainak tematikája:

„MintaZh” megoldások

- 1. gyakorlat** (2023. 03. 02.): **Egyenlőtlenségek:** háromszög-egyenlőtlenségek, a Bernoulli-egyenlőtlenség, a mértani és a számtani közép közötti egyenlőtlenség, alkalmazások.
- 2. gyakorlat** (2023. 03. 09.): **Számhalmazok korlátossága:** korlátos számhalmazok, számhalmaz maximuma és minimuma, a szuprénum elv, számhalmaz szuprénumának és infimumának a meghatározása.
- 3. gyakorlat** (2023. 03. 16.): **Függvények:** halmaz függvény által létesített képe és ősképe; függvény invertálhatóságának fogalma és az inverz függvény meghatározása; függvények kompozíciója.
- 4. gyakorlat** (2023. 03. 23.): **Valós sorozatok 1.:** sorozatok divergenciája és konvergenciája; a határérték kiszámítása a definíció alapján.
- 5. gyakorlat** (2023. 03. 30.): **Valós sorozatok 2.:** sorozatok konvergenciájának igazolása a műveletekre vonatkozó tételek és a nevezetes sorozatok határértékére vonatkozó állítások alapján.

- 6. gyakorlat** (2023. 04. 06.): **Valós sorozatok 3.:** rekurzív sorozatok kvalitatív vizsgálata (konvergenca, monotonitás, határérték).
- 7. gyakorlat** (2023. 04. 13.): **Numerikus sorok 1.:** numerikus sorok összegének kiszámítása (mértani és teleszkopikus sorok); számok p -adikus tört alakja, az Euler-féle szám approximációja.
- 8. gyakorlat** (2023. 04. 20.): **Numerikus sorok 2.:** A végtelen sorokra vonatkozó Cauchy-kritérium. Az összehasonlító kritériumok (minoráns- és majoránskritérium) alkalmazása. A Cauchy-féle gyök- és a D'Alembert-féle
- 9. gyakorlat** (2023. 04. 27.): **Numerikus sorok 3.:** hatványsorok konvergenciahalmazának meghatározása; függvények hatványsörbe fojtása/ hatványsírbba fejtése (előállítás hatványsor összegeként).
- 10. gyakorlat** (2023. 05. 04.): **Valós függvények határértéke és folytonossága 1.:** a határérték kiszámítása a definíció alapján, a határértékekre vonatkozó tételek.
- 11. gyakorlat** (2023. 05. 11.): **Valós függvények határértéke és folytonossága 2.:** kritikus határértékek, a folytonosság fogalma, a folytonosságra vonatkozó alapvető tételek.
- 12. gyakorlat** (2023. 05. 18.): **Valós függvények határértéke és folytonossága 3.:** A szakadási helyek osztályozása. Intervallumon folytonos függvények tulajdonságai, egyenletesen folytonos függvények.
- 13. gyakorlat** (2023. 05. 25.): **Informatikai alkalmazások** (generátorfüggvények, leképezések fixpontja).
- „14. gyakorlat”** Az első zárthelyi feladatainak megoldása

A MintaZh-k feladatainak megoldása

Az 1. MintaZh feladatai

1. **Vizsgálja** a

$$\mathcal{H} := \left\{ \frac{x^2 + 9}{3x^2 + 9} \in \mathbb{R} : x \in (-\infty, 3) \right\}$$

halmazt korlátosság szempontjából! **Határozza meg** \mathcal{H} infimumát és szuprémumát! Van-e a \mathcal{H} halmaznak legkisebb, ill. legnagyobb eleme?

2. **Tekintse** az alábbi függvényeket!

$$f(x) := \frac{2}{|x+1|} \quad (-1 \neq x \in \mathbb{R}), \quad g(x) := x^2 - 2x - 4 \quad (0 \leq x \in \mathbb{R}).$$

- (a) **Állapítsa meg**, hogy invertálható-e az f függvény!
- (b) **Határozza meg** az $f \circ g$ függvényt!
- (c) **Számítsa ki** a $[-4, 4]$ halmaz g által létesített ősképet!

3. A határérték definíciója alapján **lássa be**, hogy fennáll a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3n^3 - n^2 + 3}{2n^2 - n + 1} \right) = +\infty$$

egyenlőség!

4. **Számítsa ki** az alábbi határértékeket!

(a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sqrt{n^3 + 1} - \sqrt{n^3 - n^2}}{\sqrt{4n + 1}} \right);$

(b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sqrt[n]{5^{n+1} + n^2 3^n} \right);$

(c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\left(\frac{n+5}{2n} \right)^{3n+1} \right).$

5. **Mutassa meg**, hogy az

$$x_0 := 5, \quad x_{n+1} := \frac{x_n^2 + 2x_n}{10} \quad (n \in \mathbb{N}_0)$$

sorozat konvergens, és **számítsa ki** a határértékét!

Útm.

1. • Világos, hogy minden $x \in (-\infty, 3)$ esetén

$$(*) \quad \frac{x^2 + 9}{3x^2 + 9} = \frac{1}{3} \cdot \frac{3x^2 + 27}{3x^2 + 9} = \frac{1}{3} \cdot \frac{3x^2 + 9 + 18}{3x^2 + 9} = \frac{1}{3} \cdot \left(1 + \frac{6}{x^2 + 3}\right) = \frac{1}{3} + \frac{2}{x^2 + 3}.$$

- Mivel bármely $x \in (-\infty, 3)$ esetén

$$\frac{2}{x^2 + 3} > 0,$$

ezért

$$\mathcal{H} \ni \frac{x^2 + 9}{3x^2 + 9} > \frac{1}{3},$$

azaz $\frac{1}{3}$ alsó korlátja \mathcal{H} -nak. Látható, hogy a

$$\frac{2}{x^2 + 3}$$

tört az x^2 nagy értékeire igen közel van 0-hoz, ezért a \mathcal{H} halmaz elemei az ilyen x -ekre $\frac{1}{3}$ -hoz közeli értékeket vesznek fel. Sejthető tehát, hogy \mathcal{H} -nak nincsen $\frac{1}{3}$ -nál nagyobb korlátja:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists x \in (-\infty, 3) : \quad \mathcal{H} \ni \frac{1}{3} + \frac{2}{x^2 + 3} < \frac{1}{3} + \varepsilon.$$

Megmutatjuk, hogy $\frac{1}{3}$ a legnagyobb alsó korlát: $\inf(\mathcal{H}) = \frac{1}{3}$. Mivel

$$\frac{1}{3} + \frac{2}{x^2 + 3} < \frac{1}{3} + \varepsilon \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 > \frac{2}{\varepsilon} - 3,$$

ezért van ilyen $x \in (-\infty, 3)$ szám, hiszen ha $x \in \left(-\infty, -\sqrt{\frac{2}{\varepsilon}}\right)$, akkor

$$x^2 > \frac{2}{\varepsilon} > \frac{2}{\varepsilon} - 3.$$

Mivel $\frac{1}{3} \notin \mathcal{H}$, ezért \mathcal{H} -nak nincsen legkisebb eleme.

- A $(*)$ felbontásból az is látható, hogy bármely $x \in (-\infty, 3)$ esetén

$$\frac{1}{3} + \frac{2}{x^2 + 3} \leq \frac{1}{3} + \frac{2}{0^2 + 3} = 1 \in \mathcal{H}.$$

Ez azt jelenti, hogy $\sup(\mathcal{H}) = \max(\mathcal{H}) = 1$.

2. (a) Mivel $f(1) = 1 = f(-3)$, ezért f nem invertálható.

(b) Világos, hogy

$$\begin{aligned}\mathcal{D}_{f \circ g} &= \{x \in \mathcal{D}_g : g(x) \in \mathcal{D}_f\} = \{x \in [0, +\infty) : x^2 - 2x - 4 \neq -1\} = \\ &= \{x \in [0, +\infty) : x^2 - 2x - 3 \neq 0\}.\end{aligned}$$

Mivel

$$x^2 - 2x - 3 = 0 \quad \implies \quad x_{\pm} = 1 \pm \sqrt{1+3} = 1 \pm 2 \in \{-1; 3\},$$

ezért

$$\mathcal{D}_{f \circ g} = \{x \in [0, +\infty) : (x+1)(x-3) \neq 0\} = [0, +\infty) \setminus \{3\}.$$

Tehát bármely $3 \neq x \in [0, +\infty)$ esetén

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \frac{2}{|x^2 - 2x - 3|}.$$

Az f és a g függvény kompozíciója így az

$$(f \circ g)(x) := \frac{2}{|x^2 - 2x - 3|} \quad (3 \neq x \in [0, +\infty))$$

függvény.

(c) Világos, hogy

$$\begin{aligned}g^{-1} [[-4, 4]] &= \{x \in [0, +\infty) : x^2 - 2x - 4 \in [-4, 4]\} = \\ &= \{x \in [0, +\infty) : -4 \leq (x-1)^2 - 5 \leq 4\} = \\ &= \{x \in [0, +\infty) : 1 \leq (x-1)^2 \leq 3\} = \{x \in [0, +\infty) : 1 \leq |x-1| \leq 3\} = \\ &= \{x \in [0, +\infty) : 1 \leq x-1 \leq 3\} \cup \{x \in [0, +\infty) : -3 \leq x-1 \leq -1\} = \\ &= [2, 4] \cup \{0\}.\end{aligned}$$

3. Azt kell megmutatni, hogy az

$$x_n := \frac{3n^3 - n^2 + 3}{2n^2 - n + 1} \quad (n \in \mathbb{N}_0)$$

sorozatra

$$\forall \omega \in \mathbb{R} \exists N \in \mathbb{N}_0 \forall n \in \mathbb{N}_0 : \quad (n \geq N \implies x_n > \omega)$$

teljesül. Valóban, ha $0 < \omega \in \mathbb{R}$, akkor bármely $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\begin{aligned} \frac{3n^3 - n^2 + 3}{2n^2 - n + 1} &> \frac{3n^3 - n^2}{2n^2 + 1} = \frac{2n^3 + n^3 - n^2}{2n^2 + 1} = \frac{2n^3 + n^2(n-1)}{2n^2 + 1} \geq \\ &\stackrel{n \geq 1}{\geq} \frac{2n^3}{2n^2 + n^2} = \frac{2n^3}{3n^2} = \frac{2n}{3} > \omega \quad \Longleftrightarrow \quad n > \frac{3\omega}{2}, \end{aligned}$$

így

$$N := \max \left\{ 1, \left\lfloor \frac{3\omega}{2} \right\rfloor + 1 \right\} = \left\lfloor \frac{3\omega}{2} \right\rfloor + 1.$$

4. (a) Látható, hogy bármely $n \in \mathbb{N}$ indexre

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{n^3+1} - \sqrt{n^3-n^2}}{\sqrt{4n+1}} &= \left(\frac{\sqrt{n^3+1} - \sqrt{n^3-n^2}}{\sqrt{4n+1}} \right) \cdot \frac{\sqrt{n^3+1} + \sqrt{n^3-n^2}}{\sqrt{n^3+1} + \sqrt{n^3-n^2}} = \\ &= \frac{n^2+1}{\sqrt{4n+1} (\sqrt{n^3+1} + \sqrt{n^3-n^2})} = \\ &= \frac{1 + \frac{1}{n^2}}{\sqrt{4 + \frac{1}{n}} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n^3}} + \sqrt{1 - \frac{1}{n}} \right)} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{4} \cdot (\sqrt{1} + \sqrt{1})} = \\ &= \frac{1}{4} \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

(b) Mivel tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ indexre

$$\sqrt[n]{5^{n+1} + n^2 3^n} = 5 \cdot \sqrt[n]{5 + n^2 \left(\frac{3}{5} \right)^n}$$

és az

$$x_n := 5 + n^2 \left(\frac{3}{5} \right)^n \quad (n \in \mathbb{N})$$

sorozatra

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n) = 5 + 0 = 5 > 0,$$

ezért

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt[n]{5^{n+1} + n^2 3^n} \right) = 5 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt[n]{x_n} \right) = 5 \cdot 1 = 5.$$

(c) Az $n \rightarrow \infty$ határátmenetben

$$\begin{aligned} \left(\frac{n+5}{2n}\right)^{3n+1} &= \left(\frac{1}{2}\right)^{3n+1} \cdot \left(\frac{n+5}{n}\right)^{3n+1} = \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^{3n+1} \cdot \left[\left(1 + \frac{5}{n}\right)^n\right]^3 \cdot \left(1 + \frac{5}{n}\right) \rightarrow \frac{1}{2} \cdot 0 \cdot [e^5]^3 \cdot 1 = 0. \end{aligned}$$

5. **1. lépés.** Ha az (x_n) sorozat konvergens, és $\alpha := \lim(x_n)$, akkor $\lim(x_{n+1}) = \alpha$, és így

$$\alpha = \frac{\alpha^2 + 2\alpha}{10} \implies \alpha^2 - 8\alpha = 0 \implies \alpha \in \{0, 8\}.$$

2. lépés. Mivel a kezdőtag: $x_0 = 5$, kézenfekvőnek tűnik belátni azt, hogy

$$x_n \in (0, 8) \quad (n \in \mathbb{N}_0).$$

Valóban,

- $n = 0$ esetén $x_0 = 5 \in (0, 8)$;
- ha valamely $n \in \mathbb{N}_0$ esetén $x_n \in (0, 8)$, akkor

$$x_{n+1} = \frac{x_n^2 + 2x_n}{10} \in \left(0, \frac{64 + 16}{10}\right) = (0, 8).$$

3. lépés. Megmutatjuk, hogy az (x_n) sorozat szigorúan monoton csökkenő. Valóban, bármely $n \in \mathbb{N}_0$ esetén

$$x_{n+1} - x_n = \frac{x_n^2 + 2x_n}{10} - x_n = \frac{x_n^2 - 8x_n}{10} = \frac{x_n(x_n - 8)}{10} < 0.$$

4. lépés. Mivel a sorozat (szigorúan) monoton csökkenő és alulról korlátos, ezért konvergens. A fentiek következtében tehát (x_n) konvergens és

$$\lim(x_n) = 0.$$

A 2. MintaZh feladatai

1. Konvergens-e a

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-3)^n + (-2)^{2n}}{5^{n+1}} \right)$$

végtelen sor? Ha igen, **számítsa ki** összegét!

2. **Döntse el**, hogy konvergens-e az alábbi sorok!

$$\text{a) } \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt[n]{2n^2 + 1}} \right), \quad \text{b) } \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n^3 \cdot 3^n}{(3n)!} \right), \quad \text{c) } \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\sqrt{n^4 + 1}}{n^4 + n^2 + 1} \right).$$

3. **Határozza meg** a

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2^n}{n(4^n - 1)} \cdot (x - 1)^n \right) \quad (x \in \mathbb{R})$$

hatványsor konvergenciasugarát és konvergenciahalmazát!

4. **Számítsa ki** az alábbi határértékeket!

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \sin(x)}{1 - \sqrt{\cos(2x)}}, \quad \text{b) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{\alpha x^2 - \alpha + 1} - 1}{x^3 - 1} \quad (\alpha \in [0, 1]).$$

5. **Határozza meg** az

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \begin{cases} \frac{x}{x^2 - x - 6} & (x < -2), \\ \frac{e^{2x} - e^x}{2x} & (-2 \leq x < 10), \\ 1 & (x = 0), \\ \frac{\sqrt{x^2 + 1} - 1}{x^2} & (x > 0). \end{cases}$$

függvény folytonossági és szakadási helyeit, valamint a szakadási helyek típusát!

Útm.

1. Mivel bármely $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\frac{(-3)^n + (-2)^{2n}}{5^{n+1}} = \frac{1}{5} \cdot \left\{ \left(-\frac{3}{5}\right)^n + \left(\frac{4}{5}\right)^n \right\}$$

és

$$\left| -\frac{3}{5} \right| < 1, \quad \text{ill.} \quad \left| \frac{4}{5} \right| < 1,$$

ezért konvergens geometriai sorról van szó, amelynek összege

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n + (-2)^{2n}}{5^{n+1}} &= \frac{1}{5} \cdot \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{3}{5}\right)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{5}\right)^n \right\} = \frac{1}{5} \cdot \left\{ \frac{-\frac{3}{5}}{1 + \frac{3}{5}} + \frac{\frac{4}{5}}{1 - \frac{4}{5}} \right\} = \\ &= \frac{1}{5} \cdot \left\{ -\frac{3}{8} + 4 \right\} = \frac{29}{40}. \end{aligned}$$

2. (a) Mivel

$$\sqrt[n]{2n^2} \leq \sqrt[n]{2n^2 + 1} \leq \sqrt[n]{2n^2 + n^2} \leq \sqrt[n]{3n^2} \quad (2 \leq n \in \mathbb{N})$$

és

$$\sqrt[n]{2n^2} = \sqrt[n]{2} \cdot (\sqrt[n]{n})^2 \xrightarrow{(n \rightarrow \infty)} 1 \cdot 1^2 = 1 = 1 \cdot 1^2 \xleftarrow{(n \rightarrow \infty)} \sqrt[n]{3} \cdot (\sqrt[n]{n})^2 = \sqrt[n]{3n^2},$$

ezért a Sandwich-tétel felhasználásával azt kapjuk, hogy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt[n]{2n^2 + 1}} \right) = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[n]{2n^2 + 1})} = \frac{1}{1} = 1 \neq 0.$$

Következésképpen a

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt[n]{2n^2 + 1}} \right)$$

sor divergens. **Megjegyezzük**, hogy tetszőleges $2 \leq n \in \mathbb{N}$ indexre

$$\frac{1}{\sqrt[n]{2n^2 + 1}} = \frac{1}{\sqrt[n]{n^2} \cdot \sqrt[n]{2 + \frac{1}{n^2}}} \rightarrow \frac{1}{1 \cdot 1} = 1 \quad (n \rightarrow \infty),$$

hiszen

$$x_n := 2 + \frac{1}{n^2} \rightarrow 2 > 0 \quad (n \rightarrow \infty) \quad \implies \quad \sqrt[n]{x_n} \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty).$$

(b) Ha

$$x_n := \frac{n^3 \cdot 3^n}{(3n)!} \quad (n \in \mathbb{N}),$$

akkor

$$\left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| = \frac{(n+1)^3 \cdot 3^{n+1}}{(3n+3)!} \cdot \frac{(3n)!}{n^3 \cdot 3^n} = \frac{3(n+1)^3}{n^3(3n+1)(3n+2)(3n+3)} \rightarrow 0 < 1 \quad (n \rightarrow \infty).$$

Így a hányadoskritérium következtében a

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n^3 \cdot 3^n}{(3n)!} \right)$$

sor konvergens.

(c) Mivel nagy $n \in \mathbb{N}$ indexre

$$\frac{\sqrt{n^4+1}}{n^4+n^2+1} = \frac{\sqrt{1+\frac{1}{n^4}}}{n^2+1+\frac{1}{n^2}} \approx \frac{1}{n^2} \quad \text{és} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^2} \right) \quad \text{konvergens,}$$

ezért a majoránskritériumot kíséreljük meg alkalmazni. Mivel

$$\frac{\sqrt{n^4+1}}{n^4+n^2+1} \leq \frac{\sqrt{n^4+3n^4}}{n^4} = \frac{2n^2}{n^4} = \frac{2}{n^2} \quad (n \in \mathbb{N})$$

és a

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{n^2} \right) = 2 \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^2} \right)$$

sor konvergens, ezért a

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\sqrt{n^4+1}}{n^4+n^2+1} \right)$$

sor a majoránskritérium alapján konvergens.

3. Világos, hogy $c := 1$ középpontú és

$$a_n := \frac{2^n}{n(4^n - 1)} \quad (n \in \mathbb{N})$$

együtthatójú hatványsorról van szó. Mivel az $n \rightarrow \infty$ határesetben

$$\left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \frac{2^n}{n(4^n - 1)} \cdot \frac{(n+1)(4^{n+1} - 1)}{2^{n+1}} = \frac{n+1}{2n} \cdot \frac{4^{n+1} - 1}{4^n - 1} = \frac{n+1}{2n} \cdot \frac{4 - \frac{1}{4^n}}{1 - \frac{1}{4^n}} \rightarrow \frac{1}{2} \cdot 4 = 2,$$

ezért a hatványsor konvergenciasugara 2. Mivel

$$|x - 1| < 2 \iff -2 < x - 1 < 2 \iff -1 < x < 3,$$

ezért a hatványsor $x \in (1, 3)$ esetén konvergens, $x \in \mathbb{R} \setminus [-1, 3]$ esetén pedig divergens. Ha $x = -1$, akkor a

$$\sum_{n=1} \left((-1)^n \cdot \frac{4^n}{n(4^n - 1)} \right)$$

sor a Leibniz-kritérium következtében konvergens, hiszen

$$\frac{4^n}{n(4^n - 1)} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{4^n}} \searrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

Ha $x = 3$, akkor a

$$\sum_{n=1} \left(\frac{4^n}{n(4^n - 1)} \right)$$

sor divergens, hiszen

$$\frac{4^n}{4^n - 1} > 1 \quad (n \in \mathbb{N})$$

következtében

$$\frac{4^n}{n(4^n - 1)} > \frac{1}{n} > 0 \quad (n \in \mathbb{N}),$$

és így a

$$\sum_{n=1} \left(\frac{1}{n} \right)$$

harmonikus sor divergens minoránsa.

4. (a) Bármely $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ esetén

$$\begin{aligned} \frac{x \cdot \sin(x)}{1 - \sqrt{\cos(2x)}} &= \frac{x \cdot \sin(x)}{1 - \sqrt{\cos(2x)}} \cdot \frac{1 + \sqrt{\cos(2x)}}{1 + \sqrt{\cos(2x)}} = \frac{x \cdot \sin(x) \cdot (1 + \sqrt{\cos(2x)})}{1 - \cos(2x)} = \\ &= \frac{x \cdot \sin(x) \cdot (1 + \sqrt{\cos(2x)})}{2 \cdot \sin^2(x)} = \frac{1 + \sqrt{\cos(2x)}}{2 \cdot \frac{\sin(x)}{x}} \longrightarrow \frac{1 + 1}{2 \cdot 1} = 1 \quad (x \rightarrow 0). \end{aligned}$$

(b) Mivel alkalmas $r > 0$, illetve $1 \neq x \in (1 - r, 1 + r)$ esetén

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{\alpha x^2 - \alpha + 1} - 1}{x^3 - 1} &= \frac{\sqrt{\alpha x^2 - \alpha + 1} - 1}{x^3 - 1} \cdot \frac{\sqrt{\alpha x^2 - \alpha + 1} + 1}{\sqrt{\alpha x^2 - \alpha + 1} + 1} = \\ &= \frac{\alpha \cdot (x^2 - 1)}{(x^3 - 1) \cdot (\sqrt{\alpha x^2 - \alpha + 1} + 1)} = \\ &= \frac{\alpha \cdot (x - 1) \cdot (x + 1)}{(x - 1) \cdot (x^2 + x + 1) \cdot (\sqrt{\alpha x^2 - \alpha + 1} + 1)} = \\ &= \frac{\alpha \cdot (x + 1)}{(x^2 + x + 1) \cdot (\sqrt{\alpha x^2 - \alpha + 1} + 1)}, \end{aligned}$$

ezért

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{\alpha x^2 - \alpha + 1} - 1}{x^3 - 1} = \frac{\alpha \cdot 2}{3 \cdot (\sqrt{1} + 1)} = \frac{\alpha}{3}.$$

5. A folytonosság és a műveletek kapcsolatára vonatkozó tételek alapján nyilvánvaló, hogy f folytonos a $(-\infty, -2)$, $(-2, 0)$, $(0, +\infty)$ intervallumok mindegyikén. Látható továbbá, hogy

- f -nek másodfajú szakadása van az $a := -2$ pontban, hiszen

$$\lim_{-2-0} f = \lim_{x \rightarrow -2-0} \frac{x}{(x+2)(x-3)} = \left(\lim_{x \rightarrow -2-0} \frac{x}{x-3} \right) \cdot \left(\lim_{x \rightarrow -2-0} \frac{1}{x+2} \right) = \frac{2}{5} \cdot (+\infty) = +\infty;$$

- f -nek megszüntethető szakadása van az $a := 0$ pontban, hiszen (vö. 284., ill. 286. oldal)

$$\lim_{0-0} f = \lim_{x \rightarrow 0-0} \frac{e^{2x} - e^x}{2x} = \frac{2 - 1}{2} = \frac{1}{2}$$

és

$$\begin{aligned} \lim_{0+0} f &= \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{\sqrt{x^2 + 1} - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{\sqrt{x^2 + 1} - 1}{x^2} \cdot \frac{\sqrt{x^2 + 1} + 1}{\sqrt{x^2 + 1} + 1} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{x^2}{x^2 \cdot (\sqrt{x^2 + 1} + 1)} = \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + 1} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Mindez azt jelenti, hogy

$$\lim_{0} f = \frac{1}{2} \in \mathbb{R}, \quad \text{de} \quad f(0) = 1 \neq \frac{1}{2}.$$

1. gyakorlat (2023. 03. 02.)

Emlékeztető. Az $x \in \mathbb{R}$ szám **abszolútértékén**, ill. **előjelén** az

$$|x| := \begin{cases} x & (x \geq 0), \\ -x & (x < 0) \end{cases}, \quad \text{ill.} \quad \text{sgn}(x) := \begin{cases} 0 & (x = 0), \\ \frac{x}{|x|} & (x \neq 0) \end{cases}$$

valós számot értjük.

Nyilván igaz, hogy

$$\text{sgn}(x) = \begin{cases} -1 & (x < 0), \\ 0 & (x = 0), \\ 1 & (x > 0) \end{cases} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Tétel. Bármely $x, y \in \mathbb{R}$ esetén

1. $|x| \geq 0$ és $|x| = 0 \iff x = 0$;
2. $|x| = |-x|$;
3. $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$, ill. ha $y \neq 0$, úgy $\left|\frac{1}{y}\right| = \frac{1}{|y|}$;
4. ha $a \geq 0$, akkor

$$|x| \leq a \iff -a \leq x \leq a, \quad \text{ill.} \quad |x| \geq a \iff (x \leq -a \text{ vagy } x \geq a);$$

5. $|x \pm y| \leq |x| + |y|$ (**háromszög-egyenlőtlenség**);
6. $|x \pm y| \geq ||x| - |y||$ (**háromszög-egyenlőtlenség**).

Biz.

- 1. lépés.** Mivel az első négy állítás közvetlenül adódik az abszolút érték definíciójából, ill. a szorzás előjel szabályából, ezért ezek bizonyítását nem részletezzük.
- 2. lépés.** Az $|x|$ értelmezése alapján az x szám $|x|$ -kel vagy $-|x|$ -kel egyenlő. Következésképpen bármely

$x, y \in \mathbb{R}$ számpárra

$$-|x| \leq x \leq |x|, \quad -|y| \leq y \leq |y|.$$

Innen, összeadva az egyenlőtlenségeket

$$-(|x| + |y|) \leq x + y \leq |x| + |y|$$

következik, ami az első és a negyedik tulajdonság alapján éppen avval egyenértékű, hogy

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

A második tulajdonság következménye az

$$|x - y| \leq |x| + |y|$$

egyenlőtlenség.

3. lépés. Az ötödik₊ egyenlőtlenség alapján $|x| = |(x - y) + y| \leq |x - y| + |y|$, azaz

$$|x| - |y| \leq |x - y| \tag{1},$$

ill. $|y| = |(y - x) + x| \leq |y - x| + |x| = |x - y| + |x|$, azaz

$$|y| - |x| \leq |x - y|, \tag{2}$$

ahonnan a (2) egyenlőtlenségnek (-1) -gyel való szorzása után a

$$-|x - y| \leq |x| - |y| \leq |x - y|$$

adódik. Ez az első és a negyedik tulajdonság alapján a bizonyítandó

$$|x - y| \geq ||x| - |y||$$

egyenlőtlenséggel egyenértékű.

4. lépés. Az ötödik₋ egyenlőtlenség alapján $|x| = |(x + y) - y| \leq |x + y| + |y|$, azaz

$$|x| - |y| \leq |x + y|, \tag{3}$$

ill. $|y| = |(y + x) - x| \leq |y + x| + |x| = |x + y| + |x|$, azaz

$$|y| - |x| \leq |x + y|, \quad (4)$$

ahonnan a (4) egyenlőtlenségnek (-1) -gyel való szorzása után a

$$-|x + y| \leq |x| - |y| \leq |x + y|$$

adódik. Ez az első és a negyedik tulajdonság alapján a bizonyítandó

$$|x + y| \geq ||x| - |y||$$

egyenlőtlenséggel egyenértékű.

Tétel (a teljes indukció elve.) Legyen $m \in \mathbb{Z}$ rögzített egész szám, és tegyük fel, hogy $\mathcal{A}(n)$ az $m \leq n \in \mathbb{Z}$ (m -nél nem kisebb egész) számokra vonatkozó olyan állítás, amelyre:

- (a) $\mathcal{A}(m)$ igaz, és
- (b) ha valamely $m \leq n \in \mathbb{Z}$ esetén $\mathcal{A}(n)$ igaz, akkor $\mathcal{A}(n + 1)$ is igaz.

Ekkor $\mathcal{A}(n)$ igaz minden $m \leq n \in \mathbb{Z}$ számra.

A teljes indukció módszerével (is) könnyen belátható a

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} \quad (1)$$

állítás. Valóban, ha

- $n = 1$, akkor

$$\sum_{k=1}^1 k = 1 = \frac{1 \cdot (1+1)}{2}. \checkmark$$

- valamely $n \in \mathbb{N}$ esetén fennáll a (1) állítás, akkor

$$\sum_{k=1}^{n+1} k = \sum_{k=1}^n k + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}. \checkmark$$

Feladat. Igazoljuk, hogy bármely $n \in \mathbb{N}$ számra fennáll a

$$2\sqrt{n+1} - 2 < \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$$

egyenlőtlenség!

Útm. Teljes indukcióval igazoljuk a fenti egyenlőtlenséget.

- Ha $n = 1$, akkor az állítás nyilvánvalóan igaz, ui.

$$\sum_{k=1}^1 \frac{1}{\sqrt{k}} = 1 > 2\sqrt{1+1} - 2 \quad \Longleftrightarrow \quad 3 > 2\sqrt{2} \quad \Longleftrightarrow \quad 9 > 8. \checkmark$$

- Tegyük fel, hogy valamely $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} > 2\sqrt{n+1} - 2$$

teljesül (indukciós feltevés). Mivel

$$\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{\sqrt{k}} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} + \frac{1}{\sqrt{n+1}},$$

ezért ha belátjuk, hogy

$$2\sqrt{n+1} - 2 + \frac{1}{\sqrt{n+1}} > 2\sqrt{n+1+1} - 2,$$

akkor igazoltuk az állítást. A fenti egyenlőtlenség pontosan akkor teljesül, ha

$$2\sqrt{n+1} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} > 2\sqrt{n+2} \quad \Longleftrightarrow \quad 2(n+1) + 1 > 2\sqrt{n+2}\sqrt{n+1}.$$

Ez utóbbi pedig nem más, mint

$$2n+3 > 2\sqrt{n^2+3n+2} \quad \Longleftrightarrow \quad 4n^2+12n+9 > 4n^2+12n+8 \quad \Longleftrightarrow \quad 9 > 8,$$

ami igaz. ■

Emlékeztető. Legyen $n \in \mathbb{N}$. Ekkor tetszőleges $a, b \in \mathbb{R}$ esetén fennáll az

$$a^n - b^n = (a - b) (a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1}) = (a - b) \sum_{k=1}^n a^{n-k} b^{k-1} \quad (2)$$

egyenlőség.

Következmény. Tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ számra

$$x^n - 1 = x^n - 1^n = (x - 1)(x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + x + 1).$$

Tétel (Barrow-Bernoulli-egyenlőtlenség). Ha $n \in \mathbb{N}_0$ és $h \in [-2, +\infty)$, akkor

$$(1 + h)^n \geq 1 + nh, \quad (3)$$

és egyenlőség pontosan akkor van, ha $h = 0$ vagy $n \in \{0; 1\}$.

Biz.

0. lépés. Világos, hogy ha $n = 0$, akkor igaz az egyenlőtlenség: egyenlőség áll fenn, ui.

$$(1 + h)^0 = 1 = 1 + 0 \cdot h.$$

A továbbiakban feltehetjük tehát, hogy $1 \leq n \in \mathbb{N}_0$, azaz $n \in \mathbb{N}$.

1. lépés. Legyen $h = -2$. Ekkor a $(-1)^n \geq 1 - 2n$ egyenlőtlenséget kell bebizonyítanunk. Ez nyilvánvalóan teljesül, ui. $n = 1$ esetén $(-1)^1 = 1 - 2 \cdot 1$, ill. ha $2 \leq n \in \mathbb{N}$, akkor $1 - 2n < -1$, hiszen ez a $2 < 2n$ egyenlőtlenséggel egyenértékű.

2. lépés. Legyen $h \in (-2, -1)$. Világos, hogy ha $n = 1$, akkor teljesül a becslés, sőt egyenlőség van. Ha $2 \leq n \in \mathbb{N}$, akkor legyen

$$h := -\epsilon - 1 \quad (\epsilon \in (0, 1)).$$

Így

$$(1 + h)^n = (-\epsilon)^n > -1 > 1 - n - n\epsilon = 1 + n(-1 - \epsilon) = 1 + nh.$$

3. lépés. Legyen $h \in [-1, +\infty)$.

1. módszer. Ha $x := 1 + h$, akkor

$$\begin{aligned} x^n - 1 - n(x - 1) &= (x - 1)(x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + x + 1) - n(x - 1) = \\ &= (x - 1)(x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + x + 1 - n), \end{aligned}$$

ezért, ha

- $h \geq 0$, azaz $x \geq 1$, akkor

$$x - 1 \geq 0 \quad \text{és} \quad x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + x + 1 \geq n,$$

- ha pedig $-1 \leq h \leq 0$, azaz $0 \leq x \leq 1$, akkor

$$x - 1 \leq 0 \quad \text{és} \quad x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + x + 1 \leq n.$$

Ennélfogva

$$x^n - 1 - n(x - 1) \geq 0, \quad \text{azaz} \quad \boxed{(1 + h)^n \geq 1 + nh}. \quad \checkmark$$

2. módszer. Teljes indukcióval bizonyítunk. Ha

- $n = 1$, akkor $(1 + h)^1 = 1 + h = 1 + n \cdot h. \checkmark$
- valamely $n \in \mathbb{N}$ esetén fennáll a (3) egyenlőtlenség, akkor

$$\begin{aligned} (1 + h)^{n+1} &= (1 + h)^n \cdot (1 + h) \stackrel{1+h>0 \& (3)}{\geq} (1 + nh) \cdot (1 + h) = \\ &= 1 + nh + h + nh^2 = 1 + (n + 1)h + nh^2 \stackrel{nh^2 \geq 0}{\geq} 1 + (n + 1)h. \checkmark \end{aligned}$$

4. lépés. Ha $h = 0$ vagy $n = 1$ esetén nyilván teljesül az egyenlőség. Tegyük fel, hogy alkalmas $2 \leq n \in \mathbb{N}$ esetén

$$(1 + h)^n = 1 + nh.$$

Ekkor $h = 0$, ugyanis a (2) azonosságot felhasználva azt kapjuk, hogy

$$(1 + h)^n = 1 + nh \iff (1 + h)^n - 1^n = nh \iff h \cdot \sum_{k=1}^n (1 + h)^{n-k} = h \cdot n$$

miatt sem $h > 0$ sem pedig $h < 0$ nem lehetséges, mert különben

$$\sum_{k=1}^n (1 + h)^{n-k} > n, \quad \text{ill.} \quad 0 \leq \sum_{k=1}^n (1 + h)^{n-k} < n$$

teljesülne, ami nyilvánvalóan nem igaz.

Megjegyzések.

1. A Bernoulli-egyenlőtlenségről **Jakob Bernoulli** egy könyvéből **latinul** (1670), és **Isaac Barrow**-tól **angolul** (1669) olvashatunk.
2. **Megmutatható**, hogy a $h < -2$ esetben már nem igaz az egyenlőtlenség.
3. Alkalmazás: az

$$f(x) := (1 + x)^n \quad (-2 \leq x \in \mathbb{R}; n \in \mathbb{N})$$

függvény grafikonja nem megy a 0-beli érintője alá, ui. az alsó becslés következtében

$$y = f(0) + f'(0)(x - 0) = 1 + n(1 + 0)^{n-1}x = 1 + nx \leq (1 + x)^n = f(x).$$

Definíció. Adott $n \in \mathbb{N}$ esetén

1. az $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ számok **számtani** vagy **aritmetikai közepét** az alábbi módon értelmezzük:

$$A_n := \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k;$$

2. az $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ számok **négyzetes** vagy **kvadratis közepét** így értelmezzük:

$$Q_n := \sqrt{\frac{x_1^2 + \dots + x_n^2}{n}} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k^2};$$

3. a $0 \leq x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ számok **mértani** vagy **geometriai közepét** az alábbi módon értelmezzük:

$$G_n := \sqrt[n]{x_1 \cdot \dots \cdot x_n} = \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n x_k};$$

4. a $0 < x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ számok **harmonikus közepét** így értelmezzük:

$$H_n := \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}} = \frac{n}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{x_k}}.$$

Megjegyezzük, hogy

1. a fenti definícióban a közép elnevezés jogos, hiszen egyszerű becsléssel belátható, hogy ha $n \in \mathbb{N}$ és

(a) $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$, akkor

$$\min\{x_1, \dots, x_n\} \leq A_n \leq \max\{x_1, \dots, x_n\};$$

(b) $0 \leq x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$, akkor

$$\min\{x_1, \dots, x_n\} \leq Q_n \leq \max\{x_1, \dots, x_n\};$$

(c) $0 \leq x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$, akkor

$$\min\{x_1, \dots, x_n\} \leq G_n \leq \max\{x_1, \dots, x_n\};$$

(d) $0 < x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$, akkor

$$\min\{x_1, \dots, x_n\} \leq H_n \leq \max\{x_1, \dots, x_n\}.$$

2. $0 < x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$, akkor igaz a

$$H_n \leq G_n \leq A_n \Leftrightarrow H_n^n \leq G_n^n \leq A_n^n \Leftrightarrow \left(\frac{n}{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}} \right)^n \leq x_1 \cdot \dots \cdot x_n \leq \left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \right)^n$$

ekvivalencia-lánc.

Tétel (a mértani közép és a számtani közép közötti egyenlőtlenség).

Bármely $n \in \mathbb{N}$, ill. $0 \leq x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ esetén

$$x_1 \cdot \dots \cdot x_n = \prod_{k=1}^n x_k \leq \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k \right)^n = \left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \right)^n,$$

és egyenlőség pontosan az $x_1 = \dots = x_n$ esetben teljesül.

Biz. Több lépésben bizonyítunk.

0. lépés. Ha $n = 1$, akkor az egyenlőtlenség nyilvánvalóan teljesül, sőt egyenlőség van. Ha pedig

$n = 2$, akkor

$$\sqrt{x_1 x_2} \leq \frac{x_1 + x_2}{2} \iff 0 \leq \left(\frac{x_1 + x_2}{2} \right)^2 - x_1 x_2 = \frac{x_1^2 - 2x_1 x_2 + x_2^2}{4} = \left(\frac{x_1 - x_2}{2} \right)^2,$$

és egyenlőség pontosan az $x_1 = x_2$ esetben áll fenn.

1. lépés. Legyen $2 \leq n \in \mathbb{N}$. Ha valamely $k \in \{1, \dots, n\}$ esetén $x_k = 0$, akkor az egyenlőtlenség triviálisan teljesül. Tegyük fel tehát, hogy bármely $k \in \{1, \dots, n\}$ esetén $x_k > 0$. Mivel

$$\frac{A_n}{A_{n-1}} > 0, \quad \text{azaz} \quad \frac{A_n}{A_{n-1}} - 1 > -1,$$

ezért alkalmazható a Bernoulli-egyenlőtlenség:

$$\begin{aligned} \left(\frac{A_n}{A_{n-1}} \right)^n &= \left(1 + \underbrace{\frac{A_n}{A_{n-1}} - 1}_{:=h} \right)^n \geq 1 + n \left(\frac{A_n}{A_{n-1}} - 1 \right) = \frac{A_{n-1} + nA_n - nA_{n-1}}{A_{n-1}} = \\ &= \frac{nA_n - (n-1)A_{n-1}}{A_{n-1}} = \frac{x_n}{A_{n-1}}, \end{aligned}$$

azaz

$$A_n^n \geq x_n \cdot A_{n-1}^{n-1}.$$

Így

$$A_n^n \geq x_n \cdot A_{n-1}^{n-1} \geq x_n \cdot x_{n-1} \cdot A_{n-2}^{n-2} \geq \dots \geq x_n \cdot x_{n-1} \cdot \dots \cdot x_2 \cdot A_1^1 = x_n \cdot x_{n-1} \cdot \dots \cdot x_2 \cdot x_1 = G_n^n.$$

2. lépés. Nyilvánvaló, hogy ha $x_1 = \dots = x_n$, akkor $A_n = G_n$. Ha $2 \leq n \in \mathbb{N}$ és bizonyos $0 \leq x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ esetén fennáll az $A_n = G_n$ egyenlőség, továbbá az x_1, \dots, x_n számok nem mind egyenlők egymással, azaz van közöttük legalább két különböző:

$$\exists i, j \in \{1, \dots, n\}: \quad x_i \neq x_j,$$

akkor az **1. lépésben** belátottak alapján

$$\sqrt{x_i x_j} < \frac{x_i + x_j}{2}, \quad \text{azaz} \quad x_i x_j < \left(\frac{x_i + x_j}{2} \right)^2.$$

Ezért

$$\begin{aligned} G_n &= \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n x_k} < \sqrt[n]{\frac{x_i + x_j}{2} \cdot \frac{x_i + x_j}{2} \prod_{\substack{k=1 \\ k \notin \{i,j\}}}^n x_k} \leq \\ &\leq \frac{1}{n} \left(\frac{x_i + x_j}{2} + \frac{x_i + x_j}{2} + \sum_{\substack{k=1 \\ k \notin \{i,j\}}}^n x_k \right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k = A_n, \end{aligned}$$

ami ellentmond az $A_n = G_n$ feltételnek.

Tétel (a harmonikus közép és a mértani közép közötti egyenlőtlenség).

Tetszőleges $n \in \mathbb{N}$, ill. $0 < x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ esetén

$$x_1 \cdot \dots \cdot x_n = \prod_{k=1}^n x_k \geq \left(\frac{n}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{x_k}} \right)^n = \left(\frac{n}{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}} \right)^n,$$

és egyenlőség pontosan az $x_1 = \dots = x_n$ esetben van.

Biz. A mértani közép és a számtani közép közötti egyenlőtlenséget felhasználásával azt kapjuk, hogy

$$H_n^n = \left(\frac{n}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{x_k}} \right)^n = \left(\frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{x_k}} \right)^n = \frac{1}{\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{x_k} \right)^n} \leq \frac{1}{\prod_{k=1}^n \frac{1}{x_k}} = \prod_{k=1}^n x_k = G_n^n,$$

és egyenlőség pontosan akkor van, ha $\frac{1}{x_1} = \dots = \frac{1}{x_n}$, azaz ha $x_1 = \dots = x_n$ teljesül.

Megjegyzés. A

- mértani és a számtani közép közötti egyenlőtlenséget kifejező állítás tehát a következő: bármely $n \in \mathbb{N}$, ill. $0 \leq x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ esetén

$$G_n \leq A_n, \quad \text{azaz} \quad \sqrt[n]{x_1 \cdot \dots \cdot x_n} \leq \frac{x_1 + \dots + x_n}{n},$$

és egyenlőség pontosan az $x_1 = \dots = x_n$ esetben áll fenn. Ha tehát az x_1, \dots, x_n számok **nem mind egyenlők egymással**, akkor

$$G_n < A_n, \quad \text{azaz} \quad \sqrt[n]{x_1 \cdot \dots \cdot x_n} < \frac{x_1 + \dots + x_n}{n},$$

- harmonikus és a mértani közép közötti egyenlőtlenséget kifejező állítás tehát a következő: bármely $n \in \mathbb{N}$, ill. $0 < x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ esetén

$$H_n \leq G_n, \quad \text{azaz} \quad \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}} \leq \sqrt[n]{x_1 \cdot \dots \cdot x_n},$$

és egyenlőség pontosan az $x_1 = \dots = x_n$ esetben áll fenn. Ha tehát az x_1, \dots, x_n számok **nem mind egyenlők egymással**, akkor

$$H_n < G_n, \quad \text{azaz} \quad \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}} < \sqrt[n]{x_1 \cdot \dots \cdot x_n}.$$

Feladat. Bizonyítsuk be, hogy minden $-\frac{1}{2} \leq a \in \mathbb{R}$ esetén fennáll az

$$(1 - a)^5(1 + a)(1 + 2a)^2 \leq 1$$

egyenlőtlenség! Mely esetben van itt egyenlőség?

Útm.

1. lépés. Ha $a \geq 1$, akkor

$$(1 - a)^5(1 + a)(1 + 2a)^2 \leq 0 \leq 1.$$

2. lépés. Ha $a \in \left[-\frac{1}{2}, 1\right]$, és $a \neq 0$, akkor

$$1 - a, \quad 1 + a, \quad \text{ill.} \quad 1 + 2a$$

különböző nem-negatív számok, ha pedig $a = 0$, akkor egyenlőség áll fenn: $1 = 1$. Így

$0 \neq a \in \left[-\frac{1}{2}, 1\right]$ esetén

$$(1-a)^5(1+a)(1+2a)^2 < \left(\frac{5(1-a) + 1 + a + 2(1+2a)}{8}\right)^8 = \left(\frac{8}{8}\right)^8 = 1. \quad \blacksquare$$

Házi feladatok

Feladat. Mutassuk meg, hogy tetszőleges $a, b \in \mathbb{R}$: $a > b > 0$, $n \in \mathbb{N}$ esetén fennáll az

$$a^n [a - (n+1)(a-b)] < b^{n+1}$$

egyenlőtlenség!

Útm. Mivel $0 < b < a$, így $a - b > 0$, ill. (2) felhasználásával azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} a^{n+1} - b^{n+1} &= (a-b)(a^n + a^{n-1}b + \dots + ab^{n-1} + b^n) < \\ &< (a-b)(a^n + a^{n-1}a + \dots + aa^{n-1} + a^n) = (a-b)(n+1)a^n, \end{aligned}$$

ezért

$$a^{n+1} - a^n(n+1)(a-b) < b^{n+1},$$

amiből pedig kiemeléssel a kívánt egyenlőtlenséget kapjuk. \blacksquare

Feladat. Igazoljuk, hogy minden $n \in \mathbb{N}$ esetén fennállnak az

$$1. \quad \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \quad 2. \quad 2 \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < 4$$

egyenlőtlenségek!

Útm.

1. Legyen

$$a := 1 + \frac{1}{n}, \quad \text{ill.} \quad b := 1 + \frac{1}{n+1}.$$

Ekkor $a > b > 0$, így az előző feladat alapján

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \underbrace{\left(1 + \frac{1}{n} - (n+1) \left(1 + \frac{1}{n} - 1 - \frac{1}{n+1}\right)\right)}_{=1} < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}.$$

A bal oldalon a második tényező 1, így a kívánt egyenlőtlenséget kapjuk.

2. **1. lépés.** $n = 1$ esetén

$$\left(1 + \frac{1}{1}\right)^1 = 2,$$

és az előző egyenlőtlenség alapján minden $2 < n \in \mathbb{N}$ számra

$$2 < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

2. lépés. Legyen

$$a := 1 + \frac{1}{2n} \quad \text{és} \quad b := 1.$$

Ekkor $a > b > 0$, ezért az előző feladat alapján

$$\left(1 + \frac{1}{2n}\right)^n \underbrace{\left(1 + \frac{1}{2n} - (n+1) \left(1 + \frac{1}{2n} - 1\right)\right)}_{=\frac{1}{2}} < 1.$$

A bal oldalon a második tényező $\frac{1}{2}$. Kettővel szorozva és négyzetre emelve

$$\left(1 + \frac{1}{2n}\right)^{2n} < 4$$

adódik. Az első feladat miatt minden $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\left(1 + \frac{1}{2n-1}\right)^{2n-1} < \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^{2n} < 4$$

teljesül. Ebből pedig már következik a bizonyítandó egyenlőtlenség. ■

Emlékeztető (binomiális tétel). Legyen $n \in \mathbb{N}_0$. Ekkor bármely $a, b \in \mathbb{R}$ szám esetén

$$(a + b)^n = \binom{n}{0} a^n + \binom{n}{1} a^{n-1} b + \dots + \binom{n}{n-1} a b^{n-1} + \binom{n}{n} b^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k. \quad (4)$$

Megjegyzés. Az is könnyen belátható, hogy

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < 3 \quad (n \in \mathbb{N}),$$

ui. a binomiális tétel felhasználásával azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot \frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} \cdot \frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^n \frac{n(n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{k! n^k} = \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdot \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \leq \\ &\leq \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = 1 + 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k!} < 2 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k-1)} = 2 + \sum_{k=2}^n \frac{k - (k-1)}{k(k-1)} = \\ &= 2 + \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}\right) = \\ &= 2 + \left[\left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right)\right] = \\ &= 2 + 1 - \frac{1}{n} < 3. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Feladat. Döntsük el, hogy melyik szám nagyobb!

$$1. (1,000001)^{1000000} \quad \text{vagy} \quad 2. 1000^{1000} \quad \text{vagy} \quad 1001^{999}.$$

Útm. Mivel

$$2 \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < 3 \quad (n \in \mathbb{N}) \quad \text{és} \quad 2 = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \iff n = 1,$$

ezért

$$(1,000001)^{1000000} = \left(1 + \frac{1}{10^6}\right)^{10^6} > 2$$

ill.

$$\begin{aligned} 1001^{999} &= \frac{1001^{999}}{1000^{1000}} \cdot 1000^{1000} = \left(\frac{1001}{1000}\right)^{1000} \cdot \frac{1000^{1000}}{1001} = \left(1 + \frac{1}{1000}\right)^{1000} \cdot \frac{1000^{1000}}{1001} < \\ &< 3 \cdot \frac{1000^{1000}}{1001} < 1000^{1000}. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Feladat. Alkalmazzuk a mértani és a számtani közép közötti egyenlőtlenséget az alábbi számokra!

1. $x_k := 1 + \frac{1}{n} \quad (k \in \{1, \dots, n\}), \quad x_{n+1} := 1;$
2. $x_k := 1 + \frac{1}{n} \quad (k \in \{1, \dots, n\}), \quad x_{n+1} := x_{n+2} := \frac{1}{2}.$

Útm. Ha $n \in \mathbb{N}$,

1. akkor

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot 1 < \left(\frac{n \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right) + 1}{n+1}\right)^{n+1} = \left(\frac{n+1+1}{n+1}\right)^{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}.$$

2. akkor

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 4 \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} < 4 \cdot \left(\frac{n \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{n+2}\right)^{n+2} = 4 \cdot \left(\frac{n+1+1}{n+2}\right)^{n+2} = 4.$$

A következő feladatbeli egyenlőtlenségek fontos szerepet játszanak az

$$x_n := \sqrt[n]{\alpha} \quad (n \in \mathbb{N}, \alpha \in (0, +\infty)), \quad \text{ill. az} \quad x_n := \sqrt[n]{n} \quad (n \in \mathbb{N})$$

sorozat konvergenciájának tárgyalásakor.

Feladat. Mutassuk meg, hogy ha

1. $n \in \mathbb{N}$ és $\alpha \in (1, +\infty)$, akkor

$$\frac{\alpha - 1}{\alpha n} \leq \sqrt[n]{\alpha} - 1 \leq \frac{\alpha - 1}{n};$$

2. $n \in \mathbb{N}$ és $\alpha \in (0, 1)$, akkor

$$\frac{1 - \alpha}{n} \leq 1 - \sqrt[n]{\alpha} \leq \frac{1 - \alpha}{\alpha n};$$

3. $n \in \mathbb{N}$, akkor

$$1 \leq \sqrt[n]{n} \leq 1 + 2 \cdot \frac{\sqrt{n} - 1}{n}.$$

teljesül!

Útm.

1. Felhasználva a mértani közép és a számtani közép, ill. a harmonikus közép és a mértani közép közötti egyenlőtlenséget azt kapjuk, hogy

$$\sqrt[n]{\alpha} = \sqrt[n]{1 \cdots 1 \cdot \alpha} \leq \frac{(n-1) \cdot 1 + \alpha}{n} = 1 + \frac{\alpha - 1}{n}$$

és

$$\begin{aligned} \sqrt[n]{\alpha} &= \sqrt[n]{1 \cdots 1 \cdot \alpha} \geq \frac{n}{(n-1) \cdot \frac{1}{\alpha} + 1} = \frac{\alpha n}{\alpha n - \alpha + 1} = \frac{\alpha n - \alpha + 1 + \alpha - 1}{\alpha n - \alpha + 1} = \\ &= 1 + \frac{\alpha - 1}{\alpha n - \alpha + 1} > 1 + \frac{\alpha - 1}{\alpha n}. \end{aligned}$$

2. Ha $\alpha \in (0, 1)$, akkor

$$\frac{1}{\alpha} \in (1, +\infty),$$

így az 1. felhasználásával adódik a két becslés.

3. Az első egyenlőtlenség triviális. A második:

$$\sqrt[n]{n} = \sqrt[n]{\sqrt{n} \cdot \sqrt{n} \cdot 1 \cdot \dots \cdot 1} \leq \frac{2\sqrt{n} + (n-2) \cdot 1}{n} = 1 + 2 \cdot \frac{\sqrt{n} - 1}{n}. \quad \blacksquare$$

Feladat. Igazoljuk, hogy ha $a, b \in [0, +\infty)$: $a \leq b$, akkor fennáll a

$$\sqrt{\frac{a}{b+1}} + \sqrt{\frac{b}{a+1}} < \frac{a+b+1}{a+1}$$

egyenlőtlenség!

Útm. A mértani és a számtani közép közötti egyenlőtlenség következményeként azt kapjuk, hogy bármely $x \in [0, +\infty)$: $x \neq 1$ számra

$$\sqrt{x} = \sqrt{x \cdot 1} < \frac{1}{2}(x+1).$$

Mivel

$$0 \leq a \leq b \quad \implies \quad 0 \leq \frac{a}{b+1} < 1,$$

ezért

$$\sqrt{\frac{a}{b+1}} + \sqrt{\frac{b}{a+1}} < \frac{1}{2} \left(1 + \frac{a}{b+1} \right) + \frac{1}{2} \left(1 + \frac{b}{a+1} \right) = 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{a}{b+1} + \frac{b}{a+1} \right).$$

Világos, hogy

$$0 \leq a \leq b \quad \iff \quad \frac{a}{b+1} \leq \frac{b}{a+1},$$

ennélfogva

$$\sqrt{\frac{a}{b+1}} + \sqrt{\frac{b}{a+1}} < 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{a}{b+1} + \frac{b}{a+1} \right) \leq 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{b}{a+1} + \frac{b}{a+1} \right) = \frac{a+b+1}{a+1}. \quad \blacksquare$$

Feladatok.

1. Feladatok teljes indukcióra (59-65. old.)

2. Bizonyítsuk be, hogy bármely $n \in \mathbb{N}$ esetén fennállnak az alábbi egyenlőtlenségek!

$$(a) \left(1 + \frac{3}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{3}{n+1}\right)^{n+1}; \quad (b) \left(1 + \frac{3}{n}\right)^n < 27 \cdot \left(1 + \frac{1}{n+3}\right)^{n+3}.$$

3. Igazoljuk, hogy bármely $2 \leq n \in \mathbb{N}$ esetén fennáll a

$$2^n > 1 + n\sqrt{2^{n-1}}$$

egyenlőtlenség!

4. Legyen

$$x \in [-1, +\infty), \quad \text{ill.} \quad r \in \mathbb{Q}.$$

Igazoljuk, hogy ha

(a) $0 \leq r \leq 1$, úgy

$$(1+x)^r \leq 1+rx;$$

(b) $r \geq 1$, úgy

$$(1+x)^r \geq 1+rx.$$

5. Igazoljuk, hogy fennállnak az alábbi egyenlőtlenségek!

$$(a) \frac{1}{2} \leq \left(1 - \frac{1}{2n}\right)^n < \frac{2}{3} \quad (n \in \mathbb{N});$$

$$(b) n^n > (n+1)^{n-1} \quad (2 \leq n \in \mathbb{N});$$

$$(c) \sqrt[n]{(n!)^3} \leq \frac{n(n+1)^2}{4} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

6. Lássuk be, hogy bármely $a, b, c \in (0, +\infty)$ fennáll az

$$\left(a + \frac{1}{b}\right) \left(b + \frac{1}{c}\right) \left(c + \frac{1}{a}\right) > 7$$

becslés!

Útm.

1. **Vö. 59-65. old.**

2. (a) **1. módszer** Legyen

$$a := 1 + \frac{3}{n}, \quad \text{ill.} \quad b := 1 + \frac{3}{n+1}.$$

Ekkor $a > b > 0$, így az

$$a^n [a - (n+1)(a-b)] < b^{n+1}$$

egyenlőtlenség felhasználásával azt kapjuk, hogy

$$\left(1 + \frac{3}{n}\right)^n \underbrace{\left(1 + \frac{3}{n} - (n+1) \left(1 + \frac{3}{n} - 1 - \frac{3}{n+1}\right)\right)}_{=1} < \left(1 + \frac{3}{n+1}\right)^{n+1}.$$

A bal oldalon a második tényező 1, így a kívánt egyenlőtlenséget kapjuk.

2. módszer A mértani és a számtani közép közötti egyenlőtlenséget alkalmazva

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{3}{n}\right)^n &= 1 \cdot \left(1 + \frac{3}{n}\right)^n < \left(\frac{1 + n \left(1 + \frac{3}{n}\right)}{n+1}\right)^{n+1} = \left(\frac{1 + n + 3}{n+1}\right)^{n+1} = \\ &= \left(1 + \frac{3}{n+1}\right)^{n+1}. \end{aligned}$$

(b) A mértani és a számtani közép közötti egyenlőtlenséget alkalmazva azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{3}{n}\right)^n &= 27 \cdot \frac{1}{27} \cdot \left(1 + \frac{3}{n}\right)^n = 27 \cdot \overset{1}{\frac{1}{3}} \cdot \overset{2}{\frac{1}{3}} \cdot \overset{3}{\frac{1}{3}} \cdot \overset{1}{\left(1 + \frac{3}{n}\right)} \cdot \dots \cdot \overset{n}{\left(1 + \frac{3}{n}\right)} < \\ &< 27 \cdot \left(\frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + n \cdot \left(1 + \frac{3}{n}\right)}{n+3}\right)^{n+3} = 27 \cdot \left(\frac{1 + n + 3}{n+3}\right)^{n+3} = \\ &= 27 \cdot \left(1 + \frac{1}{n+3}\right)^{n+3}. \end{aligned}$$

3. Kétféleképpen is belátjuk az egyenlőtlenség fennállását.

1. módszer. A mértani közép és a számtani közép közötti egyenlőtlenséget felhasználva azt

kapjuk, hogy

$$\frac{2^n - 1}{n} = \frac{2^{n-1} + 2^{n-2} + \dots + 4 + 2 + 1}{n} > \sqrt[n]{2^{n(n-1)/2}} = \sqrt{2^{n-1}},$$

ahonnan átrendezéssel

$$2^n > 1 + n\sqrt{2^{n-1}}$$

adódik.

2. módszer. (Teljes indukcióval.)

- Ha $n = 2$, akkor

$$2^2 = 4 > 1 + 2\sqrt{2} \quad \Longleftrightarrow \quad 3 > 2\sqrt{2} \quad \Longleftrightarrow \quad 9 > 8.$$

- Ha valamely $2 \leq n \in \mathbb{N}$ esetén

$$2^n > 1 + n\sqrt{2^{n-1}},$$

akkor

$$2^{n+1} = 2 \cdot 2^n > 2(1 + n\sqrt{2^{n-1}}).$$

Ha belátjuk, hogy

$$2(1 + n\sqrt{2^{n-1}}) > 1 + (n+1)\sqrt{2^n},$$

akkor igazoltuk az állítást. Mivel a

$$2(1 + n\sqrt{2^{n-1}}) > 1 + (n+1)\sqrt{2^n}$$

egyenlőtlenség a

$$2 + 2n\sqrt{2^{n-1}} = 2 + \sqrt{2}n\sqrt{2^n} > 1 + (n+1)\sqrt{2^n},$$

azaz a

$$(*) \quad 1 + \sqrt{2}n\sqrt{2^n} > (n+1)\sqrt{2^n}$$

egyenlőtlenséggel egyenértékű, és az iménti egyenlőtlenségben $\sqrt{2^n}$ együtthatóira:

$$\sqrt{2}n > n+1 \quad \Longleftrightarrow \quad (\sqrt{2}-1)n > 1,$$

azaz

$$n > \frac{1}{\sqrt{2}-1} = \frac{1}{\sqrt{2}-1} \cdot \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}+1} = \sqrt{2}+1,$$

ezért a (*) egyenlőtlenség minden $3 \leq n \in \mathbb{N}$ szám esetén fennáll. Ha pedig $n = 2$, akkor

$$1 + \sqrt{2} \cdot 2\sqrt{2^2} > 3 \cdot \sqrt{2^2} \iff 4 \cdot \sqrt{2} > 5 \iff 32 > 25.$$

4. **A $0 \leq r \leq 1$ eset bizonyítása.** Mivel $r \in \mathbb{Q}$, ezért alkalmas $p, q \in \mathbb{N}$, $p \leq q$ esetén $r = \frac{p}{q}$.

Tekintsük az

$$\underbrace{1, \dots, 1}_{q-p \text{ darab}}, \underbrace{(1+x), \dots, (1+x)}_{p \text{ darab}}$$

q -darab valós számot. Ezeknek a számoknak a mértani közepe, ill. számtani közepe:

$$(1+x)^{p/q}, \quad \text{ill.} \quad 1 + \frac{p}{q}x.$$

Így tehát

$$(1+x)^{p/q} \leq 1 + \frac{p}{q}x, \quad \text{azaz} \quad (1+x)^r \leq 1 + rx.$$

Az $r \geq 1$ eset bizonyítása. Mivel $x \in [-1, +\infty)$, ezért a $0 \leq r \leq 1$ esetben

$$(1+x)^r \leq 1 + rx \iff 1+x \leq \left(1 + \frac{p}{q}x\right)^{q/p}.$$

Ha most $y := \frac{p}{q}x$, akkor $x \geq -1$ következtében $y \geq -\frac{p}{q} \geq -1$. Innen $x = \frac{q}{p}y$, ill.

$$1 + \frac{q}{p}y \leq (1+y)^{q/p}$$

következik. Mivel $s := \frac{q}{p} \geq 1$, ezért a fentiek következtében

$$(1+y)^s \geq 1 + sy.$$

5. (a) Külön-külön igazoljuk az alsó, ill. a felső becslést.

- Az alsó becslés a következő módon látható be. Mivel minden $n \in \mathbb{N}$ esetén $-\frac{1}{2n} \geq -2$,

ezért Bernoulli-egyenlőtlenségből

$$\left(1 - \frac{1}{2n}\right)^n \geq 1 - \frac{n}{2n} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

következik.

- A felső becsléshez azt használjuk fel, hogy bármely $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\left(1 - \frac{1}{2n}\right)^n = \left(\frac{2n-1}{2n}\right)^n = \frac{1}{\left(\frac{2n}{2n-1}\right)^n} = \frac{1}{\left(\frac{2n-1+1}{2n-1}\right)^n} = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{2n-1}\right)^n},$$

továbbá $\frac{1}{2n-1} \geq -2$, így a Bernoulli-egyenlőtlenséget felhasználva azt kapjuk, hogy

$$\frac{1}{\left(1 + \frac{1}{2n-1}\right)^n} \leq \frac{1}{1 + \frac{n}{2n-1}} = \frac{2n-1}{3n-1} < \frac{2}{3} \quad \Longleftrightarrow \quad 6n-3 < 6n-2.$$

- (b) Világos, hogy bármely $2 \leq n \in \mathbb{N}$ esetén

$$n^n > (n+1)^{n-1} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{n^n}{(n+1)^n} > \frac{1}{n+1}.$$

Így a nyilvánvaló

$$\frac{n^n}{(n+1)^n} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \left(\frac{n+1-1}{n+1}\right)^n = \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^n$$

állítás és a Bernoulli-egyenlőtlenséget felhasználva azt kapjuk, hogy

$$\left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^n > 1 - \frac{n}{n+1} = \frac{1}{n+1},$$

azaz igaz az állítás.

- (c) Az egyenlőtlenség a mértani közép és a számtani közép közötti egyenlőtlenség, ill. a ??/3. gyakorló feladat triviális következménye:

$$\sqrt[n]{(n!)^3} = \sqrt[n]{(1 \cdot \dots \cdot n)^3} = \sqrt[n]{1^3 \cdot \dots \cdot n^3} \leq \frac{1^2 + \dots + n^3}{n} = \frac{n^2(n+1)^2}{4n} = \frac{n(n+1)^2}{4}.$$

Jól látható, hogy egyenlőség csak az $n = 1$ esetben van.

Megjegyzés. Ha

$$a_n := \frac{n^n(n+1)^{2n}}{4^n(n!)^3} \quad (n \in \mathbb{N}),$$

akkor az (a_n) sorozatra tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ esetén $a_n \geq 1$ teljesül, hiszen $a_1 = 1$, továbbá az

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{(n+1)^{n+1}(n+2)^{2n+2}}{4^{n+1}[(n+1)!]^3} \cdot \frac{4^n(n!)^3}{n^n(n+1)^{2n}} = \frac{1}{4} \left(\frac{n+2}{n+1}\right) \left(\frac{n+2}{n}\right)^n \left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n+1} = \\ &= \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{n+2}{n+1}\right) \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \end{aligned}$$

egyenlőségéből, ill. a Bernoulli-egyenlőtlenség felhasználásából

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{n+2}{n+1}\right) \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} &\geq \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{n+2}{n+1}\right) (1+2)(1+1) = \\ &= \frac{6}{4} \cdot \frac{n+2}{n+1} > \frac{6}{4} = \frac{3}{2} > 1 \end{aligned}$$

következik, ami azt jelenti, hogy az (a_n) sorozat monoton növekedő.

Látható, hogy

$$a_2 = \frac{81}{32} > \left(\frac{3}{2}\right)^2,$$

sőt teljes indukcióval az is megmutatható (**Házi feladat.**), hogy

$$a_n > \left(\frac{3}{2}\right)^n \quad (2 \leq n \in \mathbb{N}). \quad \blacksquare$$

6. A mértani és a számtani közép közötti egyenlőtlenség következménye, hogy bármely $a, b, c \in (0, +\infty)$ számra

$$a + \frac{1}{b} \geq 2\sqrt{a \cdot \frac{1}{b}}, \quad b + \frac{1}{c} \geq 2\sqrt{b \cdot \frac{1}{c}}, \quad c + \frac{1}{a} \geq 2\sqrt{c \cdot \frac{1}{a}}.$$

Így

$$\left(a + \frac{1}{b}\right) \left(b + \frac{1}{c}\right) \left(c + \frac{1}{a}\right) \geq 8\sqrt{a \cdot \frac{1}{b} \cdot b \cdot \frac{1}{c} \cdot c \cdot \frac{1}{a}} = 8 > 7. \quad \blacksquare$$

2. gyakorlat (2023. 03. 09.)

Emlékeztető. Legyen $\emptyset \neq \mathcal{H} \subset \mathbb{R}$. Azt mondtuk, hogy

1. a \mathcal{H} halmaz **alulról korlátos**, ha van olyan $k \in \mathbb{R}$, hogy bármely $x \in \mathcal{H}$ esetén $x \geq k$. Az ilyen k számot a \mathcal{H} halmaz **alsó korlátjának** neveztük.
2. a \mathcal{H} halmaz **felülről korlátos**, ha van olyan $K \in \mathbb{R}$, hogy bármely $x \in \mathcal{H}$ esetén $x \leq K$. Az ilyen K számot a \mathcal{H} halmaz **felső korlátjának** neveztük.
3. a \mathcal{H} halmaz **korlátos**, ha alulról és felülről is korlátos.

Megjegyzések.

1. Valamely számhalmazt megadó kifejezésből az esetek többségében nehéz látni a halmaz szerkezetét, ezért a korlátosságának vizsgálata általában nem egyszerű feladat. Ennek megoldásához gyakran használhatjuk a következő ötletet: valamilyen „alkalmas” módon átalakítjuk a szóban forgó kifejezést (ilyen átalakításokra példákat fogunk mutatni). Ezután már számos esetben könnyen megfogalmazható sejtés az alsó, ill. a felső korlátokra vonatkozóan. Ezek bizonyításához (sokszor triviális) egyenlőtlenségek fennállását kell majd belátnunk.
2. Sok esetben hasznos lehet halmazok szerkezetének feltárására az alábbi átalakítás ismerete: bármely $(a, b, c, d, x \in \mathbb{R}: c \neq 0, x \neq -d/c)$ esetén

$$\begin{aligned} \frac{ax+b}{cx+d} &= \frac{a}{c} \cdot \frac{x+\frac{b}{a}}{x+\frac{d}{c}} = \frac{a}{c} \cdot \frac{x+\frac{d}{c}+\frac{b}{a}-\frac{d}{c}}{x+\frac{d}{c}} = \frac{a}{c} \cdot \left[1 + \frac{\frac{bc-ad}{ac}}{x+\frac{d}{c}} \right] = \frac{a}{c} + \frac{\frac{bc-ad}{c^2}}{x+\frac{d}{c}} = \\ &= \frac{a}{c} + \frac{\frac{bc-ad}{c}}{cx+d} = \frac{a}{c} + \frac{bc-ad}{c} \cdot \frac{1}{cx+d} \end{aligned}$$

vagy

$$\begin{aligned} \frac{ax+b}{cx+d} &= \frac{a}{c} \cdot \frac{acx+bc}{acx+ad} = \frac{a}{c} \cdot \frac{acx+ad+bc-ad}{acx+ad} = \frac{a}{c} \cdot \left(1 + \frac{bc-ad}{acx+ad} \right) = \\ &= \frac{a}{c} + \frac{1}{c} \cdot \frac{bc-ad}{cx+d} = \frac{a}{c} + \frac{bc-ad}{c} \cdot \frac{1}{cx+d}. \end{aligned}$$

Példák.

1. A

$$\mathcal{H} := \left\{ \frac{1}{n} \in \mathbb{R} : n \in \mathbb{N} \right\}$$

halmaz alulról is és felülről is korlátos, ui. a 0, ill. az 1 alsó, ill. felső korlátja \mathcal{H} -nak:

$$0 < \frac{1}{n} \leq 1 \quad (n \in \mathbb{N}).$$

2. A

$$\mathcal{H} := \left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \in \mathbb{R} : n \in \mathbb{N} \right\}$$

halmaz alulról is és felülről is korlátos, ui. a 2, ill. a 3 alsó, ill. felső korlátja \mathcal{H} -nak:

$$2 \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < 3 \quad (n \in \mathbb{N}).$$

3. A

$$\mathcal{H} := \left\{ a + \frac{1}{a} \in \mathbb{R} : 0 < a \in \mathbb{R} \right\}$$

halmaz alulról korlátos, ui. 2 alsó korlátja \mathcal{H} -nak:

$$a + \frac{1}{a} = 2 \cdot \frac{a + \frac{1}{a}}{2} \geq 2 \cdot \sqrt{a \cdot \frac{1}{a}} = 2 \quad (0 < a \in \mathbb{R}).$$

4. A

$$\mathcal{H} := \left\{ \left| \frac{a}{b} + \frac{b}{a} \right| \in \mathbb{R} : a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \right\}$$

halmaz alulról korlátos, ui. 2 alsó korlátja \mathcal{H} -nak: ha $ab > 0$, akkor $\frac{a}{b}, \frac{b}{a} > 0$, így

$$\frac{a}{b} = \frac{1}{\frac{b}{a}} \quad \implies \quad \frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2;$$

ha pedig $ab < 0$, akkor $\frac{a}{b}, \frac{b}{a} < 0$, így

$$\frac{a}{b} = \frac{1}{\frac{b}{a}} \quad \implies \quad \frac{a}{b} + \frac{b}{a} \leq -2.$$

5. A

$$\mathcal{H} := \left\{ \left| \frac{x+1}{x-1} \right| + \left| \frac{x-1}{x+1} \right| \in \mathbb{R} : x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\} \right\}$$

halmaz alulról korlátos, ui. 2 alsó korlátja \mathcal{H} -nak: az

$$a := |x+1|, \quad \text{ill.} \quad b := |x-1|$$

helyettesítéssel látható, hogy bármely $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ esetén

$$\left| \frac{x+1}{x-1} \right| + \left| \frac{x-1}{x+1} \right| = \frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2.$$

6. A

$$\mathcal{H} := \left\{ \operatorname{tg}(\alpha) + \operatorname{ctg}(\alpha) \in \mathbb{R} : \alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \right\}$$

halmaz alulról korlátos, ui. 2 alsó korlátja \mathcal{H} -nak:

$$\operatorname{tg}(\alpha) + \operatorname{ctg}(\alpha) = \operatorname{tg}(\alpha) + \frac{1}{\operatorname{tg}(\alpha)} \geq 2 \quad \left(\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \right).$$

7. A

$$\mathcal{H} := \left\{ \frac{x^2+2}{\sqrt{x^2+1}} \in \mathbb{R} : x \in \mathbb{R} \right\}$$

halmaz alulról korlátos, ui. a 2 alsó korlátja \mathcal{H} -nak:

1. módszer. tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\frac{x^2+2}{\sqrt{x^2+1}} = \frac{x^2+1+1}{\sqrt{x^2+1}} = \sqrt{x^2+1} + \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \geq 2;$$

2. módszer. bármely $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\frac{x^2+2}{\sqrt{x^2+1}} \geq 2 \quad \Longleftrightarrow \quad x^2+1+1 \geq 2\sqrt{x^2+1} \quad \Longleftrightarrow \quad \left(\sqrt{x^2+1}-1\right)^2 \geq 0.$$

8. A

$$\mathcal{H} := \left\{ \frac{x^2}{1+x^4} \in \mathbb{R} : x \in \mathbb{R} \right\}$$

halmaz felülről korlátos, ui. az $\frac{1}{2}$ felső korlátja \mathcal{H} -nak:

1. módszer. ha $x = 0$, akkor az egyenlőtlenség triviálisan teljesül, ha pedig $0 \neq x \in \mathbb{R}$, akkor

$$\frac{x^2}{1+x^4} = \frac{1}{\frac{1}{x^2} + x^2} \leq \frac{1}{2};$$

2. módszer. minden $x \in \mathbb{R}$ számra

$$\frac{x^2}{1+x^4} \leq \frac{1}{2} \iff 2x^2 \leq 1+x^4 \iff (x^2-1)^2 \geq 0.$$

9. A

$$\mathcal{H} := \{2x^4 - 2x^3 - x^2 + 1 \in \mathbb{R} : x \in \mathbb{R}\}$$

halmaz alulról korlátos, ui. a 0 alsó korlátja \mathcal{H} -nak:

$$2x^4 - 2x^3 - x^2 + 1 \geq 0 \iff (x^2-1)^2 + (x^2-x)^2 \geq 0 \quad (x \in \mathbb{R}).$$

10. A

$$\mathcal{H} := \{a + b - ab \in \mathbb{R} : a, b \in \mathbb{R}\}$$

halmaz alulról is és felülről is korlátos, ui. a 0, ill. az 1 alsó, ill. felső korlátja \mathcal{H} -nak, hiszen ha $b \in (0, 1)$, akkor $1 - b > 0$, így bármely $a \in (0, 1)$ esetén

$$0 < a(1-b) < 1-b \iff 0 < a + b - ab < 1.$$

11. A

$$\mathcal{H} := \{ab - 5a^2 - 3b^2 \in \mathbb{R} : a, b \in \mathbb{R}\}$$

halmaz felülről korlátos, ui. a 0 felső korlátja \mathcal{H} -nak:

$$ab - 5a^2 - 3b^2 \leq 0 \iff -ab - 4a^2 - 4b^2 - (a-b)^2 \leq 0 \quad (a, b \in \mathbb{R}).$$

12. A

$$\mathcal{H} := \{a^2 + b^2 - ab - a - b + 1 \in \mathbb{R} : a, b \in \mathbb{R}\}$$

halmaz felülről alulról, ui. a 0 alsó korlátja \mathcal{H} -nak:

$$a^2 + b^2 - ab - a - b + 1 \geq 0 \iff (a-b)^2 + (a-1)^2 + (b-1)^2 \geq 0 \quad (a, b \in \mathbb{R}).$$

13. A

$$\mathcal{H} := \left\{ \frac{(a+b)(b+c)(a+c)}{abc} \in \mathbb{R} : 0 < a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$$

halmaz alulról korlátos, ui. a $\frac{128}{65}$ alsó korlátja \mathcal{H} -nak:

$$\begin{aligned} \frac{(a+b)(b+c)(a+c)}{abc} &= \frac{a+b}{a} \cdot \frac{b+c}{b} \cdot \frac{a+c}{c} = \left(1 + \frac{b}{a}\right) \left(1 + \frac{c}{b}\right) \left(1 + \frac{a}{c}\right) = \\ &= \left(1 + \frac{b}{a} + \frac{c}{b} + \frac{c}{a}\right) \left(1 + \frac{a}{c}\right) = 1 + \frac{b}{a} + \frac{c}{b} + \frac{c}{a} + \frac{a}{c} + \frac{b}{c} + \frac{a}{b} + 1 = \\ &= 2 + \underbrace{\frac{a}{b} + \frac{b}{a}}_{\geq 2} + \underbrace{\frac{b}{c} + \frac{c}{b}}_{\geq 2} + \underbrace{\frac{a}{c} + \frac{c}{a}}_{\geq 2} \geq 8. \end{aligned}$$

és

$$8 \geq \frac{128}{65} \iff 520 \geq 128.$$

14. A

$$\mathcal{H} := \left\{ \left(1 + \frac{x}{y}\right)^2 + \left(1 + \frac{y}{z}\right)^2 + \left(1 + \frac{z}{x}\right)^2 \in \mathbb{R} : 0 < x, y, z \in \mathbb{R} \right\}$$

halmaz alulról korlátos, ui. a 12 alsó korlátja \mathcal{H} -nak: bármely $a, b \in (0, +\infty)$ esetén

$$\frac{1 + \frac{a}{b}}{2} \geq \sqrt{\frac{a}{b}},$$

ezért

$$\left(1 + \frac{a}{b}\right)^2 \geq 4 \cdot \frac{a}{b}.$$

A mértani és a számtani közép közötti egyenlőtlenség felhasználásával így azt kapjuk, hogy

$$\left(1 + \frac{x}{y}\right)^2 + \left(1 + \frac{y}{z}\right)^2 + \left(1 + \frac{z}{x}\right)^2 \geq 4 \left(\frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x}\right) \geq 4 \cdot 3 \cdot \sqrt[3]{\frac{x}{y} \cdot \frac{y}{z} \cdot \frac{z}{x}} = 12. \quad \blacksquare$$

Feladat. Fogalmazzuk meg pozitív állítás formájában azt, hogy a $\mathcal{H} \subset \mathbb{R}$ halmaz alulról, ill. felülről nem korlátos!

Útm. A definíció szerint valamely $\emptyset \neq \mathcal{H} \subset \mathbb{R}$ halmaz

- **alulról nem korlátos**, ha

$$\neg (\exists k \in \mathbb{R} \quad \forall x \in \mathcal{H} : \quad x \geq k) \iff (\forall k \in \mathbb{R} \quad \exists x \in \mathcal{H} : \quad x < k);$$

- **felülről nem korlátos**, ha

$$\neg (\exists K \in \mathbb{R} \quad \forall x \in \mathcal{H} : \quad x \leq K) \quad \Longleftrightarrow \quad (\forall K \in \mathbb{R} \quad \exists x \in \mathcal{H} : \quad x > K).$$

Feladat. Igazoljuk, hogy a

$$\mathcal{H} := \left\{ \frac{x^2 + 2x + 3}{x + 1} \in \mathbb{R} : 1 \leq x \in \mathbb{R} \right\}$$

halmaz felülről nem korlátos!

Útm. Mivel bármely $1 \leq x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\frac{x^2 + 2x + 3}{x + 1} \stackrel{x \geq 1}{\geq} \frac{x^2}{x + 1} \geq \frac{x^2}{x + x} = \frac{x^2}{2x} = \frac{x}{2},$$

ezért tetszőleges $0 < K \in \mathbb{R}$ esetén igaz az

$$\frac{x}{2} > K \quad \Longrightarrow \quad \frac{x^2 + 2x + 3}{x + 1} > K$$

implikáció. Következésképpen az

$$x := 2K + 1 \in [1, +\infty)$$

jó választás. ■

Emlékeztető. Legyen $\emptyset \neq \mathcal{H} \subset \mathbb{R}$. Azt mondtuk, hogy a \mathcal{H} halmaznak **van**

- **maximuma**, ha

$$\exists \alpha \in \mathcal{H} \quad \forall x \in \mathcal{H} : \quad x \leq \alpha.$$

Ekkor α -t a \mathcal{H} halmaz **maximumának** nevezzük és a $\max(\mathcal{H})$ szimbólummal jelöljük.

- **minimuma**, ha

$$\exists \beta \in \mathcal{H} \quad \forall x \in \mathcal{H} : \quad x \geq \beta.$$

Ekkor β -t a \mathcal{H} halmaz **minimumának** nevezzük és a $\min(\mathcal{H})$ szimbólummal jelöljük.

Megjegyzések.

1. Ha a \mathcal{H} halmaznak van maximuma, akkor $\max(\mathcal{H})$ egyben felső korlátja \mathcal{H} -nak.

2. Ha a \mathcal{H} halmaznak van minimuma, akkor $\min(\mathcal{H})$ egyben alsó korlátja \mathcal{H} -nak.
3. A \mathcal{H} halmaznak pontosan akkor **nincsen maximuma**, ha bármely \mathcal{H} -beli eleménél van nagyobb \mathcal{H} -beli elem:

$$\forall \alpha \in \mathcal{H} \exists x \in \mathcal{H} : \quad x > \alpha.$$

4. A \mathcal{H} halmaznak pontosan akkor **nincsen minimuma**, ha bármely \mathcal{H} -beli eleménél van kisebb \mathcal{H} -beli elem:

$$\forall \beta \in \mathcal{H} \exists x \in \mathcal{H} : \quad x < \beta.$$

Példák.

1. A

$$\mathcal{H} := \left\{ \frac{1}{n} \in \mathbb{R} : n \in \mathbb{N} \right\}$$

halmaz esetén $\max(\mathcal{H}) = 1$, ui. $1 \in \mathcal{H}$ ($n = 1$) és bármely $n \in \mathbb{N}$ esetén $\frac{1}{n} \leq 1$. A \mathcal{H} halmaznak nincsen minimuma, hiszen bármely $n \in \mathbb{N}$ esetén $(n + 1)$ -re

$$\mathcal{H} \ni \frac{1}{n} > \frac{1}{n+1} \in \mathcal{H} \quad (\text{ui.} \quad \Longleftrightarrow \quad n+1 > n).$$

2. A

$$\mathcal{H} := \left\{ 1 - \frac{1}{n} \in \mathbb{R} : n \in \mathbb{N} \right\}$$

halmaz esetén $\min(\mathcal{H}) = 0$, ui. $0 \in \mathcal{H}$ ($n = 1$) és bármely $n \in \mathbb{N}$ esetén $0 \leq 1 - \frac{1}{n}$. A \mathcal{H} halmaznak nincsen maximuma, hiszen bármely $n \in \mathbb{N}$ esetén $(n + 1)$ -re

$$\mathcal{H} \ni 1 - \frac{1}{n+1} > 1 - \frac{1}{n} \in \mathcal{H} \quad (\text{ui.} \quad \Longleftrightarrow \quad n+1 > n). \quad \blacksquare$$

A következő, alapvető fontosságú tétel azt mondja ki, hogy minden (nem-üres)

- felülről korlátos halmaz felső korlátai között van legkisebb, azaz a **felső korlátok halmazának van minimuma**;
- alulról korlátos halmaz alsó korlátai között van legnagyobb, azaz az **alsó korlátok halmazának van maximuma**.

Tétel. Legyen $\emptyset \neq \mathcal{H} \subset \mathbb{R}$. Ha a \mathcal{H} halmaz

1. felülről korlátos, akkor, akkor felső korlátai között van legkisebb: az

$$\mathcal{F} := \{K \in \mathbb{R} : K \text{ felső korlátja } \mathcal{H}\text{-nak}\}$$

halmaznak van minimuma.

2. alulról korlátos, akkor, akkor alsó korlátai között van legnagyobb: az

$$\mathcal{A} := \{k \in \mathbb{R} : k \text{ alsó korlátja } \mathcal{H}\text{-nak}\}$$

halmaznak van maximuma.

Definíció.

1. A felülről korlátos $\emptyset \neq \mathcal{H} \subset \mathbb{R}$ számhalmaz legkisebb felső korlátját a számhalmaz **felső határának**, más szóval **szuprémumának** vagy **lényeges felső korlátjának** nevezzük és a $\sup(\mathcal{H})$ szimbólummal jelöljük: $\sup(\mathcal{H}) := \min(\mathcal{F}) \in \mathbb{R}$.
2. Az alulról korlátos $\emptyset \neq \mathcal{H} \subset \mathbb{R}$ számhalmaz legnagyobb alsó korlátját a számhalmaz **alsó határának**, más szóval **infimumának** vagy **lényeges alsó korlátjának** nevezzük és az $\inf(\mathcal{H})$ szimbólummal jelöljük: $\inf(\mathcal{H}) := \max(\mathcal{A}) \in \mathbb{R}$.

Példák.

1. A $\mathcal{H} := [-1, 1]$ halmaz esetében

$$\inf(\mathcal{H}) = \min(\mathcal{H}) = -1, \quad \sup(\mathcal{H}) = \max(\mathcal{H}) = 1;$$

2. A $\mathcal{H} := (-1, 1]$ halmaz esetében

$$\inf(\mathcal{H}) = -1, \nexists \min(\mathcal{H}), \quad \sup(\mathcal{H}) = \max(\mathcal{H}) = 1.$$

Megjegyezzük, hogy a $\nexists \min(\mathcal{H})$ állítás a következőképpen látható be. Ha lenne \mathcal{H} -nak minimuma: $\xi \in \mathcal{H} \subset (-1, 1]$, akkor az

$$\eta := \frac{-1 + \xi}{2} < \xi,$$

számra $\eta \in (-1, 1] = \mathcal{H}$ teljesülne, ami nem lehetséges.

Megjegyzések.

1. Világos, hogy

(a) $\exists \min(\mathcal{H}) \iff \inf(\mathcal{H}) \in \mathcal{H}$. Ebben az esetben $\inf(\mathcal{H}) = \min(\mathcal{H})$.

(b) $\exists \max(\mathcal{H}) \iff \sup(\mathcal{H}) \in \mathcal{H}$. Ebben az esetben $\sup(\mathcal{H}) = \max(\mathcal{H})$.


2. Az $\inf(\mathcal{H}) = \alpha$ állítás azt jelenti, hogy

- α a \mathcal{H} halmaz alsó korlátja:

$$\forall x \in \mathcal{H} : x \geq \alpha,$$

- bármely α -nál nagyobb szám már nem alsó korlátja \mathcal{H} -nak:

$$\forall \alpha > \alpha \exists x \in \mathcal{H} : x < \alpha \iff (\forall \varepsilon > 0 \exists x \in \mathcal{H} : x < \alpha + \varepsilon).$$




3. A $\sup(\mathcal{H}) = \beta$ állítás azt jelenti, hogy

- β a \mathcal{H} halmaz felső korlátja:

$$\forall x \in \mathcal{H} : x \leq \beta,$$

- bármely β -nél kisebb szám \mathcal{H} -nak már nem felső korlátja:

$$(\forall b < \beta \exists x \in \mathcal{H} : x > b) \iff (\forall \varepsilon > 0 \exists x \in \mathcal{H} : x > \beta - \varepsilon).$$



Feladat. Vizsgáljuk az \mathcal{H} halmazt korlátosság szempontjából! Határozzuk meg $\inf \mathcal{H}$ -t és $\sup \mathcal{H}$ -t! Van-e a \mathcal{H} halmaznak legkisebb, ill. legnagyobb eleme?

$$1. \mathcal{H} := \left\{ \frac{1}{x} \in \mathbb{R} : x \in (0, 1] \right\};$$

$$2. \mathcal{H} := \left\{ \frac{5n+3}{8n+1} \in \mathbb{R} : n \in \mathbb{N}_0 \right\};$$

$$3. \mathcal{H} := \left\{ \frac{x+1}{2x+3} \in \mathbb{R} : 0 \leq x \in \mathbb{R} \right\};$$

$$4. \mathcal{H} := \left\{ \frac{2x+3}{3x+1} \in \mathbb{R} : x \in \mathbb{Z} \right\};$$

$$5. \mathcal{H} := \left\{ \frac{2|x|+3}{3|x|+1} \in \mathbb{R} : -2 \leq x \in \mathbb{R} \right\};$$

$$6. \mathcal{H} := \left\{ \sqrt{x+1} - \sqrt{x} \in \mathbb{R} : 0 \leq x \in \mathbb{R} \right\}.$$

Útm.

1. • \mathcal{H} alulról korlátos, ugyanis 0 nyilván alsó korlátja \mathcal{H} -nak, sőt minden $x \in (0, 1]$ esetén

$$\frac{1}{x} \geq \frac{1}{1} = 1,$$

ezért 1 is alsó korlátja \mathcal{H} -nak. Mivel $x = 1$ esetén

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{1} = 1 \in \mathcal{H},$$

ezért \mathcal{H} -nak van legkisebb eleme (minimuma):

$$\min \mathcal{H} = 1, \quad \text{így} \quad \inf \mathcal{H} = \min \mathcal{H} = 1.$$

- Ha x elég közel van 0-hoz, akkor $\frac{1}{x}$ értéke igen nagy. Így sejtethető, hogy a \mathcal{H} halmaz felülről nem korlátos. Ennek megmutatásához azt kell belátni, hogy


$$\forall K \in \mathbb{R}\text{-hoz } \exists x \in (0, 1]: \quad \frac{1}{x} > K.$$

Legyen $K > 0$ tetszőlegesen rögzített szám. Ekkor

$$\frac{1}{x} > K, \quad \text{ha} \quad 0 < x < \frac{1}{K}.$$

Így pl. az $x := \frac{1}{K+1} < 1$ megfelelő, ami azt mutatja, hogy a \mathcal{H} halmaz felülről nem korlátos.

Megjegyzés. A kapott eredmények az $\frac{1}{x}$ ($x > 0$) függvény grafikonjáról is leolvashatók:



Összefoglalva: a \mathcal{H} halmaz alulról korlátos, felülről nem,

$$\inf \mathcal{H} = \min \mathcal{H} = 1, \quad \sup \mathcal{H} = +\infty.$$

2. A \mathcal{H} halmaz szerkezetének feltárásához először az

$$\frac{5n+3}{8n+1}$$

törtet a gyakorlat elején leírt módon átalakítjuk. Világos, hogy bármely $n \in \mathbb{N}_0$ esetén

$$\frac{5n+3}{8n+1} = \frac{5}{8} \cdot \frac{n+\frac{3}{5}}{n+\frac{1}{8}} = \frac{5}{8} \cdot \frac{n+\frac{1}{8}+\frac{3}{5}-\frac{1}{8}}{n+\frac{1}{8}} = \frac{5}{8} + \frac{5}{8} \cdot \frac{19}{40} \cdot \frac{1}{n+\frac{1}{8}} = \frac{5}{8} + \frac{19}{8} \cdot \frac{1}{8n+1} > \frac{5}{8}$$

vagy

$$\begin{aligned} \frac{5n+3}{8n+1} &= \frac{5}{8} \cdot \frac{40n+24}{40n+5} = \frac{5}{8} \cdot \frac{40n+5+19}{40n+5} = \frac{5}{8} \cdot \left(1 + \frac{19}{40n+5}\right) = \\ &= \frac{5}{8} + \frac{5}{8} \cdot \frac{19}{40n+5} = \frac{5}{8} + \frac{19}{8} \cdot \frac{1}{8n+1} > \frac{5}{8}. \end{aligned}$$

- Mivel bármely $n \in \mathbb{N}_0$ esetén

$$\frac{5n+3}{8n+1} = \frac{5}{8} + \frac{19}{8} \cdot \frac{1}{8n+1} \leq \frac{5}{8} + \frac{19}{8} \cdot \frac{1}{8 \cdot 0 + 1} = 3,$$

ezért

$$\max \mathcal{H} = \sup \mathcal{H} = 3,$$

ui. 3 felső korlát és $3 \in \mathcal{H}$.

- $\inf \mathcal{H} = \frac{5}{8}$, ui. $\frac{5}{8}$ alsó korlát és minden $\varepsilon > 0$ -hoz van olyan $N \in \mathbb{N}_0$, hogy

$$\frac{5}{8} + \frac{19}{8} \cdot \frac{1}{8N+1} < \frac{5}{8} + \varepsilon \quad \Longleftrightarrow \quad N > \frac{1}{8} \left(\frac{19}{8\varepsilon} - 1 \right)$$

és

$$N := \max \left\{ 0, \left[\left(\frac{19}{8\varepsilon} - 1 \right) \frac{1}{8} \right] + 1 \right\}$$

ilyen. Világos, hogy $\nexists \min \mathcal{H}$, mivel

$$\forall a \in \mathcal{H} : \quad a > \inf \mathcal{H} = \frac{5}{8}.$$

Összefoglalva: a \mathcal{H} halmaz alulról korlátos, felülről nem,

$$\inf \mathcal{H} = \frac{5}{8}, \quad \min \mathcal{H} = 1, \quad \max \mathcal{H} = \sup \mathcal{H} = 3.$$

3. • Világos, hogy bármely $0 \leq x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\frac{x+1}{2x+3} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2x+2}{2x+3} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2x+3-1}{2x+3} = \frac{1}{2} \cdot \left(1 - \frac{1}{2x+3} \right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2x+3}.$$

- Mivel

$$\mathcal{H} \ni \frac{x+1}{2x+3} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2x+3} \geq \frac{1}{2} - \frac{1}{4 \cdot 0 + 6} = \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{1}{3},$$

ezért

$$\inf(\mathcal{H}) = \min(\mathcal{H}) = \frac{1}{3}.$$

- Mivel bármely $0 \leq x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\frac{1}{2x+3} > 0,$$

ezért

$$\mathcal{H} \ni \frac{x+1}{2x+3} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2x+3} < \frac{1}{2},$$

azaz $\frac{1}{2}$ felső korlátja \mathcal{H} -nak.

- Mivel nagy x -ekre $\frac{1}{2x+3}$ igen kicsi, ezért sejthető, hogy \mathcal{H} -nak nincsen $\frac{1}{2}$ -nél kisebb felső korlátja:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists x \in [0, +\infty) : \quad \mathcal{H} \ni \frac{x+1}{2x+3} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2x+3} > \frac{1}{2} - \varepsilon.$$

Ez azzal egyenértékű, hogy $\frac{1}{4x+6} < \varepsilon$, azaz hogy $\frac{1}{\varepsilon} - 6 < 4x$. Ilyen $x \geq 0$ nyilván létezik.

Következésképpen $\sup(\mathcal{H}) = \frac{1}{2}$. Világos, hogy $\nexists \max(\mathcal{H})$, mivel $\frac{1}{2} \notin \mathcal{H}$.

Összefoglalva: a \mathcal{H} halmaz alulról és felülről is korlátos,

$$\inf(\mathcal{H}) = \min(\mathcal{H}) = \frac{1}{3}, \quad \sup(\mathcal{H}) = \frac{1}{2}, \quad \nexists \max(\mathcal{H}).$$

4. • Világos, hogy bármely $x \in \mathbb{Z}$ esetén

$$\frac{2x+3}{3x+1} = \frac{2}{3} \cdot \frac{6x+9}{6x+2} = \frac{2}{3} \cdot \frac{6x+2+7}{6x+2} = \frac{2}{3} \cdot \left(1 + \frac{7}{6x+2}\right) = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{7}{6x+2} = \frac{2}{3} + \frac{7}{3} \cdot \frac{1}{3x+1}.$$

- Ha $x < 0$, akkor $\frac{7}{3} \cdot \frac{1}{3x+1} < 0$, míg $x \geq 0$ esetén

$$0 \leq \frac{7}{3} \cdot \frac{1}{3x+1} \leq \frac{7}{3}.$$

Ezért

$$\frac{2x+3}{3x+1} \leq \frac{2}{3} + \frac{7}{3} = 3$$

és $x = 0$ -ra

$$\frac{2 \cdot 0 + 3}{3 \cdot 0 + 1} = 3.$$

Tehát a \mathcal{H} halmaznak van maximuma és $\max(\mathcal{H}) = 3$, következésképpen $\sup(\mathcal{H}) = 3$.

- Ha $x = -1$, akkor

$$\frac{2(-1)+3}{3(-1)+1} = -\frac{1}{2}.$$

Lássuk be, hogy

$$\frac{2x+3}{3x+1} \geq -\frac{1}{2} \quad (x \in \mathbb{Z})$$

teljesül. Ui. ez azzal ekvivalens, hogy

$$\frac{2x+3}{3x+1} + \frac{1}{2} = 7 \cdot \frac{x+1}{3x+1} \geq 0 \quad (x \in \mathbb{Z}),$$

ami igaz. Tehát

$$\min(\mathcal{H}) = \inf(\mathcal{H}) = -1/2.$$

Összefoglalva: a \mathcal{H} halmaz alulról és felülről is korlátos,

$$\inf(\mathcal{H}) = \min(\mathcal{H}) = -\frac{1}{2}, \quad \sup(\mathcal{H}) = \max(\mathcal{H}) = 3.$$

5. • Világos, hogy bármely $-2 \leq x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\frac{2|x|+3}{3|x|+1} = \frac{2}{3} \cdot \frac{6|x|+9}{6|x|+2} = \frac{2}{3} \cdot \frac{6|x|+2+7}{6|x|+2} = \frac{2}{3} \left(1 + \frac{7}{6|x|+2} \right) = \frac{2}{3} + \frac{7}{3} \cdot \frac{1}{3|x|+1}.$$

- Mivel tetszőleges $-2 \leq x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\frac{7}{3} \cdot \frac{1}{3|x|+1} > 0,$$

ezért

$$\mathcal{H} \ni \frac{2|x|+3}{3|x|+1} = \frac{2}{3} + \frac{7}{3} \cdot \frac{1}{3|x|+1} > \frac{2}{3},$$

azaz a \mathcal{H} halmaz alulról korlátos, és $\frac{2}{3}$ alsó korlátja \mathcal{H} -nak.

- Látható, hogy az

$$\frac{1}{3|x|+1}$$

tört az x nagy értékeire igen közel van 0-hoz, ezért a \mathcal{H} halmaz elemei nagy x -ekre $\frac{2}{3}$ -hoz közeli értékeket vesznek fel. Sejthető tehát, hogy \mathcal{H} -nak nincsen $\frac{2}{3}$ -nál nagyobb alsó korlátja:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists x \in [-2, +\infty) : \quad \mathcal{H} \ni \frac{2}{3} + \frac{7}{3} \cdot \frac{1}{3|x|+1} < \frac{2}{3} + \varepsilon.$$

Valóban, a tetszőleges $x \in [-2, +\infty)$ esetén fennálló

$$\frac{2}{3} + \frac{7}{3} \cdot \frac{1}{3|x|+1} < \frac{2}{3} + \varepsilon \iff \frac{7}{3} \cdot \frac{1}{3|x|+1} < \varepsilon \iff \frac{7}{\varepsilon} < 9|x|+3 \iff |x| > \frac{7}{9\varepsilon} - \frac{1}{3}$$

ekvivalencia-lánc következtében tetszőleges $\varepsilon > 0$ számhoz van olyan $h \in \mathcal{H}$, amelyre

$$h < \frac{2}{3} + \varepsilon.$$

Így

$$\inf(\mathcal{H}) = \frac{2}{3} \quad \text{és} \quad \nexists \min(\mathcal{H}), \quad \text{ui.} \quad \frac{2}{3} \notin \mathcal{H}.$$

- Mivel bármely $x \in [-2, +\infty)$ esetén

$$\mathcal{H} \ni \frac{2|x|+3}{3|x|+1} = \frac{2}{3} + \frac{7}{3} \cdot \frac{1}{3|x|+1} \leq \frac{2}{3} + \frac{7}{3} \cdot \frac{1}{3|0|+1} = \frac{2|0|+3}{3|0|+1} = \frac{3}{1},$$

ezért \mathcal{H} -nak van legnagyobb eleme: $\max(\mathcal{H}) = 3$. Következésképpen

$$\sup(\mathcal{H}) = \max(\mathcal{H}) = 3.$$

Összefoglalva: a \mathcal{H} halmaz alulról és felülről is korlátos,

$$\inf(\mathcal{H}) = \frac{2}{3}, \quad \nexists \min(\mathcal{H}), \quad \sup(\mathcal{H}) = \max(\mathcal{H}) = 3.$$

Megjegyezzük, hogy az $y := |x|$ helyettesítéssel jól látható, hogy

$$\left\{ \frac{2|x|+3}{3|x|+1} \in \mathbb{R} : -2 \leq x \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ \frac{2y+3}{3y+1} \in \mathbb{R} : 0 \leq y \in \mathbb{R} \right\}$$

ami némileg egyszerűsíti a megoldást.

6. • Mivel bármely $0 \leq x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = (\sqrt{x+1} - \sqrt{x}) \cdot 1 = (\sqrt{x+1} - \sqrt{x}) \cdot \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}$$

és

$$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \geq 1 \quad (0 \leq x \in \mathbb{R}),$$

ezért

$$0 < \sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} \leq 1 \quad (0 \leq x \in \mathbb{R}).$$

Ez azt jelenti, hogy a \mathcal{H} halmaz korlátos, továbbá 0, ill. 1 alsó, ill. felső korlátja \mathcal{H} -nak.

- Mivel $x = 0$ esetén $\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = 1$ ezért $1 \in \mathcal{H}$, következésképpen $\max(\mathcal{H}) = 1$, és így $\sup(\mathcal{H}) = 1$.
- Látható, hogy ha x elég nagy, akkor

$$\frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}$$

igen kicsi. Sejthető tehát, hogy \mathcal{H} -nak nincsen 0-nál nagyobb alsó korlátja:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists x \in [0, +\infty) : \mathcal{H} \ni \sqrt{x+1} - \sqrt{x} < 0 + \varepsilon = \varepsilon.$$

Mivel tetszőleges $0 \leq x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} \leq \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}} < \varepsilon \iff x > \frac{1}{4\varepsilon^2},$$

ezért $\inf(\mathcal{H}) = 0$. Mivel $0 \notin \mathcal{H}$, ezért \mathcal{H} -nak nincsen legkisebb eleme.

Összefoglalva: a \mathcal{H} halmaz alulról és felülről is korlátos,

$$\inf(\mathcal{H}) = 0, \quad \nexists \min(\mathcal{H}), \quad \sup(\mathcal{H}) = \max(\mathcal{H}) = 1. \quad \blacksquare$$

Házi feladat. Van-e a

$$\mathcal{H} := \left\{ 2 - \frac{1}{n} \in \mathbb{R} : n \in \mathbb{N} \right\}$$

halmaznak maximuma, ill. minimuma?

Útm.

1. lépés. Megmutatjuk, hogy

$$\sup \mathcal{H} = 2 \quad \text{és} \quad \inf \mathcal{H} = \min \mathcal{H} = 1.$$

Valóban,

- a 2 szám felső korlátja \mathcal{H} -nak, hiszen bármely $n \in \mathbb{N}$ esetén $2 - \frac{1}{n} < 2$. A 2 a legisebb felső korlát, ui. ha $\varepsilon > 0$, akkor van a $2 - \varepsilon$ számnál nagyobb \mathcal{H} -beli elem, azaz alkalmas $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$2 - \frac{1}{n} > 2 - \varepsilon \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{1}{\varepsilon} < n.$$

Ez pedig igaz, hiszen \mathbb{N} felülről nem korlátos.

- az 1 szám alsó korlátja \mathcal{H} -nak, hiszen bármely $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$1 \leq 2 - \frac{1}{n} \quad \Longleftrightarrow \quad 0 \leq 1 - \frac{1}{n} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{1}{n} \leq 1.$$

Mivel $1 \in \mathcal{H}$ (hiszen $n = 1$ esetén $2 - \frac{1}{1} = 2 - 1 = 1$), ezért

$$\inf \mathcal{H} = \min \mathcal{H} = 1.$$

2. lépés. Mivel $2 \notin \mathcal{H}$ (nincsen olyan $n \in \mathbb{N}$, amelyre

$$2 - \frac{1}{n} = 2$$

volna), ezért \mathcal{H} -nak nincsen maximuma.

Megjegyezzük, hogy ez így is belátható: ha $h \in \mathcal{H}$ tetszőleges, akkor van olyan $n \in \mathbb{N}$, hogy

$$h = 2 - \frac{1}{n}.$$

Ha most $m := n + 1$ akkor a $k := 2 - \frac{1}{m} \in \mathcal{H}$ elemre

$$k = 2 - \frac{1}{m} > 2 - \frac{1}{n} = h.$$

Gyakorló feladat. Vizsgáljuk az \mathcal{H} halmazt korlátosság szempontjából! Határozzuk meg $\inf \mathcal{H}$ -t és $\sup \mathcal{H}$ -t! Van-e a \mathcal{H} halmaznak legkisebb, ill. legnagyobb eleme?

1. $\mathcal{H} := \left\{ \frac{x^2 + 1}{4x^2 + 3} \in \mathbb{R} : x \in [2, +\infty) \right\};$
2. $\mathcal{H} := \left\{ \frac{5 \cdot 5^n + 1}{2 \cdot 5^n + 3} \in \mathbb{R} : n \in \mathbb{N} \right\};$
3. $\mathcal{H} := \left\{ \frac{\sqrt{x} - 1}{5\sqrt{x} + 2} \in \mathbb{R} : x \in [4, +\infty) \right\};$
4. $\mathcal{H} := \left\{ \frac{x}{y} \in \mathbb{R} : x \in (0, 1), y \in (0, x) \right\};$
5. $\mathcal{H} := \left\{ \frac{2 + \sqrt{x}}{3\sqrt{x} + 1} \in \mathbb{R} : x \in [1/9, +\infty) \right\}.$
6. $\mathcal{H} := \left\{ \frac{5x - 1}{2x + 3} \in \mathbb{R} : x \in [3, +\infty) \right\}.$

Útm.

1. • Mivel minden $x \in [2, +\infty)$ esetén

$$(*) \quad \frac{x^2 + 1}{4x^2 + 3} = \frac{1}{4} \cdot \frac{4x^2 + 4}{4x^2 + 3} = \frac{1}{4} \cdot \frac{4x^2 + 3 + 1}{4x^2 + 3} = \frac{1}{4} \cdot \left(1 + \frac{1}{4x^2 + 3} \right) = \frac{1}{4} + \frac{1}{16x^2 + 12}$$

és

$$\frac{1}{16x^2 + 12} > 0,$$

ezért

$$\mathcal{H} \ni \frac{x^2 + 1}{4x^2 + 3} > \frac{1}{4},$$

azaz $\frac{1}{4}$ alsó korlátja \mathcal{H} -nak.

- Megmutatjuk, hogy $\frac{1}{4}$ a legnagyobb alsó korlát: $\inf(\mathcal{H}) = \frac{1}{4}$. Valóban, bármely $\varepsilon > 0$ szám

esetén pontosan akkor van olyan $h \in \mathcal{H}$, hogy $h < \frac{1}{4} + \varepsilon$, ha alkalmas $x \in [2, +\infty)$ számra

$$\frac{1}{4} + \varepsilon > h := \frac{1}{4} + \frac{1}{16x^2 + 12} \iff \varepsilon > \frac{1}{16x^2 + 12} \iff x^2 > \frac{1}{16\varepsilon} - \frac{3}{4}.$$

Világos, hogy pl. az

$$x := \sqrt{\frac{1}{16\varepsilon}} + 2 = \frac{1}{4\sqrt{\varepsilon}} + 2 > 2$$

szám ilyen.

- Mivel $\frac{1}{4} \notin \mathcal{H}$, ezért \mathcal{H} -nak nincsen legkisebb eleme.
- A (*) felbontásból az is látható, hogy bármely $x \in [2, +\infty)$ esetén

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{16x^2 + 12} \leq \frac{1}{4} + \frac{1}{16 \cdot 2^2 + 12} = \frac{5}{19} \in \mathcal{H}.$$

Ez azt jelenti, hogy $\sup(\mathcal{H}) = \max(\mathcal{H}) = \frac{5}{19}$.

Összefoglalva: a \mathcal{H} halmaz alulról és felülről is korlátos,

$$\inf(\mathcal{H}) = \frac{1}{4}, \quad \nexists \min(\mathcal{H}), \quad \sup(\mathcal{H}) = \max(\mathcal{H}) = \frac{5}{19}.$$

2. • Mivel minden $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\begin{aligned} (*) \quad \frac{5 \cdot 5^n + 1}{2 \cdot 5^n + 3} &= \frac{5}{2} \cdot \frac{10 \cdot 5^n + 2}{10 \cdot 5^n + 15} = \frac{5}{2} \cdot \frac{10 \cdot 5^n + 15 - 13}{10 \cdot 5^n + 15} = \frac{5}{2} \cdot \left(1 - \frac{13}{10 \cdot 5^n + 15}\right) = \\ &= \frac{5}{2} - \frac{13}{4 \cdot 5^n + 6} \end{aligned}$$

és

$$\frac{13}{4 \cdot 5^n + 6} > 0,$$

ezért

$$\frac{5 \cdot 5^n + 1}{2 \cdot 5^n + 3} < \frac{5}{2},$$

azaz $\frac{5}{2}$ felső korlátja \mathcal{H} -nak.

- Megmutatjuk, hogy $\frac{5}{2}$ a legkisebb felső korlát: $\sup(\mathcal{H}) = \frac{5}{2}$. Valóban, bármely $\varepsilon > 0$ szám esetén pontosan akkor van olyan $h \in \mathcal{H}$, hogy $h > \frac{5}{2} - \varepsilon$, ha alkalmas $n \in \mathbb{N}$ számra

$$\frac{5}{2} - \varepsilon < h := \frac{5}{2} - \frac{13}{4 \cdot 5^n + 6} \iff \varepsilon > \frac{13}{4 \cdot 5^n + 6} \iff 5^n > \frac{13}{4\varepsilon} - \frac{6}{4}.$$

Nem nehéz belátni, hogy van ilyen n .

- Mivel $\frac{5}{2} \notin \mathcal{H}$, ezért \mathcal{H} -nak nincsen legnagyobb eleme.
- A $(*)$ felbontásból az is látható, hogy bármely $n \in \mathbb{N}_0$ esetén

$$\frac{5}{2} - \frac{13}{4 \cdot 5^n + 6} \geq \frac{5}{2} - \frac{13}{4 \cdot 5^0 + 6} = \frac{6}{5} \in \mathcal{H}.$$

Ez azt jelenti, hogy $\inf(\mathcal{H}) = \min(\mathcal{H}) = \frac{6}{5}$.

Összefoglalva: a \mathcal{H} halmaz alulról és felülről is korlátos,

$$\inf(\mathcal{H}) = \min(\mathcal{H}) = \frac{6}{5}, \quad \sup(\mathcal{H}) = \frac{5}{2}, \quad \nexists \max(\mathcal{H}).$$

3. • Mivel minden $x \in [4, +\infty)$ esetén

$$(*) \quad \frac{\sqrt{x}-1}{5\sqrt{x}+2} = \frac{1}{5} \cdot \frac{5\sqrt{x}-5}{5\sqrt{x}+2} = \frac{1}{5} \cdot \frac{5\sqrt{x}+2-7}{5\sqrt{x}+2} = \frac{1}{5} \cdot \left(1 - \frac{7}{5\sqrt{x}+2}\right) = \frac{1}{5} - \frac{7}{25\sqrt{x}+10}$$

és

$$\frac{7}{25\sqrt{x}+10} > 0,$$

ezért

$$\frac{\sqrt{x}-1}{5\sqrt{x}+2} < \frac{1}{5},$$

azaz $\frac{1}{5}$ felső korlátja \mathcal{H} -nak.

- Megmutatjuk, hogy $\frac{1}{5}$ a legkisebb felső korlát: $\sup(\mathcal{H}) = \frac{1}{5}$. Valóban, bármely $\varepsilon > 0$ szám esetén pontosan akkor van olyan $h \in \mathcal{H}$, hogy $h > \frac{1}{5} - \varepsilon$, ha alkalmas $x \in [4, +\infty)$ számra

$$\frac{1}{5} - \varepsilon < h := \frac{1}{5} - \frac{7}{25\sqrt{x}+10} \iff \varepsilon > \frac{7}{25\sqrt{x}+10} \iff \sqrt{x} > \frac{7}{25\varepsilon} - \frac{2}{5}.$$

Világos, hogy pl. az

$$x := \left(\frac{7}{25\varepsilon}\right)^2 + 4 = \frac{49}{225\varepsilon^2} + 4 > 4$$

szám ilyen.

- Mivel $\frac{1}{5} \notin \mathcal{H}$, ezért \mathcal{H} -nak nincsen legnagyobb eleme.

- A (*) felbontásból az is látható, hogy bármely $x \in [4, +\infty)$ esetén

$$\frac{1}{5} - \frac{7}{25\sqrt{x} + 10} \geq \frac{1}{5} - \frac{7}{25\sqrt{4} + 10} = \frac{1}{12} \in \mathcal{H}.$$

Ez azt jelenti, hogy $\inf(\mathcal{H}) = \min(\mathcal{H}) = \frac{1}{12}$.

Összefoglalva: a \mathcal{H} halmaz alulról és felülről is korlátos,

$$\inf(\mathcal{H}) = \min(\mathcal{H}) = \frac{1}{12}, \quad \sup(\mathcal{H}) = \frac{1}{5}, \quad \nexists \max(\mathcal{H}).$$

4. • A \mathcal{H} halmaz felülről nem korlátos, ugyanis tetszőleges $K \geq 1$ számhoz van olyan $h \in \mathcal{H}$, hogy $h > K$, hiszen $h := \frac{x}{y}$:

$$x := \frac{1}{2}, \quad y \in \left(0, \frac{1}{2K}\right) \quad \text{esetén} \quad h = \frac{\frac{1}{2}}{y} > \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2K}} = K.$$

Ezért

$$\sup(\mathcal{H}) = +\infty, \quad \text{ill.} \quad \nexists \max(\mathcal{H}).$$

- A \mathcal{H} halmaz alulról korlátos, ugyanis 0 alsó korlátja, sőt minden $x \in (0, 1)$ esetén $\frac{x}{y} > \frac{x}{x} = 1$, ezért az 1 is alsó korlát.
- $\inf(\mathcal{H}) = 1$, ugyanis minden $\varepsilon > 0$ -hoz van olyan $x \in (0, 1)$, $y \in (0, x)$, hogy $\frac{x}{y} < 1 + \varepsilon$, hiszen

$$\frac{x}{y} < 1 + \varepsilon \iff y > \frac{x}{1 + \varepsilon}$$

és $\frac{x}{1 + \varepsilon} < x$, ezért tetszőleges $x \in (0, 1)$ esetén y legyen olyan, hogy $\frac{x}{1 + \varepsilon} < y < x$.

- $\nexists \min(\mathcal{H})$, mivel $\inf(\mathcal{H}) = 1 \notin \mathcal{H}$.

Összefoglalva: a \mathcal{H} halmaz alulról korlátos, felülről nem korlátos,

$$\inf(\mathcal{H}) = 1, \quad \nexists \min(\mathcal{H}), \quad \sup(\mathcal{H}) = +\infty.$$

5. • Mivel minden $x \in [1/9, +\infty)$ esetén

$$(*) \quad \frac{2 + \sqrt{x}}{3\sqrt{x} + 1} = \frac{1}{3} \cdot \frac{3\sqrt{x} + 6}{3\sqrt{x} + 1} = \frac{1}{3} \cdot \frac{3\sqrt{x} + 1 + 5}{3\sqrt{x} + 1} = \frac{1}{3} \cdot \left(1 + \frac{5}{3\sqrt{x} + 1}\right) = \frac{1}{3} + \frac{5}{9\sqrt{x} + 3}$$

és

$$\frac{5}{9\sqrt{x}+3} > 0,$$

ezért

$$\frac{2+\sqrt{x}}{3\sqrt{x}+1} > \frac{1}{3},$$

azaz $\frac{1}{3}$ alsó korlátja \mathcal{H} -nak.

- Megmutatjuk, hogy $\frac{1}{3}$ a legnagyobb alsó korlát: $\inf(\mathcal{H}) = \frac{1}{3}$. Valóban, bármely $\varepsilon > 0$ szám esetén pontosan akkor van olyan $h \in \mathcal{H}$, hogy $\alpha < \frac{1}{3} + \varepsilon$, ha alkalmas $x \in [1/9, +\infty)$ számra

$$\frac{1}{3} + \varepsilon > h := \frac{1}{3} + \frac{5}{9\sqrt{x}+3} \iff \varepsilon > \frac{5}{9\sqrt{x}+3} \iff \sqrt{x} > \frac{1}{9} \left(\frac{5}{\varepsilon} - 3 \right) = \frac{5}{9\varepsilon} - \frac{1}{3}.$$

Világos, hogy pl. az

$$x := \frac{25}{81\varepsilon^2} + \frac{1}{9}$$

szám ilyen.

- Mivel $\frac{1}{3} \notin \mathcal{H}$, ezért \mathcal{H} -nak nincsen legkisebb eleme.
- A (*) felbontásból az is látható, hogy bármely $x \in [1/9, +\infty)$ esetén

$$\frac{1}{3} + \frac{5}{9\sqrt{x}+3} \leq \frac{1}{3} + \frac{5}{9\sqrt{1/9}+3} = \frac{1}{3} + \frac{5}{6} = \frac{7}{6} \in A.$$

Ez azt jelenti, hogy

$$\sup(\mathcal{H}) = \max(\mathcal{H}) = \frac{7}{6}.$$

Összefoglalva: a \mathcal{H} halmaz alulról és felülről is korlátos,

$$\inf(\mathcal{H}) = \frac{1}{3}, \quad \nexists \min(\mathcal{H}), \quad \sup(\mathcal{H}) = \max(\mathcal{H}) = \frac{7}{6}.$$

6. • Világos, hogy bármely $3 \leq x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\frac{5x-1}{2x+3} = \frac{5}{2} \cdot \frac{10x-2}{10x+15} = \frac{5}{2} \cdot \frac{10x+15-17}{10x+15} = \frac{5}{2} \cdot \left(1 - \frac{17}{10x+15} \right) = \frac{5}{2} - \frac{17}{2} \cdot \frac{1}{2x+3}.$$

- Mivel tetszőleges $3 \leq x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\frac{14}{9} = \frac{5}{2} - \frac{17}{2} \cdot \frac{1}{2 \cdot 3 + 3} \leq \frac{5}{2} - \frac{17}{2} \cdot \frac{1}{2x+3},$$

ezért

$$\inf(A) = \min(A) = \frac{14}{9}.$$

- Látható, hogy $\frac{5}{2}$ felső korlát. Belátjuk, hogy $\sup(A) = \frac{5}{2}$. Ehhez azt kell megmutatni, hogy

$$\forall \varepsilon > 0 \exists x \in [3, +\infty) : \frac{5}{2} - \frac{17}{2} \cdot \frac{1}{2x+3} > \frac{5}{2} - \varepsilon.$$

Ez azzal egyenértékű, hogy

$$\frac{17}{2} \cdot \frac{1}{2x+3} < \varepsilon, \quad \text{azaz hogy} \quad \frac{17}{2\varepsilon} - 3 < 2x.$$

Ilyen $x \in \mathcal{H} := [3, +\infty)$ nyilván létezik, hiszen \mathcal{H} felülről nem korlátos.

- $\nexists \max(A)$, mivel $\frac{5}{2} \notin A$.

Összefoglalva: a \mathcal{H} halmaz alulról és felülről is korlátos,

$$\inf(\mathcal{H}) = \inf(\mathcal{H}) = \frac{14}{9}, \quad \sup(\mathcal{H}) = \frac{5}{2}, \quad \nexists \max(\mathcal{H}) = . \quad \blacksquare$$

3. gyakorlat (2023. 03. 16.)

Emlékeztető.

- Ha $\emptyset \neq A, B$, akkor az A halmazból a B halmazba leképező függvényt úgy adunk meg, hogy A bizonyos elemeihez hozzárendeljük a B valamelyik elemét. Jelölés: $f: A \rightarrow B$. Például

$$\sqrt{\cdot} \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \sin \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}.$$

- Az f függvény **értelmezési tartományán**, ill. **értékkészletén**: a

$$\mathcal{D}_f := \{x \in A : \exists y \in B : y = f(x)\}, \quad \text{ill. az} \quad \mathcal{R}_f := \{y \in B : \exists x \in A : y = f(x)\}$$

halmazt értjük. B neve: **képhalmaz**. Ha $\mathcal{D}_f = A$, akkor azt írjuk, hogy $f: A \rightarrow B$. Valamely $x \in \mathcal{D}_f$ esetén az $f(x)$ elemet az f függvény x helyen felvett **helyettesítési értékének** nevezzük.

- Ha f és g függvény, akkor

$$f = g \quad :\Longleftrightarrow \quad (\mathcal{D}_f = \mathcal{D}_g =: \mathcal{D} \quad \text{és} \quad f(x) = g(x) \quad (x \in \mathcal{D})).$$

Példa.

$$\mathcal{D}_{\sqrt{\cdot}} = [0, +\infty), \quad \mathcal{R}_{\sqrt{\cdot}} = [0, +\infty), \quad \mathcal{D}_{\sin} = \mathbb{R}, \quad \mathcal{R}_{\sin} = [-1, 1].$$

Definíció. Legyen A, B, C halmaz, $C \subset A$, továbbá $f: A \rightarrow B$ és $g: C \rightarrow B$ olyan függvények, amelyekre

$$f(x) = g(x) \quad (x \in C).$$

Ekkor azt mondjuk, hogy a g függvény az f függvény C halmazra való **leszűkítése**. Jelben: $g =: f|_C$.

Emlékeztető. Valamely $f \in A \rightarrow B$ függvény

- és $\mathcal{H} \subset A$ halmaz esetén a \mathcal{H} halmaz f által létesített **képén** az

$$f[\mathcal{H}] := \{f(x) \in B : x \in \mathcal{H}\} = \{y \in B \mid \exists x \in \mathcal{H} : y = f(x)\}$$

halmazt értettük (speciálisan $f[\emptyset] := \emptyset$).

- és $\mathcal{H} \subset B$ halmaz esetén a \mathcal{H} halmaz f által létesített **ősképen** az

$$f^{-1}[\mathcal{H}] := \{x \in \mathcal{D}_f : f(x) \in \mathcal{H}\}$$

halmazt értettük (speciálisan $f^{-1}[\emptyset] := \emptyset$).

Megjegyzések.

1. Szóhasználat:

- $f[\mathcal{H}]$ az a B -beli halmaz, amelyet az $f(x)$ függvényértékek „befutnak”, ha x „befutja” a \mathcal{H} halmaz elemeit;
- az $f[\mathcal{H}]$ a B azon y elemeit tartalmazza, amelyekhez van olyan $x \in \mathcal{H}$, hogy $y = f(x)$.

2. Az f függvény értékkészlete értelmezési tartománynak f által létesített képe és f értelmezési tartománya az értékkészletének f által létesített ősképe:

$$f[\mathcal{D}_f] = \mathcal{R}_f \quad \text{és} \quad f^{-1}[\mathcal{R}_f] = \mathcal{D}_f.$$

3. Adott $f \in A \rightarrow B$ függvény és $b \in B$ esetén az

$$f(x) = b \quad (x \in A) \tag{5}$$

egyenlet megoldásainak nevezzük az $f^{-1}[\{b\}]$ halmaz elemeit. Azt mondjuk továbbá, hogy

- a (5) egyenletnek **nincsen megoldása** ((5) **nem oldható meg**), ha $f^{-1}[\{b\}] = \emptyset$;
- (5) **megoldása egyértelmű**, ha $f^{-1}[\{b\}]$ egyelemű halmaz.

Példa. Meghatározzuk a $\mathcal{H} := [1, 2]$ halmaz


$$f(x) := x^2 \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény által létesített képét. Az ábrából sejthető, hogy

$$f[1, 2] = [1, 4].$$

Biz. A definíció alapján

$$f[1, 2] = \{x^2 \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x \leq 2\} = \{y \in \mathbb{R} \mid \exists x \in [1, 2] : y = x^2\}.$$



Azt kell tehát meghatározni, hogy x^2 milyen értékek vesz fel, ha x „befutja” az $[1, 2]$ intervallum pontjait. Mivel

$$1 \leq x \leq 2 \quad \implies \quad 1 \leq x^2 \leq 4, \quad \text{azaz} \quad x^2 \in [1, 4],$$

ezért

$$f[1, 2] \subset [1, 4]. \quad (6)$$

A kérdés ezek után az, hogy az x^2 függvényértékek vajon teljesen „befutják-e” az egész $[1, 4]$ intervallumot, ha x „befutja” az $[1, 2]$ intervallum pontjait, vagyis igaz-e a fordított irányú

$$[1, 4] \subset f[1, 2] \quad (7)$$

tartalmazás is. Az előzőek alapján ez azzal egyenértékű, hogy

$$\forall y \in [1, 4] \text{ számhoz } \exists x \in [1, 2] : \text{ hogy } y = x^2. \quad (8)$$

Ennek az egyenletnek a megoldása $x_{\pm} = \pm\sqrt{y}$. Mivel $1 \leq y \leq 4$, ezért $1 \leq \sqrt{y} \leq 2$, így $x_+ \in [1, 2]$. Ez pedig azt jelenti, hogy a (8) állítás, tehát a vele egyenértékű (7) tartalmazás is igaz. (6) és (7) alapján a két halmaz egyenlő, azaz $f[1, 2] = [1, 4]$. ■


Példa. Meghatározzuk a $\mathcal{H} := [1, 4]$ halmaz

$$f(x) := x^2 \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény által létesített ősképet. Az ábrából sejthető, hogy $f^{-1}[1, 4] = [-2, -1] \cup [1, 2]$.

Biz. A definíció alapján

$$f^{-1}([1, 4]) = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 \in [1, 4]\} = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x^2 \leq 4\}.$$



Így

$f^{-1}([1, 4])$ az $1 \leq x^2 \leq 4$ egyenlőtlenségrendszer megoldáshalmaza. Mivel

$$\begin{aligned} 1 \leq x^2 \leq 4 &\iff 1 \leq |x| \leq 2 \iff 1 \leq x \leq 2 \text{ vagy } -2 \leq x \leq -1 \iff \\ &\iff x \in [-2, -1] \cup [1, 2], \end{aligned}$$

ezért beláttuk azt, hogy

$$f^{-1}([1, 4]) = [-2, -1] \cup [1, 2]. \quad \blacksquare$$

Példa. Az

$$f(x) := 3 + 2x - x^2 \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény és a $\mathcal{H} := \{0\}$ halmaz esetében meghatározzuk az $f[\mathcal{H}]$ és az $f^{-1}[\mathcal{H}]$ halmazt. Mivel $0 \in \mathcal{D}_f = \mathbb{R}$, ezért


$$f[\{0\}] = \{3 + 2x - x^2 \in \mathbb{R} : x \in \{0\}\} = \{3 + 2x - x^2 \in \mathbb{R} : x = 0\} = \{3\},$$

továbbá

$$f^{-1}[\{0\}] = \{x \in \mathbb{R} : 3 + 2x - x^2 \in \{0\}\} = \{x \in \mathbb{R} : 3 + 2x - x^2 = 0\} = \{-1; 3\},$$

hiszen

$$3 + 2x - x^2 = 0 \iff x = 1 \pm \sqrt{1 + 3}. \quad \blacksquare$$



1. ábra. Az $\mathbb{R} \ni x \mapsto 3 + 2x - x^2$ függvény grafikonja.

Feladat. Határozzuk meg a $\mathcal{H} := [-2, 2]$ halmaz

$$f(x) := 3 + 2x - x^2 \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény által létesített képét!

Útm. A definíció alapján

$$f[[-2, 2]] = \{3 + 2x - x^2 \mid x \in [-2, 2]\} = \{y \in \mathbb{R} \mid \exists x \in [-2, 2]: y = 3 + 2x - x^2\}.$$

Mivel bármely $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f(x) = 3 + 2x - x^2 = -(x - 1)^2 + 4,$$

továbbá

$$\begin{aligned} -2 \leq x \leq 2 &\implies -3 \leq x - 1 \leq 1 \implies 0 \leq (x - 1)^2 \leq 9 \implies -9 \leq -(x - 1)^2 \leq 0 \implies \\ &\implies -5 \leq -(x - 1)^2 + 4 \leq 4, \end{aligned}$$

ezért tetszőleges $x \in [-2, 2]$ esetén $-(x - 1)^2 + 4 \in [-5, 4]$, azaz

$$f[[-2, 2]] \subset [-5, 4]. \quad (9)$$

Megmutajuk, hogy a fordított irányú

$$[-5, 4] \subset f[[-2, 2]] \quad (10)$$

tartalmazás is igaz, azaz

$$y \in [-5, 4] \implies \exists x \in [-2, 2]: y = -(x - 1)^2 + 4. \quad (11)$$

Ennek az egyenletnek a megoldása

$$x_1 = 1 - \sqrt{4 - y} \quad \text{és} \quad x_2 = 1 + \sqrt{4 - y}.$$

Mivel

$$\begin{aligned} y \in [-5, 4] &\iff -5 \leq y \leq 4 \iff -4 \leq -y \leq 5 \iff 0 \leq 4 - y \leq 9 \iff \\ &\iff 0 \leq \sqrt{4 - y} \leq 3, \end{aligned}$$


ezért

$$-2 = 1 - 3 \leq x_1 = 1 - \sqrt{4 - y} \leq 1 + 0 = 1 \iff x_1 \in [-2, 1] \subset [-2, 2].$$

Így a (11) állítást, következésképpen a (10) tartalmazást bebizonyítottuk. (Ezek után az x_2 megoldással már nem is kell foglalkoznunk. Ennek ellenére megjegyezzük, hogy az előzőekhez hasonlóan adódik az, hogy $x_2 \in [1, 4]$, ha $y \in [-5, 4]$, de $x_2 \in [-2, 2]$ is igaz, ha $y \in [3, 4]$.) (9) és (10) alapján a szóban forgó halmazok egyenlők, így beláttuk, hogy

$$f[-2, 2] = [-5, 4].$$

A megoldást szemlélteti a mellékelt ábra:



Feladat. Határozzuk meg a $\mathcal{H} := [1, 2]$ halmaz

$$f(x) := |x - 1| - 1 \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény által létesített ősképet!

Útm. Mivel

$$\begin{aligned} f^{-1}[[1, 2]] &= \{x \in \mathbb{R} : |x - 1| - 1 \in [1, 2]\} = \{x \in \mathbb{R} : 1 \leq |x - 1| - 1 \leq 2\} = \\ &= \{x \in \mathbb{R} : 2 \leq |x - 1| \leq 3\}, \end{aligned}$$

ezért a

$$2 \leq |x - 1| \leq 3 \quad (12)$$

egyenlőtlenség-rendszer megoldáshalmazának meghatározása a feladat.

- A \leq megoldása. Mivel

$$2 \leq |x - 1| \iff (x - 1 \geq 2 \text{ vagy } x - 1 \leq -2) \iff (x \geq 3 \text{ vagy } x \leq -1),$$

ezért


$$2 \leq |x - 1| \iff x \in (-\infty, -1] \cup [3, +\infty) =: \mathcal{B}$$

- A \leq megoldása. Mivel


$$|x - 1| \leq 3 \iff -3 \leq x - 1 \leq 3 \iff -2 \leq x \leq 4 \iff x \in [-2, 4] =: \mathcal{J}.$$

Az (12) egyenlőtlenség megoldáshalmaza és egyben a keresett őskép:

$$\begin{aligned} f^{-1}[[1, 2]] &= \mathcal{B} \cap \mathcal{J} = \{(-\infty, -1] \cup [3, +\infty)\} \cap [-2, 4] = \\ &= \{(-\infty, -1] \cap [-2, 4]\} \cup \{[3, +\infty) \cap [-2, 4]\} = [-2, -1] \cup [3, 4]. \quad \blacksquare \end{aligned}$$



A megoldást szemlélteti az alábbi ábra.



Emlékeztető. Valamely $f \in A \rightarrow B$ függvény

- **invertálható (injektív vagy egy-egyértelmű)**, ha

$$\forall x, y \in \mathcal{D}_f : \quad (x \neq y \implies f(x) \neq f(y)).$$

Ekkor az

$$f^{-1} : \mathcal{R}_f \rightarrow \mathcal{D}_f, \quad f^{-1}(y) = x : \quad f(x) = y$$

függvényt f **inverzének** nevezzük.

- **szürjektív**, ha $\mathcal{R}_f = B$.
- **bijektív** vagy **kölcsönösen egyértelmű**, ha injektív és szürjektív.


Példa. Az ábrán látható

$$f := \{(a, j), (b, h), (c, i)\}$$


függvény invertálható, és inverze az

$$f^{-1} := \{(j, a), (h, b), (i, c)\}$$


függvény, de az $f : A \rightarrow B$ függvény nem bijektív.



Egy $f : A \rightarrow B$ bijektív leképezés párba állítja az A és B halmaz elemeit: a két halmaz elemszáma megegyezik. Ekkor



azt mondjuk, hogy az A és B halmaz **azonos számosságú**.



A fenti ábra bal oldala példa injektív függvényre, a jobb oldalán lévő f pedig nem injektív.

Megjegyzések.

1. f pontosan akkor invertálható, ha

$$\forall x, y \in \mathcal{D}_f : (f(x) = f(y) \implies x = y),$$

ill. ha minden $y \in \mathcal{R}_f$ -hez pontosan egy olyan $x \in \mathcal{D}_f$ van, amelyre $f(x) = y$.

2. Ha **alkamas** $u, v \in \mathcal{D}_f$, $u \neq v$ esetén $f(u) = f(v)$, akkor **f nem invertálható** (nem injektív).
3. Ha \mathcal{D}_f nem egyelemű, viszont \mathcal{R}_f egyelemű (valódi konstans függvény), akkor f nem invertálható, hiszen

$$\exists x, y \in \mathcal{D}_f, x \neq y : f(x) = f(y).$$

4. A definícióból látható, hogy

$$\mathcal{D}_{f^{-1}} = \mathcal{R}_f \quad \text{és} \quad \mathcal{R}_{f^{-1}} = \mathcal{D}_f.$$

5. Ha az $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ szigorúan monoton (növekvő/csökkenő), akkor invertálható, és f^{-1} is szigorúan monoton (növekvő/csökkenő). Mindez fordítva nem igaz, ui. pl. az


$$f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \begin{cases} x & (x \in [0, \frac{1}{2})) \\ \frac{3}{2} - x & (x \in [\frac{1}{2}, 1]) \end{cases}$$

függvény ugyan injektív, de nem szigorúan monoton.

6. Ha $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ invertálható függvény, akkor f és az f^{-1} grafikonjai egymásnak az $y = x$ egyenletű egyenesre való tükröképei (vö. (2). ábra), hiszen ha valamely $(x, y) \in \mathbb{R}$ pont rajta van f grafikonján:

$$(x, y) \in \text{graph} \{ (u, v) \in \mathbb{R}^2 : u \in \mathcal{D}_f, v = f(u) \},$$

akkor az (y, x) pont rajta van az f^{-1} inverz grafikonján, és ha egy \mathbb{R}^2 -beli pont két koordinátáját felcseréljük, akkor a pontot az $y = x$ egyenesre tükrözzük.




2. ábra. Az $x \mapsto \sqrt{x}$, x , x^2 függvények grafikonjai.

7. Felhívjuk a figyelmet egy, a jelölésekkel kapcsolatos látszólagos következetlenségre. Az $f^{-1}[\mathcal{H}]$ szimbólum tetszőleges f függvény esetén a \mathcal{H} halmaz f által létesített ősképet jelölte. Azonban, ha f invertálható függvény, akkor ugyanezzel jelöltük – a fogalmilag igencsak különböző dolgot, nevezetesen – a \mathcal{H} halmaz f^{-1} inverz függvény által létesített képét. Ez azért nem vezet félreértéshez – sőt némiképp egyszerűsíti a bevezetett jelöléseket –, mert minden invertálható f függvény és minden $\mathcal{H} \subset \mathcal{R}_f$ esetén a \mathcal{H} halmaz f által létesített ősképe – azaz az $\{x \in \mathcal{D}_f : f(x) \in \mathcal{H}\}$ halmaz – megegyezik a \mathcal{H} halmaz f^{-1} inverz függvény által létesített képével – azaz az

$$\{f^{-1}(y) \in \mathcal{R}_{f^{-1}} : y \in \mathcal{H}\}$$

halmazzal.

Megjegyezzük, hogy „átlátszó” papír felhasználásával a tükrözés elkerülhető. Az f grafikonjának megrajzolása után rögtön láthatóvá válik inverzének grafikonja is, ha először elforgatjuk a papírt 90 fokkal az óramutató járásával megegyező irányban, majd függőlegesen megforgatjuk a papírt. Az az ábra, ami a papíron át látható, pont az f^{-1} inverz grafikonja.



Példa. Megmutatjuk, hogy az

$$f(x) := \frac{3x+2}{x-1} \quad (1 \neq x \in \mathbb{R})$$

függvény injektív, majd kiszámítjuk inverzét. Mivel minden $1 \neq x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f(x) = 3 \cdot \frac{3x+2}{3x-3} = 3 \cdot \frac{3x-3+5}{3x-3} = 3 \cdot \left(1 + \frac{5}{3x-3}\right) = 3 + \frac{5}{x-1}, \quad (13)$$

ezért

$$f(x) = f(y) \iff 3 + \frac{5}{x-1} = 3 + \frac{5}{y-1} \iff x = y,$$

azaz f invertálható. Az inverz függvény meghatározásához f értékkészletét kell megállapítani. (13) alapján sejthető, hogy

$$\mathcal{R}_f = \mathbb{R} \setminus \{3\}.$$

Biz.:

- Világos, hogy $3 \notin \mathcal{R}_f$, hiszen bármely $1 \neq x \in \mathbb{R}$ esetén $\frac{5}{x-1} \neq 0$, így (13) alapján $\mathcal{R}_f \subset \mathbb{R} \setminus \{3\}$.
- Most megmutatjuk, hogy $\mathcal{R}_f \supset \mathbb{R} \setminus \{3\}$, azaz bármely $y \in \mathbb{R} \setminus \{3\}$ esetén van olyan $x \in \mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$, hogy $f(x) = y$. Valóban, ha $y \in \mathbb{R} \setminus \{3\}$, akkor

$$f(x) = y \iff 3 + \frac{5}{x-1} = y \iff x = 1 + \frac{5}{y-3} = \frac{y+2}{y-3}$$

és $x \neq 1$ miatt $x \in \mathcal{D}_f$.

Tehát

$$f^{-1} : \mathbb{R} \setminus \{3\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{1\}, \quad f^{-1}(y) := \frac{y+2}{y-3}. \quad \blacksquare$$

Feladat. Döntsük el, hogy az alábbi függvények közül melyek invertálhatók!

1. $f(x) := 3x + 2 \ (x \in \mathbb{R});$
2. $f(x) := x^2 \ (x \in \mathbb{R});$
3. $f(x) := \sqrt{9 - x^2} \ (x \in [-3, 3]);$
4. $f(x) := \left(\frac{x-1}{1+x}\right)^2 - 1 \ (x \in (-1, 1)).$

Útm.

1. f invertálható, hiszen szigorúan monoton (növekedő):

$$\forall u, v \in \mathbb{R}, u < v: \quad 3u < 3v \iff 3u + 2 < 3v + 2 \iff f(u) < f(v).$$

2. f nem invertálható, hiszen $f(-1) = (-1)^2 = 1^2 = f(1)$.

3. f nem invertálható, hiszen $f(-3) = \sqrt{9 - (-3)^2} = \sqrt{9 - 3^2} = f(3)$.

Megjegyzés. Ha f (nemtrivi) páros függvény, akkor f nyilvánvalóan nem invertálható.

4. f invertálható, hiszen tetszőleges $x, y \in (-1, 1)$ esetén

$$\begin{aligned} f(x) = f(y) &\iff \left(\frac{x-1}{1+x}\right)^2 - 1 = \left(\frac{y-1}{1+y}\right)^2 - 1 \iff \underbrace{\left(\frac{x-1}{1+x}\right)^2 - \left(\frac{y-1}{1+y}\right)^2}_{\Downarrow} = 0 \\ &\iff \overbrace{\left[\frac{x-1}{1+x} - \frac{y-1}{1+y}\right] \cdot \left[\frac{x-1}{1+x} + \frac{y-1}{1+y}\right]} = 0 \end{aligned}$$

és

$$\frac{x-1}{1+x} - \frac{y-1}{1+y} = \frac{(x-1)(1+y) - (y-1)(1+x)}{(1+x)(1+y)} = \frac{2(x-y)}{(1+x)(1+y)}$$

ill.

$$\frac{x-1}{1+x} + \frac{y-1}{1+y} = \frac{(x-1)(1+y) + (y-1)(1+x)}{(1+x)(1+y)} = \frac{2(xy-1)}{(1+x)(1+y)} \neq 0,$$

így

$$f(x) = f(y) \iff x = y. \quad \blacksquare$$

Feladat. Invertálhatóak-e az alábbi függvények? Ha igen, akkor számítsuk ki f^{-1} -et!

1. $f(x) := \frac{1}{1+|x-1|} \quad (x \in \mathbb{R});$

2. $a, b \in \mathbb{R}, f(x) := ax + b \quad (x \in \mathbb{R});$

3. $f(x) := \frac{x+1}{x-2} \quad (2 \neq x \in \mathbb{R});$

4. $f(x) := \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^2 - 1 \quad (x \in (-1, 1)).$

Útm.

1. Az f függvény nem injektív, ui.

$$0 \neq 2 \quad \text{és} \quad f(0) = \frac{1}{1+|0-1|} = \frac{1}{2} = \frac{1}{1+|2-1|} = f(2).$$

2. Ha

- $a = 0$, akkor $\mathcal{R}_f = \{b\}$, de $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$, így f nem invertálható.
- $a \neq 0$, akkor nyilván $\mathcal{R}_f = \mathbb{R}$ és

$$f(x) = f(y) \quad \Longleftrightarrow \quad ax + b = ay + b \quad \Longleftrightarrow \quad x = y,$$

azaz f invertálható és

$$f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f^{-1}(x) = \frac{x-b}{a},$$

hiszen

$$ax + b = y \quad \Longleftrightarrow \quad x = \frac{y-b}{a}.$$

3. Mivel minden $2 \neq x \in \mathbb{R}$ esetén

$$(*) \quad f(x) = \frac{x-2+3}{x-2} = 1 + \frac{3}{x-2},$$

ezért

$$f(x) = f(y) \quad \Longleftrightarrow \quad 1 + \frac{3}{x-2} = 1 + \frac{3}{y-2} \quad \Longleftrightarrow \quad x = y,$$

azaz f invertálható. Az inverz függvény meghatározásához f értékkészletét kell megállapítani. $(*)$ alapján sejthető, hogy

$$\mathcal{R}_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}.$$

Biz.:

- Világos, hogy $1 \notin \mathcal{R}_f$, hiszen bármely $2 \neq x \in \mathbb{R}$ esetén $\frac{3}{x-2} \neq 0$, így $(*)$ alapján

$$\mathcal{R}_f \subset \mathbb{R} \setminus \{1\}.$$

- Most megmutatjuk, hogy $\mathcal{R}_f \supset \mathbb{R} \setminus \{1\}$, azaz bármely $y \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ esetén van olyan $x \in \mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$, hogy $f(x) = y$. Valóban, ha $y \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$, akkor

$$f(x) = y \quad \Longleftrightarrow \quad 1 + \frac{3}{x-2} = y \quad \Longleftrightarrow \quad x = 2 + \frac{3}{y-1} = \frac{2y+1}{y-1}$$

és $x \neq 2$ miatt $x \in \mathcal{D}_f$.

Tehát

$$f^{-1} : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{2\}, \quad f^{-1}(y) := \frac{2y+1}{y-1}.$$

4. Korábbról tudjuk, hogy f invertálható. Világos, hogy bármely $x \in (-1, 1)$ estén $f(x) > -1$, azaz

$$\mathcal{R}_f \subset (-1, +\infty). \quad (14)$$

Mivel $f(x)$ a (-1) -hez közeli x pontokban tetszőlegesen nagy értéket felvesz, ezért sejthető, hogy a fordított irányú

$$\mathcal{R}_f \supset (-1, +\infty). \quad (15)$$

tartalmazás is igaz, azaz

$$\forall y \in (-1, +\infty) \exists x \in (-1, 1) : f(x) = \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^2 - 1 = y.$$

Ha tehát $y \in (-1, +\infty)$, akkor

$$\begin{aligned} f(x) = y &\iff \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^2 - 1 = y \iff \left| \frac{x-1}{x+1} \right| = \sqrt{y+1} \quad \stackrel{x \in (-1, 1)}{\iff} \\ &\stackrel{x \in (-1, 1)}{\iff} \frac{1-x}{x+1} = \sqrt{y+1} \iff x = \frac{1 - \sqrt{y+1}}{1 + \sqrt{y+1}}. \end{aligned}$$

Mivel $y \in (-1, +\infty)$, ezért

$$-1 < x = \frac{1 - \sqrt{y+1}}{1 + \sqrt{y+1}} < 1 \iff -1 - \sqrt{y+1} < 1 - \sqrt{y+1} < 1 + \sqrt{y+1},$$

ez utóbbi egyenlőtlenség-rendszer pedig nyilvánvaló. Így (14), ill. (15) alapján $\mathcal{R}_f = (-1, +\infty)$. Így $x = f^{-1}(y)$ következtében az inverz függvény:


$$f^{-1}(y) = \frac{1 - \sqrt{y+1}}{1 + \sqrt{y+1}} \quad (y \in (-1, +\infty)). \quad \blacksquare$$

Emlékeztető. Legyen $f \in A \rightarrow B$, $g \in C \rightarrow D$, ill.

$$\mathcal{H} := \{x \in \mathcal{D}_g : g(x) \in \mathcal{D}_f\} \neq \emptyset.$$

Ekkor az f (külső) és a g (belső) függvény **összetett függvénynek (kompozíciójának)** nevezzük az alábbi függvényt:

$$f \circ g : \mathcal{H} \rightarrow D, \quad (f \circ g)(x) := f(g(x)).$$



Megjegyzések.

1. A definícióból nyilvánvaló, hogy $\mathcal{D}_{f \circ g} = g^{-1}[\mathcal{R}_g \cap \mathcal{D}_f]$, illetve $\mathcal{R}_g \subset \mathcal{D}_f$ esetén $\mathcal{D}_{f \circ g} = \mathcal{D}_g$.

2. Ha $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ invertálható függvény, akkor

$$(f^{-1} \circ f)(x) = x \quad (x \in \mathcal{D}_f), \quad (f \circ f^{-1})(y) = y \quad (y \in \mathcal{R}_f).$$

3. Ha $f, g \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ olyan invertálható függvények, amelyekre $\mathcal{R}_g = \mathcal{D}_f$ és $\mathcal{R}_f = \mathcal{D}_g$ teljesül, akkor $f \circ g$ is invertálható és

$$(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}.$$

4. A kompozíció-képzés nem kommutatív, hiszen pl. az

$$f(x) := \sqrt{1-x} \quad (x \in (-\infty, 1]) \quad \text{és a} \quad g(x) := x^2 \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvények esetében $f \circ g \neq g \circ f$. Valóban,

• a

$$\mathcal{D}_{f \circ g} = \{x \in \mathcal{D}_g : g(x) \in \mathcal{D}_f\} = \{x \in \mathbb{R} : x^2 \in (-\infty, 1]\} = [-1, 1] \neq \emptyset$$

halmazzal, ha $x \in \mathcal{D}_{f \circ g}$, akkor

$$(f \circ g)(x) = (f(g(x))) = \sqrt{1 - g(x)} = \sqrt{1 - x^2},$$

azaz az f és a g kompozíciója:

$$f \circ g : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad (f \circ g)(x) = \sqrt{1 - x^2};$$

• a

$$\mathcal{D}_{g \circ f} = \{x \in \mathcal{D}_f : f(x) \in \mathcal{D}_g\} = \left\{x \in (-\infty, 1] : \sqrt{1 - x} \in \mathbb{R}\right\} = (-\infty, 1] \neq \emptyset$$

halmazzal, ha $x \in \mathcal{D}_{g \circ f}$, akkor

$$(g \circ f)(x) = (g(f(x))) = g(\sqrt{1 - x}) = (\sqrt{1 - x})^2 = 1 - x,$$

azaz a g és az f függvény kompozíciója pedig

$$g \circ f : (-\infty, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad (g \circ f)(x) = 1 - x.$$

Feladat. Írjuk fel az $f \circ g$ kompozíciót a következő függvények esetében, amennyiben az képezhető!

$$1. f(x) := \sqrt{x+1} \quad (-1 \leq x \in \mathbb{R}), \quad g(x) := x^2 - 3x + 1 \quad (x \in \mathbb{R});$$

$$2. f(x) := \frac{1}{2x+1} \quad \left(-\frac{1}{2} \neq x \in \mathbb{R}\right), \quad g(x) := x^2 + 3x + \frac{3}{2} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Útm.

1. Világos, hogy

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_{f \circ g} &= \{x \in \mathcal{D}_g : g(x) \in \mathcal{D}_f\} = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 3x + 1 \in [-1, +\infty)\} = \\ &= \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 3x + 1 \geq -1\} = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 3x + 2 \geq 0\}. \end{aligned}$$

Mivel

$$x^2 - 3x + 2 \quad \implies \quad x_{\pm} = \frac{3 \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \cdot 2}}{2} = \frac{3 \pm 1}{2} \in \{1; 2\},$$

ezért

$$x^2 - 3x + 2 \geq 0 \quad \iff \quad (x-1)(x-2) \geq 0 \quad \iff \quad x \in (-\infty, 1] \cup [2, +\infty).$$

Tehát

$$\mathcal{D}_{f \circ g} = (-\infty, 1] \cup [2, +\infty),$$

és bármely $x \in \mathcal{D}_{f \circ g}$ esetén

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \sqrt{g(x) + 1} = \sqrt{(x^2 - 3x + 1) + 1} = \sqrt{x^2 - 3x + 2}.$$

Az f és a g függvény kompozíciója így az

$$(f \circ g)(x) := \sqrt{x^2 - 3x + 2} \quad (x \in (-\infty, 1] \cup [2, +\infty))$$

függvény.

2. Látható, hogy

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_{f \circ g} &= \{x \in \mathcal{D}_g : g(x) \in \mathcal{D}_f\} = \left\{x \in \mathbb{R} : x^2 + 3x + \frac{3}{2} \in \mathbb{R} \setminus \{-1/2\}\right\} = \\ &= \left\{x \in \mathbb{R} : x^2 + 3x + \frac{3}{2} \neq \frac{1}{2}\right\} = \{x \in \mathbb{R} : x^2 + 3x + 2 \neq 0\} = \\ &= \{x \in \mathbb{R} : (x+1)(x+2) \neq 0\} = \mathbb{R} \setminus \{-1; -2\}. \end{aligned}$$

Így tetszőleges $x \in \mathcal{D}_{f \circ g}$ esetén

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \frac{1}{2g(x) + 1} = \frac{1}{2(x^2 + 3x + \frac{3}{2}) + 1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^2 + 3x + 2}.$$

Mindez azt jelenti, hogy az f és a g függvény kompozíciója így az

$$(f \circ g)(x) := \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^2 + 3x + 2} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{-1; -2\})$$

függvény. ■

Feladat. Írjuk fel az $f \circ g$ és a $g \circ f$ kompozíciót a következő függvények esetében, amennyiben az képezhető!

$$1. f(x) := \sqrt{2x+1} \left(\frac{1}{2} \leq x \in \mathbb{R} \right), g(x) := \frac{1}{x^2-2} \left(2 < x \in \mathbb{R} \right);$$

$$2. f(x) := 1 - x^2 \left(x \in \mathbb{R} \right), g(x) := \sqrt{x} \left(0 \leq x \in \mathbb{R} \right);$$

$$3. f(x) := x^2 \left(x \in \mathbb{R} \right), g(x) := 2^x \left(x \in \mathbb{R} \right);$$

$$4. f(x) := -x^2 \left(0 < x \in \mathbb{R} \right), g(x) := \frac{1}{x^2} \left(0 < x \in \mathbb{R} \right).$$

Útm.

1. Mivel

$$\{x \in \mathcal{D}_g : g(x) \in \mathcal{D}_f\} = \left\{ x \in (2, +\infty) : \frac{1}{x^2-2} \geq \frac{1}{2} \right\} = \emptyset,$$

ui. $x \in (2, +\infty)$ következtében $x^2 - 2 > 0$, így

$$\frac{1}{x^2-2} \geq \frac{1}{2} \quad \implies \quad 2 \geq x^2 - 2 \quad \implies \quad 4 \geq x^2 \quad \implies \quad |x| < 2.$$

Ez azt jelenti, hogy

$f \circ g$ nem képezhető.

Mivel

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_{g \circ f} &= \{x \in \mathcal{D}_f : f(x) \in \mathcal{D}_g\} = \left\{ x \in \left[\frac{1}{2}, +\infty \right) : \sqrt{2x+1} \in (2, +\infty) \right\} = \\ &= \left\{ x \in \left[\frac{1}{2}, +\infty \right) : 2x+1 \in (4, +\infty) \right\} = \left\{ x \in \left[\frac{1}{2}, +\infty \right) : x \in \left(\frac{3}{2}, +\infty \right) \right\} = \\ &= \left(\frac{3}{2}, +\infty \right) \neq \emptyset, \end{aligned}$$

ezért tetszőleges $x \in \mathcal{D}_{g \circ f}$ esetén

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = \frac{1}{f^2(x) - 2} = \frac{1}{(\sqrt{2x+1})^2 - 2} = \frac{1}{2x-1}.$$

Mindez azt jelenti, hogy a g és az f függvény kompozíciója így a

$$(g \circ f)(x) := \frac{1}{2x-1} \quad \left(x \in \left(\frac{3}{2}, +\infty \right) \right)$$

függvény.

2. Mivel

$$\mathcal{D}_{f \circ g} = \{x \in \mathcal{D}_g : g(x) \in \mathcal{D}_f\} = \{x \in [0, +\infty) : \sqrt{x} \in \mathbb{R}\} = [0, +\infty),$$

ill.

$$\mathcal{D}_{g \circ f} = \{x \in \mathcal{D}_f : f(x) \in \mathcal{D}_g\} = \{x \in \mathbb{R} : 1 - x^2 \in [0, +\infty)\} = [-1, 1],$$

ezért

$$f \circ g : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad (f \circ g)(x) = f(g(x)) = 1 - (g(x))^2 = 1 - (\sqrt{x})^2 = 1 - x,$$

ill.

$$g \circ f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad (g \circ f)(x) = g(f(x)) = \sqrt{f(x)} = \sqrt{1 - x^2}.$$

3. Mivel

$$\mathcal{D}_{f \circ g} = \{x \in \mathcal{D}_g : g(x) \in \mathcal{D}_f\} = \{x \in \mathbb{R} : 2^x \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R},$$

ill.

$$\{x \in \mathcal{D}_f : f(x) \in \mathcal{D}_g\} = \{x \in \mathbb{R} : x^2 \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R},$$

ezért

$$f \circ g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad (f \circ g)(x) = f(g(x)) = (g(x))^2 = (2^x)^2 = 2^{2x};$$

ill.

$$g \circ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad (g \circ f)(x) = g(f(x)) = 2^{f(x)} = 2^{x^2}.$$

4. Mivel

$$\mathcal{D}_{f \circ g} = \{x \in \mathcal{D}_g : g(x) \in \mathcal{D}_f\} = \left\{x \in (0, +\infty) : \frac{1}{x^2} \in (0, +\infty)\right\} = (0, +\infty),$$

ill.

$$\mathcal{D}_{g \circ f} = \{x \in \mathcal{D}_f : f(x) \in \mathcal{D}_g\} = \{x \in (0, +\infty) : -x^2 \in (0, +\infty)\} = \emptyset,$$

ezért

$$f \circ g : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad (f \circ g)(x) = f(g(x)) = -\frac{1}{(f(x))^2} = -\frac{1}{x^4},$$

ill.

$g \circ f$ nem képezhető. ■

Gyakorló feladat. Az

$$f(x) := 3x^2 - 2 \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény és a $\mathcal{H} := [0, 1]$ halmaz esetén határozzuk meg az $f[\mathcal{H}]$ és az $f^{-1}[\mathcal{H}]$ halmazokat! Milyen A halmaz esetén áll fenn az $f[A] = \emptyset$ vagy az $f^{-1}[A] = \emptyset$ egyenlőség?

Útm.

- Világos, hogy

$$f[\mathcal{H}] = \{3x^2 - 2 \in \mathbb{R} \mid x \in [0, 1]\}.$$

Mivel minden $x \in [0, 1]$ számra

$$3 \cdot 0^2 - 2 = -2 \leq 3x^2 - 2 \leq 3 \cdot 1^2 - 2 = 1,$$

ezért

$$\{3x^2 - 2 \in \mathbb{R} \mid x \in [0, 1]\} \subset [-2, 1],$$

azaz

$$f[\mathcal{H}] \subset [-2, 1].$$

Tegyük fel, hogy $y \in [-2, 1]$. Ekkor $3x^2 - 2 = y$, ha $x = \pm \sqrt{\frac{y+2}{3}}$. Mivel

$$\sqrt{\frac{y+2}{3}} \in [0, 1] \quad \text{és} \quad f\left(\sqrt{\frac{y+2}{3}}\right) = y,$$

ezért $y \in f[\mathcal{H}]$, azaz

$$[-2, 1] \subset f[\mathcal{H}].$$

Megjegyzés. Mivel

$$f[\mathcal{H}] = \{3x^2 - 2 \in \mathbb{R} \mid x \in [0, 1]\} = 3 \cdot \{x^2 \in \mathbb{R} \mid x \in [0, 1]\} - 2,$$

és nem nehéz megmutatni, hogy

$$\{x^2 \in \mathbb{R} \mid x \in [0, 1]\} = [0, 1],$$

ezért

$$f[\mathcal{H}] = [-2, 1].$$

- Világos, hogy

$$f^{-1}[\mathcal{H}] = \{x \in \mathbb{R} \mid 3x^2 - 2 \in [0, 1]\}.$$

Az $f^{-1}[\mathcal{H}]$ halmaz tehát a

$$0 \leq 3x^2 - 2 \leq 1 \iff \frac{2}{3} \leq x^2 \leq 1 \quad (x \in \mathbb{R})$$

egyenlőtlenség-rendszer megoldáshalmaza, ezért

$$\begin{aligned} f^{-1}[\mathcal{H}] &= \left(\left(-\infty, -\sqrt{\frac{2}{3}} \right] \cup \left[\sqrt{\frac{2}{3}}, +\infty \right) \right) \cap [-1, 1] = \\ &= \left(\left(-\infty, -\sqrt{\frac{2}{3}} \right] \cap [-1, 1] \right) \cup \left(\left[\sqrt{\frac{2}{3}}, +\infty \right) \cap [-1, 1] \right) = \\ &= \left[-1, -\sqrt{\frac{2}{3}} \right] \cup \left[\sqrt{\frac{2}{3}}, 1 \right]. \end{aligned}$$

- A definíció alapján világos, hogy

$$f[A] = \emptyset \iff A \cap \mathbb{R} = \emptyset \quad \text{és} \quad f^{-1}[A] = \emptyset \iff A \cap [-2, +\infty) = \emptyset. \quad \blacksquare$$

Gyakorló feladat. Invertálhatóak-e az alábbi függvények?

1. $f(x) := |x - 1| + |x + 2| \quad (x \in \mathbb{R});$
2. $f(x) := x^3 + 6x^2 + 12x \quad (x \in \mathbb{R});$
3. $f(x) := x^3 - 3x^2 + 3x + 4 \quad (x \in \mathbb{R}).$

Útm.

1. Mivel

$$f(x) = \begin{cases} 1 - x - x - 2 = -1 - 2x & (x \in (-\infty, -2)), \\ 1 - x + x + 2 = 3 & (x \in [-2, 1]), \\ x - 1 + x + 2 = 2x + 1 & (x \in [1, +\infty)), \end{cases}$$

ezért f nem invertálható.

2. Mivel bármely $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f(x) = x^3 + 6x^2 + 12x + 2^3 - 6 = (x + 2)^3 - 8,$$

ezért f szigorúan monoton növekedő, következésképpen invertálható. Sőt, az is könnyen megmutatható, hogy $\mathcal{R}_f = \mathbb{R}$, hiszen bármely $y \in \mathbb{R}$ esetén van olyan $x \in \mathcal{D}_f = \mathbb{R}$, hogy

$$f(x) = y \iff (x + 2)^3 - 8 = y \iff x = \sqrt[3]{y + 8} - 2.$$

Az f inverze:

$$f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f^{-1}(y) := \sqrt[3]{y + 8} - 2$$

3. Mivel bármely $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1 + 5 = (x - 1)^3 + 5,$$

ezért f szigorúan monoton növekedő, következésképpen invertálható. Sőt, az is könnyen megmutatható, hogy $\mathcal{R}_f = \mathbb{R}$, hiszen bármely $y \in \mathbb{R}$ esetén van olyan $x \in \mathcal{D}_f = \mathbb{R}$, hogy

$$f(x) = y \iff (x - 1)^3 + 5 = y \iff x = \sqrt[3]{y - 5} + 1.$$

Az f inverze:

$$f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f^{-1}(y) := \sqrt[3]{y - 5} + 1. \quad \blacksquare$$

Gyakorló feladat. Invertálható-e az

$$f(x) := \frac{3x + 2}{x - 1} \quad (1 \neq x \in \mathbb{R})$$

függvény? Ha igen, akkor számítsuk ki f^{-1} -et!

Útm. Mivel minden $1 \neq x \in \mathbb{R}$ esetén

$$(*) \quad f(x) = 3 \cdot \frac{3x + 2}{3x - 3} = 3 \cdot \frac{3x - 3 + 5}{3x - 3} = 3 \cdot \left(1 + \frac{5}{3x - 3}\right) = 3 + \frac{5}{x - 1},$$

ezért

$$f(x) = f(y) \iff 3 + \frac{5}{x - 1} = 3 + \frac{5}{y - 1} \iff x = y,$$

azaz f invertálható. Az inverz függvény meghatározásához f értékkészletét kell megállapítani. $(*)$ alapján

sejthető, hogy

$$\mathcal{R}_f = \mathbb{R} \setminus \{3\}.$$

Biz.:

- Világos, hogy $3 \notin \mathcal{R}_f$, hiszen bármely $1 \neq x \in \mathbb{R}$ esetén $\frac{5}{x-1} \neq 0$, így (*) alapján

$$\mathcal{R}_f \subset \mathbb{R} \setminus \{3\}.$$

- Most megmutatjuk, hogy $\mathcal{R}_f \supset \mathbb{R} \setminus \{3\}$, azaz bármely $y \in \mathbb{R} \setminus \{3\}$ esetén van olyan $x \in \mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$, hogy $f(x) = y$. Valóban, ha $y \in \mathbb{R} \setminus \{3\}$, akkor

$$f(x) = y \quad \Longleftrightarrow \quad 3 + \frac{5}{x-1} = y \quad \Longleftrightarrow \quad x = 1 + \frac{5}{y-3} = \frac{y+2}{y-3}$$

és $x \neq 1$ miatt $x \in \mathcal{D}_f$.

Tehát

$$f^{-1} : \mathbb{R} \setminus \{3\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{1\}, \quad f^{-1}(y) := \frac{y+2}{y-3}. \quad \blacksquare$$

Gyakorló feladatok.

1. Írjuk fel az $f \circ g$ és a $g \circ f$ kompozíciót az

$$f(x) := \sqrt{1-x} \quad (x \in (-\infty, 1]), \quad g(x) := x^2 \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvények esetében!

2. Írjuk fel az $f \circ g$ kompozíciót a következő függvények esetében!

(a) $f(x) := 2x + 1 \quad (x \in \mathbb{R}), g(x) := x^2 - 3x + 2 \quad (x \in \mathbb{R});$

(b) $f(x) := \begin{cases} 0 & (-\infty < x \leq 0) \\ x & (0 < x < +\infty) \end{cases}, \quad g(x) := \begin{cases} 0 & (-\infty < x \leq 0) \\ -x^2 & (0 < x < +\infty) \end{cases};$

(c) $f(x) := \frac{1}{2x+1} \quad (-1/2 \neq x \in \mathbb{R}), g(x) := x^2 + 3x - 10 \quad (x \in \mathbb{R}).$

3. Tekintsük az alábbi függvényeket!

$$f(x) := \sqrt{\frac{1-x}{x+2}} \quad (x \in [0, 1]), \quad g(x) := -x^2 - 4x - 3 \quad (x \in \mathbb{R}).$$

(a) Határozzuk meg az $f \circ g$ függvényt!

(b) Invertálható-e az f függvény? Ha igen, akkor határozzuk meg az f^{-1} inverzet!

Útm.

1. Mivel

$$\{x \in \mathcal{D}_g : g(x) \in \mathcal{D}_f\} = \{x \in \mathbb{R} : x^2 \in (-\infty, 1]\} = [-1, 1]$$

ill.

$$\{x \in \mathcal{D}_f : f(x) \in \mathcal{D}_g\} = \{x \in (-\infty, 1] : \sqrt{1-x} \in \mathbb{R}\} = (-\infty, 1],$$

ezért

$$f \circ g : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad (f \circ g)(x) = f(g(x)) = \sqrt{1-x^2};$$

ill.

$$g \circ f : (-\infty, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad (g \circ f)(x) = g(f(x)) = (\sqrt{1-x})^2 = 1-x.$$

2. (a) Világos, hogy

$$\mathcal{D}_{f \circ g} = \{x \in \mathcal{D}_g : g(x) \in \mathcal{D}_f\} = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 3x + 2 \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R},$$

továbbá

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = 2(x^2 - 3x + 2) + 1 = 2x^2 - 6x + 5 \quad (x \in \mathbb{R}).$$

(b) Világos, hogy

$$\mathcal{D}_{f \circ g} = \{x \in \mathcal{D}_g : g(x) \in \mathcal{D}_f\} = \{x \in \mathbb{R} : g(x) \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R},$$

továbbá

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \begin{cases} 0 & (-\infty < g(x) \leq 0), \\ g(x) & (0 < g(x) < +\infty). \end{cases}$$

Mivel bármely $x \in \mathcal{D}_g$ esetén $-\infty < g(x) \leq 0$, ezért

$$(f \circ g)(x) = 0 \quad (x \in \mathbb{R}).$$

(c) Világos, hogy

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_{f \circ g} &= \{x \in \mathcal{D}_g : g(x) \in \mathcal{D}_f\} = \{x \in \mathbb{R} : x^2 + 3x - 10 \in \mathbb{R} \setminus \{-1/2\}\} = \\ &= \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{-3 - \sqrt{47}}{2}, \frac{-3 + \sqrt{47}}{2} \right\}, \end{aligned}$$

továbbá

$$(f \circ g)(x) = \frac{1}{2(x^2 + 3x - 10) + 1} = \frac{1}{2x^2 + 6x - 19} \quad (x \in \mathcal{D}_{f \circ g}).$$

3. (a) Mivel tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$g(x) = 0 \iff x = -2 \pm \sqrt{(-2)^2 - 3} \in \{-1; -3\},$$

ezért


$$g(x) = -(x+1)(x+3) \quad (x \in \mathbb{R})$$

(vö. 3. ábra). Így

$$\{x \in \mathcal{D}_g : g(x) \in \mathcal{D}_f\} = \{x \in \mathbb{R} : -(x+1)(x+3) \in [0, 1]\} = [-3, -1] \neq \emptyset$$

következtében

$$f \circ g : [-3, -1] \rightarrow \mathbb{R},$$

3. ábra. A g függvény grafikonja.

$$\begin{aligned}
 (f \circ g)(x) &= f(g(x)) = \sqrt{\frac{1+x^2+4x+3}{-x^2-4x-3+2}} = \sqrt{\frac{x^2+4x+4}{-x^2-4x-1}} = \\
 &= \sqrt{\frac{(x+2)^2}{3-(x^2+4x+4)}} = \frac{|x+2|}{\sqrt{3-(x+2)^2}}.
 \end{aligned}$$

(b) Mivel

$$(*) \quad \frac{1-x}{x+2} = -\frac{x-1}{x+2} = -\frac{x+2-3}{x+2} = -1 + \frac{3}{x+2} \quad (x \in [0, 1]),$$

ezért bármely $x, y \in [0, 1]$ esetén

$$f(x) = f(y) \implies \sqrt{-1 + \frac{3}{x+2}} = \sqrt{-1 + \frac{3}{y+2}} \implies \dots \implies x = y.$$

Mindez azt jelenti, hogy f invertálható. Az inverz függvény meghatározásához f értékkészletét kell megállapítani. $(*)$ alapján sejthető, hogy

$$\mathcal{R}_f = [f(1), f(0)] = \left[0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right].$$

Biz.:

- $\mathcal{R}_f \subset [f(1), f(0)]$, ui. bármely $x \in [0, 1]$ esetén

$$\begin{aligned}
 x+2 \in [2, 3] &\implies \frac{1}{x+2} \in \left[\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right] \implies \frac{3}{x+2} \in \left[1, \frac{3}{2}\right] \implies -1 + \frac{3}{x+2} \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \\
 &\implies f(x) = \sqrt{-1 + \frac{3}{x+2}} \in \left[0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right].
 \end{aligned}$$

- $[f(1), f(0)] \subset \mathcal{R}_f$, hiszen bármely $y \in [f(1), f(0)]$ van olyan $x \in \mathcal{D}_f = [0, 1]$, hogy $f(x) = y$, ui.

$$f(x) = y \iff \sqrt{-1 + \frac{3}{x+2}} = y \iff x+2 = \frac{3}{y^2+1} \iff x = \frac{3}{y^2+1} - 2 = \frac{1-2y^2}{y^2+1}$$

és

$$0 \leq \frac{1-2y^2}{y^2+1} = -\frac{2y^2-1}{y^2+1} = -2 \cdot \frac{2y^2-1}{2y^2+2} = -2 \cdot \frac{2y^2+2-3}{2y^2+2} = -2 + \frac{3}{y^2+1} \leq 1$$

miatt $x \in [0, 1] = \mathcal{D}_f$.Tehát f invertálható és inverzére

$$f^{-1} : \left[0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f^{-1}(y) := \frac{1-2y^2}{y^2+1}.$$

4. gyakorlat (2023. 03. 23.)

Az alábbiakban a természetes számok halmazán értelmezett függvényekkel: sorozatokkal foglalkozunk.

Definíció. Legyen $\mathcal{H} \neq \emptyset$. Ekkor az

$$x : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathcal{H}$$

függvényt **\mathcal{H} -beli sorozatnak** nevezzük. Ha

$$\mathcal{H} = \mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}, \quad \text{ill.} \quad \mathcal{H} = \{f : f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}$$

akkor valós vagy komplex számsorozatról, illetve valós-valós függvények sorozatáról beszélünk.

Megjegyzések.

1. Az $x(n)$ helyettesítési értéket az x sorozat **n -edik tagjának** vagy **n -indexű tagjának** nevezzük.

2. Az

$$x(n) =: x_n \quad (n \in \mathbb{N}_0)$$

indexes jelölés bevezetésével az x sorozatra az alábbi jelölések használatosak:

$$x =: (x_n, n \in \mathbb{N}_0), \quad x_n \quad (n \in \mathbb{N}_0), \quad x =: (x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}, \quad (x_n),$$

ill.

$$x =: (x_0, x_1, x_2, \dots).$$

3. Sok esetben tetszőlegesen rögzített $k \in \mathbb{N}_0$ szám esetén az

$$x : \mathbb{N}_k \rightarrow \mathcal{H}$$

függvény is sorozatnak tekintendő, ahol

$$\mathbb{N}_k := \{n \in \mathbb{N}_0 : n \geq k\} \quad / \mathbb{N}_1 = \mathbb{N} /.$$

4. A továbbiakban csak valós számsorozatokkal foglalkozunk, azaz feltesszük, hogy $\mathcal{H} = \mathbb{R}$.

5. A függvények közötti összeadás, ill. a függvények számmal való szorzására vonatkozóan a sorozatok vektorteret (lineáris teret) alkotnak, melynek nulleleme a

$$\theta := (0, 0, 0, \dots)$$

sorozat. A számsorozatok lineáris terét az \mathcal{S} szimbólummal fogjuk jelölni.

Példák.

1. Legyen $c \in \mathbb{R}$, $x_n := c$ ($n \in \mathbb{N}_0$) (**konstans sorozat** vagy **állandó sorozat**),

$$x_0 = c, \quad x_1 = c, \quad x_2 = c, \quad x_3 = c, \quad x_4 = c, \quad \dots$$

2. $x_n := n$ ($n \in \mathbb{N}_0$),

$$x_0 = 0, \quad x_1 = 1, \quad x_2 = 2, \quad x_3 = 3, \quad x_4 = 4, \quad \dots$$

3. $x_n := \frac{1}{n}$ ($n \in \mathbb{N}$) (**harmonikus sorozat**),

$$x_1 = \frac{1}{1} = 1, \quad x_2 = \frac{1}{2}, \quad x_3 = \frac{1}{3}, \quad x_4 = \frac{1}{4}, \quad x_5 = \frac{1}{5}, \quad \dots$$

A név eredete:

$$x_n = \frac{2}{\frac{1}{x_{n-1}} + \frac{1}{x_{n+1}}} \quad (2 \leq n \in \mathbb{N}),$$

ui. tetszőleges $2 \leq n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\frac{2}{\frac{1}{x_{n-1}} + \frac{1}{x_{n+1}}} = \frac{2}{\frac{1}{n-1} + \frac{1}{n+1}} = \frac{2}{\frac{n-1+n+1}{(n-1)(n+1)}} = \frac{2}{\frac{2n}{(n-1)(n+1)}} = \frac{2}{2n} = \frac{1}{n} = x_n.$$

4. $x_n := \alpha + nd$ ($n \in \mathbb{N}_0$), ahol $\alpha, d \in \mathbb{R}$ (**számtani sorozat**),

$$x_0 = \alpha, \quad x_1 = \alpha + d, \quad x_2 = \alpha + 2d, \quad x_3 = \alpha + 3d, \quad x_4 = \alpha + 4d, \quad \dots$$

A név eredete:

$$x_n = \frac{x_{n-1} + x_{n+1}}{2} \quad (n \in \mathbb{N}),$$

ui. tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\frac{x_{n-1} + x_{n+1}}{2} = \frac{\alpha + (n-1)d + \alpha + (n+1)d}{2} = \frac{2\alpha + 2nd}{2} = \alpha + nd = x_n.$$

5. $x_n := \beta q^n$ ($n \in \mathbb{N}_0$), ahol $\beta, q \in \mathbb{R}$ (**mértani sorozat**),

$$x_0 = \beta, \quad x_1 = \beta q, \quad x_2 = \beta q^2, \quad x_3 = \beta q^3, \quad x_4 = \beta q^4, \quad \dots$$

A név eredete: ha $\beta, q > 0$, akkor

$$x_n = \sqrt{x_{n-1} \cdot x_{n+1}} \quad (n \in \mathbb{N}),$$

ui. tetszőleges $2 \leq n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\sqrt{x_{n-1} \cdot x_{n+1}} = \sqrt{\beta \cdot q^{n-1} \cdot \beta \cdot q^{n+1}} = \sqrt{\beta^2 \cdot q^{2n}} = \beta \cdot q^n = x_n.$$

$$6. \quad x_n := (-1)^n \frac{4n^2 + 2n + 1}{3n^3 + 6} \quad (n \in \mathbb{N}_0),$$

$$x_0 = \frac{1}{6}, \quad x_1 = -\frac{7}{9}, \quad x_2 = \frac{21}{30}, \quad x_3 = -\frac{43}{87}, \quad x_4 = \frac{73}{198}, \quad x_5 = -\frac{211}{381}, \quad \dots$$

$$7. \quad x_n := \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad (n \in \mathbb{N}),$$

$$x_1 = \left(1 + \frac{1}{1}\right)^1 = 2, \quad x_2 = \left(1 + \frac{1}{2}\right)^2, \quad x_3 = \left(1 + \frac{1}{3}\right)^3, \quad x_4 = \left(1 + \frac{1}{4}\right)^4, \quad \dots$$

$$8. \quad x_n := \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \quad (n \in \mathbb{N}) \text{ (harmonikus sor)},$$

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 1 + \frac{1}{2}, \quad x_3 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}, \quad x_4 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}, \quad \dots$$

$$9. \quad x_n := \sum_{k=1}^n (-1)^k \frac{1}{k} \quad (n \in \mathbb{N}) \text{ (alternáló harmonikus sor)},$$

$$x_1 = -1, \quad x_2 = -1 + \frac{1}{2}, \quad x_3 = -1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3}, \quad x_4 = -1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4}, \quad \dots$$

$$10. \quad x_n := \sum_{k=0}^n q^k \quad (n \in \mathbb{N}_0) \text{ (mértani sor)},$$

$$x_0 = 1, \quad x_1 = 1 + q, \quad x_2 = 1 + q + q^2, \quad x_4 = 1 + q + q^2 + q^3, \quad \dots$$

$$11. \quad x_n := \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \quad (n \in \mathbb{N})$$

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 1 + \frac{1}{4}, \quad x_3 = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9}, \quad x_4 = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16}, \quad \dots$$

$$12. x_n := \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \quad (n \in \mathbb{N}_0)$$

$$x_0 = 1, \quad x_1 = 1 + 1, \quad x_2 = 1 + 1 + \frac{1}{2}, \quad x_3 = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6}, \quad x_4 = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24}, \quad \dots$$

$$13. x_0 := c,$$

$$x_{n+1} := \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right) \quad (n \in \mathbb{N}_0),$$

ahol $0 < c \in \mathbb{R}$. Ha $c = 2$, akkor

$$x_1 = 1.5, \quad x_2 \approx 1.416 \quad \text{és} \quad (x_2)^2 \approx 2.$$

A valós számsorozatokot kétféle módon is szemléltethetjük. Mivel ezek speciális valós-valós függvények, ezért a különálló pontokból álló grafikonjukat ábrázolhatjuk a koordináta-rendszerben. Másrészt a sorozat tagjait – értékei szerint – elhelyezhetjük a számegyenesen. Mindkét szemléltetési módot megmutatjuk az

$$x_n := \frac{(-1)^n}{n} \quad (n \in \mathbb{N})$$

sorozat esetében:

Számegyenesen

Koordináta-rendszerben

A matematikai analízis egyik legfontosabb fogalma a határérték. A következőkben a határérték legegyszerűbb típusával, a sorozatok határértékével foglalkozunk. Elsőként ábrázoljuk a számegyenesen a következő sorozatokat:

A fenti három animációból jól látható, hogy

- az (x_n) sorozat a következő tulajdonsággal rendelkezik: tagjai a 0 körül „sűrűsödnek”, azaz a 0 szám bármely K_ε sugarú környezetén kívül a sorozatnak véges számú (legfeljebb $[1/\varepsilon]$ ¹) tagja van.
- az (y_n) sorozat a következő tulajdonsággal rendelkezik: a tagok egy része -1 körül, a másik része pedig 1 körül „sűrűsödik”, továbbá bármely számnak van olyan környezete, amelyen kívül a sorozatnak végtelen sok tagja van.
- a (z_n) sorozat esetében egyetlen valós szám sincsen, amely körül „sűrűsödne”. Itt is elmondható, hogy bármely számnak van olyan környezete, amelyen kívül a sorozatnak végtelen sok tagja van. Viszont igaz, hogy a $+\infty$ bármely K_ε sugarú környezetén kívül a sorozatnak véges számú (legfeljebb $[1/\varepsilon]$) tagja van.

¹Valamely $x \in \mathbb{R}$ szám **egészrészének** nevezzük az $[x] := \max\{m \in \mathbb{Z} : m \leq x\}$ számot.

Definíció. Legyen $x = (x_n) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Ekkor

- az (x_n) sorozat **konvergens** (jelben $(x_n) \in \mathfrak{c}$), ha

$$\exists A \in \mathbb{R} \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \in \mathbb{N} : \quad (n \geq N \implies |x_n - A| < \varepsilon);$$

Ekkor az A számot az (x_n) sorozat **határértékének** vagy **limeszének** nevezzük és az

$$A =: \lim(x) =: \lim(x_n) := \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n) \quad \text{vagy az} \quad x_n \longrightarrow A \quad (n \rightarrow \infty)$$

jelölést használjuk.

- az (x_n) sorozat **divergens**, ha nem konvergens, azaz

$$\forall A \in \mathbb{R} \quad \exists \varepsilon > 0 \quad \forall N \in \mathbb{N} \quad \exists n \in \mathbb{N} : \quad (n \geq N \wedge |x_n - A| \geq \varepsilon);$$

- az (x_n) sorozat **határértéke** $+\infty$ ($\lim(x_n) = +\infty$), ha

$$\forall \omega \in \mathbb{R} \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \in \mathbb{N} : \quad (n \geq N \implies x_n > \omega);$$

- az (x_n) sorozat **határértéke** $-\infty$ ($\lim(x_n) = -\infty$), ha

$$\forall \alpha \in \mathbb{R} \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \in \mathbb{N} : \quad (n \geq N \implies x_n < \alpha);$$

- az (x_n) sorozatnak **van határértéke** ($\lim(x_n) \in \overline{\mathbb{R}}$), ha

$$(x_n) \text{ konvergens} \quad \text{VAGY} \quad \lim(x_n) \in \{-\infty, +\infty\}.$$

Példák.

1. Legyen $c \in \mathbb{R}$. Az

$$x_n := c \quad (n \in \mathbb{N}_0)$$

sorozat konvergens és $\lim(x_n) = c$, hiszen ha $\varepsilon > 0$, akkor

$$|x_n - c| = |c - c| = 0 < \varepsilon \quad (n \in \mathbb{N}_0)$$

következtében minden $N \in \mathbb{N}_0$ esetén

$$|x_n - c| < \varepsilon \quad (N \leq n \in \mathbb{N}_0).$$

2. Tetszőleges $k \in \mathbb{N}$ esetén az

$$x_n := \frac{1}{n^k} \quad (n \in \mathbb{N})$$

sorozat konvergens és $\lim(x_n) = 0$, hiszen ha $\varepsilon > 0$, akkor

$$|x_n - 0| = |x_n| = \frac{1}{n^k} < \varepsilon \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{1}{\sqrt[k]{\varepsilon}} < n$$

következtében az

$$N := \left\lceil \frac{1}{\sqrt[k]{\varepsilon}} \right\rceil + 1$$

választás² megfelelő: bármely $N \leq n \in \mathbb{N}$ esetén $|x_n - 0| < \varepsilon$.

3. Ha ha $q \in (-1, 1]$, akkor az

$$x_n := q^n \quad (n \in \mathbb{N})$$

sorozat konvergens, és fennáll a

$$\lim(x_n) = \begin{cases} 0 & (q \in (-1, 1) \iff |q| < 1), \\ 1 & (q = 1) \end{cases}$$

határérték-reláció, hiszen

- ha $q = 1$, akkor $x_n = 1$ ($n \in \mathbb{N}$);
- ha $q = 0$, akkor $x_n = 0$ ($n \in \mathbb{N}$);
- ha $q \neq 0$, $|q| < 1$, akkor $\frac{1}{|q|} > 1$, következésképpen alkalmas van olyan $0 < p \in \mathbb{R}$ számmal

$$\frac{1}{|q|} = 1 + p,$$

ahonnan a Bernoulli-egyenlőtlenség felhasználásával tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\frac{1}{|q|^n} = (1 + p)^n \geq 1 + np > np, \quad \text{azaz} \quad |q|^n < \frac{1}{np}$$

adódik. Így, ha $\varepsilon > 0$, akkor

$$N := \left\lceil \frac{1}{\varepsilon p} \right\rceil + 1 > \frac{1}{\varepsilon p}$$

²Valamely $x \in \mathbb{R}$ szám **egészrészének** nevezzük az $[x] := \max\{m \in \mathbb{Z} : m \leq x\}$ számot.

mellett az $n \in \mathbb{N}_0$, $n \geq N$ egyenlőtlenségből

$$|x_n - 0| = |q^n - 0| = |q|^n < \frac{1}{n^p} < \varepsilon$$

következik.

Megjegyzések.

1. Mivel

$$|x_n - A| < \varepsilon \iff -\varepsilon < x_n - A < \varepsilon \iff A - \varepsilon < x_n < A + \varepsilon,$$

ezért a konvergencia fogalma pl. az alábbiakkal egyenértékű:



- $\exists A \in \mathbb{R} \ \forall \varepsilon > 0 \ \exists N \in \mathbb{N}_0$:

$$N = \max\{n \in \mathbb{N}_0 : x_n \notin K_\varepsilon(A)\}.$$

- $\exists A \in \mathbb{R} \ \forall \varepsilon > 0 : \{n \in \mathbb{N}_0 : x_n \notin K_\varepsilon(A)\}$ (legfeljebb) véges halmaz
(minden $\varepsilon > 0$ esetén a sorozatnak csak véges sok tagja esik a $K_\varepsilon(A)$ környezetén kívülre).
- $\exists A \in \mathbb{R} \ \forall \varepsilon > 0 \ \exists N \in \mathbb{N}_0 \ \forall n \in \mathbb{N}_0$:

$$(n \geq N \implies x_n \in K_\varepsilon(A)).$$

A határérték fogalmát szemléltetik az alábbi ábrák:



A N indexet szokás **küszöbindex**nek is nevezni.

2. Ha az (x_n) sorozat konvergens, akkor nyilván tetszőleges $k \in \mathbb{Z}$ esetén az

$$y_n := x_{n+k} \quad (n \in \mathbb{N}_0)$$

ún. **elcsúsztatott sorozat** is konvergens, és $\lim(y_n) = \lim(x_n)$.

3. Mit jelent az, hogy (x_n) divergens? Pl.:

- $\forall A \in \mathbb{R} \exists \varepsilon > 0 \forall N \in \mathbb{N} \exists n \in \mathbb{N}$:

$$(n \geq N \quad \wedge \quad x_n \notin K_\varepsilon(A)),$$

azaz minden $A \in \mathbb{R}$ számnak van olyan $K_\varepsilon(A)$ környezete, hogy a sorozat tetszőlegesen nagy N indexű tagjánál van olyan nagyobb n indexű tag, amelyik nincsen benne a $K_\varepsilon(A)$ környezetben.

- $\forall A \in \mathbb{R} \exists \varepsilon > 0 : \{n \in \mathbb{N} : x_n \notin K_\varepsilon(A)\}$ végtelen halmaz.

Példa. Az

$$x_n := (-1)^n \quad (n \in \mathbb{N}_0)$$

sorozat divergens, hiszen, ha $A \in \mathbb{R}$, akkor az

$$\varepsilon := \max\{|A + 1|, |A - 1|\}$$

pozitív valós számmal $K_\varepsilon(A)$ -n kívülre végtelen sok tagja esik a sorozatnak, ui. tetszőleges $N \in \mathbb{N}_0$ esetén

- $\varepsilon = |A - 1|, n := 2N > N \implies |(-1)^n - A| = |1 - A| = |A - 1| \geq \varepsilon;$
- $\varepsilon = |A + 1|, n := 2N + 1 > N \implies |(-1)^n - A| = |-1 - A| = |A + 1| \geq \varepsilon.$

4. A fentiek következtében elmondható, hogy ha egy sorozat véges sok tagját megváltoztatjuk, akkor a konvergencia minősége nem változik: a konvergens sorozat konvergens, a divergens sorozat pedig divergens marad.

Feladat. Sejtsük meg az alábbi sorozatok határértékét, majd a definíció alapján igazoljuk sejtésünket!

$$1. x_n := \frac{3n+4}{2n-1} \quad (n \in \mathbb{N});$$

$$2. x_n := \frac{n}{2n-3} \quad (n \in \mathbb{N});$$

$$3. x_n := \frac{1}{n^2-3} \quad (n \in \mathbb{N});$$

$$4. x_n := \sqrt{n^2+1} - n \quad (n \in \mathbb{N}_0);$$

$$5. x_n := \frac{1+n^2}{2+n+2n^2} \quad (n \in \mathbb{N});$$

$$6. x_n := \sqrt{n+3} - \sqrt{n+1} \quad (n \in \mathbb{N}_0);$$

$$7. x_n := \frac{3n^2-1}{2n^2+n+3} \quad (n \in \mathbb{N}_0).$$

Útm.

1. Mivel bármely $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\frac{3n+4}{2n-1} = \frac{3 + \frac{4}{n}}{2 - \frac{1}{n}}$$

és „igen nagy n esetén $\frac{1}{n}$ igen kicsi”, ezért azt sejtjük, hogy

$$\lim(x_n) = \frac{3-0}{2-0} = \frac{3}{2}.$$

Valóban, ha $1 \leq n \in \mathbb{N}_0$, azaz $n \in \mathbb{N}$, akkor

$$\left| \frac{3n+4}{2n-1} - \frac{3}{2} \right| = \frac{11}{4n-2} < \frac{11}{n} < \varepsilon \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{11}{\varepsilon} < n,$$

ezért tetszőleges $\varepsilon > 0$ esetén a

$$N := \left\lceil \frac{11}{\varepsilon} \right\rceil + 1$$

választás megfelelő.

2. Mivel bármely $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\frac{n}{2n-3} = \frac{1}{2 - \frac{3}{n}}$$

és „igen nagy n esetén $\frac{1}{n}$ igen kicsi”, ezért azt sejtjük, hogy

$$\lim(x_n) = \frac{1}{2-0} = \frac{1}{2}.$$

Valóban, ha $6 < n \in \mathbb{N}_0$, akkor

$$\left| \frac{n}{2n-3} - \frac{1}{2} \right| = \frac{3}{4n-6} < \frac{3}{3n} = \frac{1}{n} < \varepsilon \quad \Longleftrightarrow \quad n > \frac{1}{\varepsilon},$$

hiszen

$$4n-6 > 3n \quad \Longleftrightarrow \quad n > 6.$$

Ezért tetszőleges $\varepsilon > 0$ esetén az

$$N := \max \left\{ 7, \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1 \right\}$$

választás megfelelő.

3. Mivel bármely $n \in \mathbb{N}$ esetén x_n „igen nagy n esetén igen kicsi”, ezért azt sejtjük, hogy

$$\lim(x_n) = 0.$$

Valóban, ha $3 \leq n \in \mathbb{N}$, akkor

$$\left| \frac{1}{n^2-3} - 0 \right| = \frac{1}{n^2-3} < \frac{1}{n} \varepsilon \quad \Longleftrightarrow \quad n > \frac{1}{\varepsilon},$$

hiszen ekkor

$$\frac{1}{n^2-3} < \frac{1}{n} \quad \Longleftrightarrow \quad n < n^2-3$$

és

$$n^2-3-n = n^2-n-3 = n(n-1)-3 > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad n \geq 3.$$

Ezért tetszőleges $\varepsilon > 0$ esetén az

$$N := \max \left\{ 3, \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1 \right\}$$

választás megfelelő.

4. Mivel bármely $n \in \mathbb{N}_0$ esetén

$$\sqrt{n^2+1} - n = \left(\sqrt{n^2+1} - n \right) \cdot \frac{\sqrt{n^2+1} + n}{\sqrt{n^2+1} + n} = \frac{1}{\sqrt{n^2+1} + n}$$

és az utóbbi tört számlálója korlátos, nevezője edig nem, ezért azt sejtjük, hogy $\lim(x_n) = 0$. Valóban, ha $n \in \mathbb{N}$, akkor

$$\left| \sqrt{n^2 + 1} - n - 0 \right| = \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1} + n} < \frac{1}{n} < \varepsilon \quad \Longleftrightarrow \quad n > \frac{1}{\varepsilon},$$

ezért tetszőleges $\varepsilon > 0$ esetén

$$N := \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1. \quad \blacksquare$$

5. Mivel bármely $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\frac{1 + n^2}{2 + n + 2n^2} = \frac{\frac{1+n^2}{n^2}}{\frac{2+n+2n^2}{n^2}} = \frac{\frac{1}{n} + 1}{\frac{2}{n^2} + \frac{1}{n} + 2},$$

és „igen nagy n esetén $\frac{1}{n^k}$ igen kicsi, ahol $k \in \{1; 2\}$ ”, ezért azt sejtjük, hogy

$$\lim(x_n) = \frac{1 + 0}{0 + 0 + 2} = \frac{1}{2}.$$

Valóban,

$$\left| \frac{1 + n^2}{2 + n + 2n^2} - \frac{1}{2} \right| = \frac{|-n|}{2(2n^2 + n + 2)} < \frac{n}{4n^2} = \frac{1}{4n} < \varepsilon \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{1}{4\varepsilon} < n,$$

ezért tetszőleges $\varepsilon > 0$ esetén

$$N := \left\lceil \frac{1}{4\varepsilon} \right\rceil + 1.$$

6. Mivel bármely $n \in \mathbb{N}_0$ esetén

$$\sqrt{n+3} - \sqrt{n+1} = (\sqrt{n+3} - \sqrt{n+1}) \cdot \frac{\sqrt{n+3} + \sqrt{n+1}}{\sqrt{n+3} + \sqrt{n+1}} = \frac{2}{\sqrt{n+3} + \sqrt{n+1}}$$

és az utóbbi tört számlálója korlátos, nevezője edig nem, ezért azt sejtjük, hogy $\lim(x_n) = 0$. Valóban, ha $n \in \mathbb{N}$, akkor

$$\left| \sqrt{n+3} - \sqrt{n+1} - 0 \right| = \frac{2}{\sqrt{n+3} + \sqrt{n+1}} < \frac{2}{\sqrt{n} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n}} < \varepsilon \quad \Longleftrightarrow \quad n > \frac{1}{\varepsilon},$$

ezért tetszőleges $\varepsilon > 0$ esetén az

$$N := \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1$$

választás megfelelő.

7. Mivel bármely $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\frac{3n^2 - 1}{2n^2 + n + 3} = \frac{\frac{3n^2 - 1}{n^2}}{\frac{2n^2 + n + 3}{n^2}} = \frac{3 - \frac{1}{n^2}}{2 + \frac{1}{n} + \frac{3}{n^2}},$$

és „igen nagy n esetén $\frac{1}{n^k}$ igen kicsi, ahol $k \in \{1; 2\}$ ”, ezért azt sejtjük, hogy

$$\lim(x_n) = \frac{3 - 0}{2 + 0 + 0} = \frac{3}{2}.$$

Valóban,

$$\left| \frac{3n^2 - 1}{2n^2 + n + 3} - \frac{3}{2} \right| = \frac{|-3n - 11|}{4n^2 + 2n + 6} < \frac{3n + 11}{4n^2} < \frac{14n}{4n^2} = \frac{7}{2n} < \varepsilon \iff \frac{7}{2\varepsilon} < n,$$

ezért tetszőleges $\varepsilon > 0$ esetén az

$$N := \left\lceil \frac{7}{2\varepsilon} \right\rceil + 1$$

választás megfelelő. ■

Feladat. A határérték definíciója alapján lássuk be, hogy igaz a

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n^2 + 14n + 19}{1 + (n + 3)^2} \right) = 2$$

állítás!

Útm. Ha $n \in \mathbb{N}$, akkor

$$\left| \frac{2n^2 + 14n + 19}{1 + (n + 3)^2} - 2 \right| = \left| \frac{2n^2 + 14n + 19}{n^2 + 6n + 10} - \frac{2(n^2 + 6n + 10)}{n^2 + 6n + 10} \right| = \frac{2n - 1}{1 + (n + 3)^2} \leq \frac{2n}{n^2} = \frac{2}{n},$$

és

$$\frac{2}{n} < \varepsilon \iff \frac{2}{\varepsilon} < n,$$

ezért tetszőleges $\varepsilon > 0$ esetén, ha

$$N := \left\lceil \frac{2}{\varepsilon} \right\rceil + 1,$$

akkor elmondható, hogy bármely $N \leq n \in \mathbb{N}$ indexre

$$\left| \frac{2n^2 + 14n + 19}{1 + (n + 3)^2} - 2 \right| < \varepsilon, \quad \text{azaz} \quad \lim \left(\frac{2n^2 + 14n + 19}{1 + (n + 3)^2} \right) = 2. \quad \blacksquare$$

Feladat. Konvergens-e az $(x_n) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ sorozat, ha

1. $\exists A \in \mathbb{R} \exists \varepsilon > 0 \forall n \in \mathbb{N} : |x_n - A| < \varepsilon$;
2. $\exists A \in \mathbb{R} \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : |x_N - A| < \varepsilon$;
3. $\exists A \in \mathbb{R} \exists N \in \mathbb{N} \forall N \leq n \in \mathbb{N} \forall \varepsilon > 0 : |x_n - A| < \varepsilon$.

Útm.

1. Nem, ui. az

$$x_n := (-1)^n \quad (n \in \mathbb{N}), \quad A := 0, \quad \varepsilon := 2$$

választással tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ esetén $|x_n - A| < \varepsilon$, de (x_n) divergens. Az állításból csak annyi következik, hogy (x_n) korlátos, ui. a feltétel szerint

$$\exists A \in \mathbb{R} \exists \varepsilon > 0 : \quad A - \varepsilon < x_n < A + \varepsilon \quad (n \in \mathbb{N}).$$

2. Nem, hiszen a megadott feltételeknek minden sorozat eleget tesz, ui. válaszszuk meg az A valós számot úgy, hogy

$$A \in \{x_n \in \mathbb{R} : n \in \mathbb{N}\}$$

teljesüljön. Ekkor ui. alkalmas $N \in \mathbb{N}$ indexre $x_N - A = 0$.

3. Igen, ui. ez a felétel azt jelenti, hogy az (x_n) sorozat **kvázikonstans**: egy bizonyos indextől kezdve tagjai egyenlők. ■.

Feladat. Mutassuk meg, hogy ha az (x_n) sorozat konvergens és $A := \lim (x_n) \in \mathbb{R}$, akkor $(|x_n|)$ is konvergens és fennáll a

$$\lim (|x_n|) = |A|$$

határérték-reláció!

Útm. Mivel

$$\lim (x_n) = A,$$

ezért tetszőleges $\varepsilon > 0$ számhoz van olyan $N \in \mathbb{N}$ index, hogy minden $N \leq n \in \mathbb{N}_0$ indexre $|x_n - A| < \varepsilon$, ahonnan

$$0 \leq ||x_n| - |A|| \leq |x_n - A| < \varepsilon,$$

következik. Mindez azt jelenti, hogy

$$\lim (|x_n| - |A|) = 0, \quad \text{azaz} \quad \lim (|x_n|) = |A|. \quad \blacksquare$$

Megjegyezzük, hogy

1. a fenti feladatbeli állítás megfordítása nem igaz:

$$(1) \in \mathfrak{c}, \quad \text{de} \quad ((-1)^n) \notin \mathfrak{c}.$$

2. ha \mathcal{N} jelöli a nullsorozatok halmazát, akkor igaz az

$$(x_n) \in \mathcal{N} \quad \Longleftrightarrow \quad (|x_n|) \in \mathcal{N}$$

ekvivalencia, hiszen

$$||x_n| - 0| = |x_n - 0| \quad (n \in \mathbb{N}_0).$$

Feladat. Legyen

$$x_n \in [0, +\infty) \quad (n \in \mathbb{N}_0)$$

konvergens sorozat. Mutassuk meg, hogy ekkor igazak az alábbi állítások.

1. $\lim(x_n) =: A \in [0, +\infty)$;
2. $(\sqrt{x_n})$ konvergens és $\lim(\sqrt{x_n}) = \sqrt{A}$.

Útm.

1. A határérték és a rendezés kapcsolatáról szóló tétel (vö. EA) következtében

$$\lim(x_n) =: A \in [0, +\infty).$$

2. Ha

- $A = 0$, akkor tetszőleges $\varepsilon > 0$ számhoz van olyan $N \in \mathbb{N}$ index, hogy minden $N \leq n \in \mathbb{N}_0$ indexre

$$|x_n - 0| < \varepsilon^2,$$

azaz a sorozat nemnegativitása következtében

$$x_n < \varepsilon^2, \quad \text{ill.} \quad \sqrt{x_n} < \varepsilon,$$

ahonnan

$$|\sqrt{x_n} - 0| = \sqrt{x_n} < \varepsilon$$

következik. Mindez azt jelenti, hogy $\lim(\sqrt{x_n}) = 0$.

- $A > 0$, akkor tetszőleges $\varepsilon > 0$ számhoz van olyan $N \in \mathbb{N}$ index, hogy minden $N \leq n \in \mathbb{N}_0$ indexre

$$|x_n - A| < \varepsilon \sqrt{A},$$

ahonnan

$$\left| \sqrt{x_n} - \sqrt{A} \right| = \left| \sqrt{x_n} - \sqrt{A} \right| \cdot \frac{\sqrt{x_n} + \sqrt{A}}{\sqrt{x_n} + \sqrt{A}} = \frac{|x_n - A|}{\sqrt{x_n} + \sqrt{A}} \leq \frac{|x_n - A|}{\sqrt{A}} < \frac{\varepsilon \sqrt{A}}{\sqrt{A}} = \varepsilon$$

következik, ami azt jelenti, hogy

$$\lim(\sqrt{x_n}) = \sqrt{A}. \quad \blacksquare$$

Megjegyezzük, hogy ha $2 \leq k \in \mathbb{N}$, akkor hasonló mondható el a $(\sqrt[k]{x_n})$ sorozat határértékéről; a bizonyítás második fele egy kicsit összetettebb számolás:

$$\left| \sqrt[k]{x_n} - \sqrt[k]{A} \right| = \left| \sqrt[k]{x_n} - \sqrt[k]{A} \right| \cdot \frac{\sum_{i=1}^k \sqrt[k]{x_n^{k-i} \cdot A^{i-1}}}{\sum_{i=1}^k \sqrt[k]{x_n^{k-i} \cdot A^{i-1}}} = \frac{|x_n - A|}{\sum_{i=1}^k \sqrt[k]{x_n^{k-i} \cdot A^{i-1}}} \leq \frac{|x_n - A|}{\sqrt[k]{A^{k-1}}}.$$

Feladat. A definíció alapján lássa be, hogy igazak az alábbi határérték-relációk!

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} (n^2 + 3) = +\infty \quad 2. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 3n + 1}{n + 3} = +\infty \quad 3. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 - 3n^2}{n + 1} = -\infty.$$

1. Azt kell megmutatni, hogy az

$$x_n := n^2 + 3 \quad (n \in \mathbb{N}_0)$$

sorozatra

$$\forall \omega \in \mathbb{R} \exists N \in \mathbb{N}_0 \forall n \in \mathbb{N}_0 : \quad (n \geq N \implies x_n > \omega)$$

teljesül. Valóban, ha $3 \leq \omega \in \mathbb{R}$, akkor

$$n^2 + 3 = x_n > \omega \iff n^2 > \omega - 3.$$

Így az

$$N := [\omega - 3] + 1$$

választás megfelelő.

2. Azt kell megmutatni, hogy az

$$x_n := \frac{n^2 + 3n + 1}{n + 3} \quad (n \in \mathbb{N}_0)$$

sorozatra

$$\forall \omega \in \mathbb{R} \exists N \in \mathbb{N}_0 \forall n \in \mathbb{N}_0 : \quad (n \geq N \implies x_n > \omega)$$

teljesül. Valóban, ha $0 < \omega \in \mathbb{R}$, akkor bármely $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\frac{n^2 + 3n + 1}{n + 3} > \frac{n^2}{n + 3} \geq \frac{n^2}{n + 3n} = \frac{n}{4} > \omega \iff n > 4\omega,$$

így

$$N := \max \{1, [4\omega] + 1\} = 4[\omega] + 1.$$

3. Azt kell megmutatni, hogy az

$$x_n := \frac{2 - 3n^2}{n + 1} \quad (n \in \mathbb{N}_0)$$

sorozatra

$$\forall \alpha \in \mathbb{R} \exists N \in \mathbb{N}_0 \forall n \in \mathbb{N}_0 : \quad (n \geq N \implies x_n < \alpha)$$

teljesül. Valóban, ha $0 > \alpha \in \mathbb{R}$, akkor bármely $n \in \mathbb{N}_0$ esetén

$$\frac{2 - 3n^2}{n + 1} < \alpha \iff \frac{3n^2 - 2}{n + 1} > -\alpha,$$

így tetszőleges $2 \leq n \in \mathbb{N}$ indexre

$$\frac{3n^2 - 2}{n + 1} = \frac{2n^2 + (n^2 - 2)}{n + 1} \geq \frac{2n^2}{n + n} = \frac{2n^2}{2n} = n$$

következtében

$$N := \max \{2, [-\alpha] + 1\}. \quad \blacksquare$$

Feladat. Lássuk be, hogy ha bármely $n \in \mathbb{N}$ esetén $x_n \in (0, +\infty)$, akkor igaz a

$$\lim(x_n) = 0 \quad \implies \quad \lim\left(\frac{1}{x_n}\right) = +\infty$$

implikáció!

Útm. Mivel

$$\lim(x_n) = 0 \quad \implies \quad \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}_0 \forall n \leq N : \quad x_n = |x_n| = |x_n - 0| < \varepsilon$$

és

$$x_n < \varepsilon \quad \implies \quad \frac{1}{x_n} > \frac{1}{\varepsilon} =: \omega,$$

ezért elmondható, hogy tetszőleges $0 < \omega \in \mathbb{R}$ számhoz van olyan $N \in \mathbb{N}_0$ (küszöb)index, hogy bármely $N \leq n \in \mathbb{N}_0$ indexre

$$\frac{1}{x_n} > \omega, \quad \text{azaz} \quad \lim\left(\frac{1}{x_n}\right) = +\infty. \quad \blacksquare$$

Feladat. Igaz-e, hogy az $(x_n) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ sorozatra $\lim(x_n) = +\infty$, ha

$$\exists \omega \in \mathbb{R} \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} : \quad (n \geq N \implies x_n > \omega) \quad (16)$$

teljesül?

Útm. Nem, ui. pl. az

$$x_n := 1 \quad (n \in \mathbb{N})$$

sorozat teljesíti az (16) feltételt, de határértéke nem $+\infty$. \blacksquare

Feladat. Igazoljuk hogy ha $d \in \mathbb{N}$, $a_1, \dots, a_d \in \mathbb{R}$, továbbá

$$p(x) := a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + a_dx^d = \sum_{k=0}^d a_kx^k \quad (x \in \mathbb{R}),$$

akkor igaz az alábbi állítás!

$$\lim(p(n)) = \begin{cases} +\infty & (a_d > 0), \\ -\infty & (a_d < 0). \end{cases}$$

Útm. Világos, hogy bármely $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\begin{aligned} p(n) &= a_0 + a_1 n + \dots + a_{d-1} n^{d-1} + a_d n^d = n^d \cdot \left(\frac{a_0}{n^d} + \frac{a_1}{n^{d-1}} + \dots + \frac{a_{d-1}}{n} + a_d \right) \longrightarrow \\ &\xrightarrow{(n \rightarrow \infty)} (+\infty)^d \cdot (0 + 0 + \dots + 0 + a_d) = \\ &= (+\infty) \cdot \operatorname{sgn}(a_d) = \begin{cases} +\infty & (a_d > 0), \\ -\infty & (a_d < 0). \end{cases} \blacksquare \end{aligned}$$

Házi feladatok.

1. A határérték definíciója alapján mutassuk meg, hogy fennáll a

$$\lim (2 - n^3) = -\infty$$

határérték-reláció!

2. Sejtsük meg az

$$x_n := \frac{n^4 + 2n^2 + 1}{n^2 + 1} \quad (n \in \mathbb{N}_0)$$

sorozat határértékét, majd a definíció alapján bizonyítsa be sejtését!

3. Lássuk be, hogy ha bármely $n \in \mathbb{N}$ esetén $x_n \in (-\infty, 0)$, akkor igaz a

$$\lim(x_n) = 0 \quad \implies \quad \lim\left(\frac{1}{x_n}\right) = -\infty$$

implikáció!

Útm.

1. Azt kell megmutatni, hogy az

$$x_n := 2 - n^3 \quad (n \in \mathbb{N}_0)$$

sorozatra

$$\forall \alpha \in \mathbb{R} \exists N \in \mathbb{N}_0 \forall n \in \mathbb{N}_0 : \quad (n \geq N \implies x_n < \alpha)$$

teljesül. Valóban, ha $3 \leq \alpha \in \mathbb{R}$, akkor

$$2 - n^3 < \alpha \quad \iff \quad 2 - \alpha < n^3.$$

Így az

$$N := \max \left\{ 0, [\sqrt[3]{2 - \alpha}] + 1 \right\}$$

választás megfelelő.

2. Az órán megmutattuk, hogy $\lim(x_n) = +\infty$. Valóban, ha $0 < \omega \in \mathbb{R}$, akkor bármely $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\frac{n^4 + 2n^2 + 1}{n^2 + 1} > \frac{n^4}{n^2 + 1} \geq \frac{n^4}{n^2 + n^2} = \frac{n^4}{2n^2} = \frac{n^2}{2} > \omega \quad \Longleftrightarrow \quad n > \sqrt{2\omega},$$

így

$$N := \max \left\{ 1, [\sqrt{2\omega}] + 1 \right\} = [\sqrt{2\omega}] + 1.$$

Megjegyezzük, hogy bármely $n \in \mathbb{N}_0$ indexre

$$\frac{n^4 + 2n^2 + 1}{n^2 + 1} = \frac{(n^2 + 1)^2}{n^2 + 1} = n^2 + 1 > n^2 > \omega \quad \Longleftrightarrow \quad n > \sqrt{\omega}.$$

3. Mivel

$$\lim(x_n) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}_0 \forall N \leq n \in \mathbb{N}_0 : -x_n = |x_n| = |x_n - 0| < \varepsilon$$

és

$$-x_n < \varepsilon \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{x_n} < -\frac{1}{\varepsilon} =: \alpha,$$

ezért elmondható, hogy tetszőleges $0 > \alpha \in \mathbb{R}$ számhoz van olyan $N \in \mathbb{N}_0$ (küszöb)index, hogy bármely $N \leq n \in \mathbb{N}_0$ indexre

$$\frac{1}{x_n} < \alpha, \quad \text{azaz} \quad \lim \left(\frac{1}{x_n} \right) = -\infty. \quad \blacksquare$$

5. gyakorlat (2023. 03. 30.)

Emlékeztető. Az alábbi nevezetes határértékeket ismertnek tételezzük fel.

1. Ha $k \in \mathbb{N}$ tetszőlegesen rögzített, akkor

$$(a) \lim \left(\frac{1}{n^k} \right) = 0, \quad (b) \lim (n^k) = +\infty, \quad (c) \lim (\sqrt[k]{n}) = +\infty.$$

2. Ha $m \in \mathbb{N}$ és az $x_n \in [0, +\infty)$ ($n \in \mathbb{N}$) sorozat konvergens, továbbá $\lim(x_n) =: A$, akkor

$$\lim (\sqrt[m]{x_n}) = \sqrt[m]{A}.$$

3. Ha $q \in \mathbb{R}$, akkor

$$\lim(q^n) \begin{cases} = 0 & (|q| < 1), \\ = 1 & (q = 1), \\ = +\infty & (q > 1), \\ \nexists & (q \leq -1). \end{cases}$$

4. Ha $0 < \alpha \in \mathbb{R}$, illetve $x_n \in [0, +\infty)$ ($n \in \mathbb{N}$) olyan sorozat, amelyre $\lim(x_n) \in (0, +\infty)$, akkor

$$(a) \lim (\sqrt[n]{\alpha}) = 1, \quad (b) \lim (\sqrt[n]{n}) = 1, \quad (c) \lim (\sqrt[n]{x_n}) = 1.$$

5. Ha $x \in \mathbb{Q}$, akkor

$$\lim \left(\left(1 + \frac{x}{n} \right)^n \right) = e^x.$$

6. További nevezetes **nullsorozatok**:

$$(a) x_n := \frac{n^k}{a^n} \quad (n \in \mathbb{N}, a \in (1, +\infty));$$

$$(b) x_n := \frac{a^n}{n!} \quad (n \in \mathbb{N}, a \in \mathbb{R});$$

$$(c) x_n := \frac{n!}{n^n} \quad (n \in \mathbb{N}, a \in (1, +\infty)).$$

Emlékeztető. A határértékszámítás során felhasználható eredmények.

1. **A műveletek és a határérték kapcsolata.** Tegyük fel, hogy az

$$x := (x_n), y := (y_n) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$$

sorozatoknak van határértéke. Ha

$$* \in \{+, -, \cdot, /\} \quad \text{és} \quad \lim(x_n) * \lim(y_n) \in \overline{\mathbb{R}},$$

akkor az $x * y$ sorozatnak is van határértéke és

$$\lim(x * y) = \lim(x_n) * \lim(y_n).$$

2. **Sandwich-tétel.** Tegyük fel, hogy az $u, v, w : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ sorozatokra teljesülnek a következők:

(i) van olyan $N \in \mathbb{N}$, hogy bármely $N \leq n \in \mathbb{N}$ indexre $u_n \leq v_n \leq w_n$;

(ii) $\exists \lim(u_n) = \lim(w_n) =: A \in \overline{\mathbb{R}}$.

Ekkor a közrefogott (v_n) sorozatnak is van határértéke: $\lim(v_n) = A$.

3. **A határérték és a rendezés közötti kapcsolat.** Tegyük fel, hogy az $(u_n), (v_n)$ sorozatoknak van határértékük és

$$\lim(u_n) =: A \in \overline{\mathbb{R}}, \quad \lim(v_n) =: B \in \overline{\mathbb{R}}.$$

(1) Ha $A > B$, akkor $\exists N \in \mathbb{N} : \forall N \leq n \in \mathbb{N}$ -re $u_n > v_n$.

(2) Ha $\exists N \in \mathbb{N} : \forall N \leq n \in \mathbb{N}$ -re $u_n \geq v_n$, akkor $A \geq B$.

4. **Monoton sorozatok határértéke (mozgólépcső-elv).** Minden monoton sorozatnak van határértéke. Ha

- $(x_n) \nearrow$, akkor $\lim(x_n) = \sup(x_n)$;
- $(x_n) \searrow$, akkor $\lim(x_n) = \inf(x_n)$.

Megjegyezzük, hogy a határértékekre vonatkozó tételek és műveleti szabályok nagy része a tágabb értelemben vett határértékekre is érvényes. Ezek egyszerű megfogalmazásához kiterjesztjük az algebrai műveleteket az $\overline{\mathbb{R}}$ számhalmazra az alábbiak szerint:

$$a + (-\infty) := (-\infty) + a := -\infty \quad (a \in [-\infty, +\infty)),$$

$$a + (+\infty) := (+\infty) + a := +\infty \quad (a \in (-\infty, +\infty]),$$

$$a \cdot (+\infty) := (+\infty) \cdot a := +\infty \quad (a \in (0, +\infty]),$$

$$a \cdot (+\infty) := (+\infty) \cdot a := -\infty \quad (a \in [-\infty, 0)),$$

$$a \cdot (-\infty) := (-\infty) \cdot a := -\infty \quad (a \in (0, +\infty]),$$

$$a \cdot (-\infty) := (-\infty) \cdot a := +\infty \quad (a \in [-\infty, 0)),$$

$$\frac{a}{+\infty} := \frac{a}{-\infty} := 0 \quad (a \in (-\infty, +\infty)),$$

$$\frac{a}{b} := a \cdot \frac{1}{b} \quad ((a, b) \in (-\infty, +\infty) \times \{-\infty, +\infty\} \cup [-\infty, +\infty] \times (\mathbb{R} \setminus \{0\})).$$

Nem értelmezzük

- $a + \infty$ és $a - \infty$, ill. $a - \infty$ és $a + \infty$ elemek összegét,
- $a \cdot 0$ -nak $a + \infty$ -nel és $a - \infty$ -nel való szorzatát,
- az a/b hányadost, ha $b = 0$, vagy, ha $a, b \in \{-\infty, +\infty\}$.

összeg	$a > 0$	$a = 0$	$a < 0$	$a = +\infty$	$a = -\infty$
$b > 0$	$a + b$			$+\infty$	$-\infty$
$b = 0$				$+\infty$	$-\infty$
$b < 0$				$+\infty$	$-\infty$
$b = +\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	
$b = -\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$		$-\infty$

szorzat	$a > 0$	$a = 0$	$a < 0$	$a = +\infty$	$a = -\infty$
$b > 0$	$a \cdot b$			$+\infty$	$-\infty$
$b = 0$					
$b < 0$				$-\infty$	$+\infty$
$b = +\infty$	$+\infty$		$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$b = -\infty$	$-\infty$		$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$

hányados	$a > 0$	$a = 0$	$a < 0$	$a = +\infty$	$a = -\infty$
$b > 0$	a/b			$+\infty$	$-\infty$
$b = 0$					
$b < 0$	a/b			$-\infty$	$+\infty$
$b = +\infty$	0				
$b = -\infty$	0				

Számítsuk ki az (x_n) sorozat határértékét!

$$1. x_n := \frac{n^3 - 3n^2 + n - 1}{1 - 2n^3 + n} \quad (n \in \mathbb{N}); \quad 2. x_n := \frac{(2-n)^7 + (2+n)^7}{(n^2 + n + 1)(2n + 1)^5} \quad (n \in \mathbb{N});$$

$$3. x_n := \frac{2n^2 - n + 2}{1 - n^2} \quad (n \in \mathbb{N}); \quad 4. x_n := \frac{n^2 + 1}{2n + 1} - \frac{3n^2}{6n - 1} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Útm. Ha a sorozat n -edik tagja két, n pokinomjának hányadosaként írható fel, akkor a törtet érdemes úgy átalakítani, hogy a számlálóból és a nevezőből kiemeljük az n legmagasabb kitevő hatványait.

1. Világos, hogy tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$x_n = \frac{n^3 \cdot \left(1 - \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2} - \frac{1}{n^3}\right)}{n^3 \cdot \left(\frac{1}{n^3} - 2 + \frac{1}{n^2}\right)} = \frac{1 - \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2} - \frac{1}{n^3}}{\frac{1}{n^3} - 2 + \frac{1}{n^2}} \longrightarrow \frac{1 - 0 + 0 - 0}{0 - 2 + 0} = -\frac{1}{2} \quad (n \rightarrow \infty).$$

2. Bármely $n \in \mathbb{N}$ indexre az $n \rightarrow \infty$ határátmenetben

$$x_n = \frac{n^7}{n^7} \cdot \frac{\frac{(2-n)^7 + (2+n)^7}{n^7}}{\frac{(n^2+n+1)(2n+1)^5}{n^7}} = \frac{\left(\frac{2}{n} - 1\right)^7 + \left(\frac{2}{n} + 1\right)^7}{\left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right) \cdot \left(2 + \frac{1}{n}\right)^5} \longrightarrow \frac{(0-1)^7 + (0+1)^7}{(1+0+0) \cdot (2+0)^5} = 0.$$

3. Tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ indexre az $n \rightarrow \infty$ határátmenetben

$$x_n = \frac{n^2}{n^2} \cdot \frac{2 - \frac{1}{n} + \frac{2}{n^2}}{\frac{1}{n^2} - 1} = \frac{2 - \frac{1}{n} + \frac{2}{n^2}}{\frac{1}{n^2} - 1} \longrightarrow \frac{2-0+0}{0-1} = -2.$$

4. Közös nevezőre hozva, majd az imént alkalmazott technikát alkalmazva azt kapjuk, hogy minden $n \in \mathbb{N}$ indexre az $n \rightarrow \infty$ határátmenetben

$$\begin{aligned} x_n &= \frac{(n^2+1)(6n-1) - 3n^2(2n+1)}{(2n+1)(6n-1)} = \frac{-4n^2 + 6n - 1}{12n^2 + 4n - 1} = \\ &= \frac{n^2}{n^2} \cdot \frac{-4 + \frac{6}{n} - \frac{1}{n^2}}{12 + \frac{4}{n} - \frac{1}{n^2}} = \frac{-4 + \frac{6}{n} - \frac{1}{n^2}}{12 + \frac{4}{n} - \frac{1}{n^2}} \longrightarrow \frac{-4}{12} = -\frac{1}{3}. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Feladat. Számítsuk ki a következő határértékeket!

$$1. \lim \left(\frac{1}{n^2} \cdot \sum_{k=1}^n k \right); \quad 2. \lim \left(\frac{P(n)}{Q(n)} \right), \text{ ahol } P, Q \text{ polinom.}$$

Útm.

$$1. \frac{1}{n^2} \cdot \sum_{k=1}^n k = \frac{1}{n^2} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2n} = \frac{1+1/n}{2} \longrightarrow \frac{1}{2} \quad (n \rightarrow \infty).$$

2. Legyen

$$P(x) := \sum_{i=0}^k \alpha_i x^i, \quad Q(x) := \sum_{j=0}^l \beta_j x^j \quad (x \in \mathbb{R}),$$

ahol

$$\alpha_i, \beta_j \in \mathbb{R} \quad (i \in \{0, 1, \dots, k\}; j \in \{0, 1, \dots, l\}) : \quad \alpha_k \cdot \beta_l \neq 0.$$

Legyen

$$x_n := \frac{P(n)}{Q(n)} = \frac{\alpha_k n^k + \alpha_{k-1} n^{k-1} + \dots + \alpha_1 n + \alpha_0}{\beta_l n^l + \beta_{l-1} n^{l-1} + \dots + \beta_1 n + \beta_0} = \frac{n^k}{n^l} \cdot \frac{\alpha_k + \frac{\alpha_{k-1}}{n} + \dots + \frac{\alpha_0}{n^k}}{\beta_l + \frac{\beta_{l-1}}{n} + \dots + \frac{\beta_0}{n^l}} \quad (n \in \mathbb{N}),$$

$$y_n := n^{k-l} \quad \text{és} \quad z_n := \frac{\alpha_k + \frac{\alpha_{k-1}}{n} + \dots + \frac{\alpha_0}{n^k}}{\beta_l + \frac{\beta_{l-1}}{n} + \dots + \frac{\beta_0}{n^l}} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Ekkor

$$\lim(z_n) = \frac{\alpha_k}{\beta_l} \quad \text{és} \quad \lim(y_n) = \begin{cases} 1 & (k = l) \\ +\infty & (k > l) \\ 0 & (k < l). \end{cases}$$

Így

$$\lim(x_n) = \begin{cases} \frac{\alpha_k}{\beta_l} & (k = l), \\ 0 & (k < l), \\ \operatorname{sgn}\left(\frac{\alpha_k}{\beta_l}\right) \infty & (k > l). \end{cases}$$

Számítsuk ki az (x_n) sorozat határértékét!

1. $x_n := \frac{n^4 + n^2 + n + 1}{2n^5 + n - 4} \quad (n \in \mathbb{N});$
2. $x_n := \frac{n^4 - 2n^3 + n + 1}{n^3 - 4n + 3} \quad (n \in \mathbb{N});$
3. $x_n := \frac{n^7 + n - 12}{1 - n^2 + 3n} \quad (n \in \mathbb{N}).$

Ütm. A fentiek következtében

1. $\lim(x_n) = 0;$
2. $\lim(x_n) = +\infty;$
3. $\lim(x_n) = -\infty. \quad \blacksquare$

Emlékeztető. Tudjuk, hogy tetszőleges $0 < a, b \in \mathbb{R}$ esetén

$$\sqrt{a} - \sqrt{b} = (\sqrt{a} - \sqrt{b}) \cdot 1 = (\sqrt{a} - \sqrt{b}) \cdot \frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{a - b}{\sqrt{a} + \sqrt{b}},$$

ill.

$$\sqrt{a} - b = (\sqrt{a} - b) \cdot 1 = (\sqrt{a} - b) \cdot \frac{\sqrt{a} + b}{\sqrt{a} + b} = \frac{a - b^2}{\sqrt{a} + b},$$

továbbá

$$\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b} = (\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}) \cdot 1 = (\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}) \cdot \frac{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}}{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}} = \frac{a - b}{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}}.$$

Feladat. Számítsuk ki az lábbi sorozatok határértékét!

1. $x_n := n^2 \cdot (n - \sqrt{n^2 + 1}) \quad (n \in \mathbb{N}_0);$
2. $x_n := \sqrt{n^2 + 2n + 3} - \sqrt{n^2 - n + 1} \quad (n \in \mathbb{N}_0);$
3. $x_n := \sqrt{\alpha \cdot n^2 + 2n + 1} - 2n \quad (n \in \mathbb{N}_0, \alpha \in [0, +\infty));$
4. $x_n := \sqrt{n^2 + n + 1} - \alpha n \quad (n \in \mathbb{N}_0, \alpha \in \mathbb{R});$
5. $x_n := \sqrt[3]{n + 2} - \sqrt[3]{n} \quad (n \in \mathbb{N}_0).$

Útm.

1. Ha $n \in \mathbb{N}$, akkor

$$\begin{aligned} x_n &= n^2 \cdot (n - \sqrt{n^2 + 1}) \cdot \frac{n + \sqrt{n^2 + 1}}{n + \sqrt{n^2 + 1}} = n^2 \cdot \frac{n^2 - (n^2 + 1)}{n + \sqrt{n^2 + 1}} = \\ &= \frac{-n^2}{n + \sqrt{n^2 + 1}} = \frac{-n}{0 + \sqrt{0 + \frac{1}{n^2}}} \longrightarrow \frac{-\infty}{1 + \sqrt{1 + 0}} = \frac{-\infty}{2} = -\infty \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

2. Ha $n \in \mathbb{N}$, akkor

$$\begin{aligned}
 x_n &= \left(\sqrt{n^2 + 2n + 3} - \sqrt{n^2 - n + 1} \right) \cdot \frac{\sqrt{n^2 + 2n + 3} + \sqrt{n^2 - n + 1}}{\sqrt{n^2 + 2n + 3} + \sqrt{n^2 - n + 1}} = \\
 &= \frac{(n^2 + 2n + 3) - (n^2 - n + 1)}{\sqrt{n^2 + 2n + 3} + \sqrt{n^2 - n + 1}} = \frac{3n + 2}{\sqrt{n^2 + 2n + 3} + \sqrt{n^2 - n + 1}} = \\
 &= \frac{\frac{3n+2}{n}}{\frac{\sqrt{n^2+2n+3}+\sqrt{n^2-n+1}}{n}} = \frac{3 + \frac{2}{n}}{\sqrt{1 + \frac{2}{n} + \frac{3}{n^2}} + \sqrt{1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}}} \rightarrow \\
 &\rightarrow \frac{3 + 0}{\sqrt{1 + 0 + 0} + \sqrt{1 - 0 + 0}} = \frac{3}{2} \quad (n \rightarrow \infty). \quad \blacksquare
 \end{aligned}$$

3. Látható, hogy bármely $n \in \mathbb{N}$ indexre

$$\begin{aligned}
 x_n &= \left(\sqrt{\alpha \cdot n^2 + 2n + 1} - 2n \right) \cdot \frac{\sqrt{\alpha \cdot n^2 + 2n + 1} + 2n}{\sqrt{\alpha \cdot n^2 + 2n + 1} + 2n} = \\
 &= \frac{(\alpha - 4)n^2 + 2n + 1}{\sqrt{\alpha \cdot n^2 + 2n + 1} + 2n} = \frac{\frac{(\alpha - 4)n^2 + 2n + 1}{n}}{\frac{\sqrt{\alpha \cdot n^2 + 2n + 1} + 2n}{n}} = \frac{(\alpha - 4)n + 2 + \frac{1}{n}}{\sqrt{\alpha + \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2}} + 2}.
 \end{aligned}$$

Világos, hogy

$$\alpha - 4 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha = 4.$$

Következésképpen

- $0 \leq \alpha < 4$ esetén

$$\lim \left(\sqrt{\alpha \cdot n^2 + 2n + 1} - 2n \right) = \frac{(-\infty) + 2 + 0}{\sqrt{\alpha + 0 + 0} + 2} = -\infty;$$

- $\alpha = 4$ esetén

$$\lim \left(\sqrt{\alpha \cdot n^2 + 2n + 1} - 2n \right) = \frac{2 + 0}{\sqrt{4 + 0 + 0} + 2} = \frac{1}{2};$$

- $\alpha > 4$ esetén

$$\lim \left(\sqrt{\alpha \cdot n^2 + 2n + 1} - 2n \right) = \frac{(+\infty) + 2 + 0}{\sqrt{\alpha + 0 + 0} + 2} = +\infty.$$

4. Világos, hogy

- $\alpha < 0$ esetén

$$\lim(x_n) = (+\infty) - \alpha \cdot (+\infty) = (+\infty) - (-\infty) = +\infty.$$

- $\alpha = 0$ esetén

$$\lim(x_n) = \lim(\sqrt{n^2 + n + 1}) = +\infty.$$

Ha viszont $\alpha > 0$, akkor

$$\begin{aligned} x_n &= \left(\sqrt{n^2 + n + 1} - \alpha n \right) \cdot \frac{\sqrt{n^2 + n + 1} + \alpha n}{\sqrt{n^2 + n + 1} + \alpha n} = \frac{n^2 + n + 1 - \alpha^2 n^2}{\sqrt{n^2 + n + 1} + \alpha n} = \\ &= \frac{(1 - \alpha^2)n^2 + n + 1}{\sqrt{n^2 + n + 1} + \alpha n} = \frac{\frac{(1 - \alpha^2)n^2 + n + 1}{n}}{\frac{\sqrt{n^2 + n + 1} + \alpha n}{n}} = \frac{(1 - \alpha^2)n + 1 + \frac{1}{n}}{\sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}} + \alpha}. \end{aligned}$$

Világos, hogy ekkor

$$1 - \alpha^2 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha = 1.$$

Következésképpen

- $0 < \alpha < 1$ esetén

$$\lim(x_n) = \frac{(+\infty) + 1 + 0}{\sqrt{1 + 0 + 0} + \alpha} = +\infty;$$

- $\alpha = 1$ esetén bármely $n \in \mathbb{N}$ indexre

$$\lim(x_n) = \frac{1 + \frac{1}{n}}{\sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}} + 1} = \frac{1 + 0}{\sqrt{1 + 0 + 0} + 1} = \frac{1}{2}.$$

- $\alpha > 1$ esetén

$$\lim(x_n) = \frac{(-\infty) + 1 + 0}{\sqrt{1 + 0 + 0} + \alpha} = -\infty.$$

5. Ha $n \in \mathbb{N}$, akkor

$$0 < x_n = \left(\sqrt[3]{n+2} - \sqrt[3]{n} \right) \cdot \frac{\sqrt[3]{(n+2)^2} + \sqrt[3]{(n+2)n} + \sqrt[3]{n^2}}{\sqrt[3]{(n+2)^2} + \sqrt[3]{(n+2)n} + \sqrt[3]{n^2}} =$$

$$= \frac{2}{\sqrt[3]{(n+2)^2} + \sqrt[3]{(n+2)n} + \sqrt[3]{n^2}} < \frac{2}{\sqrt[3]{n^2}} < \frac{2}{3\sqrt[3]{n}}.$$

Így a Sandwich-tétel értelmében $\lim(x_n) = 0$. ■

Feladat. Igazoljuk, hogy fennáll a

$$\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty).$$

határérték-reláció!

Útm. A Bernoulli-egyenlőtlenség felhasználásával

$$1 - \frac{1}{n} = 1 - n \cdot \frac{1}{n^2} \leq \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n \leq 1 \quad (n \in \mathbb{N})$$

adódik, így a Sandwich-tétel következtében az igazolandó állítást kapjuk. ■

Feladat. Legyen $(x_n) : \mathbb{N} \rightarrow [0, +\infty)$ olyan sorozat, amelyre $\lim(x_n) \in (0, +\infty)$. Mutassuk meg, hogy ekkor fennáll a

$$\lim(\sqrt[n]{x_n}) = 1$$

határérték-reláció!

Útm. Legyen

$$\lim(x_n) =: \alpha \in (0, +\infty).$$

Ekkor

$$\exists N \in \mathbb{N} \forall N \leq n \in \mathbb{N} : |x_n - \alpha| < \frac{\alpha}{2}.$$

Így

$$|x_n - \alpha| < \frac{\alpha}{2} \iff -\frac{\alpha}{2} < x_n - \alpha < \frac{\alpha}{2} \iff \frac{\alpha}{2} < x_n < \frac{3\alpha}{2}$$

következtében, ha $n \in \mathbb{N}$, $n \geq N$, akkor

$$\sqrt[n]{\frac{\alpha}{2}} < \sqrt[n]{x_n} < \sqrt[n]{\frac{3\alpha}{2}},$$

tehát a Sandwich-tétel értelmében

$$\lim (\sqrt[n]{x_n}) = 1. \quad \blacksquare$$

Feladat. Legyen $0 < a, b \in \mathbb{R}$. Számítsuk ki az alábbi sorozatok határértékét!

$$1. \ x_n := \sqrt[n]{3n^5 + 2n + 1} \quad (n \in \mathbb{N}); \quad 2. \ x_n := \sqrt[n]{\frac{n+1}{2n+3}} \quad (n \in \mathbb{N});$$

$$3. \ x_n := \sqrt[n]{\frac{3^n}{n!} + 2^n} \quad (n \in \mathbb{N}); \quad 4. \ x_n := \sqrt[n]{a^n + b^n} \quad (n \in \mathbb{N});$$

$$5. \ x_n := \sqrt[n]{1 + 3^{2n}} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Útm.

1. Mivel

$$\sqrt[n]{3n^5} \leq \sqrt[n]{3n^5 + 2n + 1} \leq \sqrt[n]{3n^5 + 2n^5 + n^5} = \sqrt[n]{6n^5} \quad (n \in \mathbb{N})$$

és

$$\sqrt[n]{3n^5} = \sqrt[n]{3} \cdot (\sqrt[n]{n})^5 \xrightarrow{(n \rightarrow \infty)} 1 \cdot 1^5 = 1 = 1 \cdot 1^5 \xleftarrow{(n \rightarrow \infty)} \sqrt[n]{6} \cdot (\sqrt[n]{n})^5,$$

ezért a Sandwich-tétel felhasználásával azt kapjuk, hogy

$$\lim(x_n) = 1.$$

Megjegyzés. Tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ indexre

$$\begin{aligned} x_n &= \sqrt[n]{3n^5 + 2n + 1} = \sqrt[n]{n^5 \left(3 + \frac{2}{n^4} + \frac{1}{n^5} \right)} = \\ &= (\sqrt[n]{n})^5 \cdot \sqrt[n]{3 + \frac{2}{n^4} + \frac{1}{n^5}} \xrightarrow{(n \rightarrow \infty)} 1^5 \cdot 1 = 1, \end{aligned}$$

hiszen

$$\lim \left(3 + \frac{2}{n^4} + \frac{1}{n^5} \right) = 3 + 0 + 0 = 3 \in (0, +\infty).$$

2. Világos, hogy

$$\sqrt[n]{\frac{1}{5}} = \sqrt[n]{\frac{n}{5n}} = \sqrt[n]{\frac{n}{2n+3n}} \leq \sqrt[n]{\frac{n+1}{2n+3}} \leq \sqrt[n]{\frac{n+n}{2n}} = \sqrt[n]{1},$$

így

$$\lim \left(\sqrt[n]{\frac{1}{5}} \right) = 1 = \lim \left(\sqrt[n]{1} \right)$$

következtében

$$\lim (x_n) = 1.$$

Megjegyzés. Tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ indexre

$$\lim \left(\frac{n+1}{2n+3} \right) = \frac{1}{2},$$

így (vö. fenti feladat)

$$\lim (x_n) = 1.$$

3. Mivel $\lim \left(\frac{3^n}{n!} \right) = 0$, ezért van olyan $N \in \mathbb{N}$, hogy bármely $N \leq n \in \mathbb{N}$ indexre $\frac{3^n}{n!} < 1$, így az ilyen n -ekre

$$2 = \sqrt[n]{2^n} \leq \sqrt[n]{\frac{3^n}{n!} + 2^n} \leq \sqrt[n]{1 + 2^n} \leq \sqrt[n]{2^n + 2^n} = \sqrt[n]{2} \cdot \sqrt[n]{2^n} = 2 \cdot \sqrt[n]{2}.$$

Ennélfogva

$$\lim \left(\sqrt[n]{2} \right) = 1$$

következtében

$$\lim (x_n) = 2.$$

Megjegyzés. Mivel tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ indexre

$$x_n = 2 \cdot \sqrt[n]{\frac{(3/2)^n}{n!} + 1}$$

és

$$\lim \left(\frac{(3/2)^n}{n!} + 1 \right) = 0 + 1 = 1 > 0,$$

ezért (vö. korábbi feladat)

$$\lim(x_n) = 2 \cdot 1 = 2.$$

4. Mivel bármely $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\max\{a, b\} = \sqrt[n]{\max\{a, b\}^n} \leq \sqrt[n]{a^n + b^n} \leq \sqrt[n]{2 \cdot \max\{a, b\}^n} = \sqrt[n]{2} \cdot \max\{a, b\}$$

és

$$\sqrt[n]{2} \longrightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty),$$

ezért a Sandwich-tétel felhasználásával azt kapjuk, hogy

$$\lim(x_n) = \max\{a, b\}.$$

5. Mivel

$$9 = \sqrt[n]{3^{2n}} \leq \sqrt[n]{1 + 3^{2n}} \leq \sqrt[n]{3^{2n} + 3^{2n}} = \sqrt[n]{2} \cdot 9$$

és

$$\lim\left(\sqrt[n]{2}\right) = 1,$$

ezért a Sandwich-tétel felhasználásával azt kapjuk, hogy

$$\lim\left(\sqrt[n]{1 + 3^{2n}}\right) = 9. \quad \blacksquare$$

A későbbiek szempontjából is nagyon fontos az alábbi

Tétel. Tegyük fel, hogy az

$$x_n \in (0, +\infty) \quad (n \in \mathbb{N}_0)$$

sorozat esetében

$$0 \leq \lim\left(\frac{x_{n+1}}{x_n}\right) < 1 \quad \text{vagy} \quad 0 \leq \lim\left(\sqrt[n]{x_n}\right) < 1$$

teljesül. Ekkor fennál a

$$\lim(x_n) = 0$$

határérték-reláció.

Biz.

1. lépés. Legyen

$$\alpha := \lim\left(\frac{x_{n+1}}{x_n}\right).$$

Ekkor $0 \leq \alpha < 1$. Legyen

$$q \in (\alpha, 1) \quad \text{és} \quad \varepsilon := q - \alpha.$$

Ekkor $\varepsilon > 0$, így a konvergencia következtében van olyan $N \in \mathbb{N}$, hogy minden $N \leq n \in \mathbb{N}_0$ esetén

$$\left| \frac{x_{n+1}}{x_n} - \alpha \right| < \varepsilon \quad \implies \quad -\varepsilon < \frac{x_{n+1}}{x_n} - \alpha < \varepsilon \quad \implies \quad 0 < \frac{x_{n+1}}{x_n} < \varepsilon + \alpha = q.$$

Ezért

$$0 < \frac{x_{n+1}}{x_N} = \prod_{k=N}^n \frac{x_{k+1}}{x_k} = \frac{x_{N+1}}{x_N} \cdot \frac{x_{N+2}}{x_{N+1}} \cdot \dots \cdot \frac{x_n}{x_{n-1}} \cdot \frac{x_{n+1}}{x_n} < q^{n-N+1} \quad (N \leq n \in \mathbb{N}),$$

azaz

$$0 < x_{n+1} < x_N \cdot q^{n-N+1}.$$

Mivel

$$\lim (x_N \cdot q^{n-N+1}) = x_N \cdot \lim (q^{n-N+1}) = 0,$$

ezért a Sandwich-tétel következtében $\lim (x_n) = 0$.

2. lépés. Legyen

$$\beta := \lim (\sqrt[n]{x_n}).$$

Ekkor $0 \leq \beta < 1$. Legyen

$$q \in (\beta, 1) \quad \text{és} \quad \varepsilon := q - \beta.$$

Ekkor $\varepsilon > 0$, így a konvergencia következtében van olyan $N \in \mathbb{N}$, hogy minden $N \leq n \in \mathbb{N}_0$ esetén

$$|\sqrt[n]{x_n} - \beta| < \varepsilon \quad \implies \quad -\varepsilon < \sqrt[n]{x_n} - \beta < \varepsilon \quad \implies \quad 0 < \sqrt[n]{x_n} < \beta + \varepsilon = q.$$

Ezért

$$0 < x_n < q^n \quad (N \leq n \in \mathbb{N}_0),$$

ahonnan a Sandwich-tétel felhasználásával $\lim (x_n) = 0$ adódik. ■

Példák.

1. Ha $k \in \mathbb{N}$, $q \in (-1, 1)$, azaz $|q| < 1$ és

$$x_n := n^k \cdot q^n \quad (n \in \mathbb{N}_0),$$

akkor az

$$(y_n) := (|x_n|)$$

sorozatra

$$0 < \sqrt[n]{y_n} = (\sqrt[n]{n})^k \cdot |q| \longrightarrow 1^k \cdot |q| = |q| < 1 \quad (n \rightarrow \infty).$$

Következésképpen

$$\lim(y_n) = 0, \quad \text{így} \quad \lim(n^k \cdot q^n) = \lim(x_n) = 0.$$

2. Ha $a \in \mathbb{R}$ és

$$x_n := \frac{a^n}{n!} \quad (n \in \mathbb{N}_0),$$

akkor az

$$(y_n) := (|x_n|)$$

sorozatra $a \neq 0$ esetén

$$\frac{y_{n+1}}{y_n} = \frac{|a|^{n+1}}{(n+1)!} : \frac{|a|^n}{n!} = \frac{|a|^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{|a|^n} = \frac{|a|}{n+1} \longrightarrow 0 < 1 \quad (n \rightarrow \infty).$$

Következésképpen ($a = 0$ esetén meg különösképp)

$$\lim(y_n) = 0, \quad \text{így} \quad \lim\left(\frac{a^n}{n!}\right) = \lim(x_n) = 0.$$

Feladat. Számítsuk ki az alábbi sorozatok határértékét!

$$1. \ x_n := \frac{5^{n+1} + 2^n}{3 \cdot 5^n - 5^{-n}} \quad (n \in \mathbb{N}); \quad 2. \ x_n := \frac{n^2 \cdot 3^n + 2^{2n}}{4^{n+1} + 2^n} \quad (n \in \mathbb{N});$$

$$3. \ x_n := \sqrt{\frac{(-5)^n + 7^n}{7^{n+1} + n^7}} \quad (n \in \mathbb{N}); \quad 4. \ x_n := \frac{(-2)^n + n}{n! + 3^n} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Útm.

1. Az 5^n számmal egyszerűsítve azt kapjuk, hogy

$$x_n = \frac{5^{n+1} + 2^n}{3 \cdot 5^n - 5^{-n}} = \frac{5 + (2/5)^n}{3 - (25)^{-n}} \longrightarrow \frac{5 + 0}{3 - 0} = \frac{5}{3} \quad (n \rightarrow \infty).$$

2. A 4^n számmal egyszerűsítve azt kapjuk, hogy

$$x_n = \frac{n^2 \cdot 3^n + 2^{2n}}{4^{n+1} + 2^n} = \frac{n^2 \cdot (3/4)^n + 1}{4 + (1/2)^n} \longrightarrow \frac{0 + 1}{4 + 0} = \frac{1}{4} \quad (n \rightarrow \infty).$$

3. A 7^n számmal egyszerűsítve azt kapjuk, hogy

$$x_n = \sqrt{\frac{(-5)^n + 7^n}{7^{n+1} + n^7}} = \sqrt{\frac{(-5/7)^n + 1}{7 + n^7(1/7)^n}} \longrightarrow \sqrt{\frac{0 + 1}{7 + 0}} = \frac{1}{\sqrt{7}} \quad (n \rightarrow \infty).$$

4. Az $n!$ számmal egyszerűsítve azt kapjuk, hogy

$$x_n = \frac{(-2)^n + n}{n! + 3^n} = \frac{\frac{(-2)^n}{n!} + \frac{1}{(n-1)!}}{1 + \frac{3^n}{n!}} \longrightarrow \frac{0 + 0}{1 + 0} = 0 \quad (n \rightarrow \infty). \quad \blacksquare$$

Házi feladat. Legyen $n \in \mathbb{N}$. Számítsuk ki $\lim(x_n)$ -et az alábbi esetekben!

1. $x_n := \frac{\sqrt{n^2+1} + \sqrt{n}}{\sqrt[4]{n^3+n} - n};$

2. $x_n := \sqrt{n^3+1} - n;$

3. $x_n := \sqrt[3]{(n+1)^2} - \sqrt[3]{(n-1)^2};$

4. $x_n := \frac{\sqrt{n^2+1} - \sqrt[3]{n^2+1}}{\sqrt[4]{n^4+1} - \sqrt[5]{n^4+1}};$

5. $x_n := \frac{\sqrt[5]{n^7+3} + \sqrt[4]{2n^3-1}}{\sqrt[6]{n^8+n^7+1} - n};$

6. $x_n := \frac{\sqrt[3]{n^4+3} - \sqrt[5]{n^3+4}}{\sqrt[3]{n^7+1}};$

7. $x_n := \frac{\sqrt{n^2+1} - \sqrt[3]{n^2+1}}{\sqrt[4]{n^4+1} - \sqrt[5]{n^4+1}};$

8. $x_n := \frac{(n+1)^{10} + (n+2)^{10} + \dots + (n+100)^{10}}{n^{10} + 10^{10}};$

9. $x_n := \sqrt{n^2-2n-1} - \sqrt{n^2-7n+3};$

10. $x_n := \phi(n) \cdot (\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1} - 2\sqrt{n}),$
 $\phi(n) \in \{\sqrt[3]{n^2}, \sqrt{n^3}\};$

11. $x_n := n^3 \cdot (\sqrt{n^2 + \sqrt{n^4+1}} - n\sqrt{2});$

12. $x_n := \sqrt{n + \sqrt{n}} - \sqrt{n - \sqrt{n}};$

13. $x_n := \sqrt[3]{x^2} \cdot (\sqrt{n^3+1} - \sqrt{n^3-1});$

14. $x_n := \frac{\sqrt[3]{n+1} - 1}{n}.$

Útm.

1. Tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$x_n = \frac{\sqrt{1 + \frac{1}{n^2}} + \sqrt{\frac{1}{n}}}{\sqrt[4]{\frac{1}{n} + \frac{1}{n^3}} - 1} \longrightarrow \frac{\sqrt{1+0} + 0}{\sqrt[4]{0+0} - 1} = -1 \quad (n \rightarrow \infty).$$

2. Tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\begin{aligned} x_n &= \left(\sqrt{n^3 + 1} - n \right) \cdot \frac{\sqrt{n^3 + 1} + n}{\sqrt{n^3 + 1} + n} = \frac{n^3 + 1 - n}{\sqrt{n^3 + 1} + n} = \frac{n^3 \left(1 + \frac{1}{n^3} - \frac{1}{n} \right)}{n^{3/2} \cdot \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n^3}} + \sqrt{\frac{1}{n}} \right)} = \\ &= n^{3/2} \cdot \frac{1 + \frac{1}{n^3} - \frac{1}{n}}{\sqrt{1 + \frac{1}{n^3}} + \sqrt{\frac{1}{n}}} \longrightarrow +\infty \cdot 1 = +\infty \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

3. Tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\begin{aligned} x_n &= \left(\sqrt[3]{(n+1)^2} - \sqrt[3]{(n-1)^2} \right) \cdot \frac{\sqrt[3]{(n+1)^4} + \sqrt[3]{(n+1)^2(n-1)^2} + \sqrt[3]{(n-1)^4}}{\sqrt[3]{(n+1)^4} + \sqrt[3]{(n+1)^2(n-1)^2} + \sqrt[3]{(n-1)^4}} = \\ &= \frac{(n+1)^2 - (n-1)^2}{\sqrt[3]{(n+1)^4} + \sqrt[3]{(n+1)^2(n-1)^2} + \sqrt[3]{(n-1)^4}} = \\ &= \frac{4n}{\sqrt[3]{(n+1)^4} + \sqrt[3]{(n+1)^2(n-1)^2} + \sqrt[3]{(n-1)^4}} = \\ &= \frac{4n}{n^{4/3} \cdot \left\{ \sqrt[3]{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^4} + \sqrt[3]{\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^2} + \sqrt[3]{\left(1 - \frac{1}{n}\right)^4} \right\}} = \\ &= \frac{1}{\sqrt[3]{n}} \cdot \frac{4}{\sqrt[3]{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^4} + \sqrt[3]{\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^2} + \sqrt[3]{\left(1 - \frac{1}{n}\right)^4}} \longrightarrow 0 \cdot \frac{4}{3} = 0 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

4. Tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$x_n = \frac{n \cdot \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n^2}} - \sqrt[3]{\frac{1}{n} + \frac{1}{n^3}} \right)}{n \cdot \left(\sqrt[4]{1 + \frac{1}{n^4}} - \sqrt[5]{\frac{1}{n} + \frac{1}{n^5}} \right)} = \frac{\sqrt{1 + \frac{1}{n^2}} - \sqrt[3]{\frac{1}{n} + \frac{1}{n^3}}}{\sqrt[4]{1 + \frac{1}{n^4}} - \sqrt[5]{\frac{1}{n} + \frac{1}{n^5}}} \longrightarrow \frac{1-0}{1-0} = 1 \quad (n \rightarrow \infty).$$

5. Tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ esetén az $n \rightarrow \infty$ határátmenetben

$$x_n = \frac{n^{7/5} \cdot \left(\sqrt[5]{1 + \frac{3}{n^7}} + \sqrt[4]{\frac{2}{n^{13/5}} - \frac{1}{n^{21/5}}} \right)}{n^{4/3} \cdot \left(\sqrt[6]{1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^8}} - \frac{1}{n^{1/3}} \right)} = \frac{\sqrt[5]{1 + \frac{3}{n^7}} + \sqrt[4]{\frac{2}{n^{13/5}} - \frac{1}{n^{21/5}}}}{\sqrt[6]{1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^8}} - \frac{1}{n^{1/3}}} \rightarrow (+\infty) \cdot \frac{1+0}{1-0} = +\infty.$$

6. Tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ esetén az $n \rightarrow \infty$ határátmenetben

$$x_n = \frac{n^{4/3} \cdot \left(\sqrt[3]{1 + \frac{3}{n^4}} - \sqrt[5]{\frac{1}{n^{11/3}} + \frac{4}{n^{20/3}}} \right)}{n^{7/3} \cdot \left(\sqrt[3]{1 + \frac{1}{n^7}} \right)} = \frac{\sqrt[3]{1 + \frac{3}{n^4}} - \sqrt[5]{\frac{1}{n^{11/3}} + \frac{4}{n^{20/3}}}}{\sqrt[3]{1 + \frac{1}{n^7}}} \rightarrow 0 \cdot \frac{1-0}{1} = 0.$$

7. Tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$x_n = \frac{n \cdot \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n^2}} - \sqrt[3]{\frac{1}{n} + \frac{1}{n^3}} \right)}{n \cdot \left(\sqrt[4]{1 + \frac{1}{n^4}} - \sqrt[5]{\frac{1}{n} + \frac{1}{n^5}} \right)} = \frac{\sqrt{1 + \frac{1}{n^2}} - \sqrt[3]{\frac{1}{n} + \frac{1}{n^3}}}{\sqrt[4]{1 + \frac{1}{n^4}} - \sqrt[5]{\frac{1}{n} + \frac{1}{n^5}}} \rightarrow \frac{1-0}{1-0} = 1 \quad (n \rightarrow \infty).$$

8. Tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$x_n = \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{10} + \left(1 + \frac{2}{n}\right)^{10} + \dots + \left(1 + \frac{100}{n}\right)^{10}}{1 + \left(\frac{10}{n}\right)^{10}} \rightarrow \frac{100 \cdot 1}{1+0} = 100 \quad (n \rightarrow \infty).$$

9. Tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\begin{aligned} x_n &= \left(\sqrt{n^2 - 2n - 1} - \sqrt{n^2 - 7n + 3} \right) \cdot \frac{\sqrt{n^2 - 2n - 1} + \sqrt{n^2 - 7n + 3}}{\sqrt{n^2 - 2n - 1} + \sqrt{n^2 - 7n + 3}} = \\ &= \frac{n^2 - 2n - 1 - n^2 + 7n - 3}{\sqrt{n^2 - 2n - 1} + \sqrt{n^2 - 7n + 3}} = \frac{5n - 4}{\sqrt{n^2 - 2n - 1} + \sqrt{n^2 - 7n + 3}} = \\ &= \frac{5 - \frac{4}{n}}{\sqrt{1 - \frac{2}{n} - \frac{1}{n^2}} + \sqrt{1 - \frac{7}{n} + \frac{3}{n^2}}} \rightarrow \frac{5-0}{1+1} = \frac{5}{2} \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

10. Tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\begin{aligned}
 x_n &= \phi(n) \cdot \left(\sqrt{n+1} - \sqrt{n} + \sqrt{n-1} - \sqrt{n} \right) = \\
 &= \phi(n) \cdot \left(\frac{n+1-n}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} + \frac{n-1-n}{\sqrt{n-1}+\sqrt{n}} \right) = \\
 &= \phi(n) \cdot \frac{\sqrt{n-1}+\sqrt{n}-\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{(\sqrt{n+1}+\sqrt{n}) \cdot (\sqrt{n-1}+\sqrt{n})} = \\
 &= \phi(n) \cdot \frac{\sqrt{n-1}-\sqrt{n+1}}{(\sqrt{n+1}+\sqrt{n}) \cdot (\sqrt{n-1}+\sqrt{n})} \cdot \frac{\sqrt{n-1}+\sqrt{n+1}}{\sqrt{n-1}+\sqrt{n+1}} = \\
 &= \phi(n) \cdot \frac{n-1-n-1}{(\sqrt{n+1}+\sqrt{n}) \cdot (\sqrt{n-1}+\sqrt{n}) \cdot (\sqrt{n-1}+\sqrt{n+1})}.
 \end{aligned}$$

Ha

- $\phi(n) = \sqrt[3]{n^2}$, akkor az $n \rightarrow \infty$ határátmenetben

$$\begin{aligned}
 x_n &= \frac{-2n^{2/3}}{n^{3/2} \cdot \left(\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1 \right) \cdot \left(\sqrt{1-\frac{1}{n}}+1 \right) \cdot \left(\sqrt{1-\frac{1}{n}}+\sqrt{1+\frac{1}{n}} \right)} = \\
 &= n^{-5/6} \cdot \frac{-2}{\left(\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1 \right) \cdot \left(\sqrt{1-\frac{1}{n}}+1 \right) \cdot \left(\sqrt{1-\frac{1}{n}}+\sqrt{1+\frac{1}{n}} \right)} \longrightarrow \\
 &\longrightarrow 0 \cdot \frac{-2}{8} = 0;
 \end{aligned}$$

- $\phi(n) = \sqrt{n^3}$, akkor az $n \rightarrow \infty$ határátmenetben

$$\begin{aligned}
 x_n &= \frac{-2n^{3/2}}{n^{3/2} \cdot \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1\right) \cdot \left(\sqrt{1 - \frac{1}{n}} + 1\right) \cdot \left(\sqrt{1 - \frac{1}{n}} + \sqrt{1 + \frac{1}{n}}\right)} = \\
 &= \frac{-2}{\left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1\right) \cdot \left(\sqrt{1 - \frac{1}{n}} + 1\right) \cdot \left(\sqrt{1 - \frac{1}{n}} + \sqrt{1 + \frac{1}{n}}\right)} \rightarrow \\
 &\rightarrow \frac{-2}{(1+1)(1+1)(1+1)} = -\frac{1}{4}.
 \end{aligned}$$

11. Tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ esetén az $n \rightarrow \infty$ határátmenetben

$$\begin{aligned}
 x_n &= n^3 \cdot \left(\sqrt{n^2 + \sqrt{n^4 + 1}} - n\sqrt{2}\right) \cdot \frac{\sqrt{n^2 + \sqrt{n^4 + 1}} + n\sqrt{2}}{\sqrt{n^2 + \sqrt{n^4 + 1}} + n\sqrt{2}} = \\
 &= n^3 \cdot \frac{n^2 + \sqrt{n^4 + 1} - 2n^2}{\sqrt{n^2 + \sqrt{n^4 + 1}} + n\sqrt{2}} = n^3 \cdot \frac{\sqrt{n^4 + 1} - n^2}{\sqrt{n^2 + \sqrt{n^4 + 1}} + n\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{n^4 + 1} + n^2}{\sqrt{n^4 + 1} + n^2} = \\
 &= n^3 \cdot \frac{n^4 + 1 - n^4}{\left(\sqrt{n^2 + \sqrt{n^4 + 1}} + n\sqrt{2}\right) \left(\sqrt{n^4 + 1} + n^2\right)} = \\
 &= \frac{n^3}{n^3 \cdot \left(\sqrt{1 + \sqrt{1 + \frac{1}{n^4}}} + \sqrt{2}\right) \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n^4}} + 1\right)} \rightarrow \frac{1}{(\sqrt{2} + \sqrt{2})(1+1)} = \frac{1}{4\sqrt{2}}.
 \end{aligned}$$

12. Tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\begin{aligned} x_n &= \left(\sqrt{n + \sqrt{n}} - \sqrt{n - \sqrt{n}} \right) \cdot \frac{\sqrt{n + \sqrt{n}} + \sqrt{n - \sqrt{n}}}{\sqrt{n + \sqrt{n}} + \sqrt{n - \sqrt{n}}} = \frac{n + \sqrt{n} - n + \sqrt{n}}{\sqrt{n + \sqrt{n}} + \sqrt{n - \sqrt{n}}} = \\ &= \frac{2}{\sqrt{1 + \frac{1}{\sqrt{n}}} + \sqrt{1 - \frac{1}{\sqrt{n}}}} \longrightarrow \frac{2}{1 + 1} = 1 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

13. Tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\begin{aligned} x_n &= \sqrt[3]{n^2} \cdot \left(\sqrt{n^3 + 1} - \sqrt{n^3 - 1} \right) \cdot \frac{\sqrt{n^3 + 1} + \sqrt{n^3 - 1}}{\sqrt{n^3 + 1} + \sqrt{n^3 - 1}} = \sqrt[3]{n^2} \cdot \frac{n^3 + 1 - n^3 + 1}{\sqrt{n^3 + 1} + \sqrt{n^3 - 1}} = \\ &= \sqrt[3]{n^2} \cdot \frac{2}{n^{3/2} \cdot \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n^3}} + \sqrt{1 - \frac{1}{n^3}} \right)} = \frac{2}{n^{5/6} \cdot \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n^3}} + \sqrt{1 - \frac{1}{n^3}} \right)} \longrightarrow \\ &\longrightarrow \frac{2}{(+\infty) \cdot (1 + 1)} = 0 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

14. Tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$x_n = \sqrt[3]{\frac{1}{n^3} + \frac{1}{n^2}} - \frac{1}{n} \longrightarrow 0 - 0 = 0 \quad (n \rightarrow \infty). \quad \blacksquare$$

Házi feladatok.

1. Számítsuk ki az alábbi sorozatok határértékét!

$$(a) \ x_n := \frac{n^3 - 2n - 1}{-3n^3 + n + 3} \quad (n \in \mathbb{N}_0); \quad (b) \ x_n := \frac{(n+1)^3 + (n-1)^3}{n^3 + 1} \quad (n \in \mathbb{N}_0).$$

2. Konvergensek-e a következő sorozatok? Ha igen, akkor mi a határértékük?

$$(a) \ x_n := \sqrt{n^2 + 3n + 1} - 2n \quad (n \in \mathbb{N}_0); \quad (b) \ x_n := n \cdot \left(n - \sqrt{n^2 + 1} \right) \quad (n \in \mathbb{N}_0).$$

3. Számítsuk ki az alábbi sorozatok határértékét!

$$(a) \ x_n := \sqrt[n]{n^2 + 100} \quad (n \in \mathbb{N}); \quad (b) \ x_n := \sqrt[n]{2 \cdot 5^n + 7^n} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

4. Számítsuk ki az

$$x_n := \frac{n}{n^2 + 1} + \frac{n}{n^2 + 2} + \frac{n}{n^2 + 3} + \dots + \frac{n}{n^2 + n} \quad (n \in \mathbb{N})$$

sorozat határértékét!

5. Számítsuk ki az alábbi sorozatok határértékét!

$$(a) \ x_n := \sqrt{\frac{n^2 + n + 1}{n^2 + 2}} \quad (n \in \mathbb{N}_0); \quad (b) \ x_n := \frac{n - \sqrt{n} - 1}{n + \sqrt{n} + 1} \quad (n \in \mathbb{N}_0)$$

$$(c) \ x_n := \frac{2^n + 2^{-n}}{2^{-n} + 3^n} \quad (n \in \mathbb{N}_0); \quad (d) \ x_n := \frac{n \cdot 2^{n+1} + 3^{2n}}{9^{n-1} + 3^n} \quad (n \in \mathbb{N}_0)$$

$$(e) \ x_n := \sqrt{\frac{(-2)^n + 5^n}{5^{n+1} + n^5}} \quad (n \in \mathbb{N}_0); \quad (f) \ x_n := \frac{(-3)^n + n^3}{n! + 5^n} \quad (n \in \mathbb{N}_0).$$

Útm.

1. (a) Világos, hogy tetszőlegesen $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$x_n = \frac{n^3 - 2n - 1}{-3n^3 + n + 3} = \frac{\frac{n^3 - 2n - 1}{n^3}}{\frac{-3n^3 + n + 3}{n^3}} = \frac{1 - \frac{2}{n^2} - \frac{1}{n^3}}{-3 + \frac{1}{n^2} + \frac{3}{n^3}} \rightarrow \frac{1 - 0 - 0}{-3 + 0 + 0} = -\frac{1}{3} \quad (n \rightarrow \infty).$$

(b) Bármely $n \in \mathbb{N}$ indexre

$$\begin{aligned} x_n &= \frac{(n+1)^3 + (n-1)^3}{n^3 + 1} = \frac{\frac{(n+1)^3 + (n-1)^3}{n^3}}{\frac{n^3 + 1}{n^3}} = \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^3 + \left(1 - \frac{1}{n}\right)^3}{1 + \frac{1}{n^3}} \rightarrow \\ &\rightarrow \frac{(1+0)^3 + (1-0)^3}{1+0} = \frac{2}{1} = 2 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

2. (a) Ha $n \in \mathbb{N}$, akkor

$$\begin{aligned} x_n &= (\sqrt{n^2 + 3n + 1} - 2n) \cdot \frac{\sqrt{n^2 + 3n + 1} + 2n}{\sqrt{n^2 + 3n + 1} + 2n} = \frac{-3n^2 + 3n + 1}{\sqrt{n^2 + 3n + 1} + 2n} = \\ &= \frac{\frac{-3n^2 + 3n + 1}{n}}{\frac{\sqrt{n^2 + 3n + 1} + 2n}{n}} = \frac{-3n + 3 + \frac{1}{n}}{\sqrt{1 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}} + 2} \rightarrow \frac{(-\infty) + 3 + 0}{\sqrt{1 + 0 + 0} + 2} = -\infty \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

(b) Ha $n \in \mathbb{N}$, akkor

$$\begin{aligned} x_n &= n \cdot \left(n - \sqrt{n^2 + 1}\right) \cdot \frac{n + \sqrt{n^2 + 1}}{n + \sqrt{n^2 + 1}} = n \cdot \frac{-1}{n + \sqrt{n^2 + 1}} = \\ &= \frac{-1}{1 + \sqrt{1 + \frac{1}{n^2}}} \rightarrow \frac{-1}{1 + \sqrt{1 + 0}} = -\frac{1}{2} \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

3. (a) Mivel

$$(\sqrt[n]{n})^2 = \sqrt[n]{n^2} \leq \sqrt[n]{n^2 + 100} \leq \sqrt[n]{n^2 + 100n^2} = \sqrt[n]{101n^2} = \sqrt[n]{101} \cdot (\sqrt[n]{n})^2 \quad (n \in \mathbb{N})$$

és

$$\sqrt[n]{n} \xrightarrow{(n \rightarrow \infty)} 1 = 1 \xleftarrow{(n \rightarrow \infty)} \sqrt[n]{101},$$

ezért a Sandwich-tétel felhasználásával azt kapjuk, hogy

$$\lim(x_n) = 1.$$

(b) Mivel

$$7 = \sqrt[n]{7^n} \leq \sqrt[n]{2 \cdot 5^n + 7^n} \leq \sqrt[n]{2 \cdot 7^n + 7^n} = \sqrt[n]{3 \cdot 7^n} = \sqrt[n]{3} \cdot 7 \quad (n \in \mathbb{N})$$

és

$$\sqrt[n]{3} \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty),$$

ezért a Sandwich-tétel felhasználásával azt kapjuk, hogy

$$\lim(x_n) = 7.$$

4. Az x_n -beli összeg minden tagját alulról, ill. felülről becsülhetjük az összeg legkisebb, ill. legnagyobb tagjával, azaz tetszőleges n indexre

$$\frac{n}{n^2+n} + \frac{n}{n^2+n} + \frac{n}{n^2+n} + \dots + \frac{n}{n^2+n} \leq x_n \leq \frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+1} + \dots + \frac{n}{n^2+1}.$$

Mivel

$$\frac{n}{n^2+n} + \frac{n}{n^2+n} + \frac{n}{n^2+n} + \dots + \frac{n}{n^2+n} = n \cdot \frac{n}{n^2+n} = \frac{n^2}{n^2+n} \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty)$$

és

$$\frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+1} + \dots + \frac{n}{n^2+1} = n \cdot \frac{n}{n^2+1} = \frac{n^2}{n^2+1} \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty),$$

ezért a Sandwich-tétel felhasználásával azt kapjuk, hogy $\lim(x_n) = 1$.

5. (a) Tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\begin{aligned} x_n &= \sqrt{\frac{n^2+n+1}{n^2+2}} = \sqrt{\frac{\frac{n^2+n+1}{n^2}}{\frac{n^2+2}{n^2}}} = \sqrt{\frac{\frac{n^2+n+1}{n^2}}{\frac{n^2+2}{n^2}}} = \\ &= \sqrt{\frac{1+\frac{1}{n}+\frac{2}{n^2}}{1+\frac{2}{n^2}}} \rightarrow \sqrt{\frac{1+0+0}{1+0}} = \sqrt{1} = 1 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

(b) Bármely $n \in \mathbb{N}$ indexre

$$x_n = \frac{n - \sqrt{n} - 1}{n + \sqrt{n} + 1} = \frac{\frac{n - \sqrt{n} - 1}{n}}{\frac{n + \sqrt{n} + 1}{n}} = \frac{1 - \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{n}}{1 + \frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n}} \longrightarrow \frac{1 - 0 - 0}{1 + 0 + 0} = 1 \quad (n \rightarrow \infty).$$

(c) A 3^n számmal egyszeűsítve

$$x_n = \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^n + \left(\frac{1}{6}\right)^n}{\left(\frac{1}{6}\right)^n + 1} \longrightarrow \frac{0 + 0}{0 + 1} = 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

(d) A 9^n számmal egyszeűsítve

$$x_n = \frac{n \cdot 2^{n+1} + 3^{2n}}{9^{n-1} + 3^n} = \frac{2n \cdot 2^n + 9^n}{\frac{9^n}{9} + 3^n} = \frac{2n \cdot \left(\frac{2}{9}\right)^n + 1}{\frac{1}{9} + \left(\frac{1}{3}\right)^n} \longrightarrow \frac{0 + 1}{\frac{1}{9} + 0} = 9 \quad (n \rightarrow \infty).$$

(e) Az 5^n számmal egyszeűsítve

$$x_n = \sqrt{\frac{(-2)^n + 5^n}{5^{n+1} + n^5}} = \sqrt{\frac{\left(\frac{-2}{5}\right)^n + 1}{5 + \frac{n^5}{5^n}}} \longrightarrow \sqrt{\frac{0 + 1}{5 + 0}} = \sqrt{\frac{1}{5}} \quad (n \rightarrow \infty).$$

(f) Az $n!$ számmal egyszeűsítve

$$x_n = \frac{(-3)^n + n^3}{n! + 5^n} = \frac{\frac{(-3)^n}{n!} + \frac{n^3}{n!}}{1 + \frac{5^n}{n!}} = \frac{\frac{(-3)^n}{n!} + \frac{n^2}{(n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1}}{1 + \frac{5^n}{n!}} \longrightarrow \frac{0 + 0}{1 + 0} = 0 \quad (n \rightarrow \infty). \quad \blacksquare$$

6. gyakorlat (2023. 04. 06.)

Az analízisben alapvető jelentőségű az az állítás, miszerint „egymásba skatulyázott kompakt intervallumok³ közös része nem üres.” Ezt pontosítja a következő tételben megfogalmazott állítás.

Emlékeztető (Cantor-tétel). Minden $n \in \mathbb{N}$ szám esetén legyenek adottak az $[a_n, b_n] \subset \mathbb{R}$ (kompakt) intervallumok, és tegyük fel, hogy

$$[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n] \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Ekkor

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] := \bigcap_{n \in \mathbb{N}} [a_n, b_n] \neq \emptyset,$$

sőt az is igaz, hogy

$$\exists! c \in [a_n, b_n] \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Példa. Tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ esetén legyen

$$a_n := \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, \quad \text{ill.} \quad b_n := \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1}.$$

Ekkor az (a_n) és a (b_n) sorozat teljesíti teljesítik a Cantor-féle közöspont-tétel feltételeit, hiszen

- bármely $n \in \mathbb{N}$ indexre $a_{n+1} - a_n > 0$, $b_{n+1} - b_n < 0$, ui. egyrészt (a_n) monoton növekedő (vö. 1. **GY**), másrészt pedig minden $n \in \mathbb{N}$ indexre a mértani és a számtani közép közötti egyenlőtlenség következtében

$$\frac{1}{b_n} = 1 \cdot \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} < \left(\frac{1 + (n+1) \cdot \frac{n}{n+1}}{n+2}\right)^{n+2} = \left(\frac{1+n}{n+2}\right)^{n+2} = \left(\frac{n+1}{n+2}\right)^{n+2} = \frac{1}{b_{n+1}}.$$

- tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right) = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = b_n;$$

³Ha valamely $a, b \in \mathbb{R}$ esetén $a \leq b$, akkor az $[a, b] := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$ számhalmazt szokás **kompakt intervallumnak** vagy **korlátos és zárt intervallumnak** nevezni.

- ha $\varepsilon \in \mathbb{R}$ tetszőleges és $n \in \mathbb{N}$ olyan, hogy $n > \frac{3}{\varepsilon}$, akkor

$$b_n - a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n} - 1\right) = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \frac{1}{n} < \frac{3}{n} < \varepsilon.$$

Így

$$\exists! e \in \mathbb{R} : \quad \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Megjegyezzük, hogy

1. mivel bármely $n \in \mathbb{N}$ indexre $a_n < e < b_n$, azaz tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ index esetén

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1},$$

ezért

$$2 \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{6}\right)^7 = \frac{823543}{279936} < 3;$$

2. az e szám⁴ bevezetése nem így szokásos, hanem a mozgólépcső-elv felhasználásával:

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \nearrow e \quad (n \rightarrow \infty).$$

3. az

$$e_n := \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad (n \in \mathbb{N})$$

sorozat első néhány tagja:

$$e_1 = 2; \quad e_2 = \frac{9}{4} = 2,25; \quad e_3 = \frac{64}{27} = 2,370; \quad e_4 = \frac{625}{256} = 2,44140625.$$

Később látni fogjuk, hogy

$$2,71825 < e < 2,71829.$$

⁴A e -t Leonhard Euler (1707-1783) tiszteletére **Euler-számnak** is nevezik.

Feladat. Számítsuk ki az alábbi sorozatok határértékét!

$$1. x_n := \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} \quad (n \in \mathbb{N}); \quad 2. x_n := \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \quad (n \in \mathbb{N}); \quad 3. x_n := \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n \quad (n \in \mathbb{N});$$

$$4. x_n := \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^n \quad (n \in \mathbb{N}); \quad 5. x_n := \left(1 - \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^n \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Útm.

$$1. x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right) \longrightarrow e \cdot 1 = e \quad (n \rightarrow \infty).$$

2. Világos, hogy

$$\begin{aligned} x_n &= \left(\frac{n-1}{n}\right)^n = \frac{1}{\left(\frac{n}{n-1}\right)^n} = \frac{1}{\left(\frac{n-1+1}{n-1}\right)^n} = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^n} = \\ &= \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{n-1} \cdot \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)} \longrightarrow \frac{1}{e \cdot 1} = \frac{1}{e} \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

3. Mivel

$$\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^{n^2} \longrightarrow e > 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

ezért

$$\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n = \sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^{n^2}} \longrightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty).$$

4. A Bernoulli-egyenlőtlenséget alkalmazva azt kapjuk, hogy

$$\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^n \geq 1 + \frac{n}{\sqrt{n}} = 1 + \sqrt{n} \longrightarrow +\infty \quad (n \rightarrow \infty).$$

Innen a Sandwich-tétel felhasználásával $\lim(x_n) = +\infty$ következik.

5. Tetszőleges $2 \leq n \in \mathbb{N}$ indexre

$$0 \leq x_n = \left(\frac{\sqrt{n}-1}{\sqrt{n}} \right)^n = \frac{1}{\left(\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n}-1} \right)^n} = \frac{1}{\left(\frac{\sqrt{n}-1+1}{\sqrt{n}-1} \right)^n} = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}-1} \right)^n} \stackrel{\text{Bernoulli}}{\leq} \\ \leq \frac{1}{1 + \frac{n}{\sqrt{n}-1}} = \frac{1}{1 + \frac{\sqrt{n}}{1 - \frac{1}{\sqrt{n}}}} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

Így a Sandwich-tétel következtében azt kapjuk, hogy $\lim(x_n) = 0$. ■

Tétel. Legyen (x_n) olyan sorozat, amelyre $\lim(x_n) \in \{-\infty, +\infty\}$. Ekkor fennáll a

$$\left(1 + \frac{1}{x_n} \right)^{x_n} \rightarrow e \quad (n \rightarrow \infty).$$

határérték-reláció.

Biz.

1. lépés. Ha $x_n > 0$ ($n \in \mathbb{N}$), akkor legyen

$$\mathcal{N} := \{n \in \mathbb{N} : x_n \geq 1\} \quad \text{és} \quad y_n := [x_n] \quad (n \in \mathcal{N}).$$

Ekkor $\lim(y_n) = +\infty$ és

$$y_n \leq x_n \leq y_n + 1, \quad \text{ill.} \quad \frac{1}{y_n} \geq \frac{1}{x_n} \geq \frac{1}{y_n + 1},$$

azaz

$$e \longleftarrow \left(1 + \frac{1}{y_n} \right)^{y_n} \cdot \left(1 + \frac{1}{y_n} \right) = \left(1 + \frac{1}{y_n} \right)^{y_n+1} \geq \left(1 + \frac{1}{x_n} \right)^{x_n} \geq \left(1 + \frac{1}{y_n+1} \right)^{y_n} = \\ = \left(1 + \frac{1}{y_n+1} \right)^{y_n+1} \cdot \left(1 + \frac{1}{y_n+1} \right)^{-1} \rightarrow e$$

2. lépés. Ha $x_n < 0$ ($n \in \mathbb{N}$), akkor legyen

$$y_n := -x_n - 1 \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Ekkor az $n \rightarrow \infty$ határátmenetben

$$\left(1 + \frac{1}{x_n}\right)^{x_n} = \left(1 - \frac{1}{y_n + 1}\right)^{-y_n - 1} = \left(\frac{y_n + 1}{y_n}\right)^{y_n + 1} = \left(1 + \frac{1}{y_n}\right)^{y_n} \cdot \left(1 + \frac{1}{y_n}\right) \rightarrow e. \quad \blacksquare$$

Tétel. Legyen $A \in \mathbb{R}$, (x_n) olyan sorozat, amelyre $\lim(x_n) = +\infty$. Ekkor fennáll a

$$\left(1 + \frac{A}{x_n}\right)^{x_n} \rightarrow e^A \quad (n \rightarrow \infty).$$

határérték-reláció.

Biz. Ha

- $A = 0$, akkor a tétel nyilvánvalóan igaz.
- Ha $A \neq 0$, akkor minden olyan $n \in \mathbb{N}$ esetén, amelyre $x_n > |A|$, fennáll az $1 + \frac{A}{x_n} > 0$ becslés, és így

$$\left(1 + \frac{A}{x_n}\right)^{x_n} = \left[\left(1 + \frac{1}{\frac{x_n}{A}}\right)^{\frac{x_n}{A}}\right]^A \rightarrow e^A \quad (n \rightarrow \infty). \quad \blacksquare$$

Feladat. Számítsuk ki az alábbi sorozatok határértékét!

1. $x_n := \left(\frac{6n-7}{6n+4}\right)^{3n+2} \quad (n \in \mathbb{N}_0);$
2. $x_n := \left(\frac{4n+3}{5n}\right)^{5n} \quad (n \in \mathbb{N});$
3. $x_n := \left(\frac{3n+1}{n+2}\right)^{2n+3} \quad (n \in \mathbb{N}_0).$
4. $x_n := \left(\frac{2n^2+3}{2n^2-2}\right)^{n^2-1} \quad (n \in \mathbb{N}).$

Útm.

1. Világos, hogy

$$x_n = \left(\frac{6n+4-11}{6n+4}\right)^{3n+2} = \left(1 - \frac{11}{6n+4}\right)^{3n+2} = \sqrt{\left(1 + \frac{-11}{6n+4}\right)^{6n+4}} \rightarrow \sqrt{\frac{1}{e^{11}}} \quad (n \rightarrow \infty).$$

2. Mivel bármely $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\left(\frac{4n+3}{5n}\right)^n = \left(\frac{4}{5}\right)^n \cdot \left(\frac{n+3/4}{n}\right)^n,$$

ezért

$$x_n \longrightarrow 0 \cdot e^{3/4} = 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

3. Mivel

$$\frac{3n+1}{n+2} \longrightarrow 3 \quad (n \rightarrow \infty),$$

ezért az $\varepsilon := 1$ számhoz van olyan $N \in \mathbb{N}$ (küszöb)index, hogy bármely $N \leq n \in \mathbb{N}$ indexre

$$\frac{3n+1}{n+2} > 2.$$

Következésképpen az ilyen n -ekre

$$x_n = \left(\frac{3n+1}{n+2}\right)^{2n+3} > 2^{2n+3} \longrightarrow +\infty \quad (n \rightarrow \infty),$$

$$\lim(x_n) = +\infty$$

következik.

4. Világos, hogy az $n \rightarrow \infty$ határátmenetben

$$x_n = \left(\frac{2n^2-2+5}{2n^2-2}\right)^{n^2-1} = \left(1 + \frac{5}{2n^2-2}\right)^{n^2-1} = \sqrt{\left(1 + \frac{5}{2n^2-2}\right)^{2n^2-2}} \longrightarrow \sqrt{e^5}. \quad \blacksquare$$

A matematika egyes ágaiban (diszkrét matematika, differenciaegyenletek), de az informatikában is nagy jelentőséggel bírnak az olyan sorozatok, amelyek tagjait az „előttük lévő” tag(ok) ismeretében értelmezzük. Az ilyen sorozatokat szokás **rekurzív megadású sorozatok**nak nevezni.

Példák.

1. A legenda szerint Hanoi-ban egy kolostorban a lámák egy falapból felfelé kiálló három rudacska egyikére fűzve $n = 64$ darab különböző méretű, közepén lyukas korongot kaptak Buddhától. Legalul volt a legnagyobb, felette a többi, egyre kisebb és kisebb (vö. 4. ábra).

Azt a feladatot adta nekik, hogy juttassák a korngokat valamelyik másik rudacskára úgy, hogy közben csak egyet tehetnek át és semelyiket sem szabad nála kisebbre helyezni. Mire befejezik eljön a világ vége.



4. ábra. Buddha korongjai.

Feladat. Határozzuk meg azoknak a lépéseknek a minimális l_n számát, amelyek n korong ($n \in \mathbb{N}$) átrakásához szükségesek!

Útm. $n = 1$ esetén nyilván $l_1 = 1$. Ha $n = 2$, akkor ahhoz, hogy az első korongot átrakhassuk az első rudacskáról a másikra, előbb a felső korongot át kell tenni egy harmadikra. Ezután átrakhatjuk az első korongot a második rúdra és a tetejére a másik korongot. Eszerint tehát $l_2 = 3$. Hasonló módon három korong közül a legalsó átrakásához előbb a két felsőt kell áttenni a harmadik rúdra, amihez az előbbi gondolatmenet alapján $l_2 = 3$ áthelyezést kell végrehajtanunk. Ezután átrakhatjuk a legalsó korongot a második rúdra, majd ismét két korongot kell áthoznunk a harmadik rúdról a másodikra, újabb $l_2 = 3$ lépésben. Látható tehát, hogy

$$l_3 = 2 \cdot l_2 + 1 = 7.$$

Ugyanilyen módon látható be, hogy

$$l_4 = 2 \cdot l_3 + 1 = 15, \quad l_5 = 2 \cdot l_4 + 1 = 31,$$

és általában

$$l_n = 2 \cdot l_{n-1} + 1 \quad (n \in \mathbb{N}). \quad (17)$$

Az (l_n) sorozat első néhány tagjának felírásával nem nehéz megsejteni, majd teljes indukcióval igazolni, hogy

$$l_n = 2^n - 1 \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Így tehát


$$l_{64} = 2^{64} - 1 = 18446744073709551615 > 1,8 \cdot 10^{19}$$

lépés szükséges a korongoknak a fenti feltételek mellett az egyik rúdról a másikra való átpakolásához. Ha meggondoljuk, hogy l_{64} másodperc 585 milliárd év körül van, és a Naprendszer kb. 4,6 milliárd éves, akkor a világvégével kapcsolatos jóslat nem is annyira elképzelhetetlen. 😊

Játék: Hanoi tornyai

2. Leonardo Pisano – ismert nevén Fibonacci – olasz matematikusnak 1202-ben megjelent **Liber Abaci** című könyvében szerepel a következő

Feladat. Egy ivarérett nyúlpár minden hónapban egy új nyúlpárnak ad életet: egy hímnek és egy nősténynek. A nyulak két hónapos korukra válnak ivaréretté. Egy ivarérett nyúlpártól származó nemzetségnek mekkora lesz a létszáma egy év múlva?



5. ábra. Fibonacci nyulai.

Útm. Kezdjük az összeszámlálást egy újszülött nyúlpárból kiindulva és tételezzük fel, hogy közben egyetlen nyúl sem pusztul el. Az első hónapban egyetlen pár nyulunk van, a másodikban szintén. A harmadik hónapban már nyilván két pár nyulunk lesz: az eredeti pár és ezeknek két hónapos korukban született újszülött párja. A negyedik hónapban az eredeti nyúlpár újabb nyúlpárnak ad életet, az elsőszülött ivadékaik még nem szülnek, így három nyúlpárunk lesz összesen. Az ötödik hónapban meglesz a negyedik hónap három nyúlpárja valamint az újszülöttek, és ezek pontosan annyian lesznek, ahány nyúlpár a harmadik hónapban volt, hiszen a negyedik hónap újszülöttei még nem szülnek, de a harmadik hónap újszülöttei (az öregekkel együtt) már igen. E gondolatsort folytatva az n -edik hónapban lévő nyúlpárok F_n száma adódik egyrészt az $(n - 1)$ -edik hónapban meglévő nyúlpárok

F_{n-1} számából, másrészt az újszülöttekből. Az újszülöttek száma viszont megegyezik az $(n-2)$ -dik hónapban levő nyúlpárok számával, ugyanis pontosan azok fognak az n -edik hónapban szülni, amelyek (akár öreg, akár újszülött nyulak) az $(n-2)$ -dik hónapban megvoltak.

A létszám alakulását a következő áblázat mutatja:

hónap	0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
megszületett párok:	0	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55	89	144

Megjegyzések.

(a) Az F_n számokat **Fibonacci-számok**nak, az

$$F_0 := 0, \quad F_1 := 1, \quad F_n := F_{n-1} + F_{n-2} \quad (2 \leq n \in \mathbb{N}_0) \quad (18)$$

rekurzív sorozatot **Fibonacci-sorozat**nak nevezzük. Az (F_n) sorozat tagjainak explicit alakja:

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right) \quad (n \in \mathbb{N}_0).$$

(b) **Aranymetszés**nek nevezzük egy szakasz olyan kettéosztását, ahol a nagyobbik rész hossza úgy aránylik a kisebbik rész hosszához, mint a szakasz hossza a nagyobbik rész hosszához. Könnyen megmutatható, hogy **egységnyi hosszú szakasz esetében ez az arány** nem más, mint a

$$\lim \left(\frac{F_{n+1}}{F_n} \right)$$

határérték. Ha ui. ha a nagyobbik rész x , akkor egységnyi hosszú szakaszra:

$$\frac{1}{x} = \frac{x}{1-x}, \quad \text{amiből} \quad x^2 + x - 1 = 0,$$

és ennek az egyenletnek egyetlen pozitív gyöke van:

$$x = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2},$$

amire

$$\frac{1}{x} = \frac{2}{\sqrt{5}-1} = \frac{2}{\sqrt{5}-1} \cdot \frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}+1} = \frac{2(\sqrt{5}+1)}{4} = \frac{\sqrt{5}+1}{2}.$$

Az

$$u := \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \text{ill.} \quad v := \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$$

számokkal

$$\frac{F_{n+1}}{F_n} = \frac{u^{n+1} - v^{n+1}}{u^n - v^n} = \frac{u - v \cdot \left(\frac{v}{u}\right)^n}{1 - \left(\frac{v}{u}\right)^n} \longrightarrow \frac{u - 0}{1 - 0} = u \quad (n \rightarrow \infty).^5$$

3. Ha $\alpha, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, akkor az

$$x_1 := \alpha, \quad x_{n+1} := \alpha x_n + \beta \quad (n \in \mathbb{N}) \quad (19)$$

sorozat $\alpha = 1$ esetén **számtani sorozat**:

$$x_1 := \alpha, \quad x_{n+1} := x_n + \beta \quad (n \in \mathbb{N})$$

$\beta = 0$ esetén pedig **mértani sorozat**:

$$x_1 := \alpha, \quad x_{n+1} := \alpha x_n \quad (n \in \mathbb{N}).$$

4. A Mézga-család a bankban az $n = 0$ időpontban K összegű kölcsönt vesz fel, amit időszakosan (havi vagy negyedéves vagy éppen éves időszakonként) törleszt. A törlesztés egy része a kamat, másik része a K tőkét csökkenti. Jelölje t_n az n -edik fizetés utáni tőketartozás nagyságát, az n -edik alkalommal befizetett összeget pedig jelölje b_n . Tegyük fel, hogy az egy periódusra eső $p\%$ kamatláb rögzített. Ekkor az $(n+1)$ -edik periódus elteltével, azaz az $(n+1)$ -edik fizetés megtörténte után a fennmaradó t_{n+1} tőketartozás összetevődik az n -edik periódus utáni t_n tőketartozásból, annak $t_n p/100$ egység-kamatából, csökkentve ezek összegét a befizetett b_n összeggel:

$$t_{n+1} = t_n + t_n \cdot \frac{p}{100} - b_n, \quad \text{vagyis} \quad t_{n+1} = \left(1 + \frac{p}{100}\right) \cdot t_n - b_n, \quad t_0 = K.$$

Adott $k \in \mathbb{N}$ esetén **k -lépéses rekurzióról** beszélünk, ha a sorozat tagjait az előtte lévő k tag függvényében adjuk meg. Egylépéses rekurzió pl. a (17)-beli és a (19)-beli sorozat, kétlépéses rekurzió pl. a (18)-beli Fibonacci-sorozat. Az egylépéses rekurzió esetében a fentiket pontosítja a következő

Definíció. Legyen valamely $H \neq \emptyset$ halmaz esetén adott az $f : H \rightarrow H$ függvény, és legyen adott $\alpha \in H$. Ekkor az

$$x_0 := \alpha, \quad x_{n+1} := f(x_n) \quad (n \in \mathbb{N}_0)$$

rekurzív összefüggésnek eleget tévő $(x_n) : \mathbb{N}_0 \rightarrow H$ sorozatot **α kezdőtagú rekurzív megadású sorozatnak** nevezzük.

⁵HF. Mutassuk meg, hogy fennáll a $|v/u| < 1$ egyenlőtlenség!

Felmerül a kérdés, hogy adott $\alpha \in H$ pont, ill. $f : H \rightarrow H$ függvény esetén van-e ilyen sorozat. Teljes indukcióval belátható, hogy a válasz: igen, sőt pontosan egy ilyen sorozat van (vö. [A Függelék](#)).

Megjegyzés. Általánosítás. Legyen H halmaz, $h \in H$, $k \in \mathbb{N}$, $f : H^k \rightarrow H$. Ekkor pontosan egy olyan $\varphi : \mathbb{N}_0 \rightarrow H$ függvény (**sorozat**) van, amelyre

$$(i) \quad \varphi(0) = h;$$

$$(ii) \quad \text{bármely } n \in \mathbb{N}_0 \text{ esetén } \varphi(n+k) = f(\varphi(1), \dots, \varphi(n)).$$

Példa. Legyen $2 \leq m \in \mathbb{N}$, $0 < A \in \mathbb{R}$, továbbá

$$H := (0, +\infty), \quad f(t) := \frac{1}{m} \left((m-1)t + \frac{A}{t^{m-1}} \right) \quad (t \in H).$$

Ekkor egyszerűen adódik, hogy $f : H \rightarrow H$, ui. a mértani és a számtani közép közötti egyenlőtlenség következtében bármely $t \in H$ esetén

$$f(t) = \frac{\frac{1}{t} + \dots + \frac{1}{t} + \frac{A}{t^{m-1}}}{m} \geq \sqrt[m]{\frac{1}{t} \cdot \dots \cdot \frac{1}{t} \cdot \frac{A}{t^{m-1}}} = \sqrt[m]{t^{m-1} \cdot \frac{A}{t^{m-1}}} = \sqrt[m]{A} > 0,$$

azaz $f(t) > 0$. Ezért a rekurzió-tétel következtében tetszőleges $\alpha, A \in (0, +\infty)$ esetén pontosan egy olyan $(x_n) : \mathbb{N}_0 \rightarrow (0, +\infty)$ sorozat van, amelyre

$$x_0 = \alpha, \quad x_{n+1} = f(x_n) = \frac{1}{m} \left((m-1)x_n + \frac{A}{x_n^{m-1}} \right) \quad (n \in \mathbb{N}_0). \quad (20)$$

Az alábbi feladatban megmutatjuk, hogy a (20) sorozat konvergens.

Feladat. Igazoljuk, hogy a (20)-beli sorozat konvergens, majd számítsuk ki határértékét!

Útm.

1. lépés. A sorozat értelmezéséből teljes indukcióval következik (**HF**), hogy bármely $n \in \mathbb{N}_0$ indexre $x_n > 0$.

2. lépés. Megmutatjuk, hogy a sorozat kvázi-monoton fogyó. Valóban, bármely $n \in \mathbb{N}_0$ indexre

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{1}{m} \cdot \left(m-1 + \frac{A}{x_n^m} \right) = 1 - \frac{1}{m} + \frac{1}{m} \cdot \frac{A}{x_n^m} = 1 - \frac{1}{m} \left(1 - \frac{A}{x_n^m} \right),$$

így az

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} \leq 1 \iff A \leq x_n^m \quad (n \in \mathbb{N})$$

ekvivalencia igaz voltát, illetve a mértani és a számtani közép közötti különbséget kihasználva azt kapjuk, hogy

$$x_{n+1}^m = \left(\frac{\overset{1}{x_n} + \dots + \overset{m-1}{x_n} + \frac{A}{x_n^{m-1}}}{m} \right)^m \geq \overset{1}{x_n} \cdot \dots \cdot \overset{m-1}{x_n} \cdot \frac{A}{x_n^{m-1}} = A \quad (n \in \mathbb{N}_0).$$

3. lépés. A fentiek azt jelentik, hogy (x_n) konvergens. Legyen $\beta := \lim(x_n)$. Ekkor a fentiek következtében $0 < A \leq \beta^m$, és így $\beta > 0$. Az is igaz továbbá, hogy

$$\beta = \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{m} \left((m-1)x_n + \frac{A}{x_n^{m-1}} \right) \right) = \frac{1}{m} \left((m-1)\beta + \frac{A}{\beta^{m-1}} \right),$$

azaz

$$m\beta = m\beta - \beta + \frac{A}{\beta^{m-1}}.$$

Innen áterendezéssel azt kapjuk, hogy

$$\beta^m = A, \quad \text{azaz} \quad \beta = \sqrt[m]{A}. \quad \blacksquare$$

Feladat. Vizsgáljuk meg a következő sorozatokat konvergencia szempontjából!

1. $a \in \mathbb{R}, x_0 := a, x_{n+1} := \frac{2x_n}{n+1} \quad (n \in \mathbb{N}_0);$

2. $x_0 := 2, x_{n+1} := \frac{2x_n}{x_n + 1} \quad (n \in \mathbb{N}_0);$

3. $x_0 := 6, x_{n+1} := 5 - \frac{6}{x_n} \quad (n \in \mathbb{N}_0);$

4. $x_0 := 0, x_{n+1} := \frac{1+x_n^2}{2} \quad (n \in \mathbb{N}_0);$

5. $x_n := \sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}\dots}} \quad (n \in \mathbb{N})$ és itt n darab gyökvonás szerepel;

6. $x_n := \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots}}} \quad (n \in \mathbb{N})$ és itt n darab gyökvonás szerepel;

7. $\alpha \in [0, +\infty), x_1 := 0, x_{n+1} := \sqrt{\alpha + x_n} \quad (n \in \mathbb{N});$

8. $x_0 := 0, x_{n+1} := \alpha + x_n^2 \quad (n \in \mathbb{N}_0; 0 \leq \alpha \in \mathbb{R});$

9. $x_0 := 3, x_{n+1} := 3 - \frac{2}{x_n} \quad (n \in \mathbb{N}_0);$

10. $x_0 := 0, x_{n+1} := \frac{2}{1+x_n} \quad (n \in \mathbb{N}_0).$

Útm.

1. A rekurziót „kibontva” könnyen **megsejthető**, hogy

$$x_n = \frac{2^n}{n!} \cdot a \quad (n \in \mathbb{N}_0),$$

hiszen

$$x_1 = \frac{2a}{1}, \quad x_2 = \frac{4a}{1 \cdot 2}, \quad x_3 = \frac{8a}{1 \cdot 2 \cdot 3}, \quad x_4 = \frac{16a}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}, \quad x_5 = \frac{32a}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}.$$

Ezután ezt az összefüggést a következőképpen igazoljuk. Ha

(a) $a = 0$, akkor tetszőleges $n \in \mathbb{N}_0$ esetén $x_n = 0$, hiszen

- $n = 0$ esetén $x_0 = 0$, továbbá
- ha valamely $n \in \mathbb{N}_0$ esetén $x_n = 0$, akkor

$$x_{n+1} = \frac{2x_n}{n+1} = \frac{2 \cdot 0}{n+1} = 0.$$

(b) $a \neq 0$, akkor persze bármely $n \in \mathbb{N}_0$ esetén $x_n \neq 0$ (**HF.** teljes indukcióval igazolni!), és így

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{\frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \cdot a}{\frac{2^n}{n!} \cdot a} = \frac{2}{n+1}, \quad \text{azaz} \quad x_{n+1} = \frac{2x_n}{n+1} \quad (n \in \mathbb{N}_0).$$

Tudjuk, hogy $0 \neq a \in \mathbb{R}$ esetén

$$\lim \left(\frac{|x_{n+1}|}{|x_n|} \right) = \lim \left(\frac{2}{n+1} \right) = 0 < 1,$$

következésképpen (vö. 5. **GY**)

$$\lim (x_n) = \lim (|x_n|) = 0.$$

2. Világos (**HF.** teljes indukcióval igazolni!), hogy

$$x_n > 0 \quad (n \in \mathbb{N}_0).$$

A sorozat első néhány tagja:

$$x_0 = 2, \quad x_1 = \frac{4}{3} = 1.\dot{3}, \quad x_2 = \frac{8}{7} = 1.142857.$$

Az (x_n) sorozat pontosan akkor monoton csökkenő, ha

$$x_n - x_{n+1} = x_n - \frac{2x_n}{x_n + 1} = x_n \cdot \frac{x_n - 1}{x_n + 1} \geq 0 \quad (n \in \mathbb{N}_0),$$

azaz, ha fennáll az

$$x_n \geq 1 \quad (n \in \mathbb{N}_0)$$

egyenlőtlenség. Ez viszont igaz, ui.

- $x_0 = 2 \geq 1$;
- ha valamely $n \in \mathbb{N}_0$ esetén $x_n \geq 1$, akkor

$$x_{n+1} = \frac{2x_n}{x_n + 1} = \frac{2}{1 + \frac{1}{x_n}} \geq \frac{2}{1 + \frac{1}{1}} = 1 \quad (n \in \mathbb{N}_0).$$

Az (x_n) sorozat tehát monoton csökkenő, alulról korlátos, így konvergens is. Legyen $A := \lim(x_n)$.

Az

$$x_{n+1} := \frac{2x_n}{x_n + 1} \quad (n \in \mathbb{N}_0)$$

rekurzív összefüggésben az $n \rightarrow \infty$ határátmenet elvégzése után azt kapjuk, hogy

$$A = \frac{2A}{A+1}, \quad \text{azaz} \quad A(A-1) = 0.$$

Világos, hogy $A = 0$ nem lehet a sorozat határértéke, ezért $A = 1$.

3. **1. lépés.** Ha az (x_n) sorozat konvergens, és $A := \lim(x_n)$, akkor $\lim(x_{n+1}) = A$, és így

$$A = 5 - \frac{6}{A} \implies A^2 - 5A + 6 = 0 \implies A = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 24}}{2} \in \{2, 3\}.$$

2. lépés. Mivel a kezdőtag: $x_0 = 6$, kézenfekvőnek tűnik belátni azt, hogy

$$x_n > 3 \quad (n \in \mathbb{N}_0).$$

Valóban,

- $n = 0$ esetén $x_0 = 6 > 3$;
- ha valamely $n \in \mathbb{N}_0$ esetén $x_n > 3$, akkor

$$x_{n+1} = 5 - \frac{6}{x_n} > 5 - \frac{6}{3} = 5 - 2 = 3.$$

3. lépés. Megmutatjuk, hogy az (x_n) sorozat szigorúan monoton csökkenő. Ezt teljes indukcióval igazoljuk. Világos, hogy

- $n = 0$ esetén

$$x_0 = 6 > 4 = x_1;$$

- ha valamely $n \in \mathbb{N}_0$ esetén $3 < x_{n+1} < x_n$, akkor

$$x_{n+2} = 5 - \frac{6}{x_{n+1}} > 5 - \frac{6}{x_n} = x_{n+1}.$$

4. lépés. Mivel a sorozat (szigorúan) monoton csökkenő és alulról korlátos, ezért konvergens. A fentiek következtében tehát (x_n) konvergens és

$$\lim(x_n) = 3.$$

4. A sorozat első néhány tagját meghatározva –

$$x_0 = 0, \quad x_1 = \frac{1}{2}, \quad x_2 = \frac{5}{8}$$

– az a „gyanúnk” támad, hogy az (x_n) sorozat szigorúan monoton növekedő. Ezt teljes indukcióval

igazoljuk. Mivel

$$x_0 = 0 < \frac{1}{2} = x_1,$$

ezért csak azt kell megmutatnunk, hogy ha valamilyen $n \in \mathbb{N}_0$ mellett

$$0 \leq x_n < x_{n+1},$$

akkor $0 \leq x_{n+1} < x_{n+2}$ is igaz. Valóban, $0 \leq x_n < x_{n+1}$ -ből $x_n^2 < x_{n+1}^2$, és így

$$1 + x_n^2 < 1 + x_{n+1}^2, \quad \text{azaz} \quad x_{n+1} = \frac{1 + x_n^2}{2} < \frac{1 + x_{n+1}^2}{2} = x_{n+2}$$

következik. Tudjuk, hogy ha egy monoton növekedő sorozat felülről korlátos, akkor konvergens és

$$\lim(x_n) = \sup\{x_n \in \mathbb{R} : n \in \mathbb{N}_0\}.$$

Azt kellene tehát belátni, hogy egy alkalmas $A \in \mathbb{R}$ számmal $x_n \leq A$ ($n \in \mathbb{N}_0$). Egy ilyen A „megsejtésére” a következő gondolatmenetet alkalmazhatjuk: ha $x_n \leq A$ ($n \in \mathbb{N}_0$) valamilyen A -ra fenáll, akkor A helyébe $\lim(x_n)$ is írható. Tegyük fel tehát, hogy (x_n) konvergens és legyen $A := \lim(x_n)$; ekkor $\lim(x_{n+1}) = A$, így

$$\lim\left(\frac{1 + x_n^2}{2}\right) = \frac{1 + A^2}{2}.$$

Következésképpen az (x_n) -et meghatározó rekurzív összefüggés miatt

$$A = \frac{1 + A^2}{2} \iff A^2 - 2A + 1 = 0 \iff (A - 1)^2 = 0,$$

amiből $A = 1$ adódik. Lássuk be tehát, hogy fennáll az $x_n \leq 1$ ($n \in \mathbb{N}_0$) becslés. Ezt újból teljes indukcióval bizonyítjuk: $x_0 = 0 \leq 1$ triviálisan igaz; ha pedig $x_n \leq 1$ fennáll valamilyen $\mathbb{N}_0 \ni n$ -re, akkor

$$x_{n+1} = \frac{1 + x_n^2}{2} \leq 1.$$

Összefoglalva tehát, az (x_n) sorozat konvergens és $\lim(x_n) = 1$.

5. A sorozat első néhány tagját meghatározva:

$$x_1 = \sqrt{2}, \quad x_2 = \sqrt{2\sqrt{2}} = \sqrt[4]{2}\sqrt{2}, \quad x_3 = \sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}}}$$

látható, hogy

$$x_n = \sqrt{\dots \sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}}}} \quad (n \in \mathbb{N}),$$

azaz

$$x_1 := \sqrt{2}, \quad x_{n+1} := \sqrt{2x_n} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Az a „gyanúnk” támad, hogy az (x_n) sorozat szigorúan monoton növekedő. Ezt teljes indukcióval igazoljuk. Mivel

$$x_1 = \sqrt{2} < \sqrt[4]{2}\sqrt{2} = x_2,$$

ezért csak azt kell megmutatnunk, hogy ha valamilyen $n \in \mathbb{N}$ mellett

$$0 < x_n < x_{n+1}, \quad \text{akkor} \quad 0 < x_{n+1} < x_{n+2}$$

is igaz. Valóban, a $0 < x_n < x_{n+1}$ egyenlőtlenségpárból $2x_n < 2x_{n+1}$ és így

$$\sqrt{2x_n} < \sqrt{2x_{n+1}}, \quad \text{azaz} \quad x_{n+1} = \sqrt{2x_n} < \sqrt{2x_{n+1}} = x_{n+2}$$

következik. Tudjuk, hogy ha egy monoton növekedő sorozat felülről korlátos, akkor konvergens és

$$\lim(x_n) = \sup\{x_n \in \mathbb{R} : n \in \mathbb{N}\}.$$

Azt kellene tehát belátni, hogy egy alkalmas $A \in \mathbb{R}$ számmal $x_n \leq A$ ($n \in \mathbb{N}$). Egy ilyen A „megsejtésére” a következő gondolatmenetet alkalmazhatjuk: ha $x_n \leq A$ valamilyen A -ra fenáll, akkor A helyébe $\lim(x_n)$ is írható. Tegyük fel tehát, hogy (x_n) konvergens és legyen $A := \lim(x_n)$; ekkor

$$\lim(x_{n+1}) = A, \quad \lim(\sqrt{2x_n}) = \sqrt{2A}.$$

Következésképpen az (x_n) -et meghatározó rekurzív összefüggés miatt $A = \sqrt{2A}$, amiből $A \in \{0; 2\}$ adódik. Mivel $0 < x_n$ ($n \in \mathbb{N}$) és (x_n) szigorúan monoton növekedő, ezért az $A = 0$ eset nem lehetséges, legfeljebb csak $A = 2$. Lássuk be tehát, hogy ezzel az A -val teljesül az

$$x_n \leq A \quad (n \in \mathbb{N})$$

becslés. Ezt újból teljes indukcióval bizonyítjuk: $x_1 = \sqrt{2} \leq 2 = A$ triviálisan igaz; ha pedig $x_n \leq A$ fennáll valamilyen $\mathbb{N} \ni n$ -re, akkor

$$x_{n+1} = \sqrt{2x_n} \leq \sqrt{2A} = A.$$

Összefoglalva tehát, az (x_n) sorozat konvergens és $\lim(x_n) = 2$.

Megjegyzések.

(a) A sorozat első néhány

$$x_1 = \sqrt{2} = 2^{\frac{1}{2}} = 2^{1-\frac{1}{2}}, \quad x_2 = \sqrt{2\sqrt{2}} = \sqrt{\sqrt{8}} = \sqrt[4]{8} = 2^{\frac{3}{4}} = 2^{1-\frac{1}{4}},$$

$$x_3 = \sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}}} = \sqrt{2\sqrt[4]{8}} = \sqrt[8]{128} = 2^{\frac{7}{8}} = 2^{1-\frac{1}{8}}$$

tagjának meghatározásával sejtethető, hogy

$$x_n = 2^{1-\frac{1}{2^n}} \quad (n \in \mathbb{N}),$$

a mi teljes inducióval könnyen igazolható. Valóban,

- $n = 1$ esetén

$$x_1 = \sqrt{2} = 2^{\frac{1}{2}} = 2^{1-\frac{1}{2^1}};$$

- ha pedig valamely $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$x_n = 2^{1-\frac{1}{2^n}},$$

akkor

$$x_{n+1} = \sqrt{2x_n} = \sqrt{2 \cdot 2^{1-\frac{1}{2^n}}} = 2^{\frac{2-\frac{1}{2^n}}{2}} = 2^{1-\frac{1}{2^{n+1}}}.$$

(b) Mivel

$$\lim \left(\sqrt[2^n]{\frac{1}{2}} \right) = \lim \left(\sqrt[n]{\frac{1}{2}} \right) = 1,$$

ezért

$$x_n = 2^{1-\frac{1}{2^n}} = 2 \cdot \sqrt[2^n]{\frac{1}{2}} \longrightarrow 2 \cdot 1 = 2 \quad (n \rightarrow \infty)$$

6. A sorozat első néhány tagját meghatározva:

$$x_1 = \sqrt{2}, \quad x_2 = \sqrt{2 + \sqrt{2}}, \quad x_3 = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}$$

látható, hogy

$$x_n = \sqrt{\dots \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}} \quad (n \in \mathbb{N}),$$

azaz

$$x_1 := \sqrt{2}, \quad x_{n+1} := \sqrt{2 + x_n} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Az a „gyanúnk” támad, hogy az (x_n) sorozat szigorúan monoton növekedő. Ezt teljes indukcióval

igazoljuk. Mivel

$$\sqrt{2} < \sqrt{2 + \sqrt{2}} \iff 2 < 2 + \sqrt{2},$$

így

$$x_1 = \sqrt{2} < \sqrt{2 + \sqrt{2}} = x_2,$$

ezért csak azt kell megmutatnunk, hogy ha valamilyen $n \in \mathbb{N}$ mellett

$$0 < x_n < x_{n+1}, \quad \text{akkor} \quad 0 < x_{n+1} < x_{n+2}$$

is igaz. Valóban, az $0 < x_n < x_{n+1}$ egyenlőtlenségpárból $2 + x_n < 2 + x_{n+1}$ és így

$$\sqrt{2 + x_n} < \sqrt{2 + x_{n+1}}, \quad \text{azaz} \quad x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n} < \sqrt{2 + x_{n+1}} = x_{n+2}$$

következik. Tudjuk, hogy ha egy monoton növekedő sorozat felülről korlátos, akkor konvergens és

$$\lim(x_n) = \sup\{x_n \in \mathbb{R} : n \in \mathbb{N}\}.$$

Azt kellene tehát belátni, hogy egy alkalmas $A \in \mathbb{R}$ számmal $x_n \leq A$ ($n \in \mathbb{N}$). Egy ilyen A „megsejtésére” a következő gondolatmenetet alkalmazhatjuk: ha $x_n \leq A$ valamilyen A -ra fenáll, akkor A helyébe $\lim(x_n)$ is írható. Tegyük fel tehát, hogy (x_n) konvergens és legyen $A := \lim(x_n)$; ekkor

$$\lim(x_{n+1}) = A, \quad \lim(\sqrt{2 + x_n}) = \sqrt{2 + A}.$$

Következésképpen az (x_n) -et meghatározó rekurzív összefüggés miatt $A = \sqrt{2 + A}$, amiből $A \in \{-1; 2\}$ adódik. Mivel $0 < x_n$ ($n \in \mathbb{N}$) és (x_n) szigorúan monoton növekedő, ezért az $A = -1$ eset nem lehetséges, legfeljebb csak $A = 2$. Lássuk be tehát, hogy ezzel az A -val teljesül az

$$x_n \leq A \quad (n \in \mathbb{N})$$

becslés. Ezt újból teljes indukcióval bizonyítjuk: $x_1 = \sqrt{2} \leq 2 = A$ triviálisan igaz; ha pedig $x_n \leq A$ fennáll valamilyen $\mathbb{N} \ni n$ -re, akkor

$$x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n} \leq \sqrt{2 + A} = A.$$

Összefoglalva tehát, az (x_n) sorozat konvergens és $\lim(x_n) = 2$.

Megjegyzések.

(a) Ha tudnánk, mi a \cos , ill. a π jelentése, akkor elmondhatnánk, hogy

$$x_1 = \sqrt{2} = 2 \cos\left(\frac{\pi}{4}\right),$$

$$x_2 = \sqrt{2 + x_1} = \sqrt{2 + 2 \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)} = \sqrt{2 \left[1 + \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)\right]} = 2 \cos\left(\frac{\pi}{8}\right),$$

$$x_3 = \sqrt{2 + x_2} = \sqrt{2 + 2 \cos\left(\frac{\pi}{8}\right)} = \sqrt{2 \left[1 + \cos\left(\frac{\pi}{8}\right)\right]} = 2 \cos\left(\frac{\pi}{16}\right),$$

hiszen

$$\forall \alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] : \quad \boxed{1 + \cos(\alpha)} = 1 + \cos\left(2 \cdot \frac{\alpha}{2}\right) = \boxed{2 \cos^2\left(\frac{\alpha}{2}\right)}.$$

Így, ha valamely $2 \leq n \in \mathbb{N}$ esetén

$$x_{n-1} = 2 \cos\left(\frac{\pi}{2^n}\right),$$

akkor

$$\boxed{x_n} = \sqrt{2 + x_{n-1}} = \sqrt{2 + 2 \cos\left(\frac{\pi}{2^n}\right)} = \boxed{2 \cos\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

(b) Ha tudnánk, hogy a \cos függvény folytonos, és ismernénk az átviteli elvet, akkor a következő kijelentést tehetnénk:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n) = 2 \cos\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{2^{n+1}}\right) = 2 \cos(0) = 2 \cdot 1 = 2.$$

7. Világos (**HF.** teljes indukcióval igazolni!), hogy $\alpha = 0$ esetén $x_n = 0$ ($n \in \mathbb{N}$), így $\lim (x_n) = 0$. Tegyük fel most, hogy $\alpha > 0$ és határozzuk meg a sorozat első néhány tagját! Mivel

$$0 < \sqrt{\alpha} < \sqrt{\alpha + \sqrt{\alpha}}, \quad \text{azaz} \quad x_1 < x_2 < x_3,$$

így az a „gyanúnk” támad, hogy az (x_n) sorozat szigorúan monoton növekedő. Ezt teljes indukcióval igazoljuk. Lévé, hogy $x_1 = 0 < \sqrt{\alpha} = x_2$, ezért csak azt kell megmutatnunk, hogy ha valamilyen $n \in \mathbb{N}$ mellett $x_n < x_{n+1}$, akkor $x_{n+1} < x_{n+2}$ is igaz. Valóban, $x_n < x_{n+1}$ -ből $\alpha + x_n < \alpha + x_{n+1}$ és

így

$$x_{n+1} = \sqrt{\alpha + x_n} < \sqrt{\alpha + x_{n+1}} = x_{n+2}$$

következik. Tudjuk, hogy ha egy monoton növekedő sorozat felülről korlátos, akkor konvergens. Teljes indukcióval igazoljuk, hogy (x_n) felülről korlátos. Olyan $K \in \mathbb{R}$ számot kellene keresni, amelyre $x_1 < K$ és

$$x_n < K \implies x_{n+1} < K \quad (n \in \mathbb{N})$$

teljesül. Ehhez az

$$x_{n+1} = \sqrt{\alpha + x_n} < \sqrt{\alpha + K}$$

egyenlőtlenség alapján – elég, ha

$$\sqrt{\alpha + K} < K$$

fennáll. Ez a feltétel az

$$\alpha + K < K^2, \quad \text{azaz az} \quad \alpha < K^2 - K$$

alakba írható, így a

$$K := 1 + \sqrt{\alpha}$$

választás megfelelő. A sorozat tehát konvergens. Legyen $A := \lim(x_n)$, ekkor

$$\alpha = \lim(x_{n+1}) = \sqrt{\alpha + A},$$

ahonnan $\alpha > 0$ miatt

$$A = \frac{1 + \sqrt{1 + 4\alpha}}{2}$$

következik.

Megjegyzés. A sorozat n -edik tagjának és határértékének eltérésére a következő, ún. hibabecslést

kapjuk:

$$\begin{aligned}
 |x_n - A| &= \left| \sqrt{\alpha + x_{n-1}} - \sqrt{\alpha + A} \right| = \\
 &= \left| \sqrt{\alpha + x_{n-1}} - \sqrt{\alpha + A} \right| \cdot \frac{\sqrt{\alpha + x_{n-1}} + \sqrt{\alpha + A}}{\sqrt{\alpha + x_{n-1}} + \sqrt{\alpha + A}} = \\
 &= \frac{|x_{n-1} - A|}{\sqrt{\alpha + x_{n-1}} + \sqrt{\alpha + A}} < \frac{|x_{n-1} - A|}{\sqrt{\alpha + A}} = \frac{|x_{n-1} - A|}{A} < \\
 &< \frac{|x_{n-2} - A|}{A^2} < \dots < \frac{|x_1 - A|}{A^n} = \frac{1}{A^{n-1}}.
 \end{aligned}$$

8. Világos (**HF.** teljes indukcióval igazolni!), hogy ha $\alpha = 0$, akkor bármel $n \in \mathbb{N}_0$ indexre $x_n = 0$, így $\lim(x_n) = 0$. Tegyük fel, hogy $\alpha > 0$. A sorozat első néhány tagját meghatározva:

$$x_1 = \alpha < \alpha + \alpha^2 = x_2$$

az a „gyanúnk” támad, hogy az (x_n) sorozat szigorúan monoton növekedő. Ezt teljes indukcióval igazoljuk. Mivel $x_0 = 0 < \alpha = x_1$, ezért csak azt kell megmutatnunk, hogy ha valamilyen $n \in \mathbb{N}_0$ mellett $0 < x_n < x_{n+1}$, akkor $x_{n+1} < x_{n+2}$ is igaz. Valóban, $x_n < x_{n+1}$ -ből

$$0 < x_n^2 < x_{n+1}^2 \quad \text{és így} \quad x_{n+1} = \alpha + x_n^2 < \alpha + x_{n+1}^2 = x_{n+2}$$

következik. Tudjuk, hogy ha egy monoton növekedő sorozat felülről korlátos, akkor konvergens és

$$\lim(x_n) = \sup\{x_n \in \mathbb{R} : n \in \mathbb{N}_0\}.$$

Azt kellene tehát belátni, hogy egy alkalmas $A \in \mathbb{R}$ számmal $x_n < A$ ($n \in \mathbb{N}_0$). Egy ilyen A „megsejtésére” a következő gondolatmenetet alkalmazhatjuk: ha $x_n < A$ ($n \in \mathbb{N}_0$) valamilyen A -ra fenáll, akkor A helyébe $\lim(x_n)$ is írható. Tegyük fel tehát, hogy (x_n) konvergens és legyen $A := \lim(x_n)$; ekkor

$$\lim(x_{n+1}) = A, \quad \lim(\alpha + x_n^2) = \alpha + A^2.$$

Következésképpen az (x_n) -et meghatározó rekurzív összefüggés miatt

$$A = \alpha + A^2,$$

amiből A -ra

$$A = \frac{1 \pm \sqrt{1-4\alpha}}{2}$$

adódik. Nyilvánvaló, hogy

$$A \in \mathbb{R} \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha \leq \frac{1}{4}.$$

Mivel (x_n) szigorúan monoton növekedő és $\lim(x_n)$ az

$$\{x_n \in \mathbb{R} : n \in \mathbb{N}_0\}$$

halmaz legkisebb felső korlátja, ezért a fenti A -k esetén csak az

$$A = \frac{1 - \sqrt{1-4\alpha}}{2}$$

érték jön szóba. Lássuk be tehát, hogy ezzel az A -val teljesül az $x_n \leq A$ ($n \in \mathbb{N}_0$) becslés. Ezt újból teljes indukcióval bizonyítjuk:

$$x_0 = 0 < \frac{1 - \sqrt{1-4\alpha}}{2} = A$$

triviálisan igaz. Ha pedig $x_n \leq A$ fennáll valamilyen $\mathbb{N}_0 \ni n$ -re, akkor

$$x_{n+1} = \alpha + x_n^2 \leq \alpha + A^2 = A.$$

Összefoglalva tehát, $\alpha \leq \frac{1}{4}$ esetén az (x_n) sorozat konvergens és

$$\lim(x_n) = \frac{1 - \sqrt{1-4\alpha}}{2}.$$

Megjegyezzük, hogy az $\alpha \in (\frac{1}{4}, +\infty)$ esetben (x_n) nem konvergens, így (szigorú) monotonitása miatt nem is korlátos, következésképpen $\lim(x_n) = +\infty$.

9. **1. lépés.** Ha az (x_n) sorozat konvergens, és $\alpha := \lim(x_n)$, akkor $\lim(x_{n+1}) = \alpha$, és így

$$\alpha = 3 - \frac{2}{\alpha} \quad \Longrightarrow \quad \alpha^2 - 3\alpha + 2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad \alpha = \frac{3 \pm \sqrt{9-8}}{2} \in \{2, 1\}.$$

2. lépés. Mivel a kezdőtag: $x_0 = 3$, kézenfekvőnek tűnik belátni azt, hogy

$$x_n > 2 \quad (n \in \mathbb{N}_0).$$

Valóban,

- $n = 0$ esetén $x_0 = 3 > 2$;

- ha valamely $n \in \mathbb{N}_0$ esetén $x_n > 2$, akkor

$$x_{n+1} = 3 - \frac{2}{x_n} > 3 - \frac{2}{2} = 3 - 1 = 2.$$

3. lépés. Megmutatjuk, hogy az (x_n) sorozat szigorúan monoton csökkenő. Ezt teljes indukcióval igazoljuk. Világos, hogy

- $n = 0$ esetén

$$x_0 = 3 > \frac{7}{3} = x_1;$$

- ha valamely $n \in \mathbb{N}_0$ esetén $2 < x_{n+1} < x_n$, akkor

$$x_{n+2} = 3 - \frac{2}{x_{n+1}} > 3 - \frac{2}{x_n} = x_{n+1}.$$

4. lépés. Mivel a sorozat (szigorúan) monoton csökkenő és alulról korlátos, ezért konvergens. A fentiek következtében tehát (x_n) konvergens és

$$\lim(x_n) = 2.$$

Megjegyzés. A sorozat első néhány

$$x_1 = 3 - \frac{2}{3} = \frac{7}{3}, \quad x_2 = 3 - \frac{2}{\frac{7}{3}} = \frac{15}{7}, \quad x_3 = 3 - \frac{2}{\frac{15}{7}} = \frac{31}{15}, \quad x_4 = 3 - \frac{2}{\frac{31}{15}} = \frac{63}{31}, \quad x_5 = 3 - \frac{2}{\frac{63}{31}} = \frac{127}{63}.$$

tagjának meghatározásával sejthető, hogy

$$x_n = \frac{2^{n+2} - 1}{2^{n+1} - 1} \quad (n \in \mathbb{N}_0),$$

ami teljes indukcióval könnyen igazolható. Valóban,

- $n = 0$ esetén

$$x_0 = 3 = \frac{4 - 1}{2 - 1} = \frac{2^{0+2} - 1}{2^{0+1} - 1};$$

- ha pedig valamely $n \in \mathbb{N}_0$ esetén

$$x_n = \frac{2^{n+2} - 1}{2^{n+1} - 1},$$

akkor

$$x_{n+1} = 3 - \frac{2}{x_n} = 3 - 2 \cdot \frac{2^{n+1} - 1}{2^{n+2} - 1} = \frac{3 \cdot 2^{n+2} - 3 - 2^{n+2} + 2}{2^{n+2} - 1} = \frac{2 \cdot 2^{n+2} - 1}{2^{n+2} - 1} = \frac{2^{n+3} - 1}{2^{n+2} - 1}.$$

10. A sorozat első néhány tagját meghatározva –

$$x_0 = 0, \quad x_1 = 2, \quad x_2 = \frac{2}{1+2} = \frac{2}{3} = 0, \dot{6}, \quad x_3 = \frac{2}{1+\frac{2}{3}} = \frac{6}{5} = 1, 2.$$

–látható, hogy (x_n) nem monoton. További tagokat kiszámítva –

$$x_4 = \frac{2}{1+\frac{6}{5}} = \frac{10}{11} = 0, \dot{9}0,$$

$$x_5 = \frac{2}{1+\frac{10}{11}} = \frac{22}{21} \approx 1,0476,$$

$$x_6 = \frac{2}{1+\frac{22}{21}} = \frac{42}{43} \approx 0,9767,$$

$$x_7 = \frac{2}{1+\frac{42}{43}} = \frac{86}{85} \approx 1,0118,$$

$$x_8 = \frac{2}{1+\frac{86}{85}} = \frac{170}{171} \approx 0,9942,$$

$$x_9 = \frac{2}{1+\frac{170}{171}} = \frac{342}{341} \approx 1,0029$$

– sejtethő, hogy

1° a páros indexű tagok 1-nél kisebbek, a páratlan indexűek pedig 1-nél nagyobbak:

$$x_n = x_{2k} < 1 \quad \text{és} \quad x_n = x_{2k+1} > 1 \quad (k \in \mathbb{N});$$

2° a páros indexű (x_{2k}) részsorozata szigorúan monoton növekedő, a páratlan indexű (x_{2k+1}) részsorozat pedig szigorúan monoton csökkenő:

$$(x_{2k}) \uparrow \quad \text{és} \quad (x_{2k+1}) \downarrow.$$

Biz. Mivel bármely $n \in \mathbb{N}$ indexre

$$x_{n+2} = \frac{2}{1+x_{n+1}} = \frac{2}{1+\frac{2}{1+x_n}} = 2 \cdot \frac{x_n+1}{x_n+3}, \quad (21)$$

ezért

$$x_{n+2} - x_n = 2 \cdot \frac{x_n+1}{x_n+3} - x_n = \frac{(x_n+2)(1-x_n)}{x_n+3}.$$

Ha tehát

- n páros: $n = 2k$, akkor (21) következtében $1 - x_{2k} > 0$, tehát

$$(x_{2k}) \uparrow \text{ és felülről korlátos} \implies \text{konvergens; } A := \lim(x_{2k});$$

- n páratlan: $n = 2k + 1$, akkor (21) következtében $1 - x_{2k+1} < 0$, tehát

$$(x_{2k+1}) \downarrow \text{ és alulról korlátos} \implies \text{konvergens; } B := \lim(x_{2k+1}).$$

Mindez azt jelenti (vö. (21)), hogy

$$A = 2 \cdot \frac{A+1}{A+3} \quad \text{és} \quad B = 2 \cdot \frac{B+1}{B+3}.$$

Mivel valamely $\xi \in \mathbb{R}$ számra

$$\xi = 2 \cdot \frac{\xi+1}{\xi+3} \iff \xi^2 + 3\xi = 2\xi + 2 \iff \xi^2 + \xi - 2 = 0 \iff \xi_{\pm} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{2} \in \{-2; 1\}$$

és (x_n) nemnegatív tagú sorozat (**HF.** bizonyítani teljes indukcióval), ezért $A = B = 1$, azaz (x_n) konvergens és $\lim(x_n) = 1$. ■

Feladat. Legyen $a, \alpha \in \mathbb{R}$ és

$$x_0 := a, \quad x_{n+1} := \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{\alpha}{x_n} \right) \quad (n \in \mathbb{N}_0).$$

Konvergens-e az (x_n) sorozat? Ha igen, akkor mi a határértéke?

Útm. Tegyük fel, hogy (x_n) konvergens és $A := \lim(x_n)$. Ekkor $A = \lim(x_{n+1})$, azaz

$$A = \frac{1}{2} \left(A + \frac{\alpha}{A} \right),$$

így $A^2 = \alpha$. Tehát $\alpha < 0$ esetén (x_n) divergens. Legyen $\alpha \geq 0$. $\alpha = 0$ esetén (x_n) nem más, mint egy $\frac{1}{2}$ kvóciensű mértani sorozat, így konvergens és határértéke $0 = \alpha$. Legyen most $\alpha > 0$. Ekkor a mértani és a számtani közép közötti összefüggést felhasználva megmutatjuk, hogy minden $n \in \mathbb{N}_0$ esetén $x_{n+1} \geq \sqrt{\alpha}$, azaz a sorozat alulról korlátos. Valóban, ha $n \in \mathbb{N}$, akkor

$$x_n = \frac{x_{n-1} + \frac{\alpha}{x_{n-1}}}{2} \geq \sqrt{x_{n-1} \cdot \frac{\alpha}{x_{n-1}}} = \sqrt{\alpha}.$$

A sorozat az 1-indexű tagjától kezdve monoton csökkenő, ugyanis

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{x_n^2 + \alpha}{x_n} \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{x_n^2 + x_n^2}{x_n} = x_n \quad (n \in \mathbb{N}).$$

A sorozat tehát konvergens és határértéke $\sqrt{\alpha}$. ■

Házi feladatok.

1. Számítsuk ki az alábbi sorozatok határértékét!

(a) $x_n := \left(\frac{3n+1}{3n+2}\right)^{6n+5} \quad (n \in \mathbb{N});$

(b) $x_n := \left(\frac{2n+3}{3n+1}\right)^{n-5} \quad (n \in \mathbb{N}_0);$

(c) $x_n := \left(\frac{3n+3}{2n+4}\right)^n \quad (n \in \mathbb{N});$

(d) $x_n := \left(\frac{2n+3}{3n+4}\right)^n \quad (n \in \mathbb{N}_0);$

(e) $x_n := \left(\frac{n+1}{\sqrt{n^2+2n}}\right)^{2n^2+4n} \quad (n \in \mathbb{N});$

(f) $x_n := \left(1 + \frac{1}{2^n - 1}\right)^{2^{n+2}+3} \quad (n \in \mathbb{N}_0).$

2. Számítsuk ki az alábbi sorozatok határértékét!

(a) $x_0 := \sqrt{3}, \quad x_{n+1} := \sqrt{3 + 2x_n} \quad (n \in \mathbb{N}_0);$

(b) $x_0 := 0, \quad x_{n+1} := \frac{x_n^3 + 1}{2} \quad (n \in \mathbb{N}_0).$

3. Igazoljuk, hogy bármely $\alpha \in [0, 1]$ esetén az

$$x_0 := \frac{\alpha}{2}, \quad x_{n+1} := \frac{x_n^2 + \alpha}{2} \quad (n \in \mathbb{N}_0)$$

sorozat konvergens, majd számítsuk ki a határértékét!

Ütm.

1. (a) Ha $n \in \mathbb{N}$, akkor az $n \rightarrow \infty$ határátmenetben

$$\begin{aligned}
 x_n &= \left(\frac{3n+1}{3n+2} \right)^{6n+5} = \left(\frac{3n+1}{3n+2} \right)^{6n+4+1} = \\
 &= \left(\frac{3n+1}{3n+2} \right)^{6n+4} \cdot \left(\frac{3n+1}{3n+2} \right) = \left(\left(\frac{3n+1}{3n+2} \right)^{3n+2} \right)^2 \cdot \left(\frac{3n+1}{3n+2} \right) = \\
 &= \left(\left(\frac{3n+2-1}{3n+2} \right)^{3n+2} \right)^2 \cdot \left(\frac{3n+1}{3n+2} \right) = \left(\left(1 + \frac{-1}{3n+2} \right)^{3n+2} \right)^2 \cdot \left(\frac{3n+1}{3n+2} \right) \longrightarrow \\
 &\longrightarrow \frac{1}{e^2} \cdot 1 = \frac{1}{e^2}.
 \end{aligned}$$

(b) Mivel az $n \rightarrow \infty$ határátmenetben

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{2n+3}{3n+1} \right)^n &= \left(\frac{2}{3} \right)^n \cdot \left(\frac{n+\frac{3}{2}}{n+\frac{1}{3}} \right)^n = \left(\frac{2}{3} \right)^n \cdot \left(\frac{n+\frac{1}{3}+\frac{3}{2}-\frac{1}{3}}{n+\frac{1}{3}} \right)^n = \\
 &= \left(\frac{2}{3} \right)^n \cdot \left(\frac{n+\frac{1}{3}+\frac{7}{6}}{n+\frac{1}{3}} \right)^n = \left(\frac{2}{3} \right)^n \cdot \left(1 + \frac{7}{6n+2} \right)^n = \\
 &= \left(\frac{2}{3} \right)^n \cdot \sqrt[6]{\left(1 + \frac{7}{6n+2} \right)^{6n+2} \cdot \left(1 + \frac{7}{6n+2} \right)^{-2}} \longrightarrow 0 \cdot \sqrt[6]{e^7 \cdot 1^{-2}} = 0
 \end{aligned}$$

és

$$\left(\frac{2n+3}{3n+1} \right)^{-5} \longrightarrow \left(\frac{2}{3} \right)^{-5} \quad (n \rightarrow \infty),$$

ezért

$$\lim(x_n) = 0 \cdot \left(\frac{2}{3} \right)^{-5} = 0.$$

(c) Tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ indexre

$$\begin{aligned} x_n &= \left(\frac{3n+3}{2n+4} \right)^n = \left(\frac{3}{2} \right)^n \left(\frac{n+1}{n+2} \right)^n = \\ &= \left(\frac{3}{2} \right)^n \left(1 - \frac{1}{n+2} \right)^{n+2} \left(1 - \frac{1}{n+2} \right)^{-2} \longrightarrow +\infty \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

(d) Minden n indexre

$$\begin{aligned} x_n &= \left(\frac{2n+3}{3n+4} \right)^n = \left(\frac{2}{3} \right)^n \left(\frac{n+3/2}{n+4/3} \right)^n = \\ &= \left(\frac{2}{3} \right)^n \left(1 + \frac{1/6}{n+4/3} \right)^{n+4/3} \left(1 + \frac{1/6}{n+4/3} \right)^{-4/3} \longrightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

(e) Bármely $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\begin{aligned} x_n &= \left(\frac{n+1}{\sqrt{n^2+2n}} \right)^{2n^2+4n} = \left(\frac{(n+1)^2}{n^2+2n} \right)^{n^2+2n} = \\ &= \left(\frac{n^2+2n+1}{n^2+2n} \right)^{n^2+2n} = \left(1 + \frac{1}{n^2+2n} \right)^{n^2+2n} \longrightarrow e \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

(f) Mivel tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ indexre

$$2^{n+2} + 3 = 2^2 \cdot 2^n + 3 = 4 \cdot 2^n - 4 + 7 = 4 \cdot (2^n - 1) + 7,$$

ezért

$$x_n = \left(1 + \frac{1}{2^n - 1} \right)^{2^{n+2} + 3} = \left(\left(1 + \frac{1}{2^n - 1} \right)^{2^n - 1} \right)^4 \cdot \left(1 + \frac{1}{2^n - 1} \right)^7 \longrightarrow e^4 \cdot 1^7 \quad (n \rightarrow \infty).$$

2. (a) **1. lépés.** A sorozat első két tagját meghatározva:

$$x_0 = \sqrt{3} < \sqrt{3 + 2\sqrt{3}} = x_1,$$

az a „gyanúnk” támad, hogy az (x_n) sorozat szigorúan monoton növekedő. Ezt teljes

indukcióval igazoljuk. Az iméntiek miatt elég azt igazolnunk, hogy ha valamilyen $n \in \mathbb{N}_0$ mellett $x_n < x_{n+1}$, akkor $x_{n+1} < x_{n+2}$ is teljesül. Valóban $x_n < x_{n+1}$ -ből

$$3 + 2x_n < 3 + 2x_{n+1}, \quad \text{azaz} \quad x_{n+1} = \sqrt{3 + 2x_n} < \sqrt{3 + 2x_{n+1}} = x_{n+2}$$

következik.

2. lépés. Ha az (x_n) sorozat konvergens, akkor $A := \lim(x_n)$ határértékére $\lim(x_{n+1}) = A$, és így

$$A = \sqrt{3 + 2A} \quad \implies \quad A^2 - 2A - 3 = 0 \quad \implies \quad A = 1 + \sqrt{1 + 3} = 3.$$

3. lépés. Mivel (x_n) szigorúan monoton növekedő, ezért ha felülről korlátos, akkor a 3 egy felső korlátja is. Világos, hogy

- $n = 0$ esetén $x_0 = \sqrt{3} < 3$;
- ha valamilyen $n \in \mathbb{N}_0$ esetén $x_n < 3$, akkor

$$x_{n+1} = \sqrt{3 + 2x_n} < \sqrt{3 + 2 \cdot 3} = \sqrt{9} = 3.$$

4. lépés. Midez azt jelenti, hogy az (x_n) sorozat konvergens és $\lim(x_n) = 3$.

(b) **1. lépés.** A sorozat első néhány tagját meghatározva:

$$x_0 = 0, \quad x_1 = \frac{1}{2}, \quad x_2 = \frac{9}{16}$$

az a „gyanúnk” támad, hogy az (x_n) sorozat szigorúan monoton növekedő. Ezt teljes indukcióval igazoljuk. Mivel

$$x_0 < \frac{1}{2} = x_1,$$

ezért elég azt igazolnunk, hogy ha valamilyen $n \in \mathbb{N}_0$ mellett $x_n < x_{n+1}$, akkor $x_{n+1} < x_{n+2}$ is teljesül. Valóban $x_n < x_{n+1}$ -ből

$$x_{n+1} = \frac{x_n^3 + 1}{2} < \frac{x_{n+1}^3 + 1}{2} = x_{n+2}$$

következik.

2. lépés. Ha az (x_n) sorozat konvergens, akkor $A := \lim(x_n)$ határértékére $\lim(x_{n+1}) = A$, és így

$$A = \frac{A^3 + 1}{2} \quad \iff \quad A^3 - 2A + 1 = 0.$$

Felhasználva az 1. gyakorlaton tetszőleges $a, b \in \mathbb{R}$, ill. $n \in \mathbb{N}$ számokra bizonyított [\(2\)](#)

azonosság

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

speciális esetét, azt kapjuk, hogy

$$A^3 - 2A + 1 = A^3 - 1 - 2A + 2 = A^3 - 1^3 - 2(A - 1) =$$

$$= (A - 1)(A^2 + A + 1) - 2(A - 1) = (A - 1)(A^2 + A - 1),$$

következésképpen

$$A = \frac{A^3 + 1}{2} \iff A^3 - 2A + 1 = 0 \iff A \in \left\{ 1, \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2} \right\}.$$

Mivel $x_0 = 0$ és (x_n) szigorúan monoton növekedő, ezért a $\frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$ szám nem lehet (x_n) határértéke.

3. lépés. Mivel (x_n) szigorúan monoton növekedő és $\lim(x_n)$ az

$$\{x_n \in \mathbb{R} : n \in \mathbb{N}_0\}$$

halmaz legkisebb felső korlátja, ezért az

$$A = 1 \quad \text{és} \quad A = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$$

értékek közül

$$\frac{-1 + \sqrt{5}}{2} < 1$$

miatt csak az

$$A = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$$

érték jöhet szóba. Lássuk be tehát, hogy ezzel az A -val teljesül az $x_n \leq A$ ($n \in \mathbb{N}_0$) becslés. Ezt újból teljes indukcióval bizonyítjuk:

$$x_0 = 0 < \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} = A$$

triviálisan igaz. Ha pedig $x_n \leq A$ fennáll valamilyen $\mathbb{N}_0 \ni n$ -re, akkor

$$x_{n+1} = \frac{x_n^3 + 1}{2} \leq \frac{A^3 + 1}{2} = A.$$

4. lépés. Összefoglalva tehát, az (x_n) sorozat konvergens és

$$\lim(x_n) = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}.$$

3. 1. lépés. Mivel

$$x_1 = \frac{1}{2} \left(\frac{\alpha^2}{4} + \alpha \right) = \frac{\alpha^2 + 4\alpha}{8} > \frac{4\alpha}{8} = \frac{\alpha}{2} = x_0,$$

ezért sejthető, hogy (x_n) szigorúan monoton növekedő. Az iméntiek miatt elég belátni, hogy ha valamely $n \in \mathbb{N}_0$ esetén $0 < x_n < x_{n+1}$, akkor $0 < x_{n+1} < x_{n+2}$. Valóban, ha valamely $n \in \mathbb{N}_0$ esetén $0 < x_n < x_{n+1}$, akkor

$$0 < x_{n+1} = \frac{x_n^2 + \alpha}{2} < \frac{x_{n+1}^2 + \alpha}{2} = x_{n+2}.$$

2. lépés. Ha az (x_n) sorozat konvergens, akkor $A := \lim(x_n)$ határértékére $\lim(x_{n+1}) = A$, és így

$$A = \frac{A^2 + \alpha}{2} \iff A^2 - 2A + \alpha = 0 \iff A = A_{\pm} := 1 \pm \sqrt{1 - \alpha}.$$

3. lépés. Mivel (x_n) szigorúan monoton növekedő és $\lim(x_n)$ az

$$\{x_n \in \mathbb{R} : n \in \mathbb{N}_0\}$$

halmaz legkisebb felső korlátja, ezért az A_+ és A_- értékek közül $0 \leq A_- \leq A_+$ miatt miatti csak az

$$A_- = 1 - \sqrt{1 - \alpha}$$

érték jöhet szóba ($\alpha = 1$ esetén persze $A_- = A_+$). Világos, hogy

- $n = 0$ esetén

$$x_0 = \frac{\alpha}{2} \leq \frac{\alpha + A_-^2}{2} = A_-;$$

- ha valamely $n \in \mathbb{N}_0$ esetén $x_n \leq A_-$, akkor

$$x_{n+1} = \frac{x_n^2 + \alpha}{2} \leq \frac{(A_-)^2 + \alpha}{2} = A_-.$$

Következésképpen (x_n) felülről korlátos.

4. lépés. Összefoglalva tehát, az (x_n) sorozat konvergens és

$$\lim(x_n) = 1 - \sqrt{1 - \alpha}. \quad \blacksquare$$

A Függelék

Tétel (Rekurziótétel: Dedekind (1888)). Legyen H tetszőleges (nem-üres) halmaz, $h \in H$, $f : H \rightarrow H$. Ekkor pontosan egy olyan $\varphi : \mathbb{N}_0 \rightarrow H$ függvény (**sorozat**) van, amelyre

- (i) $\varphi(0) = h$;
- (ii) bármely $n \in \mathbb{N}_0$ esetén $\varphi(n+1) = f(\varphi(n))$.

Biz.

1. lépés. Tegyük fel, hogy $\varphi, \psi : \mathbb{N}_0 \rightarrow H$ rendelkezik a fenti tulajdonsággal. Ekkor $\varphi = \psi$, ui.

- $n = 0$ esetén

$$\varphi(0) = h = \psi(0);$$

- ha valamely $n \in \mathbb{N}_0$ esetén $\varphi(n) = \psi(n)$, akkor

$$\varphi(n+1) = f(\varphi(n)) = f(\psi(n)) = \psi(n+1).$$

2. lépés. Legyen

$$\mathcal{H} := \{A \subset \mathbb{N}_0 \times H : \textbf{i)} (0, h) \in A, \textbf{ii)} \forall n \in \mathbb{N}_0 \forall k \in H : (n, k) \in A \Rightarrow (n+1, f(k)) \in A\}.$$

Ekkor nyilvánvalóan $\mathbb{N}_0 \times H \in \mathcal{H}$ és bármely $B \in \mathcal{H}$ esetén $(0, h) \in B$, ezért

$$D := \bigcap_{A \in \mathcal{H}} A$$

a legszűkebb $\mathbb{N}_0 \times H$ -beli halmaz, amelyre **i)** és **ii)** teljesül. Ekkor

1. bármely $n \in \mathbb{N}_0$ indexhez pontosan egy olyan $b \in H$ van, hogy $(n, b) \in D$ teljesül, ui.

- $n = 0$ esetén $(0, h) \in D$, továbbá ha valamely $h \neq c \in H$ esetén $(0, c) \in D$, akkor $D \setminus \{(0, c)\}$ még mindig rendelkezik az **i)** és **ii)** tulajdonsággal, ami ellentmond annak, hogy D a legszűkebb ilyen halmaz.
- ha valamely $n \in \mathbb{N}_0$ esetén pontosan egy olyan $b \in H$ van, amelyre $(n, b) \in D$, akkor az **ii)** tulajdonság következtében $(n+1, f(b)) \in D$. Ha valamely $d \neq f(b) \in H$ esetén $(n+1, d) \in D$ volna, akkor $D \setminus \{(n+1, d)\}$ rendelkezne az **ii)** tulajdonsággal, ami ellentmondana annak, hogy D a legszűkebb ilyen.

2. a fentiek következtében pontosan egy olyan $\varphi : \mathbb{N}_0 \rightarrow H$ függvény van, hogy

$$\text{graph}(\varphi) = \{(n, m) \in \mathbb{N}_0 \times H : m = \varphi(n)\} = D.$$

Ekkor

- az **i)** azt jelenti, hogy $\varphi(0) = h$;
- a **ii)** tulajdonság pedig azt, hogy $(n+1, f(\varphi(n))) \in D$, azaz

$$\varphi(n+1) = f(\varphi(n)) \quad (n \in \mathbb{N}_0). \quad \blacksquare$$

Megjegyzés. Általánosítás. Legyen H halmaz, $h \in H$, $k \in \mathbb{N}$, $f : H^k \rightarrow H$. Ekkor pontosan egy olyan $\varphi : \mathbb{N}_0 \rightarrow H$ függvény (**sorozat**) van, amelyre

(i) $\varphi(0) = h$;

(ii) bármely $n \in \mathbb{N}_0$ esetén $\varphi(n+k) = f(\varphi(1), \dots, \varphi(n))$.