

Problem Set # 9

Joshua Petitma

10/11/20

1

1.a

$\frac{a_k}{k} < a_k \therefore$ Must be Convergent bc of Comparison test

1.b $\sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{a_k}$

$$a_k = \frac{1}{k^2}$$

$$\frac{1}{\sqrt{k^2}}$$

$\frac{1}{k} =$ Divergence bc p-series

$$a_k = \frac{1}{k^3}$$

$$\frac{1}{k^3}$$

$\frac{1}{k^{3/2}} \therefore$ Convergent bc p-series

Impossible to decide

1.c $\sum_{k=1}^{\infty} \sin(a_k)$

$\sin(a_k)$ comp to a_k

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\sin(a_k)}{a_k}$$

$$\lim_{k \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} \rightarrow LH$$

$\cos(x) = 1 \therefore$ Must be convergent bc LCT

1.d $\cos(a_k)$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \cos(a_k) = \cos(0) = 1 \therefore \text{Must diverge bc Test for divergence}$$

1.e $\sum_{k=1}^{\infty} \cos(k)a_k$

$$|\cos(k)a_k| \leq |a_k| \therefore \text{Converge bc of Comparison test}$$

$$\text{Must converge bc of Absolute Convergence Test}$$

1.f

$$a_k = \frac{1}{k^2}$$

$$b_k = \frac{1}{k^2}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1/k^2}{1/k^2} = 1 \therefore \text{Diverge because of limit test}$$

$$a_k = \frac{1}{k^4}$$

$$b_k = \frac{1}{k^2}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k^4} * \frac{k^2}{1}$$

$$\frac{1}{k^2} \therefore \text{Converge because of p-series}$$

Impossible to decide

1.g $\arctan(\frac{1}{a_k})$

If a_k converges, $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \arctan(\frac{1}{0}) = \arctan(\infty) = \frac{\pi}{2} \neq 0$$

\therefore Must diverge, test for divergence

2

2.a

$$f(x) = e^{x^2}, \quad f(0) = 1$$

$$f'(x) = 2x * e^{x^2}, \quad f'(0) = 0$$

$$f''(x) = 4x^2 * e^{x^2} + 2e^{x^2}$$

$$f''(0) = 2$$

$$T_3(x) = 1 + \frac{2(x)^2}{2!} = 1 + x^2$$

2.b

$$\begin{aligned} T_3\left(\frac{1}{10}\right) &= 1 + \left(\frac{1}{10}\right)^2 \\ &= 1 + \frac{1}{100} = \boxed{\frac{101}{100}} \end{aligned}$$

2.c

2.d

$$\int_0^{\frac{1}{10}} T_3(x) dx$$

$$\int_0^{\frac{1}{10}} 1 + x^2 dx$$

$$\left(x + \frac{x^3}{3}\right) \Big|_0^{\frac{1}{10}}$$

$$\left(\frac{1}{10} + \frac{1}{3000}\right) - 0 = \frac{301}{3000}$$

3

3.a

$$f(x), f(1) = 0$$

$$f'(x) = \frac{1}{x} * x + \ln(x), f'(1) = 1 + 0 = 1$$

$$f''(x) = \frac{1}{x}, f''(1) = 1$$

$$f'''(x) = -\frac{1}{x^2}, f'''(1) = -1$$

$$T_3(x) = 0 + 1(x-1) + \frac{1(x-1)^2}{2!} + -\frac{1(x-1)^3}{3!}$$

3.b

$$f(x), f(1) = \sqrt{2}$$

$$f'(x) = \frac{1}{2}(1+x)^{-1/2}, f'(1) = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

$$f''(x) = -\frac{1}{4}(1+x)^{-3/2}, f''(1) = -\frac{1}{4\sqrt{8}}$$

$$f'''(x) = \frac{3}{8}(1+x)^{-5/2}, f'''(1) = \frac{3}{8\sqrt{32}}$$

$$T_3(x) = \sqrt{2} + \frac{\frac{1}{2\sqrt{2}}(x-1)}{1!} - \frac{\frac{1}{4\sqrt{8}}(x-1)^2}{2!} + \frac{\frac{3}{8\sqrt{32}}(x-1)^3}{3!}$$