

Notebook con código para el análisis de residuos

Contents

- **Notebook con código para el análisis de residuos**
- Vamos a analizar los residuos del modelo de este problema, el código puede extenderse a cualquier otro de los ejercicios de la práctica.
- Análisis de Residuos del Modelo:
- [Un breve resumen de lo que se ve en el cuadrado de residuos:](#)

```
#Importar librerías

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import statsmodels.api as sm
import statsmodels.formula.api as smf
import numpy as np
from scipy.stats import norm, kurtosis
from statsmodels.stats.stattools import durbin_watson, jarque_bera
from scipy.stats import chi2
```

Montar el contenido del drive-directorio donde tienen los datasets:

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```

```
-----  
ModuleNotFoundError                                Traceback (most recent call last)  
Cell In[2], line 1  
----> 1 from google.colab import drive  
      2 drive.mount('/content/drive')  
  
ModuleNotFoundError: No module named 'google'
```

Ejercicio 1 de práctica actualizada:

El dataset `student_data.csv` contiene información sobre el promedio de horas semanales de estudio que un conjunto de estudiantes dedicó para la preparación de un examen y la calificación final recibida luego de rendirlo.

1. a) Realice un gráfico que le permita visualizar la relación existente entre las calificaciones finales y las horas de estudio del grupo de estudiantes. b) ¿Cómo describiría dicha relación a partir de lo observado? c) ¿Qué métrica utilizaría para cuantificar el grado de asociación lineal entre ambas variables? Calcúlela e interprete el valor obtenido.
2. A partir de los datos, ajuste un modelo de regresión lineal para la calificación final del examen en función de las horas semanales de estudio. Represente gráficamente el modelo ajustado en el gráfico realizado en el ítem 1.
3. Escriba el modelo ajustado en forma desarrollada e interprete cada uno de los coeficientes que lo componen.

```
...  
Vamos a importar los datos de un csv. Editar en función a sus propias rutas al archivo en el  
...  
  
estudiantes=pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/Datasets_fundamentos/student_data.csv')  
  
#vemos qué aparece en el dataset  
estudiantes
```

	Unnamed: 0	hours_studied	exam_scores
0	1	9.3	63.1
1	2	23.9	90.4
2	3	12.9	63.2
3	4	26.6	87.8
4	5	28.3	92.9
...	...	...	...
240	241	16.9	77.1
241	242	20.2	82.0
242	243	6.0	62.2
243	244	19.4	79.1
244	245	10.0	67.5

245 rows × 3 columns


```
#eliminamos la columna innecesaria.
estudiantes.drop('Unnamed: 0', axis=1, inplace=True)
```

```
estudiantes.columns
```

```
Index(['hours_studied', 'exam_scores'], dtype='object')
```

```
#vamos a visualizar la relación entre la calificación final y las horas de estudio. El gráfico
# gráfico de dispersión o scatterplot.
```

```
estudiantes.plot(kind='scatter', x='hours_studied', y='exam_scores');
```



Se observa relación lineal positiva, a medida que los estudiantes dedican más horas al estudio sus calificaciones son más altas.

```
#vamos a calcular la correlación de Pearson  
estudiantes.corr('pearson')
```

	hours_studied	exam_scores
hours_studied	1.000000	0.986093
exam_scores	0.986093	1.000000

Se muestra una correlacion positiva muy alta (0.986) entre las horas de estudio y la calificación en los exámenes. Coincidente con lo que se observa en el gráfico de dispersión.

```
#ajustamos el modelo de regresión lineal:  
mod_estudiantes = smf.ols(formula='exam_scores ~ hours_studied', data=estudiantes)  
res_estudiantes = mod_estudiantes.fit()  
print(res_estudiantes.summary())
```

OLS Regression Results

```

=====
Dep. Variable:          exam_scores      R-squared:                0.972
Model:                  OLS              Adj. R-squared:           0.972
Method:                 Least Squares    F-statistic:             8555.
Date:                   Mon, 10 Nov 2025  Prob (F-statistic):      2.11e-191
Time:                   15:53:23         Log-Likelihood:          -512.26
No. Observations:      245              AIC:                     1029.
Df Residuals:          243              BIC:                     1036.
Df Model:               1
Covariance Type:       nonrobust
=====

```

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
Intercept	50.2541	0.278	180.576	0.000	49.706	50.802
hours_studied	1.4750	0.016	92.493	0.000	1.444	1.506

```

=====
Omnibus:                 0.876      Durbin-Watson:           2.190
Prob(Omnibus):           0.645      Jarque-Bera (JB):         0.585
Skew:                    -0.007     Prob(JB):                 0.747
Kurtosis:                3.239     Cond. No.                  38.8
=====

```

Notes:

[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.

El modelo sería entonces:


$$\text{Nota_final} = 50.25 + 1,48 \times \text{Horas_estudiadas} + \text{error}$$

```
# graficar los resultados del modelo:
```

```

plt.figure(figsize=(15,8))
sns.scatterplot(x='hours_studied',y='exam_scores', data = estudiantes)
plt.plot(estudiantes['hours_studied'], res_estudiantes.predict(estudiantes['hours_studied']))
plt.xticks(fontsize=15)
plt.yticks(fontsize=15)
plt.xlabel('Horas de Estudio',fontsize = 15)
plt.ylabel('Calificación Final',fontsize = 15);

```



Vamos a ver en un primer punto de nuevo la salida de este modelo simple de regresión lineal:

```
mod_estudiantes = smf.ols(formula='exam_scores ~ hours_studied', data=estudiantes)
res_estudiantes = mod_estudiantes.fit()
print(res_estudiantes.summary())
```

OLS Regression Results

=====

Dep. Variable:

exam_scores

R-squared:

0.972

Model:

OLS

Adj. R-squared:

0.972

Method:

Least Squares

F-statistic:

8555.

Date:

Mon, 10 Nov 2025

Prob (F-statistic):

2.11e-191

Time:

15:56:31

Log-Likelihood:

-512.26

No. Observations:

245

AIC:

1029.

Df Residuals:

243

BIC:

1036.

Df Model:

1

Covariance Type:

nonrobust

=====

coef

std err

t

P>|t|

[0.025

0.975]

Intercept

50.2541

0.278

180.576

0.000

49.706

50.802

hours_studied

1.4750

0.016

92.493

0.000

1.444

1.506

=====

Omnibus:

0.876

Durbin-Watson:

2.190

Prob(Omnibus):

0.645

Jarque-Bera (JB):

0.585

Skew:

-0.007

Prob(JB):

0.747

Kurtosis:

3.239

Cond. No.

38.8

=====

Notes:

[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.

Skew(sesgo) evalúa la asimetría de los residuos. En este caso el ideal es que sea cero (o muy cercano a cero). Es el momento de grado 3, la fórmula de calculo es $\$sesgo = \frac{E(X-\mu)^3}{(\sigma)^3}$

Si hay cola larga hacia la derecha el sesgo es positivo, si hay cola larga a la izquierda el sesgo es negativo.

Curtosis: es el momento de grado 4, evalúa que tan concentrados alrededor de la media están los residuos. Su fórmula de cálculo es $\$curtosis = \frac{E(X-\mu)^4}{(\sigma)^4}$

Se compara con el valor de curtosis de la distribución normal que es 3 (mesocúrtica). Si es mayor a 3 es leptocúrtica y si es menor que 3 es platicúrtica.

Omnibus: es un test estadístico que evalúa en conjunto la asimetría y la curtosis de los residuos. La hipótesis nula del test H_0 es que los residuos son normales. Debajo, en el cuadro vemos el valor de la probabilidad asociada del test que nos permite inferir si se puede rechazar o no la hipótesis nula.

Durbin Watson: este estadístico mide la correlación de los residuos. Varía entre 0 y 4. Si el estadístico de DW es 2 no hay correlación de residuos. Si tiende a cero hay autocorrelación

positiva fuerte (los residuos dependen con el mismo signo del anterior), si tiende a 4 hay autocorrelación negativa fuerte (alternan signos).

El test de **Jarque Bera** tiene un estadístico que se distribuye χ^2 con 2 grados de libertad. La idea de este test es comprobar cuanto se mueven los residuos de los valores ideales de asimetría y kurtosis para en los valores de los residuos.

El estadístico del test tiene la siguiente fórmula:

donde n es el número de observaciones, K es la kurtosis observada y S la asimetría. El valor p asociado corresponde a la probabilidad asociada en el estadístico observado sobre la distribución χ^2 .

Cond No: indica si las variables independientes están muy correlacionadas entre sí, lo que puede derivar en problemas de multicolinealidad.


Se calcula a partir de los autovalores de la matriz de diseño de las variables explicativas, X .

$$Cond. No = \sqrt{\frac{\lambda_{max}}{\lambda_{min}}}$$

Donde λ_{max} y λ_{min} Son los máximos y mínimos autovalores de la matriz de diseño X .

Si es menor que 30 no hay problemas, hasta 100 se puede considerar colinealidad leve, más de 100 ya podríamos tener problemas de multicolinealidad e inestabilidad de los coeficientes, con más de 1000 ya el modelo deja de ser confiable por la afectación provocada por la multicolinealidad. Por esto es muy importante revisar la correlación entre las variables independientes del modelo a la hora de la selección de variables.

Visualizar primero el **sesgo** en los residuos:




```


residuos = res_estudiantes.resid
media_res = np.mean(residuos)
std_res = np.std(residuos)

# Generación de valores para la curva normal teórica
x = np.linspace(min(residuos), max(residuos), 200)
normal_teorica = norm.pdf(x, loc=0, scale=std_res) # Normal con media 0 (sin sesgo)

plt.figure(figsize=(10,5))

# Histograma + normal teórica
sns.histplot(residuos, kde=False, stat='density')
plt.plot(x, normal_teorica, linewidth=2)
plt.axvline(0, linestyle='--') # Línea de media ideal
plt.title("Distribución de Residuos vs Normal (Sesgo = 0)")
plt.xlabel("Residuos")
plt.ylabel("Densidad")
plt.show()

```



En este caso el valor identificado en el sesgo (skew) de los residuos es -0.007 que es muy cercano a cero y la distribución de los residuos resulta simétrica.

Ahora continuamos con la **curtosis**:

```

# Curtosis
curt_residuos = kurtosis(residuos, fisher=False) # fisher=False → curtosis normal = 3
media_res = np.mean(residuos)
std_res = np.std(residuos)


# Distribución normal teórica
x = np.linspace(min(residuos), max(residuos), 200)
normal_teorica = norm.pdf(x, loc=0, scale=std_res)

plt.figure(figsize=(10,5))

sns.kdeplot(residuos, label=f"Curtosis Residuos = {curt_residuos:.2f}")
plt.plot(x, normal_teorica, label="Normal Teórica (Curtosis = 3)", linewidth=2)

plt.axvline(0, linestyle="--", color="black", alpha=0.6)
plt.title("Comparación de Curtosis: Residuos vs Normal Teórica")
plt.xlabel("Valor")
plt.ylabel("Densidad")
plt.legend()
plt.show()

```



Si la curtosis es cercana a 3 tenemos una distribución mesocúrtica (como en este caso).

Test Omnibus: tenemos un valor p de 0.645 que es mayor a un nivel de confianza α del 5% (0.05). No podemos rechazar la hipótesis nula de que los residuos del modelo son normales en base a este test.


```

dw = durbin_watson(residuos)
print(f"Durbin-Watson: {dw:.3f}")

# Visualización ACF
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8,4))
sm.graphics.tsa.plot_acf(residuos, lags=20, ax=ax)
ax.set_title(f"Autocorrelación de Residuos (Durbin-Watson = {dw:.2f})")
plt.show()

```

Durbin-Watson: 2.190



Jarque Bera: calculamos el estadístico:

$$JB = \frac{n}{6} \left(S^2 + \frac{(K - 3)^2}{4} \right)$$

Donde n es el nro de observaciones, en este caso 245, S es el sesgo calculado (S=-0.007) y la curtosis (K=3.24).

Reemplazando en la fórmula tenemos:

$$JB = \frac{245}{6} \left((-0.007)^2 + \frac{(3.24 - 3)^2}{4} \right)$$

$$JB = 0.585$$

Ahora calculamos el valor de la probabilidad asociada en la distribución χ^2 con 2 grados de libertad.

```
JB=0.585

p_value_JB = 1 - chi2.cdf(JB, df=2)

print('el valor P asociado al test de Jarque Bera es: ',round(p_value_JB,3))
```

el valor P asociado al test de Jarque Bera es: 0.746

Con este valor p asociado al test de Jarque Bera no podemos rechazar la hipótesis nula de distribución normal de residuos, coincidiendo entonces con la prueba de Omnibus.

El Cond. No en este caso es 38.8, no hay indicios de multicolinealidad. Además al ser una sola variable independiente no habría que mirar este indicador.

Los cálculos de la descomposición (complementarios y fuera del alcance de la materia están abajo):

```
#Construcción de la matriz X
X = estudiantes[['hours_studied']]
X = sm.add_constant(X) # agregar intercepto

# descomposición en valores singulares de la matriz de diseño
U, singular_vals, Vt = np.linalg.svd(X)

cond_number = max(singular_vals) / min(singular_vals)
print("Condition Number:", round(cond_number,1))
```

Condition Number: 38.8


Fuera del resumen que se muestra en la tabla de OLS, se puede graficar residuos versus valores ajustados para poder comprobar si la varianza permanece constante en los residuos (homocedasticidad de residuos).

```

residuals = res_estudiantes.resid
fitted = res_estudiantes.fittedvalues

plt.scatter(fitted, residuals)
plt.axhline(y=0)
plt.xlabel("Valores Ajustados")
plt.ylabel("Residuos")
plt.title("Residuos vs Valores Ajustados")
plt.show()

```



Aquí no observamos ningún patrón por lo que se consideran residuos homocedásticos.

```

# convertimos las variables categóricas
data['fem_dummy'] = 0
data.loc[data['sex']=='female', 'fem_dummy'] = 1
data['male_dummy'] = 0
data.loc[data['sex']=='male', 'male_dummy'] = 1
for region in ['southwest', 'southeast', 'northwest', 'northeast']:
    data[region] = 0
    data.loc[data['region']==region, region] = 1

```

```

mod = smf.ols(formula='charges ~ bmi + age + fem_dummy + male_dummy + southwest + southeast +
res = mod.fit()
print(res.summary())

```

OLS Regression Results

```

=====
Dep. Variable:          charges    R-squared:                0.123
Model:                  OLS        Adj. R-squared:            0.119
Method:                 Least Squares    F-statistic:              31.22
Date:                  Mon, 19 Dec 2022    Prob (F-statistic):       3.04e-35
Time:                  21:36:58    Log-Likelihood:           -14390.
No. Observations:      1338    AIC:                      2.879e+04
Df Residuals:          1331    BIC:                      2.883e+04
Df Model:               6
Covariance Type:       nonrobust
=====

```

```

=====
              coef      std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
-----
Intercept  -3441.2696    1023.758     -3.361     0.001    -5449.625    -1432.914
bmi         316.0607      53.602      5.896     0.000     210.907     421.214
age         244.2113      22.282     10.960     0.000     200.500     287.923
fem_dummy  -2388.4851      591.560     -4.038     0.000    -3548.976    -1227.994
male_dummy -1052.7845      606.390     -1.736     0.083    -2242.369     136.800
southwest  -1799.0543      602.604     -2.985     0.003    -2981.211    -616.898
southeast  -180.3714      650.863     -0.277     0.782    -1457.200     1096.458
northwest  -1215.5940      578.483     -2.101     0.036    -2350.432     -80.756
northeast  -246.2500      578.970     -0.425     0.671    -1382.044     889.544
=====
Omnibus:                 318.672    Durbin-Watson:           2.023
Prob(Omnibus):           0.000    Jarque-Bera (JB):        584.059
Skew:                    1.496    Prob(JB):                1.49e-127
Kurtosis:                 4.234    Cond. No.                 3.84e+17
=====

```

Notes:

- [1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.
 [2] The smallest eigenvalue is 2.39e-29. This might indicate that there are strong multicollinearity problems or that the design matrix is singular.

```
data[data['northwest']]
```

	age	sex	bmi	children	smoker	region	charges	fem_dummy	southwest	southe
0	19	female	27.900	0	yes	southwest	16884.92400	1	1	0
1	18	male	33.770	1	no	southeast	1725.55230	0	0	1
2	28	male	33.000	3	no	southeast	4449.46200	0	0	1
3	33	male	22.705	0	no	northwest	21984.47061	0	0	0
4	32	male	28.880	0	no	northwest	3866.85520	0	0	0