

Diplomski seminar

Modeliranje pogojne neodvisnosti s pomočjo grafov

Jošt Gojkovič

Fakulteta za matematiko in fiziko

24. november 2022

Grafično modeliranje

- Grafični model ali verjetnostni grafični model je verjetnostni model, kjer z grafi izrazimo pogojno odvisnost med slučajnimi spremenljivkami
- Povezave med vozlišči predstavljajo odvisnost
- Če je na primer povezava med vozliščem A in B , to pomeni da je A odvisen od B in B od A .

Notacija in terminologija

- $G(V, E)$ enostaven graf, torej nima večkratnih povezav in zank. Večinoma bodo vozlišča označena, torej bodo razdeljena v 2 skupini.

- Množica vozlišč ima obliko

$$V = \Delta \cup \Gamma \quad \text{z} \quad \Delta \cap \Gamma = \emptyset$$

Pravimo, da so vozlišča v Δ diskretna, v Γ pa zvezna.

- Grafom z označenimi vozlišči pravimo označeni grafi

Notacija in terminologija

- Poln graf je graf, v katerem vsaka povezava povezuje par njegovih točk, oziroma kjer so vse točke povezane vsaka z vsako.
- Če je $A \subseteq V$, A inducira podgraf $G_A = (A, E_A)$, kjer je $E_A = E \cap (A \times A)$ dobljena iz G tako da ohranimo povezave z začetnim in končnim vozliščem v A .
- Podmnožica je polna, če inducira poln podgraf
- Polni podmnožici, ki je maksimalna oziroma se je ne da povečat, pravimo klika

Notacija in terminologija

- Če imamo povezavo $\alpha \rightarrow \beta$, pravimo, da je α starš od β . Množica staršev vozlišča β je označena s $pa(\beta)$.
- Množico sosedov vozlišča α označimo z $ne(\alpha)$
- Oznaki $pa(A)$ in $ne(A)$ označujeta množico staršev in sosedov vozlišč v A , katera sama niso v A :

$$pa(A) = \cup_{\alpha \in A} pa(\alpha) \setminus A$$

$$ne(A) = \cup_{\alpha \in A} ne(\alpha) \setminus A$$

- Meja $bd(A)$ podmnožice vozlišč A je množica vozlišč v $V \setminus A$, ki so starši ali sosedi vozliščem v A . Torej $bd(A) = pa(A) \cup ne(A)$.
- Zaprtje množice A je $cl(A) = A \cup bd(A)$

Notacija in terminologija

- Množica $C \subseteq V$ je (α, β) -seperator, če vse poti od α do β sekajo množico C .
- $C \subseteq V$ separira A od B , če je (α, β) -seperator za vse $\alpha \in A$ in $\beta \in B$

Definicija

Trojica (A, B, C) disjunktne podmnožice vozlišč neusmerjenega označenega grafa G tvori močno dekompozicijo grafa G , če je $V = A \cup B \cup C$ in velja naslednje:

- i) C separira A od B
- ii) C je polna podmnožica množice V
- iii) $C \subseteq \Delta \vee B \subseteq \Gamma$

- Če pri enakih predpostavkah veljata samo 1. in 2. pogoj, potem trojica (A, B, C) tvori šibko dekompozicijo.
- Pravimo, da (A, B, C) dekompozira G v komponenti G_{AUC} in G_{BUC}

Pogojna neodvisnost

Definicija

Slučajni spremenljivki X in Y sta pogojno neodvisni pri dani spremenljivki Z če in samo če je pri dani vrednosti Z verjetnostna porazdelitev X enaka za vse vrednosti Y in verjetnostna porazdelitev Y je enaka za vse vrednosti X .

Pišemo $X \perp\!\!\!\perp Y \mid Z$.

Za drisketne slučajne spremenljivke se ta pogoj prevede na:

$$P(X = x, Y = y \mid Z = z) = P(X = x \mid Z = z) \cdot P(Y = y \mid Z = z)$$

V primeru zveznih slučajnih spremenljivk:

$$\begin{aligned} X \perp\!\!\!\perp Y \mid Z &\iff f_{XY|Z}(x, y|z) = f_{X|Z}(x|z) \cdot f_{Y|Z}(y|z) \\ &\iff f_{XYZ}(x, y, z)f_Z(z) = f_{XZ}(x, z) \cdot f_{YZ}(y, z) \end{aligned}$$

Pogojna neodvisnost

Relacija $X \perp\!\!\!\perp Y \mid Z$ ima naslednje lastnosti:

(C1) če $X \perp\!\!\!\perp Y \mid Z$ potem $Y \perp\!\!\!\perp X \mid Z$;

(C2) če $X \perp\!\!\!\perp Y \mid Z$ in $U = h(X)$ potem $U \perp\!\!\!\perp Y \mid Z$;

(C3) če $X \perp\!\!\!\perp Y \mid Z$ in $U = h(X)$ potem $X \perp\!\!\!\perp Y \mid (Z, U)$;

(C4) če $X \perp\!\!\!\perp Y \mid Z$ in $X \perp\!\!\!\perp W \mid (Y, Z)$ potem $X \perp\!\!\!\perp (W, Y) \mid Z$.

V (C2) in (C3) je h neka merljiva funkcija na vzorčnem prostoru od X .
Ob dodatnih predpostavkah velja še (treba vprašat)

(C5) če $X \perp\!\!\!\perp Y \mid Z$ in $X \perp\!\!\!\perp Z \mid Y$ potem $X \perp\!\!\!\perp (Y, Z)$

- Zanimivo je, če si predstavljamo relacije (C1) – (C5) kot čisto formalne izraze v smislu, da niso nujno povezani z verjetnostjo, ampak kot lastnosti irelevance.
- Pomeben primer modela irelevance je separacija grafov:

Označimo $A \perp B \mid C \iff C$ separira A od B v G

Potem ima separacija grafov naslednje lastnosti:

(C1) če $A \perp B \mid C$ potem $B \perp A \mid C$;

(C2) če $A \perp B \mid C$ in $U \subseteq A$ potem $U \perp B \mid C$;

(C3) če $A \perp B \mid C$ in $U \subseteq B$ potem $A \perp B \mid (C \cup U)$;

(C4) če $A \perp B \mid C$ in $A \perp D \mid (B \cup C)$ potem $A \perp (B \cup D) \mid C$.

Če so še vse množice disjunktne, velja še analogno od C(5)

Markove lastnosti na neusmerjenih grafih

- Naj bo V množica vozlišč grafa $G = (V, E)$
- Naj bodo $(X_\alpha)_{\alpha \in V}$ slučajne spremenljivke, ki zavzemajo vrednosti v verjetnostnih prostorih $(\mathcal{X}_\alpha)_{\alpha \in V}$.
- Za $A \subseteq V$ naj bo $(\mathcal{X}_A) = \times_{\alpha \in A} \mathcal{X}_\alpha$ in $\mathcal{X} = \mathcal{X}_V$
- označimo $X_A = (X_\alpha)_{\alpha \in A}$
- Uporabimo kratko notacijo $A \perp\!\!\!\perp B \mid C$ za $X_A \perp\!\!\!\perp X_B \mid X_C$

Markove lastnosti na neusmerjenih grafih

Naj bo $G = (V, E)$ neusmerjen graf in naj bodo $(X_\alpha)_{\alpha \in V}$ slučajne spremenljive. Pravimo, da verjetnostna mera P na \mathcal{X} zadošča:

(P) *Pairwise Markovi lastnosti* glede na G če je za vsak par nesosednjih vozlišč (α, β) :

$$\alpha \perp\!\!\!\perp \beta \mid V \setminus \{\alpha, \beta\}$$

(L) *Lokalni Markovi lastnosti* glede na G , če je za vsako vozlišče $\alpha \in V$:

$$\alpha \perp\!\!\!\perp V \setminus cl(\alpha) \mid bd(\alpha)$$

(G) *Globalni Markovi lastnosti* glede na G , če je za vsako trojico (A, B, S) disjunktnih podmnožic V , tako da S separira A od B v G :

$$A \perp\!\!\!\perp B \mid S$$

Trditev

Za vsak neusmerjen graf G in vsako verjetnostno porazdelitev na \mathcal{X} velja:

$$(G) \implies (L) \implies (P)$$

Ob predpostavki, da za disjunktne podmnožice A, B, C in D velja

$$(1) \quad \text{če } A \perp\!\!\!\perp B \mid (C \cup D) \text{ in } A \perp\!\!\!\perp C \mid (B \cup D) \text{ potem } A \perp\!\!\!\perp (B \cup C) \mid D$$

imamo naslednji izrek:

Izrek (Pearl in Paz)

Če je verjetnostna porazdelitev na \mathcal{X} taka, da velja (1) za disjunktne podmnožice A, B, C, D , potem

$$(G) \iff (L) \iff (P)$$