

Ideal Quantum Gases of Massive Particles

Free, massive particles $\hat{H} = \sum_{j=1}^N \frac{\hat{p}_j^2}{2m}$

One particle Hamiltonian: $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m}$

$$\Rightarrow \langle \underline{r} | \psi_{\underline{k}} \rangle = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} e^{-i\underline{k} \cdot \underline{r}}$$

$$V = L \times L \times L \quad \underline{k} = \frac{2\pi}{L} (n_x, n_y, n_z)$$

$$\sum_{\underline{k}, \sigma} \rightarrow \frac{V}{(2\pi)^3} \int d^3k; \quad \epsilon_{\underline{k}} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

$$\langle n_{\underline{k}} \rangle = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_{\underline{k}} - \mu)} \pm 1} \quad \begin{array}{l} + \text{ Fermions} \\ - \text{ Bosons} \end{array}$$

$$N = \sum_{\underline{k}} \langle n_{\underline{k}} \rangle$$

$$= \frac{V}{(2\pi)^3} \int \frac{1}{e^{\beta(\frac{\hbar^2 k^2}{2m} - \mu)} \pm 1} d^3k \quad \beta = \frac{1}{k_B T}$$

$$\left(x^2 = \beta \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{N}{V} \lambda^3 = \frac{1}{\pi^{3/2}} \int_0^\infty \frac{1}{e^{(x^2 - \beta\mu)} \pm 1} d^3x$$

$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}$

High energy $\rightarrow x^2 \gg \beta\mu \rightarrow$ classical limit

$$\text{Then } \frac{N}{V} \lambda^3 = n \lambda^3 = \frac{1}{\pi^{3/2}} \int_0^\infty \left(e^{\beta\mu - x^2} \mp e^{2\beta\mu - 2x^2} \right) d^3x$$

$$= e^{\beta\mu} \mp \frac{1}{2^{3/2}} e^{2\beta\mu} + \dots$$

Qu. correction.

Equation of state

$$PV = k_B T \mathcal{Z}_{gr.}$$

$$\mathcal{Z}_{gr} \begin{cases} = \prod_{\underline{k}} \left(1 + e^{\beta(\mu - \epsilon_{\underline{k}})} \right) & \text{Fermions} \\ = \prod_{\underline{k}} \frac{1}{1 - e^{\beta(\mu - \epsilon_{\underline{k}})}} & \text{Bosons } \mu - \epsilon_{\underline{k}} < 0. \end{cases}$$

$$\frac{P}{k_B T} = \frac{1}{V} \ln \mathcal{Z}_{gr} = \pm \frac{1}{\lambda^3 \pi^{3/2}} \int \underbrace{\ln(1 \pm e^{-x^2 + \beta\mu})}_{\substack{\left(x^2 = \beta \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \right) \\ \mp e^{-x^2 + \beta\mu} - \frac{1}{2} e^{-2x^2 + 2\beta\mu}}} d^3x$$

$$\frac{P}{k_B T} = \frac{1}{\lambda^3} \left(e^{\beta\mu} \mp \frac{1}{2^{5/2}} e^{2\beta\mu} \right)$$

Qu corr

$$n = \frac{1}{\lambda^3} \left(e^{\beta\mu} \mp \frac{1}{2^{3/2}} e^{2\beta\mu} \right)$$

$$\frac{P}{k_B T} = n + A n^2 \rightarrow \mp \frac{1}{\lambda^3} \frac{1}{2^{3/2}} + \frac{A}{\lambda^6} = \mp \frac{1}{\lambda^3} \frac{1}{2^{5/2}}$$

$$A = \lambda^3 \left(\mp \frac{1}{2^{5/2}} \pm \frac{1}{2^{3/2}} \right) = \pm \lambda^3 \frac{1}{2^{5/2}}$$

Hence $\frac{P}{k_B T} = n \left(1 \pm \lambda^3 \frac{1}{2^{5/2}} n \right)$ + Fermions
- Bosons.