

Erros comuns na prescrição:

Tópicos:

1. Prescrever sem objetivo funcional
2. Ignorar ambiente
3. Supervalorizar tecnologia
4. Baixa adesão
5. Falta de acompanhamento

Módulo 2 – Erros Comuns na Prescrição

Introdução do módulo:

Uma prescrição inadequada de OPMs pode comprometer a funcionalidade, reduzir a adesão ao tratamento e gerar desperdício de recursos. Entre os erros mais frequentes estão a prescrição sem objetivos funcionais claramente definidos, a desconsideração das características do ambiente em que o recurso será utilizado e a supervalorização de tecnologias complexas em detrimento das reais necessidades do usuário. Esses fatores evidenciam que a eficácia de uma OPM depende tanto de suas características técnicas quanto da compatibilidade com o contexto e os objetivos da intervenção.

Outro aspecto essencial é reconhecer que a prescrição não representa o fim do processo terapêutico. A baixa adesão ao uso da OPM frequentemente está relacionada à ausência de treinamento, acompanhamento e reavaliações periódicas, que permitem identificar dificuldades, promover ajustes e verificar se os objetivos inicialmente propostos estão sendo alcançados. Assim, uma prática qualificada exige monitoramento contínuo e tomada de decisão baseada na evolução funcional do usuário e em suas experiências de uso.

Aprofunde o conteúdo a seguir