Electromagnetismo 1

S02 - Ley de Coulomb

Josue Meneses Díaz

Experimento



Figure 1: Balanza de torsión de Coulomb

Ley de Coulomb

Considere un sistema de dos objetos puntuales con cargas, q_1 y q_2 , separados por una distancia r en el vacío. La fuerza eléctrica ejercida por q_1 sobre q_2 viene dada por la ley de Coulomb:

$$\vec{\mathbf{F}}_{12} = k_e \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{\mathbf{r}},$$

donde k_e es la constante de Coulomb y $\hat{r}=\vec{r}/r$ es un vector unitario dirigido de q_1 a q_2

$$k_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8,9875 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$$

donde ϵ_0 es la constante eléctrica llamada permitividad del espacio libre

Ejemplo (Ley de Coulomb)

Un protón y un electrón en un átomo de hidrógeno se encuentran separados a una distancia de $a=5,3\cdot 10^{-11}$ [m]. $(q_1=-q_2=1,6021765\times 10^{-19}[$ C])

Calcule:

- La fuerza eléctrica que sobre el electrón.
- Dibuje el vector fuerzas resultante sobre el electrón.



Comparación con fuerza gravitacional

La fuerza eléctrica y la fuerza de gravitación, junto con las fuerzas nucleares (Fuerte y Débil) son básicas en nuestro universo y rigen a distinta escala. Hay una gran semejanza en la estructura matemática de la Ley de Coulomb y la Ley de Gravitación Universal de Newton

Ley de Coulomb

$$\overrightarrow{F}_{12} = k_e \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r} \quad k_e = 8,98755 \cdot 10^9 \left[\frac{N \cdot m^2}{C^2} \right]$$

Ley de Gravitación universal


$$\overrightarrow{F}_{12} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{r} \quad G = 6,67 \cdot 10^{-11} \left[\frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{K g^2} \right]$$


5

Ejemplo (Relación entre fuerza eléctrica y gravitacional)

Calcular la relación que existe entre las fuerzas eléctrica y grávitatoria ejercidas entre el protón y el electrón de un átomo de hidrógeno.

$$\begin{split} a &= 5, 3 \cdot 10^{-11} [\mathrm{m}] \\ q_1 &= -q_2 = 1,6021765 \times 10^{-19} [\mathrm{C}] \\ m_+ &= 9,1094 \times 10^{-31} [\mathrm{kg}] \ m_- = 1,67262 \times 10^{-27} [\mathrm{kg}] \end{split}$$





Principio de superposición

La ley de Coulomb se aplica a cualquier par de cargos puntuales. Cuando hay más de dos cargas presentes, la fuerza neta sobre cualquier carga es simplemente **la suma vectorial de las fuerzas ejercidas sobre ella por las otras cargas**. Por ejemplo, si hay tres cargas presentes, la fuerza resultante experimentada por q_3 debido a q_1 y q_2 será:

$$\vec{\mathbf{F}}_3 = \vec{\mathbf{F}}_{13} + \vec{\mathbf{F}}_{23}.$$


En general, la fuerza aplicada sobre q_i es:

$$\vec{F}_i = k_e q_i \sum_{j \neq i} \frac{q_j}{r_{j,i}^2} \hat{r}_{j,i}.$$

Ejemplo

Calcular la fuerza que experimenta la carga negativa. $q_1=75 {\rm nC},\ q_2=-15 {\rm nC},$

 $a=2\mathrm{nm}$



Ejemplo (Aproximación efecto triboeléctrico)

Continuando con el ejemplo de átomo de hidrógéno. ¿Qué ocurre si acercamos una carga positiva $q_3=3q$ a la misma distancia a.

Calcule la fuerza de atracción sobre la carga negativa producto de las dos cargas positivas. ($a=5,3\cdot 10^{-11}$ [m]. $q_1=-q_2=1,6021765\times 10^{-19}$ [C])



Desafio: Encontrar la posición donde la fuerza neta sobre carga negativa es 0.

Resumen

Ley de Coulomb:

$$\vec{F} = k_e \vec{q} \sum_{j \neq i} \frac{q_j}{r_{j,i}^2} \hat{r}_{j,i}$$

Donde k_e es la constante de Coulomb:

$$k_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8.9875\times 10^9~\mathrm{N\cdot m^2/C^2}$$

La fuerza neta que experimenta la partícula $\it i$ es determinada mediante:

$$\vec{F}_i = k_e q_i \sum_{j \neq i} \frac{q_j}{r_{j,i}^2} \hat{r}_{j,i}.$$

Referencias

- Serway, Raymond A., and John W. Jewett. "23 Campos Eléctricos. 23.3 Ley de Coulomb 23.4 El Campo Eléctrico." In Física Para Ciencias e Ingeniería Con Física Moderna, 7ma ed. Vol. 2. CENGAGE learning, 2005.
- Freedman, Young, and S. Zemansky. "21 CARGA ELÉCTRICA Y CAMPO ELÉCTRICO. 21.4 Campo Eléctrico y Fuerzas Eléctricas." In Física Universitaria, 2009.