



Cijferwaarde

[illegible]



Afronden van getallen

Afronden op T, E, t of h

Je kleurt het getal waarop je moet afronden.

Is het cijfer na het gekleurde cijfer ≥ 5 ,

→ het gekleurde cijfer + 1.

Is het cijfer na het gekleurde cijfer < 5 ,

→ het gekleurde cijfer blijft hetzelfde.

De cijfers na het gekleurde cijfer worden nullen.

Voorbeeld: 123

Afronden op T

123

3 is $<$ dan 5 dus 2 blijft 2.

120

Voorbeeld: 9,67

Afronden op t

9,67

7 is $\geq$ dan 5 dus 6 wordt 7.

9,70

Deelbaarheid 8



Een getal is **deelbaar door 2** als het **EVEN** is.

Het laatste cijfer van een even getal is steeds : 0, 2, 4, 6 of 8.

vb : 1 256 2 568 32

Een getal is **deelbaar door 10** als het eindigt op **0**.

vb : 2 560 65 900



Een getal is **deelbaar door 5** als het eindigt op **0 of 5**.

vb : 120 265

Een getal is **deelbaar door 100** als het eindigt op **00**.

vb : 3 500 14 700



Een getal is **deelbaar door 4** als het eindigt op **00 of als de laatste 2 cijfers deelbaar zijn door 4**.

vb : 9 800 532 65 596

Een getal is **deelbaar door 25** als het eindigt op **00, 25, 50 en 75**.

vb: 8 325 96 400 6 375

Een getal is **deelbaar door 3** als de **som van de cijfers van het getal deelbaar is door 3**.

vb : 78 564 $\rightarrow 7 + 8 + 5 + 6 + 4 = 30$

Een getal is **deelbaar door 9** als de **som van de cijfers van het getal deelbaar is door 9**

vb : 657 $\rightarrow 6 + 5 + 7 = 18$



functie van een getal

Elke getal heeft een functie.

maatgetal (verhouding)	vb:	gewicht, lengte, inhoud, tijd, temperatuur en euro.
rangorde	vb:	eerste plaats, derde plaats, jaren en dagen.
hoeveelheid	vb:	3 koeken, taarten, dozen, stenen, tomaten, knikkers ...
code	vb:	telefoonnummer, barcode, rekeningnummer, huisnummer ...



g.g.d. en k.g.v.

1. De grootste gemene deler (g.g.d)

Hoe zoek je de g.g.d. van twee getallen? Voorbeeld 12 en 16

- Je zoekt alle delers van de twee getallen.
- Je omcirkelt alle gemeenschappelijke delers.
- Je kleurt de grootste gemeenschappelijke deler.

12	
1	12
2	6
3	4

16	
1	16
2	8
4	4

DUS : de g.g.d. van 12 en 16 is 4

2. Het kleinste gemene veelvoud (k.g.v.)

Hoe zoek je het k.g.v. van twee getallen ? Voorbeeld 6 en 8

- Je zoekt de veelvouden van de twee getallen.
- Je omcirkelt al de gemeenschappelijke veelvouden groter dan 0.
- Je kleurt het kleinste gemeenschappelijke veelvoud.

6	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
8	0	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80

DUS : het k.g.v. van 6 en 8 is 24



Het gemiddelde

Om het **gemiddelde** van een reeks getallen te berekenen, maak je eerst de som van die getallen. Daarna deel je die som door het aantal getallen.

voorbeeld:

Jan eet elke dag van de schoolweek fruit.

maandag	4 stukken
dinsdag	5 stukken
woensdag	3 stukken
donderdag	2 stukken
vrijdag	6 stukken

Hoeveel stukken fruit eet Jan gemiddeld per dag?

$$(4 + 5 + 3 + 2 + 6) : 5 =$$

$$20 : 5 = 4$$

Antwoord : Jan eet gemiddeld 4 stukken fruit per dag.

Rekenbegrippen



groter dan	$>$
kleiner dan	$<$
groter dan of gelijk aan	$\geq$
kleiner dan of gelijk aan	$\leq$

EVEN GETAL

Getallen die je kunt delen door 2.

Een even getal eindigt op 0,2,4,6 of 8.

ONEVEN GETAL

Getallen die je niet kunt delen door 2.

Een oneven getal eindigt op 1,3,5,7 of 9.

DELERS

Deler is het getal waardoor gedeeld wordt.

$$18 : 2 = 9$$

Hoe kan je de delers vinden?

18	
1	18
2	9
3	6

VEELVOUDEN

De getallen die je krijgt als je een bepaald getal vermenigvuldigt met andere getallen.

6 is een veelvoud van 3 want $2 \times 3 = 6$

20 is een veelvoud van 5 want $4 \times 5 = 20$

**DECIMAAL GETAL (kommagetel)**

Getallen met een komma.

7,52 12,7 0,485

GEMENGD GETAL

Getal bestaande uit een geheel getal en een breuk.

$2\frac{1}{2}$, $3\frac{3}{4}$, $5\frac{1}{3}$

POSITIEF GETAL

Getallen groter of gelijk aan ($\geq$) 0.

0, 1, 2, 3, ...

NEGATIEF GETAL

Getallen kleiner of gelijk aan ($\leq$) 0.

0, -1, -2, -3, ...

**PRIEMGETAL**

Getallen die je alleen kunt delen door zichzelf en door 1.

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 enz.



Rekenbegrippen

De optelling

$$5 + 4 = 9$$

De uitkomst van een optelling noem je de **SOM**

5 en 4 zijn de **TERMEN**

+ is het **PLUSTEKEN**

De aftrekking

$$12 - 5 = 7$$

De uitkomst van een aftrekking noem je het **VERSCHIL**

12 en 5 zijn de **TERMEN**

12 is het **AFTREKTAL**

5 is de **AFTREKKER**

- is het **MINTEKEN**

De vermenigvuldiging

$$3 \times 2 = 6$$

De uitkomst van een vermenigvuldiging noem je het **PRODUCT**

3 en 2 zijn de **FACTOREN**

3 is de **VERMENIGVULDIGER**

2 is het **VERMENIGVULDIGTAL**

X is het **MAALTEKEN OF VERMENIGVULDIGINGSTEKEN**

De deling

$$12 : 4 = 3$$

De uitkomst van een deling noem je het **QUOTIËNT**

12 en 4 zijn de **FACTOREN**

12 is het **DEELTAL**

4 is de **DELER**

: is het **DEELTEKEN**

Romeinse cijfers

De symbolen:



1	5	10
I	V	X



50	100	500	1000
L	C	D	M

Ik Vervang Xanders Lekkere Citroenen Door Mandarijnen



De Afspraken:

De symbolen worden gerangschikt :
van **GROOT** naar **KLEIN** en van **LINKS** naar **RECHTS**.

voorbeeld:

$$66 = LXVI \rightarrow L < X < V < I$$

Een symbool met een **lagere waarde** ACHTER een symbool met een **hogere waarde**,
wordt erbij geteld.

voorbeeld:

$$VI \rightarrow 5 + 1 = 6$$

Een symbool met een **lagere waarde** VOOR een symbool met een **hogere waarde**,
wordt ervan afgetrokken. Dit geldt enkel tussen de symbolen :

C en M	X en C	I en X
C en D	X en L	I en V

voorbeeld:

$$IV \rightarrow 5 - 1 = 4$$

Om een getal in Romeinse cijfers om te zetten, splits je dat getal best in D, H, T en E.

voorbeeld:

$$\begin{array}{ccc} 2 & 5 & 7 \\ \swarrow & \downarrow & \swarrow \\ 200 & + & 50 & + & 7 \\ (100 + 100) & & (50) & & (5 + 1 + 1) \\ C & C & L & & V & I & I \end{array}$$

257 = CCLVII



Let op !



De symbolen **M, C, X** en **I** worden maximum **DRIE** keer na elkaar gebruikt!

Voorbeeld: XXIII

De symbolen **D, L** en **V** mogen maar **EEN** keer in een getal voorkomen.

Voorbeeld: 900 = CM