

# Chirurgie de la thyroïde et des parathyroïdes

## Définition :

La thyroïde est une glande endocrine cervicale régulant de nombreux systèmes hormonaux. (Sécrétions des hormones thyroïdiennes T4 et T3, régulation hypophysaire via la TSH)

## Indication :

- Exérèse de la thyroïde si nodule du fait du risque de tumeur
- Exérèse de la thyroïde si dysthyroïdie – maladie de Basedow et hyperthyroïdie
- Exérèse de la thyroïde si goitre plongeant

## But :

- Confirmer diagnostic histologique
- Évaluer stade de la maladie
- Permettre exérèse complète
- Faciliter traitements et surveillance post-opératoires
- Limiter risque de récurrence


## Principe :


C'est l'ablation de la glande thyroïde dans sa totalité (isthme, lobe droit et gauche) ou partiellement (isthme et 1 lobe) On peut également faire l'ablation de glandes parathyroïdes.

Rapport anatomique : exploration morphologique : écho cervicale

Thyroïde : Située à la face antérieure du cou, elle se compose de 2 lobes, droit et gauche situé verticalement de part et d'autre du larynx .

Une partie interne horizontale, l'isthme thyroïdien, forme un pont entre les 2 lobes. Latéralement, le nerf récurrent (ou nerf laryngé inférieur), issu du nerf vague, a un rapport étroit avec le lobe droit et gauche. 4 parathyroïdes se situent aux 4 pôles Thyroïdiens. (Régulation du calcium via la parathormone)





Nerf récurrent : commande le muscle tenseur des cordes vocales. Il est responsable de la mobilité laryngée (inspiratoire, fermeture déglutition et de la phonation).

Installation définitive : check list 1<sup>ère</sup> partie

- Décubitus dorsal
- Rond de tête, tête en hyperextension
- Gélatines sacrum et talons
- Bras le long du corps bordés par un drap
- Couverture chauffante
- Mise ne place électrode neutre
- Validation de l'installation par l'équipe chirurgicale

Déroulement de l'intervention : check list 2<sup>ème</sup> partie

| Temps opératoires                                     | Rôle instrumentiste                                                                           | Rôle circulante                                                                                     | DM utilisé                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installation                                          | Préparation cutanée<br><b>sans iode</b> + drapage<br>Installation table<br>d'instrumentation. | Brancher le<br>générateur haute<br>fréquence,<br>l'aspiration<br>Allumer l'éclairage<br>opératoire. | Badigeon<br>Boîte cou<br>Bistouri Bipolaire et<br>monopolaire<br>Electrodes de<br>monitoring du nerf<br>récurrent et son<br>stimulateur |
| Incision cutanée<br>Cervicotomie<br>médiane au dessus | Lame froide 23 + PàD<br>à griffes                                                             | Compte des textiles                                                                                 |                                                                                                                                         |

|                                                                                |                                                                         |                                                                                                          |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| du sternum dans un pli du cou                                                  |                                                                         |                                                                                                          |                         |
| Exposition de l'isthme thyroïdien                                              | champs bordure + faraboeuf +/- beckman<br>Ligature des petits vaisseaux |                                                                                                          | Bob 2/0                 |
| Monitoring nerfs récurrents +++                                                | Electrodes de monitoring                                                | Brancher au moniteur l'électrode                                                                         | Moniteur de stimulation |
| Libération d'un(es) lobe(s)                                                    | PàD+ metzenbaum<br>BE/Bipolaire                                         |                                                                                                          |                         |
| Loboisthmectomie ou thyroïdectomie totale                                      |                                                                         |                                                                                                          |                         |
| Analyse extemporanée si nodule unique, si modifie geste chirurgical            | Anapath +/- extempo                                                     | anapath +/- extempo                                                                                      |                         |
| Curages récurrentiels +/- latéral si tumeur<br>Manubriotomie dans de rares cas |                                                                         |                                                                                                          |                         |
| Hémostase                                                                      | Compte des textiles                                                     | Compte des textiles                                                                                      |                         |
| Fermeture + drainage                                                           | PàD +BE ou Bipolaire                                                    |                                                                                                          |                         |
| Pansement                                                                      | Drain de redon<br>Porte aiguille<br>PàD à griffes<br><br>Mépore         | Donner les fils<br>Traçabilité feuille de soins service/bloc<br><br>Traçabilité heure fin d'intervention | Vicryl rapide           |

Complications : *check list 3<sup>ème</sup> partie*

- Lésion du nerf récurrent - Diminution de la mobilité d'une corde vocale : dysphonie  
- Manque de calcium : Parathyroïdectomie
- Hématome

Parathyroïdectomie : temps opératoire quasi identiques, pas de drainage. Succès de la chirurgie si chute de la calcémie. Récidive possible même complications que thyroïdectomie.

