

 	Hôpital Bicêtre	Procédure Réf : smq-reference
	COLECTOMIE GAUCHE RECTOSIGMOÏDE COELIOSCOPIE	Version : 1 Date d'application : smq-dateapplication Date de fin de validité : smq-limval Page 1 sur 4

	NOM, FONCTION	DATE
RÉDACTION	BOUIX Jean	Date de rédaction
VALIDATION		Date de validation
APPROBATION	SMQ-APPROBATEURS	Date d'approbation

Groupe de travail :

Principales modifications par rapport à la version précédente : smq-objet-modif

1. OBJET

Cette fiche décrit la procédure et le matériel nécessaire lors d'une colectomie gauche recto-sigmoïdienne par coelioscopie.

2. DOMAINE D'APPLICATION

Cette procédure s'applique au bloc opératoire commun du CHU de Bicêtre.

3. RESPONSABILITÉS/ PERSONNES CONCERNÉES

IBODE, IDE, EIBODE, chirurgiens, internes en chirurgie, externes.

4. DESCRIPTION

Définition :

La colectomie gauche recto-sigmoïdienne par coelioscopie est une intervention chirurgicale digestive mini-invasive consistant à l'exérèse du côlon gauche et du sigmoïde, avec emport du rectum supérieur, réalisée par voie laparoscopique, suivie d'un rétablissement de la continuité digestive par anastomose colorectale.

But :

- Traitement **curatif carcinologique** des cancers du côlon gauche ou du sigmoïde
- Traitement des pathologies bénignes compliquées :
 - Diverticulite compliquée
 - Sténose
 - Volvulus
- Réaliser une **résection complète avec marges saines**
- Assurer un **rétablissement de la continuité digestive** dans des conditions de sécurité optimales

Principe :

Temps d'abord et d'exploration

- Installation en **décubitus dorsal**
- Open coelio et mise en place trocart de 11
- Création d'un **pneumopéritoine**
- Mise en place de **3 à 4 trocars**
- Exploration de la cavité abdominale

Temps de dissection

- Décollement du côlon gauche selon le **plan de Toldt**
- Repérage et protection de l'**uretère gauche**
- Ligature de l'**artère mésentérique inférieure** ou de ses branches selon l'indication
- Mobilisation complète du côlon gauche et du sigmoïde

Temps de résection

- Section du côlon proximal
- Section du rectum supérieur
- Exérèse en bloc de la pièce opératoire

Temps d'anastomose **Temps septique**

- Rétablissement de la continuité digestive par **anastomose colorectale**
- Anastomose le plus souvent **mécanique**
- Test d'**étanchéité** et contrôle de la vascularisation


Protection éventuelle **Temps septique**

- Réalisation possible d'une **stomie de protection** selon le contexte

Fermeture **Temps aseptique**

Points de vigilance

- Repérage de l'**uretère gauche**
- Qualité de la vascularisation colique
- Tension et étanchéité de l'anastomose
- Indication d'une stomie de protection



Installation :

Patient installé en décubitus dorsal avec mise en place de jambières, bras gauche le long du corps, sur matelas anti-glisse et épaulières, la colonne vidéo positionnée à droite.

Matériel :

Mobile : 2 grandes tables 1 petite table 1 table mayo

Techniques : Colonne vidéo. GHF

Installation : Table opératoire, jambières, gélouses, matelas anti-glisse, épaulières



Prévoir le matériel pour la conversion (cf fiche)

DMRS

1 er temps opératoire

Boîte coelio
Optique 0° ou 30°

2 eme temps opératoire

Boîte Appendicite « colon sous coelio »

Pince fenêtrée mors long
Pince à clips Hem-o-Lok dorée
Matériel pour sondage urinaire
PAM Harmonic

Consommables : DM & DMS

1 er temps opératoire **si résection jusqu'au haut et moyen rectum**

Pack coelioscopie

1 er temps opératoire **si résection jusqu'au bas rectum**

Pack universel	Poche à instruments	Champs de table
----------------	---------------------	-----------------

1 er temps opératoire matériel commun

Casaques	Aspiration coelio Ø 5	Compressees RX	Poignée de scialytique
Plateau badigeon	Trocarts Ø 5	Champs abdominaux	Lame 11
Electrode active	Trocarts Ø 10	Compressees NT	Cupule
Housse caméra	Clip Hem-o-lock	Electrode neutre	Matériel de sondage
Tuyau d'insufflation	Suture automatique de coelio type endo GIA		Pince Harmonic

2 eme temps opératoire

Grande cupule	Suture automatique type TA 60 bleu +/-	Compressees RX	Champs abdominaux
Lames 23	Pince pure string +/-	Ecarteur d'Alexis® coelio	Pince EEA

Pharmacie :

Bétadine jaune

Bétadine rouge

Gel xylocaïne

Eau PPI

Sérum physiologique

Examen :

Anatomo-pathologie