環境概述

能量來源

主要由消化爬藤植物來獲得營養。
根據：https://www.thenewslens.com/article/205549 (來自 TNL 關鍵評論網)

AI 介入的影響

為保護生物生存，AI 在當今存活下來的物種中，挑出一定數量，並在他們體內植入了名為「Survivor(倖存者)」的特殊裝置。

這種裝置會幫助物種屏蔽電磁波干擾，並協助生物將腦中訊息傳遞給另一個裝配著 Survivor 的持有者。同時，Survivor 還能將生物吸入體內的石棉、玻璃纖維等因大樓倒塌而釋出的有毒物質淨化後排出，並過濾部分核汙染，以此降低生物的生存門檻。

但 AI 僅在現存的第一代個體體內配備 Survivor，這套裝置的數量並不會隨著物種數量的增加而跟著增加。因此生下來的子代在生存到一定歲數，隨著其受到環境汙染的反饋越來越嚴重，便必須透過搶奪前一代的 Survivor 使自己的生命得以延續。

補充：不同族群不適用於同一種 Survivor。因此同一型號的 Survivor 只會在單一物種中傳遞。

物種設定

棲地

陸生動物，生存於 AI 發展區外圍的城市廢墟。

理由：因有從 AI 發展區外溢的些許熱量，雖整體環境偏熱，但在冬季至少有穩定的熱源供給，而不至於凍死。AI 發展區幾乎由全機械構成，無法在其中獲取足夠養分，因此住在外圍仍有少許生物存在的城市廢墟中。

型態

- **外觀描述：**
  1. 這種生物長得有點像蜥蜴或壁虎，身體細長，腳趾上面有類似吸盤的構造方便爬行於牆面。

  2. 身體呈流線型以降低風阻，前腳與軀幹的連接處具有一層薄膜，可以讓其從高處滑翔而下。

  3. 尾巴長而有力，末端以好幾節長方形薄片構成，這是他們演化出來的特殊鱗片，可用於求偶、攻擊並威嚇敵人，有時也會用來切斷附著在建築物上的爬藤植物的莖。雄性的尾巴較粗，末端的鱗片也會比雌性大片並更為銳利。

  4. 母體的腹部具有育兒袋的構造，幼體出生後會先住在裡面。

  5. 頭上有一個閃著紅點且有兩根向上指的天線的裝置即為由 AI 介入後設置的「Survivor」裝置，用以協助生物生存。

- **大小：**
  成體包含尾巴約 30 公分，雌雄間沒有體型差異。幼體剛離開育兒袋時含尾巴約 10-15 公分。

代謝

- **養分攝取：**
  雜食性，但平常主要以長在大樓廢墟上藤蔓類為食，每天會吃掉大量藤蔓以獲取自身一天活動所需的能量。

- **體溫調控：**
  恆溫動物，但耐熱性佳，即使在超過 40 度的環境下也能生存。

- **淨化空氣：**
  肺部具有淨化系統，能夠阻擋部分坍塌大樓產生的細塵與有毒物質進入肺部，同時也比其他生物對輻射汙染具有更高耐性，讓它們能夠自由在 AI 發展區邊緣活動。但自身能抵禦的有毒氣體與核汙染有限，仍需透過 Survivor

協助淨化。

繁殖

胎生，體內受精(平均一胎約三至五個)。

理由：因大樓隨時可能倒塌，路面上也佈滿玻璃、鐵釘等各種尖銳物品，隨時可能會壓碎脆弱的蛋殼，而體外授精同樣也因外部環境風險過高，可能無法成功受精，使得生育率降低，因此採用胎生且體內受精，提高子代存活率。

行為

- **移動：**
  透過兩種方式移動：
  1. 爬行：可在地面或是吸附在牆面上爬行。

  2. 滑行：從高處跳下後張開前腳，以前腳與軀幹間的薄膜透過滑行在空中移動。

- **交流方式：**
  可用肢體動作、身體的氣味與同伴交流，或是透過 Survivor 傳遞腦中訊號給同伴。

- **求偶：**
  雄性間以揮動尾巴打擊對方的方式相互競爭求偶。

- **競爭：**
  待子代長到一定歲數，離開母體之時，便會開始爭奪父母的 Survivor，父母會在 Survivor 被搶奪後，會隨著那些未搶到 Survivor 的子代逐漸被環境淘汰、死亡，競爭方式同雄性的求偶行為，唯一不同的是，雌性會爭奪母親的 Survivor，雄性則是爭奪父親的，雌雄之間不會打架。

- **育兒：**
  子代出生後不會立刻離開母體，而是在母體內部類似育兒袋的構造中，待幼兒全身器官皆發育完全後才會正式離開母體。

- **特殊行為：**
  在冬天寒冷時會藉由 AI 發產區內的核電廠中，排出的讓發電設備降溫的冷卻水泡溫泉，以維持身體暖和。

威脅

- **空氣汙染：**
  建築倒塌時從中釋放的細微粉成會導致生物的肺部受損，引發呼吸道疾病。

  根據：大樓倒塌的空氣污染物中有許多都可能導致健康問題與風險。矽塵和玻璃纖維尤其有害，因長期暴露可能導致矽肺症、肺癌和呼吸道刺激。

  出處：
  https://edition.cnn.com/2026/09/08/us/nyc-sept-11-air-quality-records(CNN 報導)
  https://www.cdc.gov/wtc/exposures.html(來自美國疾病管制與預防中心)

- **輻射汙染：**
  核輻射對生物體造成的影響分成兩種：一是他可能直接破壞生物的細胞，讓生物直接死亡。第二種是慢性的，核輻射使細胞突變或增加癌化機率，對生物體造成不可逆的負面影響。

  出處：
  https://pansci.asia/archives/334291(來自泛科學：福島核災對環境的影響)

  https://www.e-info.org.tw/node/83939(來自環境資源中心對福島和災後的各研究報告的總結整理)

- **電磁波干擾：**
  電磁波會影響鳥類等利用磁場判斷方位的動物的判斷能力，誤導其方向。且也可能對生物的腦部以及生殖系統造成損害。

  出處：
  https://e-info.org.tw/node/37932(來自環境資源中心：印度研究證實電磁波破壞鳥類繁殖)

  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969720384461(來

自 sciencedirect 研究電磁波對生態環境的報告)

補：上述三種危機中，此生物能夠稍微抵禦空汙及輻射汙染，但仍會對身體造成影響，電磁波則會干擾牠們對於方向的判別，讓其迷路或判斷能力減低。而透過配戴 Survivor 可大幅降低三種危機對生物的影響，降低生物的生存門檻。

- **同類競爭：**
  如同上述提及，幼體在成長到一定歲數後便會互相爭奪父母身上的 Survivor 裝置。只要成功取得裝置，個體便更容易生存，反之隨著個體成長，如沒有 Survivor 協助淨化與阻隔電磁波干擾，上述三種危機的對個體的影響會逐漸累積，最後導致其死亡。