#### গুণের গননার খেলা

#### চলো আমরা একটি গল্প পড়ি।

অনেক অনেক বছর আগে কোন অঞ্চলে একজন রাজা ছিলেন। একদিন রাজার দরবারে এক বিদেশি পর্যটক এলেন, সাথে নিয়ে এলেন ভীষণ সুন্দর এক চিত্রকর্ম। রাজা খুশি হয়ে পর্যটককে সেই চিত্রকর্মের মূল্য দিতে চাইলেন। কিন্তু পর্যটক সরাসরি কোন মূল্য না চেয়ে বললেন, "এই চিত্রকর্মের মূল্য দেওয়ার নিয়ম একটু ভিন্ন।" রাজা জিজ্ঞেস করলেন, "বলো দেখি কি নিয়ম!" পর্যটক বলেন, একটানা ৫০ (পঞ্চাশ) দিন ধরে এর মূল্য দিবেন। প্রথম দিন তিনি ১ টাকা নিবেন। দ্বিতীয় দিন তার দ্বিগুণ, অর্থাৎ ২ টাকা। তার পরের দিন নিবেন দ্বিতীয় দিনের দ্বিগুণ, অর্থাৎ ৪ টাকা। এভাবে তিনি ৫০ দিন ধরে ঐ চিত্রকর্মের মূল্য নিবেন। হিসাবটি অনেকটা নিচের ছকের মত।

রাজা ভাবলেন, এ আর এমন কি, তিনি রাজি হয়ে গেলেন। এভাবে প্রত্যেকদিন পর্যটক এসে রাজ দরবার থেকে মূল্য নিয়ে যান। কিন্তু ২০ দিন যাওয়ার পর রাজার টনক নড়ে বসলো। ভাবো তো কি কারণে সেটি হলো ? তোমরা ছক ০.১ এর ন্যায় একটি ছক খাতায় তৈরি করে ৫ম দিন হতে ২০তম দিন পর্যন্ত টাকার পরিমাণটি নির্ণয় করো।

#### সমাধানঃ

ছক ০.১

দিন	গুণের কাজ	টাকার পরিমাণ	দিন	গুণের কাজ	টাকার পরিমাণ
>		٥	77	<b>৫</b> ১২ x ২	<b>\$</b> ०२8
২	۵ x ২	২	১২	১०২8 x ২	२०8४
9	२ x २	8	20	२०8४ x २	৪০৯৬
8	8 x ২	b	\$8	8০৯৬ x ২	৮১৯২
<b>&amp;</b>	ъχ২	১৬	36	৮১৯২ x ২	১৬৩৮৪
৬	১৬ x ২	৩২	১৬	১৬৩৮8 x ২	৩২৭৬৮
٩	৩২ x ২	৬8	<b>١</b> ٩	৩২৭৬৮ x ২	৬৫৫৩৬
৮	৬8 x ২	১২৮	<b>&gt;</b> b	৬৫৫৩৬ x ২	১৩১০৭২
৯	১২৮ x ২	২৫৬	79	১৩১০৭২ x ২	২৬২১৪৪
\$0	<b>২৫৬ x ২</b>	৫১২	২০	২৬২ <b>১</b> 88 x ২	৫২৪২৮৮

#### কাগজ ভাঁজের খেলা

একটি কাগজকে সমান ২ ভাগে ভাঁজ করতে থাকলে কত তম ভাঁজে কয়টি ঘর পাওয়া যাবে নিচের ছকে (১.১) পূরণ করার চেষ্টা করো।

ছক ১.১			
কত তম ভাঁজ?	ঘর সংখ্যা		
<b>১</b> ম	২		
২য়	8		
<b>৩</b> য়	ъ		
8र्थ	১৬		
৫ম	৩২		

পরবর্তীতে, দুইটি সমান ভাঁজের জায়গায় প্রতিবারে ৩টি করে ভাঁজ করো এবং মোট ৪ বার ভাঁজ করে ছক ১.১ এর ন্যায় ছক ১.২ পূরণ করো।

ছক ১.২			
কত তম ভাঁজ?	ঘর সংখ্যা		
১ম	•		
২য়	৯		
<b>৩</b> য়	২৭		
8र्थ	<b>لا</b> ط		

তোমাদের যাদের রোল জোড় সংখ্যা তারা ৬ সংখ্যাটি নিচের ছকে লিখো এবং যাদের রোল বিজোড় তারা ৫ সংখ্যাটি নিচের ছকে লিখো।

ছক ১.৩

71 010				
সংখ্যা কতটি সংখ্যা রয়েছে?				
Č	১টি			

এখন, তুমি যে সংখ্যাটি নিলে, সেই সংখ্যাটিকে, সেই সংখ্যাটি দিয়ে ১ বার গুণ করো এবং তা নিচের ছকের ন্যায় পুরণ করো।

ছক ১.৪

গুণাকার	গুন্ফল	গুণাকারে আলাদাভাবে একই সংখ্যা কতটি রয়েছে?
¢x¢	<b>২</b> ৫	২টি

এখন আগের বারের মতই, সেই সংখ্যাটি দিয়ে ২ বার গুণ করো এবং নিচের ছকে গুণাকারে লেখো। গুণফল কত পেলে?

ছক ১.৫

গুণাকার	গুনফল	গুণাকারে আলাদাভাবে একই সংখ্যা কতটি রয়েছে?
¢x¢x¢	১২৫	৩টি

এমন করে ৩ বার, ৪ বার ও ৫ বার গুণ করো এবং নিচের ছকে লেখো।

ছক ১.৬

গুণাকার	গুনফল	গুণাকারে আলাদাভাবে একই সংখ্যা কতটি রয়েছে?
¢x¢x¢x¢	৬২৫	8টি
<b>¢</b> χ <b>¢</b> χ <b>¢</b> χ <b>¢</b> χ <b>¢</b>	৩১২৫	৫টি
<b>Ͼ</b> Χ <b>Ͼ</b> Χ <b>Ͼ</b> Χ <b>Ͼ</b> Χ	১৫৬২৫	৬টি

এবার সংখ্যাটিকে ১০ বার, ১১ বার এবং ১২ বার গুণ করে নিচের ছকে শুধু গুণাকারে লেখো।

ছক ১.৭

গুণাকার	গুন্ফল	গুণাকারে আলাদাভাবে একই সংখ্যা কতটি রয়েছে?
¢χ¢χ¢χ ¢χ¢ χ ¢χ¢χ¢χ ¢χ¢		र्गे०८
<b>ϾΧϾΧϾΧ ϾΧϾ Χ ϾΧϾΧϾΧ ϾΧϾ ΧϾ</b>		১১টি
¢χ¢χ¢χ ¢χ¢ χ ¢χ¢χ¢χ ¢χ ¢χ ¢ χ¢		১২টি

পাঠ্যবইয়ে সমাধান করে দেয়া ছক ১.৮ এর মতো নিচের ছকটি পূরণ করে ফেলো।

ছক ১.৯

তোমার নেয়া	গুণাকার	গুণাকার গুনফল গুণাকারে আলাদাভাবে		গুনফল		
সংখ্যাটি কত ছিল			একই সংখ্যা কতটি	লেখার নতুন		
৫ নাকি ৬?			রয়েছে?	উপায়		
	¢х¢	২৫	২টি	& S		
	¢х¢х¢	১২৫	৩টি	૯°		
¢	¢x¢x¢x¢	৬২৫	8টি	<b>€</b> <sup>8</sup>		
	<b>Ͼ</b> ΧϾΧϾΧ ϾΧϾ	৩১২৫	৫টি	¢ <sup>¢</sup>		
	<b>¢</b> χ¢χ¢χ ¢χ¢χ¢	১৫৬২৫	৬টি	<b>€</b> <sup>७</sup>		

এবার চিন্তা করো। তুমি তোমার নেয়া সংখ্যাটিকে ১০ বার, ১১ বার এবং ১২ বার গুণ করে ছক পূরণ করেছিলে। কাজটি করতে কষ্ট হয়েছিল তাই না? তাহলে নিচের ছকটিতে নতুন যে নিয়ম শিখলে সেটি অনুযায়ী দেখো তো লিখতে পারো কীনা?

ছক ১.১০

গুণাকার	গুনফল	গুণাকারে আলাদাভাবে একই	গুনফল লেখার
		সংখ্যা কতটি রয়েছে?	নতুন উপায়
<b>ΦΧΦΧΦΧ ΦΧΦ Χ ΦΧΦΧΦΧ ΦΧΦ</b>	৯৭৬৫৬২৫	১০টি	<b>6</b> <sub>20</sub>
¢χ¢χ¢χ ¢χ¢ χ ¢χ¢χ¢χ ¢χ¢ χ¢	8৮৮২৮ <b>১</b> ২৫	1) বি	€ <sub>22</sub>
<b>ϾΧϾΧϾΧ ϾΧϾ Χ ϾΧϾΧϾΧϾΧ</b>	২৪৪১৪০৬২৫	১২টি	€ <sub>25</sub>

ছক ১.১১ পূরণ করো।

ছক ১.১১

সংখ্যা	ঘাত	গুণাকার	সূচকীয় পদ্ধতি	গুনফল
	۵	<b>&gt;</b> 0	20 <sub>2</sub>	70
	২	\$0 X \$0	<b>٥</b> ٥٤	\$00
20	9	20 X 20 X 20	\$0°	2000
	8	20 X 20 X 20 X 20	>08	\$0000
	¢	20 X 20 X 20 X 20 X 20	<b>&gt;</b> 0¢	\$00000
	৬	20 X 20 X 20 X 20 X 20 X 20	<b>\$0</b> <sup>6</sup>	\$000000

আশা করি তোমরা এতক্ষণে সূচক সম্পর্কে একটি বিস্তারিত ধারণা পেয়ে গেছো। এবার তাহলে আমরা নিচের ছকটি পূরণ করার চেষ্টা করি।

ছক ১.১২

গুণাকার	সূচকীয় আকার	ভিত্তি	ঘাত
9x9x9x 9x9 x 9x9x9x 9x 9x 9 x 9x9	۹۶8	٩	78
8¢x8¢x 8¢x8¢x	<b>≯</b> 8 <sup>¢</sup>	\$8	œ.
<b>২x২x</b> 2x 2x2 x 2x2x2x2x2	غ <sup>ر</sup> ه	২	20
?? x ??	77 <sub>p.</sub>	77	b
২১	57,	২১	٥

চলো, আমরা আবার আমাদের সেই কাগজ ভাঁজের খেলার কথা ভাবি। তোমরা সেখান থেকে কি সূচকের কোন ধারণা করতে পারো? যদি পারো, তাহলে, ছক ১.১৩ পূরণ করো এবং পরবর্তীতে প্রতিবারে সমান ৩ ভাগ করে ভাঁজের জন্য ছক ১.১৪ এর ন্যায় নিজের খাতায় ছক অঙ্কন করে পূরণ করো।

ছক ১.১৩

ভাঁজের প্রকৃতি	ভাঁজ সংখ্যা	ঘর সংখ্যা	গুণাকার	সূচকীয় আকার
	2	২	২	۶,
প্রতিবারে সমান ২	২	8	ર x ર	રે
ভাগ করে ভাঁজ	•	b	<b>२ x २ x २</b>	રુઁ
	8	১৬	<b>২ x ২ x ২ x ২</b>	<b>ર</b> <sup>8</sup>
	¢	৩২	<b>২x২x২x২x</b>	₹ <sup>¢</sup>

কাজঃ উপরে সেই রাজার অঙ্কের যে ছকটি ছিল সেটিকে তোমার খাতায় নিচের ছকের মত সম্পূর্ণ করো।

দিন	সূচকীয় আকার	টাকার পরিমাণ
٥		7
২	۶,	২
৩	રે	8
8	રુઁ	ъ
·	<b>ર</b> <sup>8</sup>	১৬
২৯	₹ <sup>₹₩</sup>	২৬৮৪৩৫৪৫৬
೨೦	<b>২</b> <sup>২৯</sup>	৫৩৬৮৭০৯১২
৩১	২ <sup>৩০</sup>	১০৭৩৭৪১৮২৪

#### ০ ও ১ এর সূচক

প্রথমেই তোমরা তোমাদের রোল নম্বর চিন্তা করো এবং নিজের রোলের শেষ অঙ্কটি নাও। নিয়ম অনুযায়ী, তোমার রোল যদি এক অঙ্কের হয়, তাহলে সেটিই তোমার রোলের শেষ অঙ্ক বা গ্রহণযোগ্য অঙ্ক। তাহলে, নিচের ছকটি পূরণ করে ফেলো।

ছক ১.১৮

রোল	রোলের শেষ অঙ্ক	দিন	প্রাপ্ত ক্যান্ডি সংখ্যা	
		১ম দিন	Č	
		২য় দিন	¢х¢	
¢	¢	তর ।	৩য় দিন	¢х¢х¢
			8र्थ फिन	¢х¢х¢х¢
		৫ম দিন	¢х¢х¢х¢х¢	

এখন তোমরা একটি বিষয় দেখো তো। তোমাদের শ্রেণিতে যাদের রোলের শেষে ০ অথবা ১ ছিল, তারা আসলে ৫ দিন শেষে কতটি ক্যান্ডি পেয়েছে? কিংবা তাদের প্রতিদিনের প্রাপ্ত ক্যান্ডির সংখ্যা কত?

রোল	রোলের শেষ অঙ্ক	দিন	প্রাপ্ত ক্যান্ডি সংখ্যা
		১ম দিন	o
		২য় দিন	οχο
20	o	৩য় দিন	οχοχο
		৪র্থ দিন	οχοχοχο
		৫ম দিন	οχοχοχοχο

প্রদত্ত শর্ত অনুসারে আমি প্রতিদিন ০ টি করে ক্যান্তি পাব। অর্থাৎ, বলা যায় আমি ৫ দিন শেষে কোন ক্যান্তি পাব না।

রোল	রোলের শেষ অঙ্ক	দিন	প্রাপ্ত ক্যান্ডি সংখ্যা
		১ম দিন	٥
		২য় দিন	۶×۶
22	2	৩য় দিন	2×2×2
		৪র্থ দিন	2×2×2×7
		৫ম দিন	7×7×7×7×7

প্রদত্ত শর্ত অনুসারে আমি প্রতিদিন ১ টি করে ক্যান্ডি পাব। অর্থাৎ, বলা যায় আমি ৫ দিন শেষে মোট ৫ টি ক্যান্ডি পাব।

#### সূচক নিয়ে কারিকুরি

চিন্তা করো, মহাকাশযানটি ১ সেকেন্ডে 8=8 মিটার দুরত্ব অতিক্রম করে। তাহলে,  $8^2$  সেকেন্ডে কত দুরত্ব অতিক্রম করবে? ঐকিক নিয়মের ধারণা থেকে আমরা বলতে পারি,  $8^2$  সেকেন্ড সময় ব্যবধানে মহাকাশযানটির অতিক্রান্ত দুরত্ব হবে  $8^2$   $\times$  8=8  $\times$  8=8

তাহলে, দ্বিতীয় সময় ব্যবধানে মহাকাশযানটির অতিক্রান্ত দুরত্ব কত হবে ভেবে বের করতে পারবে? মহাকাশযানটি ১ সেকেন্ডে অতিক্রম করে ৪<sup>২</sup> = ৪ মিটার

অতএব,  $8^2$  সেকেন্ডে অতিক্রম করবে,  $8^2 \times 8 = 8 \times 8 \times 8 = 8^9$  মিটার

ছক ২.১

	_		
সময় ব্যাবধান	গতিবেগ	অতিক্রান্ত দূরত্বের গুণাকার (মিটার)	অতিক্রান্ত
(সেকেন্ড)	(মিটার, প্রতি		দূরত্ব (সূচকীয়
	সেকেড)		আকারে)
8,	8	$8^{2}x8 = 8x8$	8 <sup>\$</sup>
8 <sup>2</sup>	8	$8^{2}x8 = 8x8x8$	8°
8°	8	$8^{\circ} x8 = 8x8x8x8$	88
88	8	$8^8 x8 = 8x8x8x8x8$	8 <sup>¢</sup>
8 <sup>¢</sup>	8	$8^{\circ} x8 = 8x8x8x8x8x8$	8 <sup>6</sup>
8 <sup>6</sup>	8	$8^{\circ}$ x8 = 8x8x8x8x8x8x8	8 <sup>9</sup>
8°	8	$8^9 x8 = 8x8x8x8x8x8x8x8x8$	8 <sub>p.</sub>

কিন্তু, পরবর্তী দিন অতি জরুরি একটি কারণে চালককে আবার মহাকাশযানটি চালনা করতে হয়। ফলে মনিটরের ক্রটিটি থেকেই যায়। তবে, আগের দিন যেমন প্রথম দুটি সময় ব্যবধানে চালক তাঁর অতিক্রান্ত দূরত্ব দেখতে পেয়েছিলেন , এই দিন শুধু প্রথম সময় ব্যবধানে তাঁর অতিক্রান্ত দূরত্ব দেখতে পেলেন এবং বাকি কোন সময় ব্যবধানেই তাঁর অতিক্রান্ত দূরত্ব দেখতে পেলেন না। এদিন আরেকটি ভিন্নতা ছিল। আগের দিনে যেমন প্রতি সময় ব্যবধানে মহাকাশযানটির গতিবেগ একই ছিল , এদিন কিন্তু তাঁর মহাকাশযানের গতিবেগ প্রতিটি সময় ব্যবধানে ভিন্ন ছিল। সেদিনে , তাঁর রকেটের সময় ব্যবধান ও বেগ ছকে দেয়া আছে। প্রতি সময় ব্যবধানে অতিক্রান্ত দূরত্বটি নির্ণয় করে, তোমরা কী চালককে সাহায্য করতে পারবে?

ছক ২.২

সময়	গতিবেগ	অতিক্রান্ত দূরত্বের গুণাকার (মিটার)	অতিক্রান্ত
ব্যাবধান	(মিটার, প্রতি		দূরত্ব (সূচকীয়
(সেকেন্ড)	সেকেন্ড)		আকারে)
8,	8 <sup>¢</sup>	$8^{3} \times 8^{6} = (8) \times (8 \times 8 \times 8 \times 8 \times 8)$	88
8 <sup>২</sup>	8,	8 <sup>₹</sup> x8 <sup>₺</sup>	8,0
		= (8x8)x(8x8x8x8x8x8x8)	
8°	8°	$8^{\circ}x8^{\circ} = (8x8x8)x(8x8x8)$	8 6
88	8,0	8 <sub>8</sub> x8 <sub>20</sub>	8,8
		= (8x8x8x8)x(8x8x8x8x8x8x8x8x8x8)	
8 <sup>©</sup>	88	$8^{\circ} \times 8^{\circ} = (8 \times 8 \times 8 \times 8 \times 8) \times (8 \times 8 \times 8 \times 8)$	8,2
8 6	82	$8^{6} x8^{2} = (8x8x8x8x8x8)x(8x8)$	8 <sub>p.</sub>
8°	88	8 ° x8 °	8,26
		= (8x8x8x8x8x8x8x8)x(8x8x8x8x8x8x8x8x8x8)	
8 <sub>p.</sub>	8	$8^{b} x8 = (8x8x8x8x8x8x8x8)x(8)$	8%

ছক ২.৪

			•	*-			
গৃহীত	গুণ	গুণের	১ম পদের	গুণের	২য় পদের	গুণফল	গুণফলের
সংখ্যা		১ম পদ	গুণাকার	২য় পদ	গুণাকার		সূচকীয়
			কাঠামো		কাঠামো		কাঠামো
	۴ <sup>২</sup> x۴ <sup>8</sup>	& s	¢x¢	€ <sup>8</sup>	¢x¢x¢x ¢	১৫৬২৫	€ <sup>®</sup>
Œ	۵, x ه	¢,	œ	<b>€</b> <sup>8</sup>	<b>¢</b> Χ¢Χ¢Χ ¢	৩১২৫	¢°
	% x& ک	৫°	¢χ¢χ¢	¢,	œ	৬২৫	<b>€</b> <sup>8</sup>
	هج xه۶	& S	¢х¢	¢,	(°	১২৫	৫°
	& X&	¢°	¢χ¢χ¢	¢°	¢х¢х¢	১৫৬২৫	€ <sup>®</sup>

	ছক	ছক ২.৩ হতে প্ৰাপ্ত তথ্য			ছক ২.৪ হতে প্রাপ্ত তথ্য		
ক্রমিক	গুণ	গুণ করার ধাপ	গুণফল	গুণ	গুণ করার ধাপ	গুণফল	
2	%70 <sub>5</sub> ×70 <sub>8</sub>	<b>&gt;</b> 0 <sub>≤+8</sub>	<b>&gt;</b> 0°	۴ <sup>২</sup> ×۴	€ <sup>2+8</sup>	<i>و</i> <sup>6</sup>	
২	<b>ງ</b> ວຶ× <b>ງ</b> ວຶ	>0°°+°°	<b>&gt;</b> 0°	۴٫×۴ <sub>8</sub>	<b>€</b> 2+8	¢°	
•	20 <sub>8</sub> ×20 <sub>2</sub>	<b>?</b> o <sub>8+?</sub>	<b>7</b> 0¢	%%%	& <sub>a+2</sub>	<b>€</b> <sup>8</sup>	
8	20,×20,	<b>?</b> o <sub>5+?</sub>	<b>\$</b> 0	۴۶×۴۶	& <sub>≤+?</sub>	૯°	
¢	20,×20°	<b>7</b> 02+0	<b>&gt;</b> 08	۴°×۴°	¢°+૭	¢ <sup>6</sup>	

#### কাজঃ

১) সূচকের গুণের নিয়মের সাহয্যে গুণফল নির্ণয় করো। (গুণফল ০ অথবা ১ হল্, ভিত্তিতে ০ অথবা ১ থাকবে সূচকের মান সম্পর্কে যা শিখেছো সেই অনুযায়ী গুণফল লিখবে)

ক্রমিক	সূচকের গুণ	গুণফল (সূচকীয় আকারে)
۵	9 <sup>8</sup> X9 <sup>9</sup>	٩۶۶
২	o <sub>p</sub> Xo <sub>ź</sub>	0
9	7 <sub>58</sub> X7 <sub>29.</sub>	<b>&gt;</b> 85
8	25,x25,5	<b>١</b> ٤ <sup>২8</sup>
·	۹۶ <sup>২۴</sup> x۹۶ <sup>۹২</sup>	۹۶ <sub>۶۰۰</sub>
৬	۶۶ <sub>۶۶</sub> X ۶۶ <sub>۶8</sub> X ۶۶ <sub>۴</sub> X ۶۶ <sub>۶</sub>	<b>২১</b> <sup>8২</sup>

#### ২) সূচকের গুণের নিয়মের সাহায্যে খাতায় ২.২ এর অনুরূপ ছক অঙ্কন করে তা পূরণ করো।

সময় ব্যবধান (সেকেন্ডে)	গতিবেগ (মিটার, প্রতি সেকেন্ডে)	অতিক্রান্ত দূরত্বের গুণাকার (মিটার)	অতিক্রান্ত দুরত্ব (সূচকীয় আকারে- মিটারে )
¢,	Ç¢	$\mathscr{C}^{\lambda} \times \mathscr{C}^{\alpha} = (\mathscr{C}) \times (\mathscr{C} \times \mathscr{C} \times \mathscr{C} \times \mathscr{C} \times \mathscr{C}) = \mathscr{C} \times $	¢ <sup>®</sup>
۴	<b>€</b> <sub>p</sub>	$\mathcal{C}^{2} \times \mathcal{C}^{b} = (\mathcal{C} \times \mathcal{C}) \times (\mathcal{C} \times \mathcal{C} \times \mathcal{C} \times \mathcal{C} \times \mathcal{C} \times \mathcal{C} \times \mathcal{C} \times \mathcal{C})$ $= \mathcal{C} \times \mathcal$	¢,0
৫°	৫°	$\mathscr{C}^{\circ} \times \mathscr{C}^{\circ} = (\mathscr{C} \times \mathscr{C} \times \mathscr{C}) \times (\mathscr{C} \times \mathscr{C} \times \mathscr{C}) = \mathscr{C} \times \mathscr{C} \times \mathscr{C} \times \mathscr{C} \times \mathscr{C} \times \mathscr{C}$	¢*
¢8	€ <sub>20</sub>	$q^8 \times q^{50}$ $= (e \times e $	€ <sub>78</sub>
¢°	<b>€</b> <sup>8</sup>	$e^{\alpha} \times e^{\alpha} = (e \times e \times e \times e \times e) \times (e \times e \times e \times e)$ $= e \times e$	¢,
<b>€</b> <sup>७</sup>	<b>હ</b> ર	$ \varphi^{\circ} \times \varphi^{\circ} = (\varphi \times \varphi \times \varphi \times \varphi \times \varphi \times \varphi) \times (\varphi \times \varphi) \\ = \varphi \times \varphi $	<b>€</b> <sub>p</sub>
<b>€</b> <sup>9</sup>	¢,	$e^{q} \times e^{b}$ $= (e \times e \times e \times e \times e \times e \times e) \times (e \times e \times $	€ <sub>ne</sub>
€ <sub>p</sub>	Œ	$ c^{\flat} \times c = (c \times c \times c \times c \times c \times c \times c \times c) \times c $ $ = c \times c $	¢°

# ৩) হাসান দুটি সূচকীয় আকারের সংখ্যা গুণ করতে গিয়ে আটকে গিয়েছে। সেই সংখ্যা দুটি হল ৫ ২ এবং ১২২। সে সংখ্যা দুটিকে ছকের মত করে দুইবার গুণাকারে লিখলো। দেখো তো সে ঠিক লিখেছে কীনা?

যদি হাসানের করা দুটি গুণ প্রক্রিয়ার কোনটি ঠিক হয় তবে সেই প্রক্রিয়ায় তুমি ২  $^{\circ}$  এবং  $\epsilon^8$  এর গুণফল নির্ণয় করো। যদি হাসানের করা গুণ প্রক্রিয়া ভুল হয় , তবে তুমি হাসানের ভুলটি চিহ্নিত করে সঠিক গুণফল নির্ণয় করো এবং পরবর্তীতে সঠিকভাবে ২ $^{\circ}$  এবং  $\epsilon^8$  এর গুণফল নির্ণয় করো।

#### সমাধানঃ

হাসান ঠিক লিখে নাই। উপরের সূচকীয় আকারের গুণ প্রক্রিয়ায় ত্রুটি আছে।

কারন, দুইটি সূচকীয় আকারের সংখ্যার গুণের ক্ষেত্রে , সংখ্যাদ্বয়ের সূচকের যোগ এর মাধ্যমে গুণফল নির্ণয় করতে হলে সংখ্যাদ্বয়ের বেজ বা ভিত্তি একই হতে হবে।

এখানে, দুইটি সংখ্যার ভিত্তি ৫ ও ১২ একই নয়। তাহলে সূচক ২ ও ২ যোগ করা যাবে না।

#### সঠিক গুণঃ

$(e^2 \times 32^2 = (e \times 32)^2 = 60^2 = 6000$	$2^{\circ} \times 6^{8} = 2^{\circ} \times 6^{\circ} \times 6 = (2 \times 6)^{\circ} \times 6 = 20^{\circ} \times 6$
	= \$000×& = &000

#### সূচকের ভাগ-১

"ক" দলের কাছে ২  $^{20}$  = ১০২৪ টি লজেন্স আছে। কিন্তু "খ" দলের কাছে কোন লজেন্স নিই। এখন "ক" দল, "খ" দলকে লজেন্স দেবে। কিন্তু সেখানে একটি নিয়ম আছে।

নিয়মটি হল, "ক" দল, "খ" দলকে প্রতিদিন আণের দিনের অর্ধেক সংখ্যক লজেন্স দেবে। অর্থাৎ, "ক" দল কোন একদিন যে পরিমাণ লজেন্স দেবে পরেরদিন সেটিকে ২ দ্বারা ভাগ করে যে ভাগফল পাওয়া যায়, সেই সংখ্যক লজেন্স দেবে। মনে রাখতে হবে যে, শুধুমাত্র পূর্ণসংখ্যক লজেন্সই দেয়া যাবে। কখনই লজেন্সকে ভেন্সে অর্ধেক করে, কিংবা সেটিকে আবার অর্ধেক করে দেয়া যাবে না। এভাবে যতদিন লজেন্স দেয়া সম্ভব, ততদিন চলতে থাকবে।

ধরো প্রথম দিনে, "ক" দল, "খ" দলকে ২ $^{\alpha}$  সংখ্যক লজেন্স দিয়েছে। তাহলে পরেরদিন কতটি দেবে ? কিংবা তার পরেরদিন কতটি দেবে? সেই তথ্য বের করার জন্য এবার ছকটি পূরণ করো।

(যদি কোনদিন লজেন্স দেয়া সম্ভব না হয় অথবা সূচকীয় আকারে প্রকাশ করা সম্ভব না হয়, তবে সেই ঘরে ক্রস চিহ্ন দেবে)

		-111164 -1111 141 101 11 74, -61 617 164 -1
দিন	প্রদত্ত লজেন্স	প্রদত্ত লজেন্স সংখ্যার গুণাকার
	সংখ্যার সূচকীয়	
	আকার	
<b>১</b> ম	₹ <sup>®</sup>	<b>২ x ২ x ২ x ২ x</b> ২
২য়	ع <sup>8</sup>	$\frac{2\times2\times2\times2\times2}{}=2\times2\times2\times2$
		*
<b>৩</b> য়	2°	$\frac{2\times2\times2\times2}{2} = 2\times2\times2$
	5	٧
8ৰ্থ	2 <sup>3</sup>	$\frac{2\times2\times2}{2}=2\times2$
৫ম	٤٠	$\frac{2\times 2}{2}=2$
,	0	<u> </u>
৬ষ্ঠ	<b>a</b> °	$\frac{2}{2} = 2$
৭ম	×	×

এভাবে ছকের মাধ্যমে তুমি আগের দিনে প্রদত্ত লজেন্স সংখ্যা জেনে পরেরদিন প্রদত্ত লজেন্স সংখ্যা হিসাব করতে পারছো। কিন্তু, তোমার কাছে যদি সরাসরি জানতে চাওয়া হয় যে ৪র্থ দিনে কতটি লজেন্স দেয়া হয়েছে, তুমি কীভাবে বলবে? নিশ্চয় এভাবে ছকের মত করে অথবা প্রতিদিনে প্রদত্ত লজেন্সের তথ্য ব্যবহার করে।

এবার তোমরা কল্পনা করো, শুরুতে "ক" দলের কাছে লজেন্সের পরিমাণ ছিল ২<sup>১২</sup> টি। প্রথম দিন তারা "খ" দলকে ২<sup>১০</sup> সংখ্যক লজেন্স প্রদান করে। এরপর পূর্বের নিয়ম মেনেই চকলেট প্রদান থাকে যতদিন সম্ভব হয়। এখন ভাবো তো, তোমার কাছে যদি জানতে চাওয়া হয় ৮ম দিনে "খ" দল কতটি চকলেট পেয়েছে, তা নিচের ছকের সাহায্যে নির্ণয় করো?

ছক ৩.২

		ছক ৩.২
দিন	প্রদত্ত লজেন্স সংখ্যার সূচকীয় আকার	প্রদত্ত লজেন্স সংখ্যার গুণাকার
<b>১</b> ম	5,0	<b>২</b> × <b>২</b> × <b>২</b> × <b>২</b> × <b>2</b> × <b>2</b> × <b>2</b> × <b>2</b> × <b>2</b> × <b>2</b>
২য়	2 <sup>8</sup>	<u> </u>
		$= 2 \times 2 $
<b>৩</b> য়	<b>₹</b> <sup>b</sup>	<u> </u>
		\= \times
8र्थ	٤٩	<b>***</b>
		<i>= &gt; × × × × × × × × × ×</i>
৫ম	2.6	$\frac{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2}{2} = 2 \times 2$
৬ষ্ঠ	₹ <sup>®</sup>	$\frac{2\times2\times2\times2\times2\times2}{2} = 2\times2\times2\times2\times2$
৭ম	<b>2</b> <sup>8</sup>	$\frac{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2}{2} = 2 \times 2 \times 2 \times 2$
৮ম	۶°	$\frac{2\times2\times2\times2}{2} = 2\times2\times2$

ছক ৩.৪ (ছক ৩.৩ এর ক্রমিক অনুযায়ী ১০ এর বদলে তোমার নেয়া সংখ্যাকে ভিত্তি ধরে নিচের ছকে ভাগ কি হবে তা নির্ণয় করো এবং প্রয়োজনে খাতায় ছকটি সম্পূর্ণ করো)

	11-11-11-11-1	٠ ۵ .	,					
গৃহীত	ভাগ	ভাজ্য	<b>১</b> ম	ভাজক	২য়	ভাগফল কাঠামো	ভাগফল	ভাগফলের
সংখ্যা			পদের		পদের			সূচকীয়
			গুণাকার		গুণাকার			কাঠামো
			কাঠামো		কাঠামো			
	$\mathfrak{E}_8 \div \mathfrak{E}_{2}$	¢8	¢ × ¢	৫২	¢×¢	@×@×@×@		&ş
			×¢			* × ¢		
			×¢					
	$\mathfrak{E}^{\circ} \div \mathfrak{E}^{\gtrless}$	৫৩	& × &	৫২	e×e	@ × @ × @	œ	ه۶
			×¢		4 × 4	@ × @		
	0 \	0				4 × 4		
Œ	<b>%</b> ÷ <b>%</b> γ	<b>€</b> 8	6 × 6	۴۶	œ		6 × 6	৫৩
			×¢				×¢	
			× ¢					
	$\mathfrak{E}_{\varsigma}\div\mathfrak{E}_{\varsigma}$	৫২	& × &	ه۶	œ	& × &	œ	ه۶
					ď	<u> </u>		
						v .		
	¢₂ ÷ ¢₂	ه۶	Č	ه۶	œ	Č	2	_
						<u> </u>		
						•		


ছক ৩.৪.১

XY 0.0.3						
	ছক ৻	<u> ৩.৩ হতে প্ৰাপ্ত ত</u>	চথ্য	ছক ৩.৪ হতে প্ৰাপ্ত তথ্য		
ক্রমিক	ভাগ	ভাগ করার ধাপ	ভাগফল	ভাগ	ভাগ করার ধাপ	ভাগফল
۵	<b>³</b> °, <b>³</b> °, <b>³</b> °, <b>³</b> °, <b>³</b> °, <b>°</b> °,	<b>3</b> 0 <sup>8-₹</sup>	<b>3</b> 0 <sup>2</sup>	¢ <sup>8</sup> ÷¢ <sup>₹</sup>	<b>€</b> <sup>8-২</sup>	۴ <sup>২</sup>
২	<b>&gt;</b> 0°÷>0°	<b>&gt;</b> 0°->	70,	&o÷	૯ <sup>૭-২</sup>	G,
9	20 <sub>8</sub> ÷20 <sub>2</sub>	<b>7</b> 0 <sub>8-7</sub>	<b>3</b> 0°	¢ <sub>8</sub> ÷¢ <sub>γ</sub>	<b>€</b> <sub>8-γ</sub>	৫°
8	20 <sub>5</sub> ÷20 <sub>2</sub>	20 <sub>≤-2</sub>	<b>?</b> 0,	& <sub>5</sub> ÷& <sub>2</sub>	& <sub>5-2</sub>	¢,

ছক ৩.৫

ভাগ	সূত্রের সাহায্যে ভাগফলের সূচকীয় প্রক্রিয়া	ভাগফল কাঠামো	ভাগফল	সূত্রের সাহায্যে প্রাপ্ত ভাগফলের সূচকীয় কাঠামো
\$0 <sup>8</sup> ÷\$0 <sup>8</sup>	≯o <sub>8-8</sub>	20 <sub>8</sub>	۲	\$0°
ર <sup>ર</sup> ÷ર <sup>ર</sup>	<b>ર</b> <sup>ર-ર</sup>	<u>২</u> ২ ২২ ১৭	>	٤°
৩ <sup>੧</sup> ÷৩ <sup>੧</sup>	<b>૭</b> ٩-٩	<u>৩</u> ৭ ৩৭ ৭৩	۶	o°
٩°÷٩°	٩ <sup>৩-৩</sup>	৭৩	>	٩°
৬ <sup>১</sup> ÷৬ <sup>১</sup>	<i>ن</i> <sup>2-2</sup>	<del>ن</del> ى <u>س</u>	۲	<b>⊌</b> °

সূচকের ভাগ-২ একটি খন্ডকে দুটি এবং দুটি খন্ডকে চারটি খন্ডে বিভক্ত করলে অর্থাৎ ২ বার কর্তনে, ক্ষুদ্রতম একটি খন্ড পূর্ণ বৃত্তের কত অংশ।



ছক ৪.২

কৰ্তন সংখ্যা	খন্ড সংখ্যা	একটি খন্ড বৃত্তের কত অংশ (ভগ্নাংশে লিখো)
N	8	<u> </u>

এভাবে কাজটি আরও ৩ বার করার চেষ্টা করো এবং নিচের ছকে তোমার প্রাপ্ত তথ্য বসাও।

ছক ৪.৩

কৰ্তন সংখ্যা	খন্ড সংখ্যা	একটি খন্ড বৃত্তের কত অংশ (ভগ্নাংশে লিখো)
৩	৮	<u>&gt;</u>
8	১৬	<u> </u>
Č	૭૨	<u>১</u> ৩২

#### ছক 8.8

		<u>,                                      </u>
দিন	প্রদত্ত লজেন্স সংখ্যার সুচকীয় আকার	প্রদত্ত লজেন্স সংখ্যার গুণাকার
<b>১</b> ম	ع <sup>و</sup>	<b>২ x ২ x ২ x ২</b>
২য়	N <sup>8</sup>	$\frac{2\times2\times2\times2\times2}{2} = 2\times2\times2\times2$
৩য়	ν̈́	$\frac{2\times2\times2\times2}{2} = 2\times2\times2$
8র্থ	ν <sup>ν</sup>	$\frac{2\times2\times2}{2}=2\times2$
৫ম	ų,	$\frac{2\times 2}{2}=2$
৬ঈ	٩°	$\frac{2}{2} = 2$
৭ম	ź- <sub>2</sub>	<u>&gt;</u>
৮ম	<b>ર</b> -ર	$\frac{2}{3 \times 5} = \frac{2}{8}$

# গৃহীত সংখ্যা ৫ এর জন্য নিচের ছক পূরণঃ

গৃহীত সংখ্যা	ভাগ	ভাগ করার ধাপ	ভাগফল	ভাগফল কাঠামো	ভাগফল	ভাগফলের সূচকীয় এবং লব-হর কাঠামো
	e <sup>2</sup> ÷e°	૯ <sup>ર-૭</sup>	<i>د</i> -۶	€ × € × €	<u>&gt;</u>	<u>\$</u>
	&o÷&	€ <sub>0-7</sub>	<i>ه</i> -۶	3	\$	3
œ	&5÷&8	€ <sup>₹-8</sup>	<i>«</i> -²	@ × @ × @ × @	\$ @×@	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	&°÷& <sub>₹</sub>	€°-₹	<b></b> €- <sup>₹</sup>	\$ @ × @	\$ <u>«×«</u>	<u>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</u>
	& <sub>2</sub> ÷& <sub>8</sub>	€ <sub>7-8</sub>	&- <sup>©</sup>	<u> </u>	\$ @×@×@	<u>\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ </u>

# কাজঃ ১)

ক্রমিক	সূচকের ভাগ	ভাগফল	ভাগফলের সূচকীয় এবং লব-হর কাঠামো (যদি প্রয়োজন হয়)
2	<b>77</b> <sub>78</sub> ÷ <b>77</b> <sub>∂</sub>	22 <sub>78-9</sub> = 22 <sub>9</sub>	<b>27</b> <sub>d</sub>
٤	৬ <sup>৭</sup> ÷৬ <sup>৯</sup>	৬ ৭-৯ = ৬-২	<u>১</u>
9	১৭ <sup>৯</sup> ÷১৭°	24 <sub>9-0</sub> = 24 <sub>9</sub>	<u>৬</u> ২ ১৭ <sup>৯</sup>
8	۹۶ <sub>۹۶</sub> ÷ ۹۶ <sub>۴</sub>	٩٧ <sub>٩٧-٩</sub> = ٩٧ <sub>٩٥</sub>	٩ <b>১</b> <sup>৬</sup> °
Č	?%∘÷?%	?? <sub>0-9</sub> = ?? <sub>9</sub>	<u> </u>
৬	28°÷28°	28 <sub>0-0</sub> = 28 <sub>0</sub>	<b>7</b> 8°

## ২) সূচকের ভাগের ধারণা ব্যবহার করে খাতায় ছক ৩.১ এবং ছক ৪.৪ এর অনুরূপ ছক অঙ্কন করো এবং সেটি সম্পূর্ণ করো। সমাধানঃ

#### ৩.১ এর অনুরূপ ছক নিমারুপঃ

्रकरा इसरा•	1 44 10	
দিন	প্রদত্ত লজেন্স সংখ্যার সুচকীয় আকার	প্রদত্ত লজেন্স সংখ্যার গুণাকার
<b>১</b> ম	<b>૭</b> ૯	0 x 0 x 0 x 0 x 0
২য়	<b>૭</b> <sup>8</sup>	$\frac{\circ \times \circ \times \circ \times \circ}{\circ} = \circ \times \circ \times \circ \times \circ$
<b>৩</b> য়	ల	$\frac{\circ \times \circ \times \circ \times \circ}{\circ} = \circ \times \circ \times \circ$
8র্থ	৩ <sup>২</sup>	$\frac{\circ \times \circ \times \circ}{\circ} = \frac{\circ \times \circ \times \circ}{\circ}$
৫ম	هُ،	$c = \frac{c \times c}{c}$
৬ষ্ট	ల°	×
৭ম	×	×

#### 8.8 এর অনুরূপ ছক নিন্মরূপঃ

দিন	প্রদত্ত লজেন্স সংখ্যার সূচকীয় আকার	প্রদত্ত লজেন্স সংখ্যার গুণাকার
১ম	<b>9</b> °	0 x 0 x 0 x 0
২য়	•9 <sup>8</sup>	$o \times o \times$
৩য়	<sup>9</sup>	$\frac{\circ \times \circ \times \circ \times \circ}{\circ} = \circ \times \circ \times \circ$
8ર્થ	9	$\frac{\circ \times \circ \times \circ}{\circ} = \circ \times \circ$
৫ম	۵۶	$\frac{\circ \times \circ}{\circ} = \circ$
৬ঈ	o°	$\frac{9}{6} = 6$
৭ম	<i>©</i> -3	<u>&gt;</u>
৮ম	<b>૭</b> - <sup>૨</sup>	$\frac{2}{8} = \frac{2}{8}$

# ৩) আকাশ দৃটি সূচকীয় আকারের সংখ্যা ভাগ করতে গিয়ে আর ভাগ করতে পারছে না। সেই সংখ্যা দুটি হল ১৮° এবং ৬<sup>২</sup>। সে সংখ্যা দুটিকে ছকের মত করে দুইবার ভাগ করে ভাগফল নির্ণয় করলো। দেখো তো সে ঠিক লিখেছে কীন**?**

$$2p_{0} \div p_{2} = 2p_{0-5} = 2p_{2} = 2p$$

$$p_{5} \div 2p_{0} = p_{-2} = \frac{1}{2}$$

যদি আকাশের করা দুটি ভাগ প্রক্রিয়ার কোনটি ঠিক হয় তবে সেই নিয়মে তুমি ৬  $^8$  এবং  $8^2$  এর ভাগফল নির্ণয় করো। যদি আকাশের করা ভাগ প্রক্রিয়া ভুল হয় , তবে তুমি আকাশের ভুলটি চিহ্নিত করে সঠিক ভাগফল নির্ণয় করো এবং পরবর্তীতে সঠিকভাবে ৬ $^8$  এবং  $8^2$  এর ভাগফল নির্ণয় করো।

#### সমাধানঃ

আকাশ ঠিক লিখে নাই। উপরের সূচকীয় আকারের ভাগ প্রক্রিয়ায় ত্রুটি আছে।

কারন, দুটি সূচকীয় আকারের সংখ্যা ভাগ করতে গিয়ে আমরা যখন একটি সূচক থেকে অপর সূচককে বিয়োগ করে ভাগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করি তখন দুইটি সংখ্যার ভিত্তি বা বেজ একই হতে হবে। কিন্তু উপরে উল্লেক্ষিত সংখ্যা দুইটির ভিত্তি বা বেজ যথাক্রম ১৮ ও ৬ যা আলাদা।

সঠিক ভাগফল নির্ণয় পদ্ধতিঃ	৬ <sup>8</sup> এবং ৪ <sup>২</sup> এর ক্ষেত্রে ভাগফল নির্ণয়ঃ
ეგი <sup>°</sup> ÷৬ <sup>২</sup>	৬ <sup>8</sup> ÷ ৪ <sup>২</sup>
$= (\mathfrak{O} \times \mathfrak{G})^{\mathfrak{O}} \div \mathfrak{G}^{\mathfrak{D}}$	$= b^8 \div (z^2)^2$
= o°×6°÷6°	= &8 ÷ &8
= 🔊 × ७ °-२	$= (\dot{\varphi} \div \dot{\varphi})^8$
= 9°×6'	= 9 <sup>8</sup>
= ২৭×৬	= 62
= >62	

#### সূচকের সূচক

এবার প্রথমদিন সকলেই ১টি করে ক্যান্ডি পাবে। বাকি নিয়মগুলো আগের মতই রয়েছে। অর্থাৎ, দ্বিতীয় দিন একজন শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত ক্যান্ডি সংখ্যা হবে, আগের দিনে পাওয়া ক্যান্ডির সংখ্যার সাথে তার রোলের শেষ অঙ্ক গুণ করা হলে, গুণফল যা হবে সেই সংখ্যক। এভাবে বাকি তিনদনে সকলে ক্যান্ডি পাবে।

ছক ৫.১

(ছকে অবশ্যই গুণফলের সূচক আকারে প্রকাশ করতে হবে। কোন ক্ষেত্রেই তোমাদের গুণফলটিকে প্রকাশ করতে হবে না)

রোল	রোলের শেষ অঙ্ক	দিন	প্রাপ্ত ক্যান্ডি সংখ্যা
	<b>১</b> ম	> = €°	
		২য়	2×₲ = ₲²
<b>3</b> ¢	<b>3</b> ¢ ¢	৩য়	>× <b>@</b> × <b>@</b> = <b>@</b> <sup>₹</sup>
		8র্থ	>> \d > \d > \d \d \d \d \d <
		৫ম	\$×¢×¢×¢×¢ = ¢ <sup>8</sup>

যে সকল শিক্ষার্থীর রোলের শেষ অঙ্ক মিলে যায় , তাদের নিয়ে একটি দল গঠন হবে। দল গঠন হলে তোমাদের নিজেদের কাছে থাকা ক্যান্ডির গুণের কাজ করতে হবে। গুণটি কি রকম হবে ? গুণটি হবে তোমাদের কাছে থাকা প্রতিদিনের ক্যান্ডির গুণফলের সমান। যেমন ধরো, তোমাদের প্রত্যেকের কাছে ২য় দিন কতটি ক্যান্ডি ছিল সেটি গুণ করতে হবে। তাহলে এরপরে ৩য় দিন নিজেদের দলের প্রত্যেকের কাছে কতগুলো ক্যান্ডি ছিল তা গুণ করতে হবে। এভাবে নিচের ছকটি পূরণ করো। এখানে ছক পূরণের আগে একটি বিষয় ভাবো। ধরো, কোন দল ১০ টি করে ক্যান্ডি পায়। এবং সেই দলে ৫ জন আছে। তাহলে দ্বিতীয় দিন সেই দলের প্রত্যেকে ক্যান্ডি পাবে , ১০ টি করে। এবং ৩য় দিন পাবে ১০২ টি করে। এভাবে ছকটি পূরণ করো।

#### সমাধানঃ

ছক ৫.২

রোল	রোলের শেষ অংক	দিন	১ম জনের প্রাপ্ত ক্যান্ডি সংখ্যা	১ম জনের প্রাপ্ত ক্যান্ডি সংখ্যার গুণাকার	দলের সকলের প্রাপ্ত ক্যান্ডি সংখ্যার গুণাকার	সূচকীয় আকারে গুণফল
		<b>১</b> ম	2	>	¢°×¢°×¢°×¢°	<b>€</b> °
		২য়	Ø.	Č	\$\x\$\x\$\x\$\x\$\x\$\x\$\x\$	¢ <sup>¢</sup>
<b>3</b> &	Č	<b>৩</b> য়	૯ર	٥×٥	e <sup>2</sup> ×e <sup>2</sup> ×e <sup>2</sup> ×e <sup>2</sup> ×e	<b>€</b> <sub>p</sub>
		8র্থ	ૡ૾ૺ	৫×৫×৫	ึ่ง×ึง×ึง×ึง	6 <sub>20</sub>
		৫ম	¢ <sup>8</sup>	%×%×%×%	<i></i> %×¢ <sup>8</sup> ×¢ <sup>8</sup> ×¢ <sup>8</sup> ×¢ <sup>8</sup>	<i>و</i> <sup>২٥</sup>

#### দলে ৫ জন সদস্য ও প্রত্যেকে ১০ এর গুণীতক হারে ক্যান্ডি পায়,তবে ছক ৫.৩ পূরণ করো। সমাধানঃ

ছক ৫.৩

			41 4.0	
দিন	<b>১</b> ম জনের প্রাপ্ত ক্যান্ডি সংখ্যা	১ম জনের প্রাপ্ত ক্যান্ডি সংখ্যার গুণাকার	দলের সকলের প্রাপ্ত ক্যান্ডি সংখ্যার গুণাকার	সূচকের গূনের নিয়ম ব্যবহার করে, সূচকীয় আকারে গুণফল
<b>১</b> ম	<b>ွ</b>	>	20°×20°×20°×20°	= 20°
২য়	<b>&gt;</b> 0,	<b>&gt;</b> 0	20,×20,×20,×20,×20,	= 20 <sub>6</sub> 20 <sub>2+2+2+2+2</sub>
৩য়	٥٥٤	20×20	\$0 <sup>2</sup> ×\$0 <sup>2</sup> ×\$0 <sup>2</sup> ×\$0 <sup>2</sup>	= 20 <sub>20</sub>
8र्थ	<b>\$0°</b>	20×20×20	\$0°×\$0°×\$0°×\$0°	= 20 <sub>26</sub>
৫ম	<b>&gt;</b> 08	20×20×20×20	208×308×308×308×308	\$0 <sup>8+8+8+8</sup> = \$0 <sup>₹0</sup>

ছক ৫.৪

গুণ-আকার	সূচকীয় আকার
20×20×20×20	>o <sup>€</sup>
\$0 <sup>3</sup> ×\$0 <sup>3</sup> ×\$0 <sup>3</sup> ×\$0 <sup>3</sup>	$(2\circ_{\varsigma})_{\varsigma} = 2\circ_{2\circ}$
\$8\x\8\x\8\x\8\x\8\x\8	<b>≯</b> 8 <sup>9</sup>
\$8°×\$8°×\$8°×\$8°×\$8°×\$8°	$(28_{\circ})_{\circ} = 28_{52}$

এবার তাহলে নিচের ছক দুটিকে পুনরায় তুমি এতক্ষণ যা শিখেছো সেই অনুযায়ী পূরণ করে ফেলো।

#### সমাধানঃ

ছক ৫.৫

দিন	১ম জনের	১ম জনের প্রাপ্ত	দলের সকলের প্রাপ্ত ক্যান্ডি	সূচকের সূচকীয়
	প্রাপ্ত ক্যান্ডি	ক্যান্ডি সংখ্যার	সংখ্যার গুণাকার	আকারে গুণফল
	সংখ্যা	গুণাকার		
১ম	<b>&gt;</b> 0°	2	?×?×?×?	( <b>?</b> 0°) <sup>¢</sup>
২য়	<b>7</b> 0,	20	20,×20,×20,×20,×20,	( <b>?</b> o <sub>2</sub> ) <sub>&amp;</sub>
৩য়	<b>\</b> 0 <sup>2</sup>	20×20	20,×20,×20,×20,×20,	(≯o <sub>ź</sub> ) <sub>¢</sub>
8র্থ	<b>ွ</b>	20×20×20	>0°×>0°×>0°×>0°	( <b>&gt;</b> 0°)°
৫ম	\$0 <sup>8</sup>	20×20×20×20	208×208×208×208	(\$0 <sup>8</sup> ) <sup>¢</sup>

#### সমাধানঃ

ছক ৫.৬

রোল	রোলের শেষ অংক	দিন	১ম জনের প্রাপ্ত ক্যান্ডি সংখ্যা	১ম জনের প্রাপ্ত ক্যান্ডি সংখ্যার গুণাকার	দলের সকলের প্রাপ্ত ক্যান্ডি সংখ্যার গুণাকার	সূচকীয় আকারে গুণফল
		<b>১</b> ম	2	۵	¢°×¢°×¢°×¢°	$(\mathfrak{E}_{\circ})_{\mathfrak{E}}$
		২য়	Č	Č	\$\x\@\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	$(\mathfrak{G}_{\flat})_{\mathfrak{G}}$
<b>3</b> &	œ	<b>৩</b> য়	৫ <sup>২</sup>	٥×٥	¢ <sup>2</sup> ×¢ <sup>2</sup> ×¢ <sup>2</sup> ×¢ <sup>2</sup>	(¢²)¢
) d	u u	8র্থ	૯°	٥×٥×٥	๕๖×๕๖×๕๖	(°°)°
		৫ম	¢ <sup>8</sup>	0×0×0×0	¢ <sup>8</sup> ×¢ <sup>8</sup> ×¢ <sup>8</sup> ×¢ <sup>8</sup> ×¢ <sup>8</sup>	(¢8)¢

৫.২ ও ৫.৫ ছক হতে প্রাপ্ত তথ্যের সাহায্যে ৫.৭ ছকটি পূরণ করো।

#### সমাধানঃ

ছক ৫.৭

	71	
দলের সকলের প্রাপ্ত ক্যান্ডি	সূচকের সূচকীয় আকারে	সূচকের গুণের নিয়ম ব্যবহার করে,
সংখ্যার গুণাকার	গুণফল	সূচকীয় আকারে গুণফল
?×?×?×?	(>o°) <sup>«</sup>	20° = 2
20×20×20×20×20	(?o <sub>?</sub> ) <sub>«</sub>	<b>&gt;</b> 0¢
>0,×>0,×>0,×>0,×>0,	(≯o <sub>≤</sub> ) <sub>«</sub>	<b>70</b> <sub>20</sub>
\$0°×\$0°×\$0 <sup>8</sup> ×\$0 <sup>8</sup>	(\$0°)°	>0 <sub>&gt;6</sub>
\$08×\$08×\$08×\$08	(\$0 <sub>8</sub> ) <sub>¢</sub>	>0 <sub>≤0</sub>

ছক ৫.৩ ও ৫.৬ এর প্রাপ্ত তথ্যের সাহায্যে ৫.৮ ছকটি পূরন করো।

#### সমাধানঃ

ছক ৫.৮

দলের সকলের প্রাপ্ত ক্যান্ডি সংখ্যার	সূচকের সূচকীয় আকারে	সূচকের গুণের নিয়ম ব্যবহার করে,
গুণাকার	গুণফল	সূচকীয় আকারে গুণফল
?×?×?×?	(¢°)°	& <sub>○</sub> = ?
6,×6,×6,×6,×6,	(¢ <sub>2</sub> ) <sub>¢</sub>	¢°
&x&x&x&x	$(\mathfrak{E}_{\zeta})_{\mathfrak{E}}$	€ <sub>20</sub>
°%×°%×°%×°°%	(& <sub>o</sub> ) <sub>e</sub>	€ <sub>20</sub>
¢8×¢8×¢8×¢8×¢8	(¢ <sup>8</sup> ) <sup>¢</sup>	€ <sub>≤0</sub>

তাহলে কি দেখা যাচ্ছে?

১০ $^2$  × ১০ $^2$  × ১০ $^2$  × ১০ $^2$  × ১০ $^2$  কে লেখা যায় (১০ $^2$ ) $^4$  হিসেবে এবং (১০ $^2$ ) $^4$  কে লেখা যায়, ১০ $^2$ × $^4$  =১০ $^5$ 0 হিসেবে ।

#### কাজঃ

#### ১) নিচের সূচকগুলো নির্ণয় করো


ক্রমিক	সূচকের গুণাকার	সূচকের সূচক আকার
۵	P <sub>78</sub> ×P <sub>78</sub> ×P <sub>78</sub> ×P <sub>78</sub>	(P. 78)8
২	๒ <sup>៶</sup> x๒ <sup>1</sup> x	(%),,
•	78°×78°	(\$8°)>
8	?P <sub>9</sub> ×?P <sub>9</sub> ×?P <sub>9</sub> ×?P <sub>9</sub>	(?p,)8
œ	≥6 <sub>8</sub>	(≼% <sub>8</sub> ),

#### ২) নিচের সূচকের সংক্ষিপ্ত আকার গুলো নির্ণয় করো।

ক্রমিক	সূচকের সুচকাকার	সূচকের সংক্ষিপ্ত আকার
۵	(80 <sub>d</sub> ),,	$(80_{\rm d})_{22} = 80_{\rm d} \times_{22} = 80_{\rm dd}$
২	(৯৯ <sup>২</sup> ) <sup>8</sup>	$(\delta \delta^2)^8 = \delta \delta^2 x^8 = \delta \delta^b$
9	( <b>૭</b> 8 <sup>৩</sup> ) <sup>٩</sup>	$(08^\circ)^9 = 08^{\circ \times 9} = 08^{5}$
8	(\$ <sup>-\$</sup> )°	$(\lambda^{-2})^{\circ} = \lambda^{-2} \times^{\circ} = \lambda^{-6}$
Č	(%),	(70°), = 70°×; = 70°

#### একক কাজঃ

ছবির বাবা তার ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ডের পিন ভুলে গেছেন। তিনি কোনভাবেই সেটি মনে করতে পারছেন না। আবার তার পিন মনে করাটা খুব জরুরি কারণ তিনি ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জিনিস কেনাকাটা করবেন। তখন ছবির মনে পড়লো নিচের চিত্রের সাহায্যে পিনটি খুঁজে পাওয়া সম্ভব। তোমরা কি ছবিকে সাহায্য করতে পারবে?



#### সমাধানঃ

প্রদত্ত হিসাবগুলি সমাধান করে চিত্রে প্রদত্ত রঙ্গিন ক্ষেত্রগুলোর মান বের করে সরল অংশে মানগুলো বসিয়ে পাই,

১ + ৫১২ × 
$$\frac{5}{b}$$
 +  $\frac{5}{68}$  - ৮১ + ৪০৯৬

= ১ + ৬৪ +  $\frac{5}{68}$  - ৮১ + ৪০৯৬

= ৪০৮০ +  $\frac{5}{68}$ 
= ৪০৮০ + ০. ১৫৬২৫

অর্থাৎ, পিনটি হবে ৪০৮০ [কারন পিন ভগ্নাংশ হবে না]

### আরও একটু সূচক

সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পৌঁছাতে সময় লাগে ৮ মিনিট ১৮ সেকেন্ড। সূর্য থেকে পৃথিবীর দুরত্ব ১৫,০০,০০,০০০ কিলোমিটার।

কাজঃ পৃথিবী থেকে সূর্যের দুরত্ব কথায় কত হবে চিন্তা করে বলো তো।

উত্তরঃ পনের কোটি কিলোমিটার।

আলোর গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে ৩০,০০,০০০,০০০ মিটার

কাজঃ আলোর বেগ কথায় কত হবে চিন্তা করে বলো তো।

উত্তরঃ ত্রিশ কোটি মিটার।

### আলোর গতিবেগকে সূচকের মাধ্যমে প্রকাশ করো। পাঠ্যবইয়ের ছক ৭.১ অনুসারে। সমাধানঃ

ছক ৭.১

সংখ্যা (আলোর বেগ)	১০ দ্বারা ভাগ করে প্রকা <b>শ</b>	সূচক আকারে প্রকাশ
	<b>७</b> ०००००००× <b>১</b> ०	0000000×30
	0000000×30×30	<b>೨</b> 000000× <b>১</b> 0 <sup>२</sup>
	000000×30×30×30	<b>७</b> ०००००×১०°
<b>9</b> 0000000	90000×30×30×30	<b>೨</b> 0000× <b>১</b> 0 <sup>8</sup>
90000000	0000×30×30×30×30	<b>೨</b> 000× <b>১</b> 0 <sup>©</sup>
	000×30×30×30×30×30	<b>೨</b> 00× <b>১</b> 0 <sup>७</sup>
	@0×70×70×70×70×70×70	oo×30°
	0×30×30×30×30×30×30×30	@×?op

#### পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বকে সূচকের মাধ্যমে ছক ৭.১ এর ন্যায় প্রকাশ করো। সমাধানঃ

ছক ৭.২

সংখ্যা (পৃথিবী থেকে সূর্যের দুরত্ব)	(পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব) ১০ দ্বারা ভাগ করে প্রকাশ	
<b>\$</b> ₹0000000	\$¢000000×\$0	\$\$000000\\$0
	\$&00000×\$0×\$0	<b>%</b> 000000× <b>3</b> 0 <sup>2</sup>
	\$60000×\$0×\$0	\$60000×\$0°
	\$\$000×\$0×\$0×\$0	\$\$\$000\$\$
	2600×20×20×20×20	%00×20°€
	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	<b>\$</b> %0× <b>\$</b> 0
	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	<b>3</b> €× <b>3</b> 0 <sup>9</sup>

এখানে একটি বিষয় দেখা যাচ্ছে যে ছকের শেষ সারিতে ১৫ এর সাথে ১০ সূচক আকারে রয়েছে। এখন পূর্বের ছকটির কথা চিন্তা করে দেখো তো, আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত ভাগ করে ১০ এর চেয়ে ছোট, কিন্তু ১ এর চেয়ে বড় কোন সংখ্যা না পেয়েছি, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রক্রিয়াটি চালিয়ে গিয়েছি। এক্ষেত্রেও চাইলে আমরা সেটি করতে পারি। সেটি নিচের বাক্সে সম্পন্ন করো।

\$\$0000000	= <b>\%</b> \ <b>\</b> 0°	= ১.৫×১০ <sup>৮</sup> [এখানে, ১০ < ১.৫ < ১]
-------------	---------------------------	---

তাহলে কি দেখতে পেলে? সূর্য থেকে পৃথিবীর দুরত্বকে ছোট আকারে প্রকাশ করলে কি পাওয়া যায়?
আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত প্রায় সবক্ষেত্রেই ১০ এর সূচকের ব্যাপারটি দেখেছি। এখন আমরা সেগুলো নিয়ে একটু চিন্তা করব।
আমরা সরাসরি সংখ্যা দিয়ে একটি উদাহরণ দেখার চেষ্টা করি। ১ হাজার। এর গাণিতিক রূপ হল ১০০০।

সংখ্যা	১০ দারা ভাগ করে প্রকাশ	সূচক আকারে প্রকাশ
2000	200 × 20	200 × 20,
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	20 × 20 × 20	>0 × >0≤
	2 × 20 × 20 × 20	2 × 20°

এবার দেখো, আমরা ১০০০ = ১ × ১০° পেয়েছি। একটু ভাবো তো কোন সংখ্যার সাথে ১ গুণাকারে থাকলে সেটির কি কোন পরিবর্তন হয়? হয় না তো। সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারব ১০০০ = ১ × ১০°।

#### ২. বাস্তবের বিভিন্ন বড় সংখ্যাকে সূচকের মাধ্যমে ছোট আকারে প্রকাশ করা যায়। প্রকাশের উপায় নিয়ে। ় উপরের দটি উদাহরণ থেকে তোমার অনুধাবন নিচের প্রশ্নের উত্তরের সাহায্যে প্রকাশ করো।

- (ক) ভাগের কাজটি কখন শেষ করব?
- (খ) ভাগ করে সূচক বিহীন যে সংখ্যাটি পাবো, তা কি ১ এর চেয়ে ছোট হতে পারবে? কিংবা ১ এর সমান হতে পারবে?
- (গ) ভাগ করে সূচক বিহীন যে সংখ্যাটি পাবো, তা কি ১০ এর সমান কিংবা বড় হতে পারবে?

- (ক) সূচক বিহীন সংখ্যাটি ১ এর সমান অথবা ১ এর চেয়ে বড় কিন্তু ১০ এর চেয়ে ছোট হলেই ভাগের কাজটি শেষ করব।
- (খ) ভাগ করে সূচক বিহীন যে সংখ্যাটি পাবো তা ১ এর চেয়ে ছোট হতে পারবে না কিন্তু ১ এর সমান হতে পারবে।
- (গ) ভাগ করে সূচক বিহীন যে সংখ্যাটি পাবো তা ১০ এর সমান বা ১০ এর চেয়ে বড় হতে পারবে না।

#### কাজ: পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরতু প্রায় ৩,৮৪,০০০ কিলোমিটার। এই দূরতুকে গাণিতিক ভাষায় ছোট আকারে প্রকাশ করো। সমাধানঃ


#### **9**68000

- = 25800×702
- = 0b80×30<sup>3</sup>
- =0b8×30°
- = 0b.8×308
- = 0.68×30°

অতএব, ৩,৮৪,০০০ কিলোমিটার এর গাণিতিক ভাষায় ছোট আকার হলোঃ ৩.৮৪×১০<sup>৫</sup> কিলমিটার।

#### একক কাজঃ

১) তোমরা নিশ্চয় কোভিড-১৯ মহামারী সম্পর্কে অবগত আছো। মারাত্মক ছোঁয়াচে এই মহামারীর কারণে পুরো পৃথিবী একটা বড় সময় স্থবির হয়ে ছিল। আমরা সেই মহামারী নিয়ে একটি গণনা করার চেষ্টা করব। ধরো , একটি বাড়িতে ৩ জন লোক আছে। তারা প্রত্যেকেই কোভিড আক্রান্ত হয়েছে। এখন হিসাব করে দেখা গেল , তাঁরা ৩ জন প্রত্যেকেই ১ দিনে আলাদা-আলাদাভাবে ন্যুন্তম ৩ জনকে আক্রান্ত করতে সক্ষম। আবার তাঁদের দ্বারা আক্রান্ত প্রত্যেকে আবার এক দিনে আলাদা-আলাদাভাবে ন্যুনতম ৩ জন করে ব্যাক্তিকে আক্রান্ত করতে সক্ষম।



আক্রান্ত ব্যাক্তি থাকতে পারবে? ছক অনুযায়ী পূরণ করার চেষ্টা করো। এই ধারায় ১১তম ও ১৪তম দিন শেষে সর্বনিন্ম কতজন আক্রান্ত রোগী থাকা সম্ভব?

#### সমাধানঃ

সূচকের ধারনার সাহায্যে প্রদত্ত শর্তানুসারে ৫ দিনে কোভিড আক্রান্তের একটি ছক নিম্নে প্রস্তুত করিঃ

দিন	আক্রান্ত রোগীর সংখ্যার গুণাকার	আক্রান্ত রোগীর সংখ্যার সূচকীয় আকার
<b>১</b> ম	৩	ه,
২য়	৩×৩	৩২
<b>৩</b> য়	೨×೨×೨	లి
8র্থ	৩×৩×৩×৩	<b>ీ</b>
৫ম	**********	o <sup>⊄</sup>

অতএব, ৫ম দিনে কোভিড আক্রান্ত লোক থাকবে ৩<sup>৫</sup> জন।

এবং, এই ধারায় ১১তম ও ১৪তম দিন শেষে সর্বনিন্ম আক্রান্ত রোগী থাকবে যথাক্রমে ৩<sup>১১</sup> জন ও ৩<sup>১৪</sup> জন।

#### ২) খালি ঘরগুলো সঠিকভাবে পূরণ করঃ

#### সমাধানঃ

সূচকের গুণ	গুণফল	সূচকের ভাগ	ভাগফল	সূচকের সূচকাকার	সূচকের সংক্ষিপ্ত আকার
۶ <sub>¢</sub> ×۶ <sub>۶</sub>	P. <sub>78</sub>	৯ <sup>৫৮</sup> ÷৯ <sup>৩৭</sup>	ક્ર <sup>ર</sup> ે	( <i>&gt;</i> %),	<b>ン</b> テ <sub>≤8</sub>
78 <sub>p</sub> ×78 <sub>78</sub>	<b>78</b> <sub>55</sub>	?? <sub>?≤</sub> ÷?? <sub>8</sub>	<b>77</b> <sub>₽</sub>	( <b>ર</b> હ <sup>ર</sup> ) <sup>હ</sup>	২৬ <sup>১২</sup>
6,28×6,26	<i>و</i> ځه	8°°€÷8°	8 <sup>28</sup>	(a <sub>8</sub> ),,	<b>૭</b> <sup>88</sup>
۶۹ <sup>۶</sup> ۰×۶۹ <sup>۴</sup>	<b>&gt;</b> 9%	¢5 <sub>ρ</sub> ÷¢5 <sub>ρ</sub>	۴٤°	(¢ <sup>8</sup> )-¢	<b>ℰ</b> - <sup>২</sup> 0
72×72-69	7P.p.p.	8૧ <sup>২১</sup> ÷8૧ <sup>ર૯</sup>	89 <sup>-°</sup>	( <b>\%</b> - <sup>9</sup> )- <sup>2</sup>	<b>7</b> & <sub>78</sub>
		ეგ <sub>ჯი</sub> ÷ეგ <sub>გმ</sub>	<b>3</b> 9 <sup>-69</sup>		

৩) ১০ হাজার, ১ লক্ষ, ১০ লক্ষ, ১ কোটি এবং ১০ কোটি সংখ্যাগুলোকে গাণিতিক ভাষায় ছোট আকারে প্রকাশ করো। দেখো তো মূল সংখ্যায় ১ এর ডানে মোট কতটি শূণ্য রয়েছে। এবার সংখ্যাটিকে ছোট আকারে প্রকাশের পর , যে সূচকীয় সংখ্যাটি পাও, তার সাথে পূর্বের প্রাপ্ত শুণ্যের সংখ্যার মাঝে কোন সম্পর্ক পাওয়া যায় কী?

#### সমাধানঃ

১০ হাজার

= 20000

= 2000×20,

= 200×20<sup>2</sup>

= 20×20°

 $= 2 \times 20^8$ 

একইভাবে পাই,

১ লক্ষ = ১০০০০০ = ১×১০<sup>৫</sup>

১০ লক্ষ = ১০০০০০০ = ১×১০<sup>৬</sup>

১ কোটি = ১০০০০০০০ = ১×১০<sup>৭</sup>

১০ কোটি = ১০০০০০০০ = ১×১০<sup>৮</sup>

এখানে, মূল সংখ্যায় ১ এর ডানে যতগুলো শূন্য আছ তার মান সংখ্যাটিকে ছোট আকারে প্রকাশের পর যে সূচকীয় সংখ্যাটি পাই সেখানে ১০ এর সূচকের মান এর সমান। এটাই নির্ণেয় সম্পর্ক।

উক্ত সম্পর্ককে ছক আকারে দেখানো হলোঃ

মূল সংখ্যা	সূচকীয় আকার	মূল সংখ্যায় ১ এর ডানে শূণ্য সংখ্যা	সূচকীয় সংখ্যায় ১০ এর সূচকের মান
\$0,000	2×20 <sub>8</sub>	8	8
\$,00,000	2×20 <sub>€</sub>	¢	Ĉ
\$0,00,000	2×20 <sub>e</sub>	৬	৬
\$,00,00,000	2×20°	٩	٩
\$0,00,00,000	2×20 <sub>p</sub> .	ъ	b.