

# Berechnung der Gravitationskonstanten aus SI-Konstanten

Die Fundamentale Fraktalgeometrische Feldtheorie (FFGFT, früher T0-Theorie): Emergenz von  $G$  aus der Raumzeit-Geometrie

Vollständige Herleitung ohne experimentelle Eingangswerte

## Zusammenfassung

Diese Arbeit präsentiert die neue Erkenntnis, dass die Gravitationskonstante  $G$  keine fundamentale Naturkonstante ist, sondern aus anderen SI-Konstanten berechenbar:  $G = \ell_P^2 \times c^3 / \hbar$ . Die zentrale Innovation der Fundamentale Fraktalgeometrische Feldtheorie (FFGFT, früher T0-Theorie) besteht darin, dass  $G$  aus der Geometrie der Raumzeit emergiert, analog zu  $c = 1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$  in der Elektrodynamik. Alle SI-Konstanten erweisen sich als verschiedene Projektionen einer zugrunde liegenden dimensionslosen Geometrie. Die perfekte Übereinstimmung zwischen berechneten und experimentellen Werten ( $G = 6.674 \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)$ ) bestätigt diese fundamentale Neuinterpretation der Gravitation.

## Inhaltsverzeichnis

### 1 Die fundamentale T0-Erkenntnis

#### Neuer Paradigmenwechsel

**Aus T0-Sicht sind ALLE SI-Konstanten nur Ümrechnungsfaktoren"!**

- In natürlichen Einheiten:  $G = 1$ ,  $c = 1$ ,  $\hbar = 1$  (exakt)
- SI-Werte sind nur verschiedene Beschreibungen derselben Geometrie
- Die wahre Physik ist dimensionslos und geometrisch

**Analog zu:**  $c = 1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$  (elektromagnetische Struktur)

**Jetzt auch:**  $G = f(\hbar, c, \ell_P)$  (geometrische Struktur)

## 2 Die fundamentale Formel

### G aus SI-Konstanten

Gravitationskonstante als emergente Größe:

$$G = \frac{\ell_P^2 \times c^3}{\hbar} \quad (1)$$

Wobei alle Konstanten in SI-Einheiten:

- $\ell_P = 1.616 \times 10^{-35}$  m (Planck-Länge)
- $c = 2.998 \times 10^8$  m/s (Lichtgeschwindigkeit)
- $\hbar = 1.055 \times 10^{-34}$  J·s (reduzierte Planck-Konstante)

## 3 Schritt-für-Schritt Berechnung

### 3.1 Gegebene SI-Konstanten

Konstante	Wert	Einheit
Planck-Länge $\ell_P$	$1.616 \times 10^{-35}$	m
Lichtgeschwindigkeit $c$	$2.998 \times 10^8$	m/s
Reduzierte Planck-Konstante $\hbar$	$1.055 \times 10^{-34}$	J·s

Tabelle 1: SI-Konstanten (aus T0-Sicht: Umrechnungsfaktoren)

### 3.2 Numerische Berechnung

Schritt 1: Planck-Länge im Quadrat

$$\ell_P^2 = (1.616 \times 10^{-35})^2 \quad (2)$$

$$= 2.611 \times 10^{-70} \text{ m}^2 \quad (3)$$

Schritt 2: Lichtgeschwindigkeit hoch drei

$$c^3 = (2.998 \times 10^8)^3 \quad (4)$$

$$= 2.694 \times 10^{25} \text{ m}^3/\text{s}^3 \quad (5)$$

Schritt 3: Zähler berechnen

$$\ell_P^2 \times c^3 = 2.611 \times 10^{-70} \times 2.694 \times 10^{25} \quad (6)$$

$$= 7.035 \times 10^{-45} \text{ m}^5/\text{s}^3 \quad (7)$$

Schritt 4: Division durch  $\hbar$

$$G = \frac{7.035 \times 10^{-45}}{1.055 \times 10^{-34}} \quad (8)$$

$$= 6.674 \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2) \quad (9)$$

## 4 Ergebnis und Verifikation

### Perfekte Übereinstimmung

Berechnetes Ergebnis:

$$G_{\text{berechnet}} = 6.674 \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2) \quad (10)$$

Experimenteller Wert (CODATA):

$$G_{\text{experimentell}} = 6.67430 \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2) \quad (11)$$

Übereinstimmung: Exakt bis auf Rundungsfehler!

## 5 Dimensionsanalyse

### 5.1 Überprüfung der Einheiten

$$\left[ \frac{\ell_P^2 \times c^3}{\hbar} \right] = \frac{[\text{m}]^2 \times [\text{m}/\text{s}]^3}{[\text{J} \cdot \text{s}]} \quad (12)$$

$$= \frac{[\text{m}]^2 \times [\text{m}]^3/[\text{s}]^3}{[\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2] \times [\text{s}]} \quad (13)$$

$$= \frac{[\text{m}]^5/[\text{s}]^3}{[\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}]} \quad (14)$$

$$= \frac{[\text{m}]^5/[\text{s}]^3 \times [\text{s}]}{[\text{kg} \cdot \text{m}^2]} \quad (15)$$

$$= \frac{[\text{m}]^5/[\text{s}]^2}{[\text{kg} \cdot \text{m}^2]} \quad (16)$$

$$= \frac{[\text{m}]^3}{[\text{kg} \cdot \text{s}^2]} \quad \checkmark \quad (17)$$

Die Dimensionen stimmen perfekt mit der Gravitationskonstanten überein!

## 6 Physikalische Interpretation

### 6.1 Was bedeutet diese Formel?

- $\ell_P^2$ : Planck-Fläche - fundamentale geometrische Skala

- $c^3$ : Dritte Potenz der Lichtgeschwindigkeit - relativistische Dynamik
- $\hbar$ : Quantencharakter - kleinste Wirkung

**G** entsteht aus der Kombination von Geometrie, Relativität und Quantenmechanik!

## 6.2 Analogie zur elektromagnetischen Konstante

# 7 Die neue T0-Erkenntnis

### Fundamentaler Paradigmenwechsel

#### Traditionelle Physik:

- $G$  ist eine fundamentale Naturkonstante
- Muss experimentell bestimmt werden
- Ungeklärter Ursprung

#### T0-Physik:

- $G$  ist emergent aus anderen Konstanten
- Berechenbar aus ersten Prinzipien
- Ursprung: Geometrie der Raumzeit

**Alle SI-Konstanten sind nur verschiedene Projektionen der zugrunde liegenden dimensionslosen T0-Geometrie!**

# 8 Praktische Konsequenzen

## 8.1 Für Experimente

- **G-Messungen** dienen zur Verifikation der Fundamentale Fraktalgeometrische Feldtheorie (FFGFT, früher T0-Theorie)
- **Präzisionsexperimente** können Abweichungen von der T0-Vorhersage suchen
- **Neue Kalibrationen** werden möglich

## 8.2 Für die theoretische Physik

- **Vereinheitlichung:** Eine Konstante weniger im Standardmodell
- **Quantengravitation:** Natürliche Verbindung zwischen  $\hbar$  und  $G$
- **Kosmologie:** Neue Einsichten in die Struktur der Raumzeit

## 9 Zusammenfassung

### Die revolutionäre Erkenntnis

**Gravitationskonstante ist nicht fundamental:**

$$G = \frac{\ell_P^2 \times c^3}{\hbar} = 6.674 \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2) \quad (18)$$

**Kernaussagen:**

- G folgt aus der Geometrie der Raumzeit
- Alle SI-Konstanten sind Umrechnungsfaktoren
- Die wahre Physik ist dimensionslos (T0)
- Perfekte experimentelle Übereinstimmung

**Das ist der Durchbruch der Fundamentale Fraktalgeometrische Feldtheorie (FFGFT, früher T0-Theorie)!**