===

$\xi = \lambda_h^2 v^2/(16\pi^3 m_h^2) 16\pi^3 = (4\pi)\cdot(4\pi^2) = S^2 \cdot 2S^{3}4$
$r_\tau = 25/9$
$a_e = 2\pi^2/(f\cdot k)$
$= k^2 = (n_1^2+n_2^2+n_3^2)/L^2$
$T^4 1{,}329 \pm 0{,}025 [0{,}690,\ 2{,}406] \sigma = 0{,}050{,}710 \pm 0{,}008$
$0{,}001\,\%$
$\hbar\xi L_0 = \xi\cdot\ell_P$
$\xi_0\xi$
L_0
$\xi\sim 1\,\%$

$\mathcal{R}$

$m = r\,\xi^p\,v$
$K = R_{pe}/(4/3)^7$
$1{,}314$
$(1-275/4\cdot\xi)\Delta = 0{,}0002\,\%$

$\xi/(2\pi)10^{-5}N$
$\xi/\xi = m_e c^2/(\frac{16}{9}\ 2\cdot) \approx 414\,684$

Λz
H_0
$\xi\xi^{1/4}K_M$

$\xi R_H/\ell_P$
$3\cdot\{1,6,14,26\}\{1,6,14,26\}$
$C_\ell = \sum_n N|j_\ell(kD_A)|^2\{3,18,42,78\}$
$^4 1:2:3:4:5 k^2 = 3n^2$
H_0
$\xi 4/33 2^2 = 4$

$\xi^N X = \xi^N\xi$
$R_H R_H = c/H_0 \approx 3\,R_H\Lambda$

$\xi = 4/30000$
$1/\varphi r \mapsto r(1-\xi)0$
$H_0 R_H$ $H_0 R_H \leftrightarrow R_H 41/4 R_H/L_0 = 6{,}49\times 10^{64}\sim 10^{60}$
$1+z = e^{\xi x}\lambda$
$vm = r\xi^p v E_0 = 7{,}398\alpha 3{,}521\times 10^{-2} 2{,}843\times 10^{-5} G m_\mu/m_e = 206{,}768$
$\Lambda\Delta v = c\,\dot z\,\Delta t/(1+z) + 6\,z{=}0.5 z_0 = 1.92{-}14\,z{=}4{-}20\,z{=}5\sigma\sim 2$
$m_\mu/m_e\xi H_0 R_H$
$K = 1-100\xi$
$S^1_m \to \mathbb{R}_t\tilde{T}\cdot m = 1T$

$C_3 < A_5 35 T^7 = T^4\times T^3 7 = 4+3 \supset$
$\varphi 5\varphi^2 = \varphi + 1\backslash$
$\approx 21\times$

$D6{+}D6{+}D6{+}$

M_τ/M_B

$L_0\xi$
T_0
$L_0 L_0 = \xi\,\ell_P = \frac{4}{30000}\cdot 1.616\times 10^{-35} = \boxed{2.155\times 10^{-39}}$
ξH_0
$N_0 N_0 \approx 38.6 N_g = g\, N_0 100/e100/\varphi^2 39$
$m_\tau/m_e = (m_\tau/m_\mu)(m_\mu/m_e)K^{p_3} = K^{p_1}K^{p_2}p_3 = p_1 + p_2$
$n = 3$ $\tilde{T}\cdot m = 1T^4 Z_3$
ξ
$G = \xi^2/(4m)T^4/Z_3$
v
$2\pi\xi/(2\pi)$
ξ
$\pi^2/2m_\mu(\pi^2/2)/m_\mu = 46.7050.07\,\%$
ξ $\xi 1/1000$
$122^{-12} = 2.44\times 10^{-4} 810\,\% 300$

ξ
$16\pi^3$

$D_f = 2.973n \in [98.3, 102.0] D = 2.973n = 100.12$
$H_0\Lambda$ $\Lambda\Lambda^* := 1/R_H^2 = (\pi/2)^2\xi^{20}/\bar{\lambda}_e^2 = 5.218\times 10^{-53-2}$
a_0 $\partial^4 = \emptyset \tau_c = 2\pi/H_0 = 91.9|\hbar H_0$
T_0

E_0
$H_0 41/4$

ξ σ

α_s
$SU(3)_c$
$M_Z\xi$

$\xi\xi$

$\hat{F}\xi = \lambda(\hat{F}_{D_4})$
$\Delta m_{32}^2 {+}16.0\,\% \Delta m^2 = 120\, m_\nu^2 GF(27)^* 1.0\,\%$
$nn(L) = L/(\sqrt{2}\ell_P) {=}\, 2\pi\ell_P/\ 2$
$m_T = M/\xi {=}\ \xi\cdot\lambda_C(M)$
$L_0 = \xi^1 \ell_P m_T \sim 1/\xi$
$\lambda m_T = \lambda/\xi$
$\xi/\ell g_T m_T L_0$
$S(M) = 2\pi = n$
$I/I = {}_2\, 3M\mathbb{Z}_3$
$K{=}0{\to}p^* D_4$
${}_{R_m}(\mathbb{R}_t)L^2(S_m^1)L^2(\mathbb{R}_t)C^1C^2$
$V = N_1^+ N_2^+ N_3^+ N_1^- N_2^- N_3^- = -64\cdot P_{N1}P_{N2}P_{N3}\mathbb{Z}_3\mathbb{C}V^2 \equiv -V\ \ (\ 3)$
$P_{P1}P_{P2}P_{P3}|\langle_V|_{Pp}\rangle| = 0VT_k^3 = \xi$
$\tilde{T}\cdot m\ S_m^1 \to \mathbb{R}_t L^2(S_m^1) \cong {}_{R_m}(\mathbb{R}_t)mtKR_m\xi_{n+1} = \xi_n(1 - 100\,\xi_n)$
$\tilde{T}\cdot m = 1K = 74/75$
$\psi(t)|\psi(t)|^2\tilde{T}\tilde{T}\cdot m = 1\tilde{T}_i\tilde{T}_i \neq \tilde{T}_j$
$\mathbb{Z}_3\mathbb{C}\ a + bia, b\in\{-1,0,+1\}\{0,1,2\}{+}1+1 = -1{=}\ \{0,+1,-1\}\Delta w$
$\{+1,-1\}\{1,2\}\{0,+1,-1\}\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$

$\xi = 4/30000 (r_\mu/r_e)^2/\xi = |(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |(27)| = 43200 (n_{\theta,g}, n_{\phi,g})(3^n)$
$n_{\theta,g} = n_{\theta,g-1} + n_{\phi,g-1}$
$1/\alpha = 3700/27 = 137.037\, m_e \cdot m_\mu = 54 = |(3)^*| \cdot |(27)|^{\,2}\, |(27)| \xi v m_e$
$r_i p_i \alpha E_0 L^2 \tilde{T} \cdot m = 1$

Δm^2_{32}+16.0 %
$\alpha_s(M_Z)$
$m\alpha(M_Z)\xi$

$41/410^{123} R_H \to \ell_1 \kappa = \Lambda R_H^2$
$\{1, 6, 14, 26\}|n|^2$=30
C_ℓ
Ω
$d_s = 1.86$≈ 2
H_0
$M = m_P$
$\xi\iota \subset$
D_4
$\hat{F} L_0 = \xi \cdot \ell_P \hat{F} \mathcal{D}(\hat{F}) = \mathcal{H} \hat{F} = \hat{F}^\dagger \mathbb{Z}_3(k, -k)(0, 0)\mathbb{Z}_3 \chi \xi = \lambda(\hat{F}_{D_4})$

$\Delta m^2_{32} \xi^{9/5} 8.717 \times 10^{-8} 1.059 \times 10^{-7} m_{\nu_i} = m_e \xi^{p_i} p_i \in \{9/4,\, 2,\, 9/5\} m_{\nu_3} = 54.11 \Delta m^2_{32} = 2.846 \times 10^{-3}$+16.0 %$\sum m_\nu = 64.17 m_{\nu_1} m_{\nu_2} \Delta m^2_{21}$+8.3 %$KF_7$+12.9 %$F_5 F_7 p_3 = 1.808$10.45 %9/5 Δm^2_{32}

n=$M = m_P/\sqrt{2} E(L) = \hbar c/L n(L) = L/(\sqrt{2}\,\ell_P) 6.4097 L = 2\pi \ell_P/\ 2 = 9.0647\,\ell_P n 4.6 \times 10^{29}$10 % (6)$n = 6.41$=$r_s$(6)

$m_T m_T = \lambda/\xi$≈ 5.220$m_T = M/\xi \hbar/(m_T c) = \xi \cdot \lambda_C(M) E = \hbar c/L M = m_e m_e/\xi = 3.83 O(1)\,\pi\xi\pi^2 \sqrt{\alpha/K} R_f 5.220 3.78 \times 10^{-17} M = m_P m_T = m_P/\xi = 7500\, m_P 2.155 \times 10^{-39}$= L_0

$m_T = M/\xi E = \hbar c/L T^4$

$L_0 = \xi \cdot \ell_P L_0 = \xi \cdot \ell_P \xi g^\ell_T = \xi m_\ell m_T = M/\xi^1 \lambda_C \sim 1/m$∼ $\xi^1 m_T \sim \xi^{-n} L_0 = \xi^n \ell_P m_T L_0 M = m_P$ $\lambda = 1$

$\lambda m_T = \lambda/\xi \lambda \lambda m_T \xi \lambda_h \approx 0.129 \lambda_h \lambda_h 7.75 \cdot L_0 L_0 \lambda = M m_P$

$-\frac{1}{2} m_T^2 (\partial m)^2 m_T = \xi/\ell m = 1/\ell \xi/\ell = \xi \cdot m g^\ell_T = \xi m_\ell m_T = M/\xi - \frac{1}{2} m_T^2 (\Delta m)^2 (\partial m)^2 \Delta m$ $M_0 = \xi m_P/2 L_0 r_s = 2GM/c^2 \ell_P = G m_P/c^2 r_s(x\, m_P/2) = x\,\ell_P x \xi L_0 M_0 \xi$

$S(M) = 2\pi = n r_s(M) = \sqrt{2}\,\ell_P = S(M) = 4\pi \cdot 2\ell_P^2/(4\ell_P^2) = 2\pi\, 2\pi/\ 2 = 9.0647 = n 9.065$

$I/I = {}_2\,3 M_2\,3\mathbb{Z}_3$

$$\frac{I}{I} = {}_2\,3 \approx 1.585 \quad M > M$$

$T^4/\mathbb{Z}_3 N = S(M) - 2\pi\, I = N \cdot {}_2\,3$

$\xi = (4/3) \cdot 10^{-4}$
$\delta\delta = \left(2\sqrt{2} \cdot \sqrt{\xi}/3\right) 0.0109\, 1.20 \left(2\sqrt{2}/3\right) = 1.231\,\sqrt{\xi}$
$\theta_{13}\theta_{13} = \left(\xi^{1/3}\right) 2.93° 8.57° 1/300 = 25\xi 8.59° 1/300$
$|V_{us}| 0.2124 0.2245 25.4\,\% f$

$T^4\mathbb{R}^3 K > 0 K < 0 \int K\, dA = 0 \chi = 0 \mathbb{R}^4/\mathbb{Z}^4 \delta_{ij} \mathbb{Z}^4 \Gamma^k_{ij} = 0 K = 0 \Gamma = 0 \pi C^2 \mathbb{R}^3$
$\hat{F} \mathbb{Z}_3 (k, -k) \Rightarrow (0,0) \|\hat{F}\| \leq \sum_n \xi^n = \xi/(1-\xi) N \to \infty \mathcal{D}(\hat{F}) = \mathcal{H}$
$S^1_m \to \mathbb{R}_t p : \mathbb{R} \to S^1 \Phi = p^* : L^2(S^1_m) \to {}_{R_m}(\mathbb{R}_t)(\Phi f)(t) = f(t \;\; R_m) \mathbb{R} \to S^1{}_{R_m} L^2(\mathbb{R}_t) \leftrightarrow == \leftrightarrow$ $n/R_m(1) \leftrightarrow \Phi \to$
$D_4 5 \nmid |(D_4)| = 1152 E_8 5 \mid |(E_8)|$

$\Phi = p^* \Phi f R_m \int_{\mathbb{R}} |\Phi f|^2\, dt = \infty f \neq 0 \Phi f L^2(\mathbb{R}_t)_{R_m}(\mathbb{R}_t) L^2 L^2(S^1_m) \{e_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$

$$L^2(S^1_m) \;\cong\; {}_{R_m}(\mathbb{R}_t) \quad , \qquad\qquad L^2(S^1_m) \;\cong\; L^2(\mathbb{R}_t).$$

$\langle e_{n_1}, e_{n_2} \rangle = R_m\, \delta_{n_1 n_2}$
$\to$
$C^1 C^2 \mathbb{R}^3 C^1 C^2 T^4 \mathbb{R}^3$