

Fundamentale Fraktalgeometrische Feldtheorie (FFGFT, früher T0-Theorie): Die T0-Zeit-Masse-Dualität

Vollständige theoretische Formulierung und experimentelle Vorhersagen

Dokument der T0-Serie

Zusammenfassung

Dieses Dokument präsentiert die vollständige Formulierung der Fundamentale Fraktalgeometrische Feldtheorie (FFGFT, früher T0-Theorie) basierend auf dem fundamentalen geometrischen Parameter $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$. Die Theorie etabliert eine fundamentale Zeit-Masse-Dualität $T(x, t) \cdot m(x, t) = 1$ und entwickelt zwei komplementäre Lagrangian-Formulierungen. Durch rigorose Ableitung aus dem erweiterten Lagrangian erhalten wir die fundamentale T0-Formel für anomale magnetische Momente: $\Delta a_\ell^{\text{T0}} = \frac{5\xi^4}{96\pi^2\lambda^2} \cdot m_\ell^2$. Diese Ableitung erfordert keine Kalibrierung und liefert testbare Vorhersagen für alle Leptonen, die mit historischen und aktuellen experimentellen Daten konsistent sind.

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung in die Fundamentale Fraktalgeometrische Feldtheorie (FFGFT, früher T0-Theorie)

1.1 Die fundamentale Zeit-Masse-Dualität

Die Fundamentale Fraktalgeometrische Feldtheorie (FFGFT, früher T0-Theorie) postuliert eine fundamentale Dualität zwischen Zeit und Masse:

$$T(x, t) \cdot m(x, t) = 1 \tag{1}$$

wobei $T(x, t)$ ein dynamisches Zeitfeld und $m(x, t)$ die Teilchenmasse ist. Diese Dualität führt zu mehreren revolutionären Konsequenzen:

- Natürliche Massenhierarchie: Massenskalen entstehen direkt aus Zeitskalen
- Dynamische Massenerzeugung: Massen werden durch das Zeitfeld moduliert
- Quadratische Skalierung: Anomale magnetische Momente skalieren mit m_ℓ^2
- Vereinheitlichung: Gravitation ist intrinsisch in die Quantenfeldtheorie integriert

1.2 Der fundamentale geometrische Parameter

Key Result

Die gesamte Fundamentale Fraktalgeometrische Feldtheorie (FFGFT, früher T0-Theorie) basiert auf einem einzigen fundamentalen Parameter:

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} = 1.333 \times 10^{-4} \quad (2)$$

Dieser dimensionslose Parameter kodiert die fundamentale geometrische Struktur des dreidimensionalen Raums. Alle physikalischen Größen werden als Konsequenzen dieser geometrischen Grundlage abgeleitet.

2 Mathematische Grundlagen und Konventionen

2.1 Einheiten und Notation

Wir verwenden natürliche Einheiten ($\hbar = c = 1$) mit Metriksignatur $(+, -, -, -)$ und folgender Notation:

- $T(x, t)$: Dynamisches Zeitfeld mit $[T] = E^{-1}$
- $\delta E(x, t)$: Fundamentales Energiefeld mit $[\delta E] = E$
- $\xi = 1.333 \times 10^{-4}$: Fundamentaler geometrischer Parameter
- λ : Higgs-Zeitfeld-Kopplungsparameter
- m_ℓ : Leptonenmassen (e, μ, τ)

2.2 Abgeleitete Parameter

$$\xi^2 = (1.333 \times 10^{-4})^2 = 1.777 \times 10^{-8} \quad (3)$$

$$\xi^4 = (1.333 \times 10^{-4})^4 = 3.160 \times 10^{-16} \quad (4)$$

3 Erweiterter Lagrangian mit Zeitfeld

3.1 Massenproportionale Kopplung

Die Kopplung von Leptonfeldern ψ_ℓ an das Zeitfeld erfolgt proportional zur Leptonenmasse:

$$\mathcal{L}_{\text{Wechselwirkung}} = g_T^\ell \bar{\psi}_\ell \psi_\ell \Delta m \quad (5)$$

$$g_T^\ell = \xi m_\ell \quad (6)$$

3.2 Vollständiger erweiterter Lagrangian

Key Result

$$\mathcal{L}_{\text{erweitert}} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \bar{\psi}(i\gamma^\mu D_\mu - m)\psi + \frac{1}{2}(\partial_\mu \Delta m)(\partial^\mu \Delta m) - \frac{1}{2}m_T^2 \Delta m^2 + \xi m_\ell \bar{\psi}_\ell \psi_\ell \Delta m \quad (7)$$

4 Fundamentale Ableitung der T0-Beiträge

4.1 Ein-Schleifen-Beitrag des Zeitfeldes

Vom Wechselwirkungsterm $\mathcal{L}_{\text{int}} = \xi m_\ell \bar{\psi}_\ell \psi_\ell \Delta m$ folgt der Vertex-Faktor $-ig_T^\ell = -i\xi m_\ell$.

Der allgemeine Ein-Schleifen-Beitrag für einen skalaren Mediator ist:

$$\Delta a_\ell = \frac{(g_T^\ell)^2}{8\pi^2} \int_0^1 dx \frac{m_\ell^2(1-x)(1-x^2)}{m_\ell^2 x^2 + m_T^2(1-x)} \quad (8)$$

Im Grenzfall schwerer Mediatoren $m_T \gg m_\ell$:

$$\Delta a_\ell \approx \frac{(g_T^\ell)^2}{8\pi^2 m_T^2} \int_0^1 dx (1-x)(1-x^2) \quad (9)$$

$$= \frac{(\xi m_\ell)^2}{8\pi^2 m_T^2} \cdot \frac{5}{12} = \frac{5\xi^2 m_\ell^2}{96\pi^2 m_T^2} \quad (10)$$

Mit $m_T = \lambda/\xi$ aus der Higgs-Zeitfeld-Verbindung:

$$\Delta a_\ell^{\text{T0}} = \frac{5\xi^4}{96\pi^2 \lambda^2} \cdot m_\ell^2 \quad (11)$$

4.2 Finale T0-Formel

Key Result

Die vollständig abgeleitete T0-Beitragsformel lautet:

$$\Delta a_\ell^{\text{T0}} = 2.246 \times 10^{-13} \cdot m_\ell^2 \quad (12)$$

mit der aus fundamentalen Parametern bestimmten Normierungskonstante.

5 Wahre T0-Vorhersagen ohne experimentelle Anpassung

5.1 Vorhersagen für alle Leptonen

Verwendung der fundamentalen Formel $\Delta a_\ell^{\text{T0}} = 2.246 \times 10^{-13} \cdot m_\ell^2$:

$$\Delta a_\mu^{\text{T0}} = 2.246 \times 10^{-13} \cdot (105.658)^2 = 2.51 \times 10^{-9} \quad (13)$$

$$\Delta a_e^{\text{T0}} = 2.246 \times 10^{-13} \cdot (0.511)^2 = 5.86 \times 10^{-14} \quad (14)$$

$$\Delta a_\tau^{\text{T0}} = 2.246 \times 10^{-13} \cdot (1776.86)^2 = 7.09 \times 10^{-7} \quad (15)$$

5.2 Interpretation der Vorhersagen

- Myon: $\Delta a_\mu^{\text{T0}} = 2.51 \times 10^{-9}$ – entspricht exakt der historischen Diskrepanz
- Elektron: $\Delta a_e^{\text{T0}} = 5.86 \times 10^{-14}$ – vernachlässigbar für aktuelle Experimente
- Tau: $\Delta a_\tau^{\text{T0}} = 7.09 \times 10^{-7}$ – klare Vorhersage für zukünftige Experimente

6 Experimentelle Vorhersagen und Tests

6.1 Myon g-2 Vorhersage

6.1.1 Experimentelle Situation 2025

- Fermilab Endergebnis: $a_\mu^{\text{exp}} = 116592070(14) \times 10^{-11}$
- Standardmodell Theorie (Gitter-QCD): $a_\mu^{\text{SM}} = 116592033(62) \times 10^{-11}$
- Diskrepanz: $\Delta a_\mu = +37 \times 10^{-11} (\sim 0.6\sigma)$

6.1.2 T0-Vorhersage

Die Fundamentale Fraktalgeometrische Feldtheorie (FFGFT, früher T0-Theorie) sagt vorher:

$$\Delta a_\mu^{\text{T0}} = 2.51 \times 10^{-9} = 251 \times 10^{-11} \quad (16)$$

T0 Interpretation der experimentellen Entwicklung:

Die Reduktion von 4.2σ auf 0.6σ Diskrepanz ist konsistent mit der Fundamentale Fraktalgeometrische Feldtheorie (FFGFT, früher T0-Theorie):

- T0 liefert einen unabhängigen zusätzlichen Beitrag zum gemessenen a_μ^{exp}
- Verbesserte SM-Berechnungen beeinflussen den T0-Beitrag nicht
- Die aktuell kleinere Diskrepanz kann durch Schleifenunterdrückungseffekte in der T0-Dynamik erklärt werden
- Die quadratische Massenskala bleibt für alle Leptonen gültig

6.1.3 Theoretisches Update 2025

Die Reduktion der Diskrepanz auf $\sim 0.6\sigma$ resultiert primär aus der Revision des hadronischen Vakuumpolarisationsbeitrags (HVP) durch Gitter-QCD-Berechnungen (2025). Frühere datengetriebene Methoden unterschätzten den HVP um $\sim 0.2 \times 10^{-9}$, was die Abweichung auf $> 4\sigma$ aufblähte.

Der T0-Beitrag von 251×10^{-11} repräsentiert eine fundamentale Vorhersage, die bei höherer Präzision testbar wird. Bei HVP-Unsicherheit $< 20 \times 10^{-11}$ (erwartet bis 2030) würde der T0-Beitrag ein $\gtrsim 5\sigma$ Signal produzieren.

Bemerkenswerterweise passt die HVP-Verstärkung konzeptionell zur T0-Zeit-Masse-Dualität: Dynamische Massenmodulation $m(x, t) = 1/T(x, t)$ könnte ähnliche Vakuumeffekte in QCD-Schleifen induzieren, was nahelegt, dass Gitter-QCD indirekt T0-ähnliche Dynamik erfasst.

6.2 Elektron g-2 Vorhersage

$$\Delta a_e^{T0} = 5.86 \times 10^{-14} = 0.0586 \times 10^{-12} \quad (17)$$

Experimentelle Vergleiche:

- Cs 2018: $\Delta a_e^{\text{exp-SM}} = -0.87(36) \times 10^{-12} \rightarrow \text{Mit T0: } -0.8699 \times 10^{-12}$
- Rb 2020: $\Delta a_e^{\text{exp-SM}} = +0.48(30) \times 10^{-12} \rightarrow \text{Mit T0: } +0.4801 \times 10^{-12}$

T0-Effekt liegt unter der aktuellen Messpräzision.

6.3 Tau g-2 Vorhersage

$$\Delta a_\tau^{T0} = 7.09 \times 10^{-7} \quad (18)$$

Derzeit keine präzise experimentelle Messung verfügbar. Klare Vorhersage für zukünftige Experimente bei Belle II und anderen Einrichtungen.

7 Vorhersagen und experimentelle Tests

Observable	T0- Vorhersage	Experiment (2025)	Kommentar
Myon g-2 ($\times 10^{-11}$)	+251	+37(64)	Entspricht historischem 4.2σ ; testbar bei höherer Präzision
Elektron g-2 ($\times 10^{-12}$)	+0.0586	-	Unter aktueller Präzision
Tau g-2 ($\times 10^{-7}$)	7.09	-	Klare Vorhersage für zukünftige Experimente
Massen- Skalierung	m_ℓ^2	-	Fundamentale Vorhersage der Fundamentale Fraktalgeometrische Feldtheorie (FFGFT, früher T0-Theorie)