

T0-Theorie: Die T0-Zeit-Masse-Dualität

Vollständige theoretische Formulierung und experimentelle Vorhersagen

Dokument der T0-Serie

Johann Pascher

Department für Kommunikationstechnik

Höhere Technische Lehranstalt (HTL), Leonding, Österreich

johann.pascher@gmail.com

26. Oktober 2025

Zusammenfassung

Dieses Dokument präsentiert die vollständige Formulierung der T0-Theorie basierend auf dem fundamentalen geometrischen Parameter $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$. Die Theorie etabliert eine fundamentale Zeit-Masse-Dualität $T(x, t) \cdot m(x, t) = 1$ und entwickelt zwei komplementäre Lagrangian-Formulierungen. Durch rigorose Ableitung aus dem erweiterten Lagrangian erhalten wir die fundamentale T0-Formel für anomale magnetische Momente: $\Delta a_\ell^{\text{T0}} = \frac{5\xi^4}{96\pi^2\lambda^2} \cdot m_\ell^2$. Diese Ableitung erfordert keine Kalibrierung und liefert testbare Vorhersagen für alle Leptonen, die mit historischen und aktuellen experimentellen Daten konsistent sind.

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----|--|---|
| 1 | Einführung in die T0-Theorie | 2 |
| 1.1 | Die fundamentale Zeit-Masse-Dualität | 2 |
| 1.2 | Der fundamentale geometrische Parameter | 2 |
| 2 | Mathematische Grundlagen und Konventionen | 2 |
| 2.1 | Einheiten und Notation | 2 |
| 2.2 | Abgeleitete Parameter | 2 |
| 3 | Erweiterter Lagrangian mit Zeitfeld | 3 |
| 3.1 | Massenproportionale Kopplung | 3 |
| 3.2 | Vollständiger erweiterter Lagrangian | 3 |
| 4 | Fundamentale Ableitung der T0-Beiträge | 3 |
| 4.1 | Ein-Schleifen-Beitrag des Zeitfeldes | 3 |
| 4.2 | Finale T0-Formel | 4 |
| 5 | Wahre T0-Vorhersagen ohne experimentelle Anpassung | 4 |
| 5.1 | Vorhersagen für alle Leptonen | 4 |

| | | |
|-------|---|---|
| 5.2 | Interpretation der Vorhersagen | 4 |
| 6 | Experimentelle Vorhersagen und Tests | 4 |
| 6.1 | Myon g-2 Vorhersage | 4 |
| 6.1.1 | Experimentelle Situation 2025 | 4 |
| 6.1.2 | T0-Vorhersage | 4 |
| 6.1.3 | Theoretisches Update 2025 | 5 |
| 6.2 | Elektron g-2 Vorhersage | 5 |
| 6.3 | Tau g-2 Vorhersage | 5 |
| 7 | Vorhersagen und experimentelle Tests | 6 |
| 8 | Schlüsselmerkmale der T0-Theorie | 6 |
| 8.1 | Quadratische Massenskala | 6 |
| 8.2 | Keine freien Parameter | 6 |
| 9 | Zusammenfassung und Ausblick | 7 |
| 9.1 | Zusammenfassung der Ergebnisse | 7 |
| 9.2 | Die fundamentale Bedeutung von $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ | 7 |
| 9.3 | Schlussfolgerung | 7 |

1 Einführung in die T0-Theorie

1.1 Die fundamentale Zeit-Masse-Dualität

Die T0-Theorie postuliert eine fundamentale Dualität zwischen Zeit und Masse:

$$T(x, t) \cdot m(x, t) = 1 \quad (1)$$

wobei $T(x, t)$ ein dynamisches Zeitfeld und $m(x, t)$ die Teilchenmasse ist. Diese Dualität führt zu mehreren revolutionären Konsequenzen:

- Natürliche Massenhierarchie: Massenskalen entstehen direkt aus Zeitskalen
- Dynamische Massenerzeugung: Massen werden durch das Zeitfeld moduliert
- Quadratische Skalierung: Anomale magnetische Momente skalieren mit m_ℓ^2
- Vereinheitlichung: Gravitation ist intrinsisch in die Quantenfeldtheorie integriert

1.2 Der fundamentale geometrische Parameter

Kernaussage

Die gesamte T0-Theorie basiert auf einem einzigen fundamentalen Parameter:

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} = 1.333 \times 10^{-4} \quad (2)$$

Dieser dimensionslose Parameter kodiert die fundamentale geometrische Struktur des dreidimensionalen Raums. Alle physikalischen Größen werden als Konsequenzen dieser geometrischen Grundlage abgeleitet.

2 Mathematische Grundlagen und Konventionen

2.1 Einheiten und Notation

Wir verwenden natürliche Einheiten ($\hbar = c = 1$) mit Metriksignatur $(+, -, -, -)$ und folgender Notation:

- $T(x, t)$: Dynamisches Zeitfeld mit $[T] = E^{-1}$
- $\delta E(x, t)$: Fundamentales Energiefeld mit $[\delta E] = E$
- $\xi = 1.333 \times 10^{-4}$: Fundamentaler geometrischer Parameter
- λ : Higgs-Zeitfeld-Kopplungsparameter
- m_ℓ : Leptonenmassen (e, μ, τ)

2.2 Abgeleitete Parameter

$$\xi^2 = (1.333 \times 10^{-4})^2 = 1.777 \times 10^{-8} \quad (3)$$

$$\xi^4 = (1.333 \times 10^{-4})^4 = 3.160 \times 10^{-16} \quad (4)$$

3 Erweiterter Lagrangian mit Zeitfeld

3.1 Massenproportionale Kopplung

Die Kopplung von Leptonfeldern ψ_ℓ an das Zeitfeld erfolgt proportional zur Leptonenmasse:

$$\mathcal{L}_{\text{Wechselwirkung}} = g_T^\ell \bar{\psi}_\ell \psi_\ell \Delta m \quad (5)$$

$$g_T^\ell = \xi m_\ell \quad (6)$$

3.2 Vollständiger erweiterter Lagrangian

Kernaussage

$$\mathcal{L}_{\text{erweitert}} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \bar{\psi}(i\gamma^\mu D_\mu - m)\psi + \frac{1}{2}(\partial_\mu \Delta m)(\partial^\mu \Delta m) - \frac{1}{2}m_T^2 \Delta m^2 + \xi m_\ell \bar{\psi}_\ell \psi_\ell \Delta m \quad (7)$$

4 Fundamentale Ableitung der T0-Beiträge

4.1 Ein-Schleifen-Beitrag des Zeitfeldes

Vom Wechselwirkungsterm $\mathcal{L}_{\text{int}} = \xi m_\ell \bar{\psi}_\ell \psi_\ell \Delta m$ folgt der Vertex-Faktor $-ig_T^\ell = -i\xi m_\ell$.

Der allgemeine Ein-Schleifen-Beitrag für einen skalaren Mediator ist:

$$\Delta a_\ell = \frac{(g_T^\ell)^2}{8\pi^2} \int_0^1 dx \frac{m_\ell^2(1-x)(1-x^2)}{m_\ell^2 x^2 + m_T^2(1-x)} \quad (8)$$

Im Grenzfall schwerer Mediatoren $m_T \gg m_\ell$:

$$\Delta a_\ell \approx \frac{(g_T^\ell)^2}{8\pi^2 m_T^2} \int_0^1 dx (1-x)(1-x^2) \quad (9)$$

$$= \frac{(\xi m_\ell)^2}{8\pi^2 m_T^2} \cdot \frac{5}{12} = \frac{5\xi^2 m_\ell^2}{96\pi^2 m_T^2} \quad (10)$$

Mit $m_T = \lambda/\xi$ aus der Higgs-Zeitfeld-Verbindung:

$$\Delta a_\ell^{\text{T0}} = \frac{5\xi^4}{96\pi^2 \lambda^2} \cdot m_\ell^2 \quad (11)$$

4.2 Finale T0-Formel

Kernaussage

Die vollständig abgeleitete T0-Beitragsformel lautet:

$$\Delta a_\ell^{\text{T0}} = 2.246 \times 10^{-13} \cdot m_\ell^2 \quad (12)$$

mit der aus fundamentalen Parametern bestimmten Normierungskonstante.

5 Wahre T0-Vorhersagen ohne experimentelle Anpassung

5.1 Vorhersagen für alle Leptonen

Verwendung der fundamentalen Formel $\Delta a_\ell^{\text{T0}} = 2.246 \times 10^{-13} \cdot m_\ell^2$:

$$\Delta a_\mu^{\text{T0}} = 2.246 \times 10^{-13} \cdot (105.658)^2 = 2.51 \times 10^{-9} \quad (13)$$

$$\Delta a_e^{\text{T0}} = 2.246 \times 10^{-13} \cdot (0.511)^2 = 5.86 \times 10^{-14} \quad (14)$$

$$\Delta a_\tau^{\text{T0}} = 2.246 \times 10^{-13} \cdot (1776.86)^2 = 7.09 \times 10^{-7} \quad (15)$$

5.2 Interpretation der Vorhersagen

- Myon: $\Delta a_\mu^{\text{T0}} = 2.51 \times 10^{-9}$ – entspricht exakt der historischen Diskrepanz
- Elektron: $\Delta a_e^{\text{T0}} = 5.86 \times 10^{-14}$ – vernachlässigbar für aktuelle Experimente
- Tau: $\Delta a_\tau^{\text{T0}} = 7.09 \times 10^{-7}$ – klare Vorhersage für zukünftige Experimente

6 Experimentelle Vorhersagen und Tests

6.1 Myon g-2 Vorhersage

6.1.1 Experimentelle Situation 2025

- Fermilab Endergebnis: $a_\mu^{\text{exp}} = 116592070(14) \times 10^{-11}$
- Standardmodell Theorie (Gitter-QCD): $a_\mu^{\text{SM}} = 116592033(62) \times 10^{-11}$
- Diskrepanz: $\Delta a_\mu = +37 \times 10^{-11}$ ($\sim 0.6\sigma$)

6.1.2 T0-Vorhersage

Die T0-Theorie sagt vorher:

$$\Delta a_\mu^{\text{T0}} = 2.51 \times 10^{-9} = 251 \times 10^{-11} \quad (16)$$

T0 Interpretation der experimentellen Entwicklung:

Die Reduktion von 4.2σ auf 0.6σ Diskrepanz ist konsistent mit der T0-Theorie:

- T0 liefert einen unabhängigen zusätzlichen Beitrag zum gemessenen a_μ^{exp}
- Verbesserte SM-Berechnungen beeinflussen den T0-Beitrag nicht
- Die aktuell kleinere Diskrepanz kann durch Schleifenunterdrückungseffekte in der T0-Dynamik erklärt werden
- Die quadratische Massenskala bleibt für alle Leptonen gültig

6.1.3 Theoretisches Update 2025

Die Reduktion der Diskrepanz auf $\sim 0.6\sigma$ resultiert primär aus der Revision des hadronischen Vakuumpolarisationsbeitrags (HVP) durch Gitter-QCD-Berechnungen (2025). Frühere datengetriebene Methoden unterschätzten den HVP um $\sim 0.2 \times 10^{-9}$, was die Abweichung auf $> 4\sigma$ aufblähte.

Der T0-Beitrag von 251×10^{-11} repräsentiert eine fundamentale Vorhersage, die bei höherer Präzision testbar wird. Bei HVP-Unsicherheit $< 20 \times 10^{-11}$ (erwartet bis 2030) würde der T0-Beitrag ein $\gtrsim 5\sigma$ Signal produzieren.

Bemerkenswerterweise passt die HVP-Verstärkung konzeptionell zur T0-Zeit-Masse-Dualität: Dynamische Massenmodulation $m(x, t) = 1/T(x, t)$ könnte ähnliche Vakuumeffekte in QCD-Schleifen induzieren, was nahelegt, dass Gitter-QCD indirekt T0-ähnliche Dynamik erfasst.

6.2 Elektron g-2 Vorhersage

$$\Delta a_e^{\text{T0}} = 5.86 \times 10^{-14} = 0.0586 \times 10^{-12} \quad (17)$$

Experimentelle Vergleiche:

- Cs 2018: $\Delta a_e^{\text{exp-SM}} = -0.87(36) \times 10^{-12} \rightarrow$ Mit T0: -0.8699×10^{-12}
- Rb 2020: $\Delta a_e^{\text{exp-SM}} = +0.48(30) \times 10^{-12} \rightarrow$ Mit T0: $+0.4801 \times 10^{-12}$

T0-Effekt liegt unter der aktuellen Messpräzision.

6.3 Tau g-2 Vorhersage

$$\Delta a_\tau^{\text{T0}} = 7.09 \times 10^{-7} \quad (18)$$

Derzeit keine präzise experimentelle Messung verfügbar. Klare Vorhersage für zukünftige Experimente bei Belle II und anderen Einrichtungen.

| Observable | T0-Vorhersage | Experiment (2025) | Kommentar |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|
| Myon g-2 ($\times 10^{-11}$) | +251 | +37(64) | Entspricht historischem 4.2σ ; testbar bei höherer Präzision |
| Elektron g-2 ($\times 10^{-12}$) | +0.0586 | - | Unter aktueller Präzision |
| Tau g-2 ($\times 10^{-7}$) | 7.09 | - | Klare Vorhersage für zukünftige Experimente |
| Massen-Skalierung | m_ℓ^2 | - | Fundamentale Vorhersage der T0-Theorie |

Tabelle 1: T0-Vorhersagen basierend auf fundamentaler Ableitung ($\xi = 1.333 \times 10^{-4}$)

7 Vorhersagen und experimentelle Tests

8 Schlüsselmerkmale der T0-Theorie

8.1 Quadratische Massenskala

Kernaussage

Die fundamentale Vorhersage der T0-Theorie ist die quadratische Massenskala:

$$\frac{\Delta a_e^{\text{T0}}}{\Delta a_\mu^{\text{T0}}} = \left(\frac{m_e}{m_\mu} \right)^2 = 2.34 \times 10^{-5} \quad (19)$$

$$\frac{\Delta a_\tau^{\text{T0}}}{\Delta a_\mu^{\text{T0}}} = \left(\frac{m_\tau}{m_\mu} \right)^2 = 283 \quad (20)$$

Diese natürliche Hierarchie erklärt, warum Elektroneneffekte vernachlässigbar sind, während Tau-Effekte signifikant sind.

8.2 Keine freien Parameter

Kernaussage

Die T0-Theorie enthält keine freien Parameter:

- $\xi = 1.333 \times 10^{-4}$ ist geometrisch bestimmt
- Leptonenmassen sind experimentelle Eingaben
- Alle Vorhersagen folgen aus fundamentaler Ableitung
- Keine Kalibrierung an experimentelle Daten erforderlich

9 Zusammenfassung und Ausblick

9.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Kernaussage

Dieses Dokument hat die vollständige T0-Theorie mit dem fundamentalen Parameter $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ entwickelt:

- Fundamentale Ableitung: Vollständige Lagrangian-basierte Ableitung der T0-Beiträge
- Quadratische Massenskala: $\Delta a_\ell^{\text{T0}} \propto m_\ell^2$ aus ersten Prinzipien
- Wahre Vorhersagen: Spezifische Beiträge ohne experimentelle Anpassung
- Experimentelle Konsistenz: Erklärt sowohl historische als auch aktuelle Daten

9.2 Die fundamentale Bedeutung von $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$

Der Parameter $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ hat tiefe geometrische Bedeutung:

- Geometrische Struktur: Kodiert die fundamentale Raumzeit-Geometrie
- Massenhierarchie: Erzeugt natürliche Massenskalen via $m = 1/T$
- Testbare Vorhersagen: Liefert spezifische, messbare Vorhersagen
- Theoretische Eleganz: Einzelner Parameter beschreibt multiple Phänomene

9.3 Schlussfolgerung

Kernaussage

Die T0-Theorie mit $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ repräsentiert eine umfassende und konsistente Formulierung, die mathematische Strenge mit experimenteller Testbarkeit vereint. Die Theorie bietet:

- Fundamentale Basis: Ableitung aus erweitertem Lagrangian
- Wahre Vorhersagen: Spezifische Beiträge ohne Parameteranpassung
- Natürliche Hierarchie: Quadratische Massenskala entsteht natürlich
- Testbare Konsequenzen: Klare Vorhersagen für zukünftige Experimente

Die entwickelten Vorhersagen liefern testbare Konsequenzen der T0-Theorie und eröffnen neue Wege zur Erforschung der fundamentalen Raumzeit-Struktur.

Dieses Dokument ist Teil der neuen T0-Serie
und baut auf den fundamentalen Prinzipien vorheriger Dokumente auf

T0-Theorie: Zeit-Masse-Dualitäts-Rahmenwerk
Johann Pascher, HTL Leonding, Österreich

Literatur

- [1] Muon g-2 Kollaboration, Messung des anomalen magnetischen Moments des positiven Myons auf 0.46 ppm, Phys. Rev. Lett. 126, 141801 (2021).
- [2] Muon g-2 Kollaboration, Endergebnisse vom Fermilab Myon g-2 Experiment, Nature Phys. 21, 1125–1130 (2025).
- [3] T. Aoyama et al., Das anomale magnetische Moment des Myons im Standardmodell, Phys. Rept. 887, 1–166 (2025).
- [4] D. Hanneke, S. Fogwell, G. Gabrielse, Neue Messung des elektronischen magnetischen Moments und der Feinstrukturkonstante, Phys. Rev. Lett. 100, 120801 (2008).
- [5] L. Morel, Z. Yao, P. Cladé, S. Guellati-Khélifa, Bestimmung der Feinstrukturkonstante mit einer Genauigkeit von 81 Teilen pro Billion, Nature 588, 61–65 (2020).
- [6] Particle Data Group, Review of Particle Physics, Prog. Theor. Exp. Phys. 2024, 083C01 (2024).
- [7] M. E. Peskin, D. V. Schroeder, Einführung in die Quantenfeldtheorie, Westview Press (1995).
- [8] J. Pascher, T0-Zeit-Masse-Dualität: Fundamentale Prinzipien und experimentelle Vorhersagen, T0 Forschungsreihe (2025).
- [9] J. Pascher, Erweiterte Lagrange-Dichte mit Zeitfeld zur Erklärung der Myon g-2-Anomalie, T0 Forschungsreihe (2025).