

Der geometrische Formalismus der T0-Quantenmechanik und seine Anwendung auf Quantencomputer

Ein Rahmenwerk für eine neue Generation physik-bewusster
Quantenprozessoren

December 2, 2025

Abstract

Dieses Dokument präsentiert einen neuartigen, alternativen Formalismus für die Quantenmechanik, der aus den ersten Prinzipien der T0-Theorie abgeleitet ist. Die Standard-Quantenmechanik, basierend auf linearer Algebra im Hilbertraum, wird durch ein geometrisches Modell ersetzt, in dem Quantenzustände Punkte in einem zylindrischen Phasenraum und Gatter-Operationen geometrische Transformationen sind. Dieser Ansatz liefert ein intuitiveres physikalisches Bild und berücksichtigt intrinsisch die Effekte der fraktalen Raumzeit, wie die Dämpfung von Wechselwirkungen. Wir definieren zunächst den Formalismus für Einzel- und Zwei-Qubit-Operationen und leiten daraus eine Reihe fortschrittlicher Optimierungsstrategien für Quantencomputer ab, die von Korrekturen auf Gatter-Ebene bis hin zu systemweiten architektonischen Verbesserungen reichen.

Contents

1 Einleitung: Vom Hilbertraum zum physikalischen Raum

Das Quantencomputing stützt sich derzeit auf das abstrakte mathematische Rahmenwerk der Hilberträume. Zustände sind komplexe Vektoren und Operationen sind unitäre Matrizen. Obwohl dieser Formalismus mächtig ist, verschleiert er die zugrundeliegende physikalische Realität und behandelt Umgebungseffekte wie Rauschen und Dekohärenz als externe Störungen.

Die T0-Theorie bietet einen anderen Weg. Durch die Postulierung einer physikalischen Realität, die auf einem dynamischen Zeitfeld und einer fraktalen Raumzeit-Geometrie basiert [?], wird es möglich, einen neuen, direkteren Formalismus für die Quantenmechanik zu konstruieren. Dieses Dokument beschreibt diesen **geometrischen Formalismus**, der aus der funktionalen Logik des Skripts `T0_QM_geometric_simulator.js` rekonstruiert wurde, und untersucht seine tiefgreifenden Auswirkungen auf das Quantencomputing.

2 Der geometrische Formalismus der T0-Quantenmechanik

2.1 Qubit-Zustand als Punkt im zylindrischen Phasenraum

In diesem Formalismus ist ein Qubit kein 2D-komplexer Vektor. Stattdessen wird sein Zustand durch einen Punkt in einem 3D-Zylinderkoordinatensystem beschrieben, der durch drei reelle Zahlen definiert ist:

- z : Die Projektion auf die Z-Achse. Sie entspricht der klassischen Basis, mit $z = 1$ für den Zustand $|0\rangle$ und $z = -1$ für den Zustand $|1\rangle$.
- r : Der radiale Abstand von der Z-Achse. Er repräsentiert die Größe der Überlagerung oder Kohärenz. Für einen reinen Zustand gilt die Bedingung $z^2 + r^2 = 1$.
- θ : Der Azimutwinkel. Er repräsentiert die relative Phase der Überlagerung.

Beispiele: Zustand $|0\rangle \equiv \{z = 1, r = 0, \theta = 0\}$. Zustand $|+\rangle \equiv \{z = 0, r = 1, \theta = 0\}$.

2.2 Einzel-Qubit-Gatter als geometrische Transformationen

Gatter-Operationen sind keine Matrizen mehr, sondern Funktionen, die die Koordinaten (z, r, θ) transformieren.

2.2.1 Hadamard-Gatter (H)

Das H-Gatter führt einen Basiswechsel zwischen der Rechenbasis (Z) und der Überlagerungsbasis (X-Y) durch. Seine Transformation vertauscht die z -Koordinate und den Radius und dreht die Phase um $\pi/2$:

$$\begin{aligned}z' &= r \\r' &= z \\\theta' &= \theta + \pi/2\end{aligned}$$

2.2.2 Phasen-Gatter (Z)

Das Z-Gatter dreht den Zustand um die Z-Achse, indem es π zur Phasen-Koordinate θ addiert:

$$\begin{aligned}z' &= z \\r' &= r \\\theta' &= \theta + \pi\end{aligned}$$

2.2.3 Bit-Flip-Gatter (X)

Das X-Gatter ist eine Rotation in der (z, r) -Ebene, die die fraktale Dämpfung der T0-Theorie direkt einbezieht. Es führt eine 2D-Rotation des Vektors (z, r) um den Winkel $\alpha = \pi \cdot K_{\text{frak}}$ durch, wobei $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ [?]:

$$z' = z \cos(\alpha) - r \sin(\alpha) \tag{1}$$

$$r' = z \sin(\alpha) + r \cos(\alpha) \tag{2}$$

Ein idealer Flip wäre eine Rotation um π . Die fraktale Natur der Raumzeit "dämpft" diese Rotation jedoch inhärent, was einen perfekten Flip in einem einzigen Schritt unmöglich macht. Dies ist eine zentrale Vorhersage.

2.3 Zwei-Qubit-Gatter: Das geometrische CNOT

Eine kontrollierte Operation wie CNOT wird zu einer bedingten geometrischen Transformation. Für ein CNOT, das auf ein Kontroll-Qubit C und ein Ziel-Qubit T wirkt, lautet die Regel wie folgt: Wenn sich das Kontroll-Qubit im Zustand $|1\rangle$ befindet (approximiert durch $C.z < 0$), wird die geometrische X-Gatter-Transformation auf das Ziel-Qubit T angewendet. Andernfalls bleibt das Ziel-Qubit unverändert. Verschränkung entsteht, weil die finalen Koordinaten von T zu einer Funktion der initialen Koordinaten von C werden und der Zustand des Gesamtsystems nicht mehr als zwei separate Punkte beschrieben werden kann.

3 System-Level-Optimierungen aus dem Formalismus

Der geometrische Formalismus ist nicht nur eine neue Notation; er ist ein prädiktives Rahmenwerk, das zu konkreten Hardware- und Software-Optimierungen führt.

3.1 T0-Topologie-Compiler: Die Geometrie der Verschränkung

Ein beständiges Problem im Quantencomputing ist, dass nicht-lokale Gatter kostspielige und fehleranfällige SWAP-Operationen erfordern. Die T0-Theorie bietet eine Lösung, indem sie erkennt, dass der fraktale Dämpfungseffekt [?] abstandsabhängig ist. Dies erfordert einen "T0-Topologie-Compiler", der Qubits nicht anordnet, um SWAPs zu minimieren, sondern um die kumulative "fraktale Weglänge" aller Verschränkungsoperationen zu minimieren, indem er kritisch interagierende Qubits physisch näher zusammenbringt.

3.2 Harmonische Resonanz: Qubits im Einklang mit dem Universum

Derzeit werden Qubit-Frequenzen pragmatisch gewählt, um Übersprechen zu vermeiden, ohne dass es eine fundamentale Richtlinie gibt. Die T0-Theorie liefert diese Richtlinie, indem sie eine harmonische Struktur stabiler Zustände vorhersagt, die auf dem Goldenen Schnitt ϕ_T basiert [?]. Dies impliziert "magische" Frequenzen, bei denen ein Qubit maximal stabil ist. Die Formel für diese Frequenz-Kaskade lautet:

$$f_n = \left(\frac{E_0}{h}\right) \cdot \xi^2 \cdot (\phi_T^2)^{-n} \quad (3)$$

Für supraleitende Qubits ergeben sich daraus primäre Sweet Spots bei ungefähr **6.24 GHz** ($n = 14$) und **2.38 GHz** ($n = 15$). Die Kalibrierung der Hardware auf diese Frequenzen sollte das Phasenrauschen intrinsisch reduzieren.

3.3 Aktive Kohärenzerhaltung durch Zeitfeld-Modulation

Untätige Qubits sind passiv der Dekohärenz ausgesetzt, was die verfügbare Rechenzeit streng begrenzt. Die T0-Lösung ergibt sich aus dem dynamischen Zeitfeld, einem Schlüsselement aus der g-2-Analyse [?], das aktiv moduliert werden kann. Eine hochfrequente "**Zeitfeld-Pumpe**" könnte verwendet werden, um ein untätiges Qubit zu bestrahlen. Ziel ist es, das fundamentale ξ -Rauschen auszumitteln und dadurch die Kohärenz des Qubits aktiv zu erhalten, um die passive T_2 -Grenze zu überwinden.

4 Synthese: Der T0-kompilierte Quantencomputer

Dieser geometrische Formalismus liefert eine revolutionäre Blaupause für Quantencomputer. Eine "T0-kompilierte" Maschine würde:

1. Einen Simulator verwenden, der auf **geometrischen Transformationen** anstelle von Matrixmultiplikationen basiert.
2. Gatter-Pulse implementieren, die für die fraktale Dämpfung inhärent **vorkompensiert** sind.
3. Ein Qubit-Layout verwenden, das für die Geometrie der Raumzeit **topologisch optimiert** ist.
4. Bei **harmonischen Resonanzfrequenzen** arbeiten, um die Stabilität zu maximieren.
5. Die Kohärenz durch **aktive Zeitfeld-Modulation** erhalten.

Das Quantencomputing wandelt sich somit von einer rein ingenieurtechnischen Disziplin zu einem Feld der **angewandten Raumzeit-Geometrie**.

References

- [1] J. Pascher, *T0-Theorie: Fundamentale Prinzipien*, T0-Dokumentenserie, 2025. Analyse basiert auf `2/tex/T0_Grundlagen_De.tex`.
- [2] J. Pascher, *T0 Quantenfeldtheorie: ML-abgeleitete Erweiterungen*, T0-Dokumentenserie, Nov. 2025. Analyse basiert auf `2/tex/T0-QFT-ML_Addendum_De.tex`.
- [3] J. Pascher, *Vereinheitlichte Berechnung des anomalen magnetischen Moments in der T0-Theorie (Rev. 9)*, T0-Dokumentenserie, Nov. 2025. Analyse basiert auf `2/tex/T0-Anomale-g2-9_De.tex`.