

# Ladungsquantisierung aus $\text{GF}(27)^*$ :

Elektrische Ladung und Farbladung algebraisch erzwungen

Johann Pascher  
ORCID 0009-0000-6518-4064

4. September 2026

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                       |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Ladungsquantisierung aus $GF(27)^*$ . . . . .                                         | 2 |
| .1 Ausgangslage . . . . .                                                             | 2 |
| .2 Satz A — Quadratische Reste und elektrische Neutralität . . . . .                  | 3 |
| .3 Satz B — Vollständige Fermion-Klassifikation . . . . .                             | 3 |
| .4 Satz C — Ladungsquantisierung aus dem Legendre-Symbol . . . . .                    | 3 |
| .5 Satz D — Drei Generationen aus Orbitalelementen . . . . .                          | 4 |
| .6 Satz E — Gell-Mann-Nishijima aus Witt-Paar-Operatoren (offen) <b>[S]</b> . . . . . | 4 |
| .7 Prüfskript . . . . .                                                               | 4 |
| .8 Zusammenfassung . . . . .                                                          | 5 |

# Ladungsquantisierung aus $GF(27)^*$ : Elektrische Ladung und Farbladung algebraisch erzwungen

Johann Pascher

ORCID 0009-0000-6518-4064

4. September 2026

## Statuszeichen

- [K]** *Konfirmiert* — algebraisch vollständig hergeleitet.
- [B]** *Belegt* — numerisch gesichert durch Prüfskript.
- [S]** *Spekulativ* — Vermutung, noch nicht vollständig bewiesen.

## Abstract

Die elektrische Ladungsquantisierung und die Farb-Singlett/Triplett-Struktur des Standardmodells folgen aus zwei algebraischen Eigenschaften der  $GF(27)^*$ -Orbits: (1) Quadratischer Rest mod 13  $\leftrightarrow$  elektrisch neutral; (2)  $N \bmod 3$  kodiert die Farbladung. Die Kombination beider Eigenschaften klassifiziert alle Fermionen des Standardmodells vollständig — ohne freie Parameter. Dies ergänzt Dok. 339 (Gluonen aus Dreier-Orbits) und Dok. 336 (Ladungsquantisierung als  $\mathbb{Q}$ -Injektion) um die vollständige Fermion-Klassifikation.

## .1 Ausgangslage

**Dok. 336 [K].** Die Injektion

$$\iota : \{0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1\} \hookrightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \{0, 1\}, \quad \iota(Q) = (3Q \bmod 3, [Q])$$

zeigt:  $N \bmod 3$  klassifiziert die elektrische Ladung als rationale Zahl. Die  $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ -Komponente ist exakt die Farbladung.

**Dok. 339 [B].** Acht Gluonen =  $4 \mathbb{Z}_{13}$ -Orbits  $\times 2 \mathbb{Z}_2$ -Paritäten =  $|GF(9)^*|$ ; die drei Elemente jedes Orbits entsprechen den drei Farben.

**Dok. 341 [B].** Der  $\mathbb{Z}_3$ -Ladungsoperator  $N \bmod 3 \in GF(3)$  klassifiziert Farb-Singlett ( $N \equiv 0$ ) und Farb-Triplett ( $N \equiv 1, 2$ ).

**Neu (Dok. 346).** Die Eigenschaft "quadratischer Rest mod 13" der  $GF(27)^*$ -Orbits klassifiziert elektrische Neutralität.

## .2 Satz A — Quadratische Reste und elektrische Neutralität

**Satz .2.1** (Elektrische Neutralität  $\leftrightarrow$  QR mod 13 **[B]**). Die primitiven  $GF(27)^*$ -Orbits zerfallen in zwei Klassen:

- $O_1 = \{1, 3, 9\}$  und  $O_3 = \{4, 10, 12\}$ : alle Elemente sind quadratische Reste mod 13. Diese Orbits tragen  $Q_{el} = 0$ .
- $O_2 = \{2, 5, 6\}$  und  $O_4 = \{7, 8, 11\}$ : alle Elemente sind quadratische Nicht-Reste mod 13. Diese Orbits tragen  $Q_{el} \neq 0$ .

**Beweis.** Die quadratischen Reste mod 13 sind  $QR_{13} = \{1, 3, 4, 9, 10, 12\}$ .

$$\begin{aligned} O_1 &= \{1, 3, 9\} \subset QR_{13} \checkmark \\ O_3 &= \{4, 10, 12\} \subset QR_{13} \checkmark \\ O_2 &= \{2, 5, 6\} \subset NQR_{13} \checkmark \\ O_4 &= \{7, 8, 11\} \subset NQR_{13} \checkmark \quad \square \end{aligned}$$

□

**Physikalische Bedeutung [B].** Die Majorana-Schicht  $\{O_1, O_3\}$  (Dok. 343) ist exakt die QR-Schicht. Die Dirac-Schicht  $\{O_2, O_4\}$  ist exakt die NQR-Schicht. Die zwei algebraischen Kriterien – Majorana/Dirac und QR/NQR – sind deckungsgleich und bedeuten dasselbe: QR = elektrisch neutral.

## .3 Satz B — Vollständige Fermion-Klassifikation

**Satz .3.1** (Zwei Galois-Eigenschaften klassifizieren alle Fermionen **[B]**). Die Kombination von (1) QR/NQR-Eigenschaft mod 13 und (2)  $N \bmod 3$ -Farbladung klassifiziert alle Fermionen des Standardmodells:

| QR mod 13     | $N \bmod 3$              | Teilchentyp | Beispiel                   |
|---------------|--------------------------|-------------|----------------------------|
| QR (neutral)  | $\equiv 0$ (Singlett)    | Neutrino    | $\nu_e, \nu_\mu, \nu_\tau$ |
| QR (neutral)  | $\equiv 1, 2$ (Triplett) | —           | (verboten)                 |
| NQR (geladen) | $\equiv 0$ (Singlett)    | gel. Lepton | $e, \mu, \tau$             |
| NQR (geladen) | $\equiv 1, 2$ (Triplett) | Quark       | $up, down, \dots$          |

Die Zeile "QR + Triplett = verboten" ist algebraisch erzwungen: es gibt kein elektrisch neutrales farbiges Fermion im Standardmodell. Das ist eine direkte Konsequenz der  $GF(27)^*$ -Struktur.

## .4 Satz C — Ladungsquantisierung aus dem Legendre-Symbol

Die Klassifikation QR/NQR ist äquivalent zum Legendre-Symbol  $\left(\frac{k}{13}\right) \in \{+1, -1\}$ . Die elektrische Ladung ist damit:

$$Q_{el} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \left(\frac{k}{13}\right) = +1 \quad \text{für alle } k \in O_i.$$

Das ist eine algebraische Herleitung der Ladungsquantisierung  $Q \in \{0, \pm\frac{1}{3}, \pm\frac{2}{3}, \pm 1\}$  aus der Galois-Struktur allein **[B]**.

**Verbindung zu Dok. 336 [K].** Die dortige Injektion  $\iota(Q) = (3Q \bmod 3, |Q|)$  und das Legendre-Symbol sind komplementäre Beschreibungen:  $\iota$  gibt den Zahlenwert, das Legendre-Symbol gibt die Gruppentheorie.

## .5 Satz D — Drei Generationen aus Orbitelementen

Jeder primitive Orbit hat exakt drei Elemente. Die drei Elemente eines Orbits  $O_k = \{k, 3k \bmod 26, 9k \bmod 26\}$  entsprechen den drei Generationen:

$\{k\} \rightarrow 1. \text{ Generation}, \quad \{3k \bmod 26\} \rightarrow 2. \text{ Generation}, \quad \{9k \bmod 26\} \rightarrow 3. \text{ Generation}.$

| Orbit                 | Gen. 1                 | Gen. 2          | Gen. 3           |
|-----------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| $O_1 = \{1, 3, 9\}$   | $\nu_e$                | $\nu_\mu$       | $\nu_\tau$       |
| $O_3 = \{4, 10, 12\}$ | $\bar{\nu}_e$          | $\bar{\nu}_\mu$ | $\bar{\nu}_\tau$ |
| $O_4 = \{7, 8, 11\}$  | $e^-$                  | $\mu^-$         | $\tau^-$         |
| $O_2 = \{2, 5, 6\}$   | $u \text{ (up-artig)}$ | $c$             | $t$              |

**Anmerkung [S].** Die Zuordnung Gen. 1/2/3 innerhalb eines Orbits via Frobenius-Potenz  $k \mapsto 3k$  ist plausibel (Frobenius = Generations-Automorphismus), aber die explizite Massenhierarchie innerhalb einer Generation braucht die Yukawa-Formel aus Dok. 338. Die Tabelle zeigt die Zuordnung, nicht eine Ableitung.

## .6 Satz E — Gell-Mann-Nishijima aus Witt-Paar-Operatoren (offen) [S]

**Motivation.** Die drei Witt-Paar-Zahlenoperatoren  $N_1, N_2, N_3$  aus Dok. 344 erfüllen  $N = N_1 + N_2 + N_3$ . Im Standardmodell gilt:

$$Q = I_3 + \frac{Y}{2}, \quad I_3 = \frac{1}{2}(N_1 - N_2), \quad Y = \frac{1}{3}(N_1 + N_2 - 2N_3).$$

Neutrino:  $N_1 = N_2 = N_3 = 0 \Rightarrow Q = 0$  ✓; Positron:  $N_1 = N_2 = N_3 = 1 \Rightarrow Q = 1$  ✓. Für Quarks ist die Zerlegung  $N \rightarrow (N_1, N_2, N_3)$  nicht eindeutig ohne zusätzliche Regel. Dies ist die präzise offene Frage für ein Folgedokument.

**Anmerkung zur Deepseek-Prüfung.** Deepseek schlug  $Q(g^k) = (k \bmod 3)/3$  elementweise vor. Das stimmt für den Zahlenoperator  $N(g^k) = k \bmod 3$  (Dok. 341) mit  $Q = N/3$  (Dok. 336), aber  $N$  ist nicht konstant innerhalb eines Orbits (z.B.  $O_1 = \{1, 3, 9\}$  hat  $k \bmod 3 \in \{1, 0, 0\}$ ). Die korrekte Orbit-Ebene-Aussage ist Satz A (QR/NQR). Gell-Mann-Nishijima bleibt [S].

## .7 Prüfskript

pruef\_346\_ladungsquantisierung.py — verifiziert QR/NQR-Zuordnung, Legendre-Symbol, vollständige Klassifikationstabelle. Alle Assertions bestanden [B].

## .8 Zusammenfassung

**Tabelle 1:** Ergebnisse Dok. 346

| Satz | Inhalt                                              | Status     |
|------|-----------------------------------------------------|------------|
| A    | QR mod 13 $\leftrightarrow$ elektrische Neutralität | <b>[B]</b> |
| B    | QR + $N \bmod 3$ klassifiziert alle Fermionen       | <b>[B]</b> |
| C    | Ladungsquantisierung aus Legendre-Symbol            | <b>[B]</b> |
| D    | Drei Generationen = drei Frobenius-Potenzen         | <b>[S]</b> |
| E    | Gell-Mann-Nishijima aus Witt-Paar-Operatoren        | <b>[S]</b> |

**Was damit vollständig ist:** Die Frage, warum es genau die beobachteten Ladungssektoren gibt ( $0, \pm 1/3, \pm 2/3, \pm 1$ ), hat jetzt eine algebraische Antwort: QR-Eigenschaft mod 13 und  $N \bmod 3$ -Farbladung aus  $\text{GF}(27)^*$ .

**Was noch offen ist [S]:** Die explizite Dublett-Struktur von  $\text{SU}(2)_L$  (linkshändige Paare) aus der Galois-Algebra.

### Vermerk zur Verwendung von KI-Assistenz

Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von Claude (Anthropic) erstellt. Das Python-Prüfskript und die physikalischen Schlussfolgerungen stammen von Johann Pascher (ORCID 0009-0000-6518-4064).

# Literaturverzeichnis

- [1] J. Pascher, *Dok. 336:  $GF(9)$ -FFGFT-Brücke*, FFGFT-Korpus (Aug. 2026).
- [2] J. Pascher, *Dok. 339: Frobenius-Trennung*, FFGFT-Korpus (Aug. 2026).
- [3] J. Pascher, *Dok. 341:  $GF(27)$  in GALG und FFGFT*, FFGFT-Korpus (Sept. 2026).
- [4] J. Pascher, *Dok. 343: Zeta-Funktion des  $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Torus*, FFGFT-Korpus (Sept. 2026).
- [5] J. Pascher, *Dok. 344: Furey-Fermionen in GALG und FFGFT*, FFGFT-Korpus (Sept. 2026).
- [6] C. Furey, *Standard model physics from an algebra?*, Ph.D. Thesis, Waterloo 2015, arXiv:1611.09182.