

A284 – Messung, Projektion und der Ursprung des Probabilismus

Johann Pascher

August 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Worum es geht	1
.2	Lichtstrahlen als Beobachterabstraktion — das EM-Feld als Träger	1
	Was ein Lichtstrahl wirklich ist	1
	Warum es so schwer ist, sich von der Lichtwegvorstellung zu lösen	2
	Warum wirken dann Linsen?	2
	Die Verbindung zur Bell-Frage	3
.3	Was Messung in der FFGFT ist	3
	Messung ist eine Typ-II-Projektion	3
	Die geometrische Lesart des Kollapses	4
.4	Woher der Probabilismus kommt	4
	Drei mögliche Erklärungen	4
	Warum die FFGFT-Lesart Bells Theorem nicht verletzt	4
	Born-Regel als Projektionststatistik	4
.5	Drei Ebenen der Nichtlokalität	5
	Ebene 1 — Torusbild: topologische Nachbarschaft	5
	Ebene 2 — Feldbild: globale Eigenmode	5
	Ebene 3 — Messprozess: globale Projektion	5
	Warum die Auswertung immer probabilistisch bleibt	5
.6	Feldlaufzeit, nicht Weglaufzeit — die messbare Verzögerung	6
	Die entscheidende Unterscheidung	6
	Was bei der Bell-Messung propagiert	6
	Die ξ -Verzögerung als Feldphasenversatz	7
	Warum es noch nie gemessen wurde	7
.7	Offene Frage: Sind A und B im Feld derselbe Punkt?	9
	Die Frage	9
	Drei strukturell verschiedene Möglichkeiten	10
	Was der Korpus impliziert	10
	Konsequenz für die 445-ns-Vorhersage	11
.8	Die plausibelste Erklärung — ein Urteil	11
	Gruppe 2 (Dok. 074): Artefakt, nicht Alternative	11
	Gruppe 3 (Dok. 023a): Experimentell widerlegt	11
	Gruppe 4 (Dok. 055): Kompatibel, aber zweite Ordnung	11
	Gruppe 5 (Dok. 142, Jiang PRL 2024): Strukturell stärkstes Argument	12
	Das Gesamturteil	12
.9	Offene Punkte	12
.10	Schichtstatus-Zusammenfassung	12
.11	Quellverweise	13
.12	Verwendung von KI-Werkzeugen	14

Kurzfassung. Dieses Dokument schließt eine Lücke, die in A070, A090 und A160 jeweils nur angedeutet ist: die geschlossene Argumentation dafür, *warum* Messung in der FFGFT das Gesamtsystem beeinflusst, und *warum* die Auswertung trotz deterministischer Grundgleichungen probabilistisch ist.

Die drei Ebenen werden getrennt geführt und am Ende zur Instantanitätsfrage der Bell-Korrelationen zusammengeführt.

Kernthesen: **(1)** Messung ist eine geometrische Typ-II-Projektion (A090) — sie wirkt auf den globalen Zustand auf T^4 , nicht auf einen lokalen Teilbereich. **(2)** Der Probabilismus entsteht nicht aus fundamentalem Zufall, sondern aus dem Informationsverlust der Projektion: die Born-Regel ist die Statistik des Typ-II-Verlusts. **(3)** Was als instantane Fernwirkung zwischen zwei Messpunkten A und B erscheint, ist die statistische Signatur einer globalen Mode, abgelesen an zwei Projektionsstellen desselben Systems — kein Prozess läuft von A nach B.

Schichtmarkierungen. [SETZUNG] deklarierter Ausgangspunkt — [B] algebraisch/mathematisch abgeleitet — [K] numerisch aus Korpus-Konstanten berechnet — [S] Plausibilitätsskizze — [H] offene Forschungsfrage.

.1 Worum es geht

[SETZUNG] In der Standardquantenmechanik ist der Messprozess das konzeptuell unbefriedigendste Element: eine einheitliche, deterministische Evolution der Wellenfunktion bricht beim Messen zusammen, ein probabilistisches Ergebnis erscheint, und zwei weit entfernte Teilchen scheinen instantan voneinander zu wissen. Drei Jahrzehnte nach der Bell-Verletzung bleibt die Frage offen, was dabei physikalisch passiert.

[B] Die FFGFT hat die Elemente einer Antwort bereits in anderen Dokumenten verteilt: A090 (Projektionskette, Typ-I/II/III), A070 (Messung als Polübergang, Born-Regel aus Phasenunkenntnis), A160 (Bell-Korrelationen als topologische Verbindung), A030 (Windungsklassen ohne Ort). Was fehlt, ist die geschlossene Argumentationskette. Dieses Dokument zieht sie.

.2 Lichtstrahlen als Beobachterabstraktion — das EM-Feld als Träger

Was ein Lichtstrahl wirklich ist

[S] Ein Lichtstrahl ist keine physikalische Größe. Er ist eine *geometrische Abstraktion*, die aus dem EM-Feld unter bestimmten Bedingungen destilliert wird — nämlich genau dann, wenn die Wellenlänge λ klein ist gegen alle relevanten geometrischen Abmessungen (Blenden, Objekte, Beobachterabstand). Diese Bedingung ist die *Strahlenoptik als Grenzfall der Wellenoptik* — mathematisch: $\lambda \rightarrow 0$ in der Wellengleichung ergibt die Eikonal-Gleichung, aus der Strahlen als Normalentrajektorien der Phasenflächen folgen.

[B] Das EM-Feld ist der Träger. Es existiert und entwickelt sich nach den Maxwell-Gleichungen, vollständig beobachterunabhängig. Der Lichtstrahl erscheint erst, wenn ein Beobachter oder eine Detektoranordnung eine Ortsmessung macht: Der Detektor reagiert auf das Feld an seinem Ort und *konstruiert* rückwärts einen Strahl als die geometrische Linie, die Quelle und Detektor verbindet. Der Strahl ist das Ergebnis dieser Konstruktion — nicht sein Vorläufer.

[B] Dieser Sachverhalt ist nicht neu — er liegt in der klassischen Wellenoptik vollständig vor. Was in der FFGFT hinzukommt: Die Feldentwicklung auf T^4 hat keine Orte im Standardsinn. Ein Photon hat keine Trajektorie; es hat eine Modenstruktur auf dem Torus. Was wir als "Lichtweg" beobachten, ist die statistische Häufung von Detektionsereignissen in einer Raumregion — eine Projektionststatistik, keine physikalische Bahn (A090, Typ-II-Projektion).

Warum es so schwer ist, sich von der Lichtwegvorstellung zu lösen

[S] Die Lichtwegvorstellung sitzt aus vier Gründen tief:

(1) Evolutionär. Das menschliche Gehirn ist für Kausalität durch räumliche Übertragung optimiert: Stein fliegt, trifft, wirkt. "Ursache vor Wirkung, Träger verbindet, Ferne trennt" — diese Heuristiken waren 10^5 Jahre lang überlebensrelevant. Sie sitzen tiefer als jede Theorie.

(2) Sprachlich. Jede natürliche Sprache hat Subjekte, die Prädikate ausführen: "Das Licht geht von A nach B." Die Idee, dass ein Feld existiert und ein Beobachter lokal reagiert — ohne dass "etwas" von A nach B läuft — ist grammatisch nicht natürlich formulierbar. Selbst physikalisch korrekte Sätze klingen wie Verneinungen, nicht wie positive Aussagen.

(3) Historisch. Newton dachte noch in Korpuskeln — Lichtteilchen auf Bahnen. Maxwell löste das: Felder statt Bahnen. Aber dann kamen Photonen, und die Alltagsphysik verfiel zurück in die Bahnvorstellung: "Das Photon geht durch den Doppelspalt." Die Wellenoptik wurde zur Rechenmethode, die Teilchenbahn zur Anschauung. Dieser Rückschritt ist tief in die Physikausbildung eingebaut.

(4) Sichtbarkeit durch Umwege. Lichtstrahlen werden nur über Umwege sichtbar: Staub, Rauch, Tröpfchen — Streuzentren, die das Feld lokal absorbieren und reemittieren. Was wir im Scheinwerfer-Strahl sehen, sind Millionen von Streuereignissen, jedes an einem anderen Ort. Der "Strahl" ist die statistische Linie dieser Ereignisse. Ohne Streuzentren ist das EM-Feld unsichtbar — physikalisch real, aber kein Beobachtungsobjekt.

Warum wirken dann Linsen?

[B] Die Linsenfrage ist der präziseste Test der These. Wenn Lichtstrahlen Abstraktionen sind und das EM-Feld der Träger ist — warum fokussiert dann eine Linse?

Die Antwort liegt in zwei Schichten:

Schicht 1 — Wellenoptik (vollständige Beschreibung): Das EM-Feld trifft auf das Glasmedium der Linse. Im Glas ist die Phasengeschwindigkeit $v = c/n$ kleiner als im Vakuum. Die Wellenfront — eine Fläche gleicher Phase — verlangsamt sich im dickeren Teil der Linse stärker als im dünneren Teil. Nach dem Durchgang ist die Wellenfront nicht mehr eben, sondern gekrümmt: Sie konvergiert. Das Feld dahinter entwickelt sich auf eine Fokalkpunkt-Struktur zu — eine Region maximaler Feldintensität. Kein Strahl ist nötig: Die Maxwell-Gleichungen im inhomogenen Medium beschreiben alles vollständig.

Schicht 2 — Strahlenoptik (Grenzfall-Beschreibung): Im Grenzfall $\lambda \ll f$ (Wellenlänge $\ll$ Brennweite) gilt Snellius: $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$. Die Strahlen sind jetzt Normalentrajektorien der Wellenfronten — sie beschreiben *wohin das Feld sich konzentriert*, nicht woher ein Teilchen kommt. Die Linse lenkt keine Körper; sie formt Phasenflächen um.

[B] Das Entscheidende: Die Linse wirkt auf das Feld, nicht auf Strahlen. Der Strahl ist eine nützliche geometrische Beschreibung des Ergebnisses — aber das Feld ist die Ursache. Ein Beobachter hinter der Linse sieht das Bild, weil das Feld an seinem Detektorort eine hohe Intensität hat. Er *konstruiert* daraus einen Strahlengang.

[S] In der FFGFT-Lesart: Das Photon ist eine Feldmode auf T^4 . Es hat keine Bahn. Die Linse modifiziert die lokale Metrik des EM-Feldes — sie verändert die Phasenstruktur der Mode. Hinter der Linse ist die Wahrscheinlichkeit, das Photon am Fokalkpunkt zu detektieren, maximal. Der Fokalkpunkt ist keine Station auf einer Bahn, sondern ein Maximum der Projektionswahrscheinlichkeit. Dass Linsen "funktionieren", ist eine Aussage über die Verteilung von Typ-II-Projektionsereignissen im Raum — nicht über Bahnen.

Die Verbindung zur Bell-Frage

[B] Der Zusammenhang mit der Instantanitätsfrage ist direkt: Wer fragt "Wie kann die Messung an A instantan B beeinflussen?" denkt in Lichtwegen. Der Lichtweg ist die implizite Annahme, dass jede Wirkung einen räumlichen Träger hat, der sich von A nach B bewegt.

Aber wenn das EM-Feld der Träger ist — und das Feld global auf T^4 existiert — dann gibt es kein "von A nach B". Das Feld ist schon überall. Die Messung an A ist eine lokale Wechselwirkung mit dem globalen Feld. Die Korrelation an B ist die Antwort desselben globalen Feldes an einem anderen Projektionspunkt. Kein Träger muss reisen.

[S] Das Linsenbeispiel macht das greifbar: Wenn Licht durch eine Linse geht und am Fokuspunkt landet, fragt niemand: "Welcher Strahl hat den Fokuspunkt verursacht?" Das ist die falsche Frage. Das Feld hat die Phasenstruktur, die zu diesem Fokuspunkt führt. Genauso: Wenn ein verschränktes Photonenpaar gemessen wird, fragt die FFGFT nicht: "Welches Signal lief von A nach B?" Das Feld hat die Modenstruktur, die zu diesen Korrelationen führt.

.3 Was Messung in der FFGFT ist

Messung ist eine Typ-II-Projektion

[B] In der Projektionskette (A090) gibt es drei qualitativ verschiedene Operationen: Typ I (Dualitäts-Dekomprimierung, fast reversibel), Typ II (geometrische Projektion, verlustbehaftet, nicht reversibel), Typ III (repräsentationelle Übersetzung, bijektiv).

[B] Eine Messung ist eine Typ-II-Operation. Sie kollabiert eine Dimension des Zustandsraums — sie projiziert den globalen Zustand auf T^4 auf einen niederdimensionalen Unterraum. Der Kern dieser Projektion $\ker(\pi) = \mathbb{R}$ enthält Information, die nach der Projektion nicht mehr im Bild enthalten ist (A090). Diese verlorene Information ist nicht weg — sie ist im Messapparat deponiert, der damit Teil des Gesamtsystems wird.

[B] Drei Konsequenzen folgen unmittelbar:

1. **Messung wirkt global.** Der T^4 ist randlos ($\partial T^4 = \emptyset$, A030) und trägt globale Eigenmoden ohne ausgezeichneten Ort. Eine Projektion an einem Projektionspunkt ändert den globalen Modeninhalte — es gibt keine lokale Messung, die den Rest des Systems unberührt ließe.
2. **Der Messapparat ist Teil des Systems.** Was vorher Systemzustand + Messapparat-Zustand war, ist nachher ein gemeinsamer Zustand. Die Grenze ist keine physikalische Grenze, sondern eine Modellgrenze (Schnittstellendefinition).
3. **Wiederholung verändert das System.** Jede weitere Messung trifft auf einen anderen globalen Zustand als die erste. Der Torus „weiß“ von der ersten Messung — nicht durch ein Signal, sondern weil sein globaler Modeninhalte sich verändert hat.

Die geometrische Lesart des Kollapses

[S] In der Standard-QM kollabiert die Wellenfunktion beim Messen auf einen Eigenzustand. In der FFGFT-Lesart (A070) ist das eine deterministische Bewegung im Modenraum: der (z, r, θ) -Punkt wird auf das nächstgelegene stabile Extrem getrieben ($z = +1$ oder $z = -1$). Das ist keine instantane Aktion auf Distanz, sondern eine lokale geometrische Bewegung am Projektionspunkt. Der „Kollaps“ ist der Typ-II-Projektionsschritt selbst.

[B] Was dabei verloren geht, ist die Phase θ — die azimuthale Information der Mode. Sie ist nach der Messung im Bild nicht mehr zugänglich, aber nicht vernichtet: sie ist im Messapparat kodiert (Typ-II-Verlust).

.4 Woher der Probabilismus kommt

Drei mögliche Erklärungen

Es gibt drei strukturell verschiedene Antworten auf die Frage, warum quantenmechanische Messungen probabilistische Ergebnisse liefern:

Standardlesart (ontologischer Zufall): $|\psi|^2$ ist eine ontologische Wahrscheinlichkeit. Der Ausgang ist fundamental zufällig, nicht durch verborgene Variablen bestimmt (Bell, Kochen-Specker).

Verborgene-Variablen-Lesart (lokal): Der Ausgang ist durch verborgene lokale Parameter bestimmt. Diese Lesart ist durch Bell experimentell ausgeschlossen.

FFGFT-Lesart (Projektionsverlust): Der Ausgang ist durch die deterministischen Feldgleichungen auf T^4 bestimmt, aber die Phase θ ist für den Beobachter nicht zugänglich. Die Stochastizität entsteht beim Messapparat (der Typ-II-Projektion), nicht im Naturprozess.

Warum die FFGFT-Lesart Bells Theorem nicht verletzt

[B] Bell schließt *lokale* verborgene Variablen auf dem projizierten $\mathbb{R}^3$ aus. Die Phase θ auf dem T^4 ist keine lokale verborgene Variable im Sinne des Theorems — sie ist ein globales Merkmal des Torusmodes, kein Parameter der an einem Raumort sitzt. Bells Beweis setzt eine Faktorisierung der verborgenen-Variablen-Dichte über die räumliche Trennung voraus. Diese Faktorisierung gilt auf T^4 nicht, weil Orte auf T^4 durch ihre Windungsklassen definiert sind, nicht durch Raumkoordinaten (A030).

[B] Die quantitative Form: Die Born-Regel

$$P_{\text{FFGFT}}(z = +1) = \frac{1+z}{2} = |\alpha|^2 = P_{\text{QM}}(0)$$

folgt aus der Gleichverteilung über $\theta \in [0, 2\pi)$ bei großer Statistik (A070). Der Probabilismus ist das Ensemble-Mittel über alle Phasenzustände — nicht fundamentaler Zufall, sondern Mittelung über das, was der eingebettete Beobachter nicht sehen kann.

Born-Regel als Projektionststatistik

[S] Die strukturelle These: Die Born-Regel $P = |\psi|^2$ ist die Statistik des Typ-II-Informationsverlusts. Bei einer Projektion $\pi : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^{n-1}$ verteilt sich die Information der verlorenen Dimension auf das Ensemble der Messwiederholungen. Die quadratische Form entsteht, weil die Norm im Hilbertraum euklidisch ist und die Projektion isometrisch auf den Unterraum wirkt.

[H] Die quantitative Verbindung zwischen dem Typ-II-Verlust und der exakten Form der Born-Regel ($|\psi|^2$ statt $|\psi|$ oder $|\psi|^3$) ist nicht ausgearbeitet. Das ist die eigentliche offene Stelle — nicht ob, sondern wie genau die Projektionsstatistik die Quadratform erzwingt.

.5 Drei Ebenen der Nichtlokalität

[B] Die Instantanitätsfrage bei Bell-Tests hat drei Ebenen, die strikt getrennt werden müssen. Alle drei sind im FFGFT-Rahmen konsistent auflösbar — auf verschiedene Weise.

Ebene 1 — Torusbild: topologische Nachbarschaft

[SETZUNG] (A160) Bell-Korrelationen sind auf dem T^4 eine topologische Erscheinung. Was im projizierten $\mathbb{R}^3$ als Fernwirkung erscheint, sind im kompakten Bild durch geschlossene Wege verbundene Punkte — topologische Nachbarn.

[B] Für irdische Abstände $d \ll L^*$ gilt: Beide Messpunkte A und B liegen auf demselben Torusblatt. Der T^4 mit der Abschlussskala $L^* = 4\bar{\lambda}_e/\xi_0^{10} \approx 1,3 \times 10^{26}$ m ist auf irdischen Skalen ($d \sim 10^6$ m) praktisch flach. *Aber:* Die topologische Verbindung läuft nicht über die euklidische Distanz, sondern über die Windungsklasse. Ein Verschränkungspaar teilt dieselbe Windungsklasse — das ist der Sinn der topologischen Verbindung, unabhängig vom projizierten Abstand.

Ebene 2 — Feldbild: globale Eigenmode

[B] (A030) Windungsklassen und Eigenmoden haben keinen Ort. Eine Eigenmode ist global — sie ist eine Eigenschaft des gesamten Torus, nicht eines Bereichs. Ein verschränktes Paar ist kein Paar getrennter Objekte mit einer Verbindung, sondern *ein* Objekt mit zwei Projektionsstellen (A160).

[B] Daraus folgt unmittelbar: Es propagiert nichts von A nach B. Die Korrelation ist Identität, keine Übertragung. Signalfreiheit ist keine Zusatzbedingung, die man fordern muss — sie folgt aus der Konstruktion.

Ebene 3 — Messprozess: globale Projektion

[S] Das ist die tiefste Ebene, die in den bisherigen Dokumenten nicht explizit formuliert war.

Die Messung an A ist keine lokale Störung, die danach zu B propagiert. Sie ist eine Typ-II-Projektion des *globalen* Zustands auf T^4 . Diese Projektion verändert den globalen Modeninhalte — den gemeinsamen Zustand des Gesamtsystems, zu dem beide Projektionsstellen A und B gehören. Was an B als „instantane Auswirkung“ erscheint, ist keine Wirkung die von A kommt, sondern die veränderte Randbedingung des globalen Zustands, aus dem B abliest.

[S] Anders formuliert: Die Messung an A liest die globale Mode ab und modifiziert sie dabei. Die nächste Messung an B trifft auf eine bereits modifizierte globale Mode — nicht weil ein Signal von A nach B lief, sondern weil beide Teil desselben globalen Systems sind.

Warum die Auswertung immer probabilistisch bleibt

[B] Alle drei Ebenen konvergieren auf denselben Punkt: Die Auswertung ist probabilistisch, weil:

1. Jede Einzelmessung eine Typ-II-Projektion ist (Informationsverlust der Phase θ).
2. Die globale Mode nach jeder Messung modifiziert ist — kein zweites Mal ist der Ausgangszustand exakt derselbe.
3. Das Ensemble über viele Messungen die Phase-Mittelung liefert, aus der die Born-Regel folgt.

[B] Man kann keine Bell-Korrelation an einer Einzelmessung ablesen. Man braucht immer ein Ensemble. Das Ensemble ist die Statistik der Projektion — und die Projektion ist global. Deshalb ist die Auswertung prinzipiell probabilistisch, nicht aus Bequemlichkeit, sondern weil der Einzelmessprozess die Information systematisch verbirgt.

.6 Feldlaufzeit, nicht Weglaufzeit — die messbare Verzögerung

Die entscheidende Unterscheidung

[B] Es gibt zwei grundverschiedene Arten, wie eine Verzögerung $\Delta t = d/c$ entstehen kann:

Weglaufzeit: Ein Objekt oder ein Signalträger bewegt sich von Punkt A nach Punkt B. Es gibt ein *Etwas*, das den Weg zurücklegt. Der Detektor an B registriert das Etwas wenn es ankommt. Diese Vorstellung ist die intuitive und liegt dem Konzept des Lichtstrahls zugrunde.

Feldlaufzeit: Das Feld existiert bereits überall. An Punkt A passiert etwas — eine Messung, eine Störung, eine Wechselwirkung — und diese *Änderung des Feldzustands* breitet sich als Wellenfront aus. Der Detektor an B registriert nicht ein ankommendes Objekt, sondern eine veränderte Feldkonfiguration an seinem Ort.

[B] Der mathematische Ausdruck ist für beide Fälle identisch — $\delta(|\mathbf{x} - \mathbf{x}'| - c(t - t'))$ — aber die physikalische Deutung ist grundverschieden. In der Green-Funktion (Dok. 131):

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{x}', t - t') = \theta(t - t') \cdot \frac{\delta(|\mathbf{x} - \mathbf{x}'| - c(t - t'))}{4\pi|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|}$$

steht $\mathbf{x}'$ für den *Quellpunkt der Störung* und $\mathbf{x}$ für den *Beobachtungspunkt*. Die δ -Funktion sagt: Die Änderung erreicht den Beobachtungspunkt genau dann, wenn $|\mathbf{x} - \mathbf{x}'| = c(t - t')$. Was propagiert, ist die *Wellenfront der Feldänderung* — kein Träger.

Was bei der Bell-Messung propagiert

[S] Bei der Messung an Detektor A passiert Folgendes im Feldterms:

1. Das globale EM-Feld (der verschränkte Zustand) wechselwirkt mit dem Messapparat an Ort A. Das ist eine lokale Wechselwirkung — kein globaler Vorgang.
2. Durch diese Wechselwirkung ändert sich der Feldzustand an A: Die Phase, die Amplitude, die Modenbesetzung werden modifiziert. Das ist eine *lokale Feldänderung*.
3. Diese lokale Feldänderung breitet sich als retardierte Welle aus — mit der Green-Funktion $G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_A, t - t_A)$. Sie erreicht jeden Punkt $\mathbf{x}$ zur Zeit $t_A + |\mathbf{x} - \mathbf{x}_A|/c$.
4. Detektor B, der sich bei $\mathbf{x}_B$ befindet, registriert die geänderte Feldkonfiguration zur Zeit $t_A + d_{AB}/c$ — nicht weil ein Signal von A nach B gelaufen ist, sondern weil die Feldänderung ihn erreicht hat.

[B] Das ist Feldlaufzeit, keine Weglaufzeit. Der Unterschied ist physikalisch real:

- Bei Weglaufzeit: B muss *warten* bis das Signal ankommt. Vorher weiß B *nichts*.
- Bei Feldlaufzeit: B wechselwirkt die ganze Zeit mit dem globalen Feld. Vorher reagiert B auf den ungestörten Feldzustand. Nachher reagiert B auf den durch die A-Messung modifizierten Feldzustand. Der Übergang erfolgt wenn die Wellenfront ankommt.

[B] Keine Information wurde von A nach B übertragen. Die modifizierte Feldkonfiguration an B ist keine Botschaft von A — sie ist die natürliche Entwicklung des globalen Feldes nach der A-Wechselwirkung. Da B den unmodifizierten Feldzustand sowieso nicht kannte (Typ-II-Projektion, Phase θ unbekannt), kann B auch aus dem modifizierten Feldzustand keine Information über die A-Messung ziehen — außer durch Vergleich mit A über einen klassischen Kanal.

Die ξ -Verzögerung als Feldphasenversatz

[K] (A165) Die FFGFT-Vorhersage:

$$\Delta t_{\xi} = \xi \cdot \frac{d}{c} \approx 445 \text{ ns} \quad (d = 1000 \text{ km})$$

[S] Diese Verzögerung ist *keine* Weglaufzeit und *keine* zusätzliche Signalübertragung. Sie ist ein *Phasenversatz in der Feldwellenfront*, der durch die fraktale Torusgeometrie entsteht.

Präzise: Das globale Feld auf dem T^4 ist nicht vollständig flach — auf irdischen Skalen gibt es einen Rest der Kompaktheit (A090). Dieser Rest erzeugt eine geometrische Phasenverschiebung der Feldmoden. Wenn die Wellenfront der Feldänderung sich von A aus ausbreitet, trägt sie diesen Phasenversatz mit — nicht weil sie einen Umweg nimmt, sondern weil die Feldgeometrie auf dem Torus leicht von der Euklidischen abweicht.

[S] Das bedeutet: Was Detektor B misst, ist die Fellamplitude mit einem Phasenversatz $\xi \cdot d/c$ relativ zu dem, was B ohne diesen geometrischen Effekt messen würde. Die 445 ns sind die Zeit, in der dieser Phasenversatz die Korrelationsstatistik verschiebt — nicht die Reisezeit eines Signals.

[B] Ob dieser Effekt messbar ist, hängt davon ab, ob man die Korrelationsstatistik mit einer Zeitauflösung $\ll 445 \text{ ns}$ messen kann, relativ zu einer gemeinsamen Zeitreferenz Q. Die Messung der Weglaufzeit (Signal A→B) wäre konzeptuell falsch. Die Messung der Feldlaufzeit (Änderung der Korrelationsstatistik relativ zu $t_Q + d_B/c$) ist die richtige Frage.

Warum es noch nie gemessen wurde

[K] *Vorangestellt: Was tatsächlich bewiesen ist und was nicht.* Die vier Generationen von Bell-Experimenten haben eines bewiesen: Die Korrelationsstatistik verletzt die klassische Schranke ($S > 2$). Was sie *nicht* bewiesen haben und nicht beweisen konnten: dass die Korrelation *instantan* entsteht. Die Instantanität ist keine experimentelle Beobachtung, sondern eine *Interpretation* aus dem Standard-QM-Formalismus, in dem der Kollaps per Konstruktion zeitlos ist. Keine der vier Generationen hat die Timing-Frage gestellt — die Zeitauflösung war entweder zu grob (Aspect: μs), oder das Experiment hatte keinen gemeinsamen Quellpunkt-Zeitstempel (Micius). Der Satz „Bell-Korrelationen sind instantan“ ist korrekt als *Formulierung des QM-Formalismus*, aber er ist *nicht experimentell nachgeprüft*.

[K] *Vergleich mit den Korpus-Bell-Dokumenten:* A160 (topologische Verbindung, CHSH, ξ -Rest) und A165 (Hardware-Validierung, 445-ns-Vorhersage) behandeln Bell-Tests ausführlich. Dok. 131 (scheinbare Instantanität) zeigt, dass $T \cdot E = 1$ eine *lokale Zwangsbedingung* ist, keine dynamische Fernwirkung, und dass die Feldgleichungen endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit $v \leq c$ haben. Keines dieser Dokumente stellt aber explizit fest: *Die Instantanität der Korrelation wurde nie direkt gemessen, nur aus der Standard-QM-Interpretation erschlossen.* Das ist die Lücke, die dieser Abschnitt schließt.

[K] *Einordnung von Dok. 023 (Bell-Tests im T0-Kontext, Altkorpus):* Dok. 023 — inzwischen durch A160 ersetzt — beschreibt eine ξ -Modifikation der Bell-Korrelation:

$$E^{T0}(a, b) = -\cos(a - b) \cdot (1 - \xi \cdot f(n, l, j))$$

Das ergibt $\text{CHSH}^{T0} \approx 2,827$ statt $2\sqrt{2} = 2,828$ — eine Reduktion um $\Delta \approx 10^{-4}$, konsistent mit A165 ($\Delta \text{CHSH} \approx \xi/(2\pi) \approx 2,1 \times 10^{-5}$; die Zahlendifferenz erklärt sich aus dem unterschiedlichen Ansatz über $f(n, l, j)$ -Faktoren). Das Prinzip ist in beiden dasselbe: Die FFGFT modifiziert die Korrelation um $O(\xi)$. Zusätzlich leitet Dok. 023 aus ML-Divergenz bei $\Delta\theta > \pi$ eine erweiterte Formel ab — das ist eine simulationsartefaktische Schlussfolgerung die nie in den Hauptkorpus aufgenommen wurde und [S] bleibt.

Entscheidend: Dok. 023 behandelt ausschließlich die *Winkelabhängigkeit* der Korrelation (ob $s > 2$). Die Timing-Frage — *wann* entsteht die Korrelation? — wird auch dort nicht gestellt. Das bestätigt die Aussage dieses Abschnitts: Alle Bell-Dokumente des Korpus, einschließlich Dok. 023, haben die Instantanitätsfrage nicht gestellt. A284 ergänzt diese Dimension — ohne Widerspruch zu den CHSH-Korrekturen.

Die vollständige Bestandsaufnahme der Altdokumente ergibt fünf inhaltliche Gruppen:

[K] Gruppe 1 — Konsistent mit Hauptkorpus (Dok. 023, A160, A165): CHSH-Korrektur $O(\xi)$ unterhalb der QM-Grenze: $E^{T0}(a, b) = -\cos(a - b) \cdot (1 - \xi \cdot f(n, l, j))$, ergibt $S^{T0} \approx 2,827 < 2\sqrt{2}$. Vorhersage: $\Delta\text{CHSH} \approx 10^{-4}$, messbar. Im Hauptkorpus (A160, A165) verankert und gültig.

[S→?] Gruppe 2 — Widerspruch zum Hauptkorpus (Dok. 074): Dok. 074 behauptet, $T0$ überschreite die Tsirelson-Schranke $2\sqrt{2}$ um 133 ppm: $|S_{T0}| = 2,389133$. Zugleich benutzt es Superdeterminismus (Verletzung der Messfreiheits-Annahme) als Erklärungsstrategie: Apparatur und Quantensystem korrelieren durch räumlich ausgedehnte Energiefelder. Das widerspricht direkt A160: „Was sich nicht ändert: CHSH und Tsirelson-Schranke.“ Zwei Alternativen: (a) Die 133-ppm-Vorhersage ist ein Rechenartefakt (Dok. 074 setzt $\varepsilon_{T0, \text{direkt}} = \xi$ ohne Gravitationsunterdrückung) und zu verwerfen. (b) Sie ist eine echte Alternative zu A160 — dann sind beide in denselben Experimenten gleichzeitig falsifizierbar. Dok. 074 ist im Hauptkorpus nicht aufgenommen; der Superdeterminismus-Rahmen ist nicht mit der topologischen These von A160 deckungsgleich.

[S→Widerspruch] Gruppe 3 — Distanzabhängige Dämpfung (Dok. 023a): $\rho^{T0} = \rho_0 \cdot \exp(-\xi \cdot \Delta d / D_f)$ — Verschränkung nimmt mit Abstand ab. Das steht im *direkten Widerspruch* zu A160 (Windungsklassen haben keinen Ort, keine Distanz; Verschränkung ist Identität, keine Übertragung). Zwei strukturell verschiedene Rahmen: Dämpfungsmodell (Dok. 023a) vs. topologisches Identitätsmodell (A160). Der Hauptkorpus (A160) ist maßgeblich; Dok. 023a ist ersetzt.

[S] Gruppe 4 — Energieabhängige Timing-Differenz (Dok. 055): Für verschränkte Photonen mit $\omega_1 \neq \omega_2$:

$$\Delta t_{\text{corr}} = \frac{G\langle m \rangle}{r} \left| \frac{1}{\omega_1} - \frac{1}{\omega_2} \right|$$

Timing-Aussage über *Differenzen im Paar*, nicht über Instantanität zwischen A und B. Mechanismus (Gm/r , gravitativ) verschieden von $\xi \cdot d/c$ (A165, geometrisch-fraktal). Mögliche Deckung: Wenn $G\langle m \rangle/r$ über $\xi = 2\sqrt{G} \cdot m$ auf das ξ -Schema reduzierbar ist, wären beide kompatibel. Diese Reduktion ist im Korpus nicht ausgearbeitet — offene Brücke [H].

[Q] Gruppe 5 — Externer Beleg für endliche Entstehungszeit (Dok. 142, Jiang et al., PRL 2024): Jiang, W.-C. et al., *Time Delays as Attosecond Probe of Interelectronic Coherence and Entanglement*, Phys. Rev. Lett. 133, 163201 (2024): Quantenverschränkung entsteht nicht instantan, sondern über ~ 232 Attosekunden (theoretische Vorhersage, kein Laborexperiment). Einzige peer-reviewed Quelle im Korpus, die direkt belegt: Verschränkungsentstehung hat eine endliche Zeitstruktur. Stärkt A284 direkt — in einem anderen System (Helium, EUV-Laser), aber strukturell identisch.

[K] Gesamtbewertung:

1. Gruppe 1 (Dok. 023/A160/A165): gültig, konsistent, Hauptkorpus.
2. Gruppe 2 (Dok. 074): Tsirelson-Überschreitung und Superdeterminismus — Widerspruch zu A160; zu klären ob Artefakt oder Alternative.
3. Gruppe 3 (Dok. 023a): Distanzabhängige Dämpfung — Widerspruch zu A160; Hauptkorpus ist maßgeblich.
4. Gruppe 4 (Dok. 055): Energieabhängige Timing-Differenz — kompatibel, Brücke zu ξ noch offen [H].
5. Gruppe 5 (Dok. 142): Externer Beleg endliche Entstehungszeit — stärkt A284.

Die bisherigen Bell-Experimente lassen sich in vier Generationen einteilen. Keine davon hatte die Frage gestellt, die für die FFGFT-Vorhersage entscheidend wäre.

Generation 1: Nachweis der Bell-Verletzung. Aspect, Dalibard und Roger (1982) demonstrierten erstmals eine Bell-Verletzung mit zeitveränderlichen Analysatoren [1]. Das Ziel war der Nachweis, dass $S > 2$ möglich ist. Timing-Informationen wurden nur genutzt, um Koinzidenzen zu identifizieren (Zeitfenster $\sim \mu\text{s}$), nicht um die Korrelationsstruktur zeitlich aufzulösen.

Generation 2: Schließung der Lokalitätslücke. Weihs et al. (1998) [2] schlossen die Lokalitätslücke durch schnelle zufällige Wahl der Messrichtung ($\tau_{\text{Entscheidung}} \ll d/c$). Die Zeitauflösung ($\sim 1\text{ ns}$) war ausreichend für diesen Zweck, aber das Experiment maß A gegen B — nicht relativ zum Quellpunkt Q.

Generation 3: Loophole-free Bell-Tests. Drei unabhängige Gruppen (Hensen et al. 2015 [3]; Giustina et al. 2015 [4]; Shalm et al. 2015 [5]) schlossen gleichzeitig Lokalitäts- und Detektionslücke. Zeitauflösung: $\sim 1\text{ ns}$, Abstände $d \sim 1\text{ km}$. Für $d = 1\text{ km}$ würde FFGFT $\Delta t \approx 0,44\text{ ns}$ vorhersagen — gerade noch unter der Zeitauflösung. Aber auch hier war die Fragestellung: Verletzt S die klassische Schranke? Nicht: Gibt es eine Verzögerung in der Korrelationsstruktur?

Generation 4: Kosmische Abstände. Yin et al. (2017) [6] demonstrierten mit dem Micius-Satelliten Bell-Verletzung über $\sim 1200\text{ km}$. FFGFT sagt $\Delta t \approx 530\text{ ns}$ voraus — weit über der Nachweisgrenze von Atomuhren ($\sim 10\text{ ns}$). Aber Micius hatte keine präzise Quellpunkt-Referenz Q und keine drei synchronisierten Uhren (Q, A, B) mit gemeinsamer Zeitbasis.

Das strukturelle Problem. Alle vier Generationen messen dasselbe: ob die Korrelationsstatistik über viele Ereignisse die klassische Schranke verletzt — eine Ensemblefrage. Die FFGFT-Vorhersage der 445-ns-Verzögerung ist dagegen eine Frage nach der *zeitlichen Struktur* der Feldmodifikation — statistisch extrahiert, aber konzeptuell verschieden.

Ein FFGFT-Test brauchte: (1) Präzise zeitgestempelten Quellpunkt Q. (2) Drei synchronisierte Atomuhren Q, A, B. (3) Statistische Analyse der Verzögerung an B relativ zu $t_Q + d_B/c$, nicht relativ zu t_A . (4) Ausreichende Ereigniszahl für $\Delta t \approx 445\text{ ns}$.

Niemand hat dieses Experiment durchgeführt, weil die Fragestellung im Standard-QM-Rahmen keinen Sinn ergibt: Dort propagiert nichts, der Kollaps ist instantan. Die Frage ist nur unter einer Theorie sinnvoll, die eine kausale Feldstruktur hinter den Korrelationen annimmt.

Experiment	d	Δt_{FFGFT}	Auflösung	Fragestellung
Aspect 1982	10 m	~ 0	μs	Bell-Verletzung
Weihs 1998	400 m	0,18 ns	$\sim 1\text{ ns}$	Lokalitätslücke
Hensen 2015	1,3 km	0,58 ns	$\sim 1\text{ ns}$	Loophole-free
Micius 2017	1200 km	530 ns	10 ns	Kosm. Distanz
FFGFT	1000 km	445 ns	$\leq 10\text{ ns}$	ξ -Verzögerung?

.7 Offene Frage: Sind A und B im Feld derselbe Punkt?

Die Frage

[H] Im projizierten $\mathbb{R}^3$ liegen zwei Detektoren A und B bei $d = 1000\text{ km}$ Abstand. Im Torusbild gilt:

$$\mathbf{x}_A \equiv \mathbf{x}_B \pmod{L^*}$$

Da $L^* = 4\bar{\lambda}_e/\xi_0^{10} \approx 1,3 \times 10^{26}\text{ m}$, ist $d/L^* \approx 10^{-20}$. Im Torusbild liegen A und B in derselben Fundamentaldomäne — praktisch am selben Ort.

[H] Die tiefere Frage ist feldontologisch, nicht metrisch: Sind A und B für das verschränkte Feld zwei verschiedene Punkte — oder *derselbe* Feldpunkt, der an zwei Projektionsstellen abgelesen wird?

Der Korpus hat die Elemente der Frage (A030: Windungsklassen haben keinen Ort; A090: Identifikation $t \sim t + R_m$; A160: verschränktes Paar ist ein Objekt mit zwei Projektionsbildern), aber formuliert sie nicht explizit. Das ist eine echte Lücke.

Drei strukturell verschiedene Möglichkeiten

[H] Drei Antworten, die nicht äquivalent sind:

Möglichkeit 1 — Zwei Punkte, topologisch verbunden [S]: A und B sind im Torusbild verschiedene Punkte, aber durch dieselbe Windungsklasse verbunden. Die Feldmodifikation nach der A-Messung propagiert als Wellenfront zu B. Die ξ -Verzögerung $\Delta t = \xi \cdot d/c \approx 445$ ns ist messbar.

Möglichkeit 2 — Identischer Punkt in der Fundamentaldomäne [H]: Da $d \ll L^*$, sind A und B in der Fundamentaldomäne $\mathbf{x}_A \approx \mathbf{x}_B$. Die verschränkte Mode ist vollständig lokal — es gibt keinen Abstand zwischen ihnen im Torusbild. Die 445 ns sind ein Artefakt der Projektion.

Möglichkeit 3 — Identischer Punkt im Modenraum [H]: Die relevante Variable ist nicht $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$, sondern die Windungsklasse $(n_1, n_2, n_3, n_4) \in \mathbb{Z}^4$. Zwei verschränkte Photonen teilen dieselbe Windungsklasse — sie sind im Modenraum *identisch*. Räumliche Trennung ist vollständig ein Projektionsartefakt. Auch Feldlaufzeit ist dann ein Konzept des projizierten Raums.

Möglichkeit	Status	Vorhersage
Zwei Punkte, topologisch verbunden	[S]	$\Delta t = \xi \cdot d/c$ messbar
Identisch in Fundamentaldomäne	[H]	445 ns ist Projektionsartefakt
Identisch im Modenraum	[H]	Feldlaufzeit ist Projektionskonzept

Was der Korpus impliziert

[B] A030 (Windungsklassen ohne Ort) und A090 (Identifikation $t \sim t + R_m$) stellen eine Struktur bereit, in der "Ort" für Feldmoden kein primäres Konzept ist. Das spricht eher für Möglichkeit 2 oder 3.

[B] A160: Das verschränkte Paar ist "ein Objekt mit zwei Projektionsbildern". Wenn es *ein* Objekt ist, hat es im Torusbild *eine* Feldkonfiguration, nicht zwei an verschiedenen Orten. Die beiden Projektionsbilder entstehen erst durch die Typ-II-Projektion auf den $\mathbb{R}^3$. Das spricht für Möglichkeit 3.

[S] Wenn Möglichkeit 3 zutrifft: Die Frage "Warum ist die Korrelation instantan?" ist keine Frage nach Ausbreitungsgeschwindigkeit — sie ist eine Frage danach, warum wir die Projektion eines Objekts an zwei Stellen für zwei Messungen halten. Die Antwort ist nicht Physik, sondern Erkenntnistheorie: Das Projektionsbild täuscht uns über die Anzahl der Objekte.

Konsequenz für die 445-ns-Vorhersage

[H] Die Vorhersage $\Delta t = \xi \cdot d/c$ aus A165 setzt Möglichkeit 1 voraus. Sie ist korrekt, wenn A und B im Torusbild verschiedene Feldpunkte sind.

Wenn stattdessen Möglichkeit 2 oder 3 zutrifft, ist die Vorhersage konzeptuell verschoben: Der Effekt existiert dann nicht als Feldlaufzeit zwischen A und B, sondern als Phasenversatz in der Projektion — messbar als Timing-Asymmetrie, aber mit anderem Ursprung.

[H] Diese Frage kann im FFGFT-Korpus gegenwärtig nicht entschieden werden. Sie erfordert eine präzise Formulierung dessen, was "Ort im Feld" für eine Modenstruktur auf T^4 bedeutet — eine Brücke zwischen A030 und A090, die noch nicht geschlossen ist.

Bis zur Klärung bleibt A165 gültig — unter der expliziten Annahme von Möglichkeit 1. Die Annahme ist zu deklarieren, nicht zu verschweigen.

.8 Die plausibelste Erklärung — ein Urteil

[S] Dieser Abschnitt enthält ein Urteil des Autors. Es ist keine bewiesene Aussage des Korpus, sondern eine begründete Einschätzung auf Basis der in § .2 bis § .7 dargelegten Analyse.

Gruppe 2 (Dok. 074): Artefakt, nicht Alternative

A160 formuliert explizit als [SETZUNG]-Falsifikationsbedingung: „Wird ein CHSH-Wert gemessen, der die Tsirelson-Schranke überschreitet, ist die Theorie an dieser Stelle widerlegt.“ Die Tsirelson-Schranke $2\sqrt{2}$ ist ein algebraischer Beweis, kein experimenteller Befund. Sie zu überschreiten würde bedeuten, die Standard-Quantenmechanik selbst zu widerlegen.

Dok. 074 erreicht die 133-ppm-Überschreitung durch Weglassen des Gravitationsunterdrückungsterms ($G\langle m \rangle/r \approx 10^{-30}$) und direktes Einsetzen von ξ . Das ist eine nicht begründete Parameterwahl, kein physikalisches Argument — Dok. 074 nennt es selbst „Alternative Interpretation“.

[S] Urteil: Artefakt der Parameteridentifikation. Verworfen.

Gruppe 3 (Dok. 023a): Experimentell widerlegt

A160 begründet **[B]** algebraisch: Der $\mathbb{C}^3$ -Tensorfaktor ist für Korrelationsgrößen unsichtbar — die Observable wirkt dort als Identität (A070). Distanzabhängige Dämpfung würde messbare Konsequenzen haben: Verschränkung nähme mit Abstand ab. Micius 2017 zeigt Bell-Verletzung über 1200 km auf demselben Niveau wie Laborexperimente. Das ist experimentell ausgeschlossen.

[S] Urteil: Experimentell widerlegt. Verworfen.

Gruppe 4 (Dok. 055): Kompatibel, aber zweite Ordnung

In natürlichen Einheiten gilt $\xi = 2\sqrt{G} \cdot m$, also $G = \xi^2/(4m^2)$. Der Gravitationsterm von Dok. 055 ist damit $\propto \xi^2$ — zweite Ordnung. Die vorhergesagte Zeitdifferenz liegt bei $\sim 10^{-30}$ s, experimentell nicht zugänglich.

[S] Urteil: Konsistent mit dem ξ -Schema in zweiter Ordnung, viele Größenordnungen kleiner als A165. Kompatibel, aber im Rauschen.

Gruppe 5 (Dok. 142, Jiang PRL 2024): Strukturell stärkstes Argument

Die Jiang-Arbeit ist unabhängig vom FFGFT-Rahmen. Sie zeigt aus der zeitabhängigen Schrödinger-Gleichung für Helium, dass Verschränkung eine endliche Aufbauzeit hat. Das

ist kein FFGFT-spezifisches Resultat, sondern ein allgemeines Ergebnis der zeitabhängigen Quantenmechanik.

[S] Urteil: Quantenmechanik selbst schließt strenge Instantanität aus, wenn man die zeitabhängige Entwicklung ernst nimmt. Die Standard-QM setzt Instantanität durch die stationäre Eigenzustands-Basis, nicht durch die zeitabhängige Dynamik. Das ist strukturell identisch mit der Feldlaufzeit-These von A284 — in einem anderen System, aber mit demselben Mechanismus.

Das Gesamturteil

[S] Die plausibelste Erklärung für Bell-Korrelationen in der FFGFT ist **Gruppe 1 und Gruppe 5 kombiniert**:

- Die Korrelation entsteht *nicht* instantan (Jiang, [Q]) — sie hat eine endliche Aufbauzeit in der Feldgeometrie.
- Im kompakten Torusbild ist das keine Fernwirkung, weil A und B Projektionsstellen desselben globalen Feldes sind (A160, [B]).
- Die CHSH-Korrektur liegt bei $O(\xi) \approx 10^{-4}$ unterhalb der Tsirelson-Schranke (A165, [K]).
- Distanzabhängige Dämpfung (Gruppe 3) ist experimentell ausgeschlossen; Tsirelson-Überschreitung (Gruppe 2) ist ein Rechenartefakt.

[H] Was offen bleibt: Ob A und B im Torusbild derselbe Feldpunkt sind (§ .7). Diese Frage entscheidet, ob die 445-ns-Verzögerung (A165) eine messbare Konsequenz hat — oder selbst ein Projektionsartefakt ist, weil es keinen Feldabstand zwischen A und B gibt.

[S] Das ist der ehrliche Restbestand. Die qualitative Antwort ist klar: keine Fernwirkung, keine Instantanität, keine Distanzabhängigkeit. Die quantitative Vorhersage (445 ns) hängt an der ungeklärten Frage, ob Feldpunkte auf T^4 überhaupt einen wohldefinierten Abstand tragen.

.9 Offene Punkte

[H] Drei echte offene Punkte:

1. **Born-Regel aus Typ-II-Verlust:** Die quantitative Herleitung der quadratischen Form $P = |\psi|^2$ aus dem Projektionsverlust ist nicht ausgearbeitet. Warum Quadrat und nicht Betrag oder höhere Potenz? Die isometrische Eigenschaft der Hilbertraum-Projektion ist der Kandidat (A090), aber der Beweis fehlt.
2. **Wegzuordnung bei Verschränkung:** Welche geschlossenen Wege auf T^4 welchen konkreten Verschränkungszuständen entsprechen (A160, [S]). Ohne diese Zuordnung bleibt die topologische These eine Strukturaussage, kein operationales Kriterium.
3. **Ort im Feld:** Ob A und B im Feld derselbe Punkt sind (§ .7) — drei Möglichkeiten, alle offen, Konsequenz für die 445-ns-Vorhersage unentschieden.

.10 Schichtstatus-Zusammenfassung

Aussage	Status
Messung ist Typ-II-Projektion (A090)	[B]
$\partial T^4 = \emptyset$: randlos, globale Eigenmoden ohne Ort	[B]
Messapparat wird Teil des Gesamtsystems	[B]

Aussage	Status
Windungsklassen haben keinen Ort (A030)	[B]
Born-Regel: $P = (1 + z)/2 = \alpha ^2$ aus Phase-Mittelung	[B]
Bell: keine lokalen verborgenen Variablen auf $\mathbb{R}^3$	[B]
FFGFT: θ ist globales Merkmal, kein lokaler Parameter	[B]
Verschränktes Paar: ein Objekt, zwei Projektionsstellen (A160)	[B]
Signalfreiheit: Folge der Konstruktion, nicht Zusatzbedingung	[B]
Räumliche Verzögerung $\Delta t = \xi \cdot d/c$ (A165)	[K]
Messung an A modifiziert globalen Modeninhalt	[S]
Born-Regel als Statistik des Typ-II-Verlusts	[S]
ξ -Verzögerung als Feldphasenversatz, nicht Signal	[S]
Lichtstrahlen als Beobachterabstraktion (Strahlenoptik = Grenzfall)	[S]
Born-Regel quadratische Form aus Projektion	[H]
Wegzuordnung Verschränkungszustand $\leftrightarrow T^4$ -Weg	[H]
Sind A und B im Feld derselbe Punkt?	[H]

Bilanz: $9 \times [\text{B}] \cdot 1 \times [\text{K}] \cdot 4 \times [\text{S}] \cdot 3 \times [\text{H}]$.

.11 Quellverweise

- A030** Pascher, J., *Kompakte Geometrie*. A-Serie, 2026. Windungsklassen ohne Ort, $\partial T^4 = \emptyset$.
- A070** Pascher, J., *Hilbertraum-Übersetzung*. A-Serie, 2026. Messung als Polübergang, Born-Regel aus Phasenunkenntnis.
- A090** Pascher, J., *Projektionskette*. A-Serie, 2026. Typ-I/II/III-Operationen, Reversibilität, Informationsverlust.
- A160** Pascher, J., *Quantenmechanik und Bell-Korrelationen*. A-Serie, 2026. Topologische Verbindung, CHSH, ξ -Rest.
- A165** Pascher, J., *Bell-Hardware und Quantencomputing*. A-Serie, 2026. $\Delta t = \xi \cdot d/c$, IBM-Heron-Messungen.
- Dok. 131** Pascher, J., *Scheinbare Instantanität*. Altkorpus, 2025. Green-Funktion, Kausalität.

Literaturverzeichnis

- [1] Aspect, A., Dalibard, J., Roger, G. (1982). *Experimental test of Bell's inequalities using time-varying analyzers*. Phys. Rev. Lett., 49(25), 1804–1807.
- [2] Weihs, G., Jennewein, T., Simon, C., Weinfurter, H., Zeilinger, A. (1998). *Violation of Bell's inequality under strict Einstein locality conditions*. Phys. Rev. Lett., 81(23), 5039–5043.
- [3] Hensen, B. et al. (2015). *Loophole-free Bell inequality violation using electron spins separated by 1.3 kilometres*. Nature, 526, 682–686.
- [4] Giustina, M. et al. (2015). *Significant-loophole-free test of Bell's theorem with entangled photons*. Phys. Rev. Lett., 115(25), 250401.
- [5] Shalm, L. K. et al. (2015). *Strong loophole-free test of local realism*. Phys. Rev. Lett., 115(25), 250402.
- [6] Yin, J. et al. (2017). *Satellite-based entanglement distribution over 1200 kilometers*. Science, 356(6343), 1140–1144.

.12 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.