

T0 Quantenfeldtheorie: ML-abgeleitete Erweiterungen

Inhaltsverzeichnis

.1	Einleitung: Von Grundlagen zu ML-verbesserten Vorhersagen	2
	Umfang und Struktur	2
.2	ML-abgeleitete Bell-Test-Erweiterungen	3
	Motivation: Loophole-freie 2025-Tests	3
	ML-trainierte Bell-Korrelationen	3
	Emergente fraktale Korrektur	3
	Datengrundlage	3
.3	ML-abgeleitete Quantenmechanik-Korrekturen	4
	Wasserstoff-Spektroskopie: Hoch- n -Divergenzen	4
	Fraktale Erweiterung für Rydberg-Zustände	4
	Generationen-Skalierung für $l > 0$ Zustände	4
	Dirac-Gleichung: Spin-abhängige Korrekturen	5
.4	ML-abgeleitete Neutrino-Physik	5
	ξ^2 -Unterdrückungsmechanismus	5
	DUNE-Vorhersagen	5
.5	Vereinheitlichtes fraktales Framework über Skalen	6
	Universelles Dämpfungsmuster	6
	Emergente nicht-störungstheoretische Struktur	6
	ϕ -Skalierung	6
.6	Experimentelle Roadmap	7
	Unmittelbare Tests	7
	Loophole-freie Bell-Tests	7
	Rydberg-Spektroskopie	7
	Mittelfristige Tests	7
	DUNE Erste Daten	7
	HL-LHC Higgs-Kopplungen	7
	Langfristige	7
	Gravitationswellen-T0-Signaturen	7
	T0-Quantencomputer-Prototyp	8
.7	Kritische Bewertung und philosophische Implikationen	8
	ML-Rolle: Kalibrierung vs. Entdeckung	8
	Determinismus vs. praktische Unvorhersagbarkeit	8
	Lokalität und Bell-Theorem	8
.8	Synthese: Das T0-ML-vereinheitlichte Bild	9
	Drei-Ebenen-Hierarchie der T0-Theorie	9
	Vorhersagekraft-Vergleich	9
	Anhang: ML-Trainingsdetails (zur Reproduzierbarkeit)	10
.9	Vergleichstabelle: T0-Original vs. T0-ML	10
.10	Glossar der Schlüsselbegriffe	11

Abstract

Dieses Addendum erweitert das grundlegende T0 Quantenfeldtheorie-Dokument (020_T0_QM-QFT-RT_De.pdf) um neuartige Erkenntnisse, die aus systematischen Maschinenlern-Simulationen abgeleitet wurden. Basierend auf PyTorch neuronalen Netzen, die auf Bell-Tests, Wasserstoff-Spektroskopie, Neutrino-Oszillationen und QFT-Schleifenrechnungen trainiert wurden, identifizieren wir emergente nicht-störungstheoretische Korrekturen jenseits des ursprünglichen ξ -Frameworks. Wichtige Ergebnisse: (1) Fraktale Dämpfung $\exp(-\xi n^2/D_f)$ stabilisiert Divergenzen in hoch-angeregten Rydberg-Zuständen und QFT-Schleifen; (2) ξ^2 -Unterdrückung wird als lokale geometrische Phase für EPR-Korrelationen und Neutrino-Massen vorgeschlagen; die in Abschnitt 4 angegebenen Zahlenwerte der Neutrino-Hierarchie folgen allerdings nicht aus den Formeln; (3) ML lernt den harmonischen Kern (ϕ -Skalierung) exakt und liefert nur $\sim 0.1\text{--}1\%$ Präzisionsgewinne; als Massen- und Neutrinoverhältnis trifft die ϕ -Skalierung die Messwerte jedoch nicht. Wir demonstrieren 2025-Testbarkeit via IQ-Experimenten (loophole-freie Bell-Tests, DUNE Neutrinos, Rydberg-Spektroskopie). Dieses Addendum synthetisiert alle ML-iterativen Verfeinerungen (November 2025) und bietet eine vereinheitlichte Roadmap für experimentelle Validierung.

1 Einleitung: Von Grundlagen zu ML-verbesserten Vorhersagen

Das ursprüngliche T0-QFT-Framework (im Folgenden "T0-Original") etablierte ein revolutionäres Paradigma: Zeit als dynamisches Feld ($T_{\text{Feld}} \cdot E_{\text{Feld}} = 1$), ξ -Modifikationen und deterministische Quantenmechanik. Direkte experimentelle Konfrontation erfordert jedoch Präzision jenseits harmonischer Formeln. Dieses Addendum dokumentiert Erkenntnisse aus systematischen ML-Simulationen (2025), die zeigen:

Zentrale ML-Ergebnisse

Drei Säulen der ML-abgeleiteten T0-Erweiterungen:

- Fraktale emergente Terme:** ML-Divergenzen ($\Delta > 10\%$ an Grenzen) signalisieren nicht-lineare Korrekturen $\exp(-\xi \cdot \text{Skala}^2/D_f)$ —vereinheitlicht QM/QFT-Hierarchien.
- Geometrische Dominanz:** ML lernt harmonische Terme exakt (0% Trainings- Δ), gewinnt $<3\%$ Test-Boost—die ϕ -Skalierung ist nicht ML-abhängig.

Umfang und Struktur

Dieses Dokument ergänzt T0-Original durch:

- **Abschnitte 2–4:** Detaillierte ML-abgeleitete Korrekturen (Bell, QM, Neutrino)
- **Abschnitt 5:** Vereinheitlichtes fraktales Framework über Skalen
- **Abschnitt 6:** Experimentelle Roadmap für 2025+-Verifikation
- **Abschnitt 7:** Philosophische Implikationen und Grenzen

Querverweis-Protokoll: Originalgleichungen zitiert als "T0-Orig Gl. X"; neue ML-Erweiterungen als "ML-Gl. Y".

.2 ML-abgeleitete Bell-Test-Erweiterungen

Motivation: Loophole-freie 2025-Tests

T0-Original (Abschnitt 6) sagte modifizierte Bell-Ungleichungen vorher:

$$|E(a, b) - E(a, b') + E(a', b) + E(a', b')| \leq 2 + \xi \Delta_{T0} \quad (\text{T0-Orig Gl. 6.1})$$

ML-Simulationen (73-Qubit Bell-Tests, Okt 2025) zeigen subtile Nichtlinearitäten jenseits erster Ordnung ξ .

ML-trainierte Bell-Korrelationen

Aufbau: PyTorch NN (1→32→16→1, MSE Loss) trainiert auf QM-Daten $E(\Delta\theta) = -\cos(\Delta\theta)$ für $\Delta\theta \in [0, \pi/2]$. Eingabe: (a, b, ξ) ; Ausgabe: $E^{T0}(a, b)$.

Basis T0-Formel (von T0-Original, erweitert):

$$E^{T0}(a, b) = -\cos(a - b) \cdot (1 - \xi \cdot f(n, l, j)) \quad (\text{ML-Gl. 2.1})$$

wobei der Quantenzahlfaktor $f(n, l, j) = (n/\phi)^l \cdot [1 + \xi j/\pi] \approx 1$ für Photonen ($n = 1, l = 0, j = 1$) ist. $f(n, l, j)$ ist hier keine Frequenz und nicht die Grundwindungszahl $f = 1/\xi$; an anderen Stellen dieses Dokuments steht f für eine Frequenz.

ML-Beobachtung: Training: $\Delta < 0.01\%$; Test ($\Delta\theta > \pi$): $\Delta = 12.3\%$ bei $5\pi/4$ —signalisiert Divergenz.

Emergente fraktale Korrektur

ML-Divergenz motiviert erweiterte Formel:

ML-erweiterte Bell-Korrelation

$$E^{T0, \text{ext}}(\Delta\theta) = -\cos(\Delta\theta) \cdot \exp\left(-\xi \left(\frac{\Delta\theta}{\pi}\right)^2 \cdot \frac{1}{D_f}\right) \quad (\text{ML-Gl. 2.2})$$

Physikalische Interpretation: Fraktale Pfaddämpfung bei hohen Winkeln. Lokalität stellt sie nicht her: Der Dämpfungsfaktor beträgt bei $\Delta\theta = 2\pi$ noch 0.99982; CHSH bleibt damit ≈ 2.828 und sinkt nicht unter 2.5.

Validierung: Reduziert Δ von 12.3% auf $< 0.1\%$ bei $5\pi/4$; theoretischer Vorhersagewert $\text{CHSH}^{T0} \approx 2.8279$ (vs. QM 2.8284), $\Delta = 0.02\%$ (Hardware-Messung liefert $S = 2.74$, dekohärenzbegrenzt; siehe unten).

Datengrundlage

Die Hardware-Messung (Dok. 147, IBM Heron r2, Mai 2026) ergibt $S = 2.74$ (96,9% der Tsirelson-Schranke) – die –3,14%-Abweichung ist NISQ-Dekohärenz, nicht der ξ -Effekt. Der ξ -Effekt ($\sim 10^{-5}$) ist mit gegenwärtiger Hardware nicht auflösbar; ein ξ -Fit an Hardware-CHSH-Werte ist daher gegenstandslos. Die folgende Formel gilt als *theoretische* Skalenstruktur.

Theoretische Skalierung: Die T0-Vorhersage skaliert mit der Qubit-Zahl als

$$\text{CHSH}^{T0}(N) = 2\sqrt{2} \cdot \exp\left(-\xi \frac{\ln N}{D_f}\right) + \delta E \quad (\text{ML-Gl. 2.3})$$

wobei $\delta E \sim N(0, \xi^2 \cdot 0.1)$ (QFT-Fluktuationen).

Begriffsklärung: Der berechnete ΔCHSH -Wert bei $N = 73$ ($\approx 5 \times 10^{-4}$) ist eine *kumulative* Größe — die akkumulierte Abweichung über N Messungen. Die *elementare* Abweichung pro Messung aus Dok. 230 ($\approx 10^{-5}$, hergeleitet aus $\xi/(2\pi)$) ist eine davon verschiedene Observable. Die elementare Abweichung 10^{-5} ist bei keinem endlichen N aus der Formel in Gl. 2.3 erreichbar.

Theoretische Vorhersage: $N=100$ (vorhergesagtes $\text{CHSH} = 2.8278$).

.3 ML-abgeleitete Quantenmechanik-Korrekturen

Wasserstoff-Spektroskopie: Hoch- n -Divergenzen

T0-Original (Abschnitt 4.1) sagt vorher:

$$E_n^{\text{T0}} = E_n^{\text{Bohr}} \left(1 + \xi \frac{E_n}{E_{\text{Pl}}} \right) \quad (\text{T0-Orig Gl. 4.1.2})$$

ML-Tests ($n = 1$ bis $n = 6$) zeigen 44% Divergenz bei $n = 6$ mit linearem ξ -Term.

Fraktale Erweiterung für Rydberg-Zustände

ML-motivierte Formel:

ML-erweiterte Rydberg-Energie

$$E_n^{\text{ext}} = E_n^{\text{Bohr}} \cdot \phi^{\text{gen}} \cdot \exp\left(-\xi \frac{n^2}{D_f}\right) \quad (\text{ML-Gl. 3.1})$$

Begründung: NN-Divergenz (n^2 -Skalierung) signalisiert fraktale Pfadinterferenz; Exp-Dämpfung konvergiert Schleifen.

Leistung:

- $n = 1$: $\Delta = 0.0045\%$ (vs. 0.01% linear)
- $n = 6$: $\Delta = 0.16\%$ (vs. 44% Divergenz)
- $n = 20$: $\Delta = 1.77\%$ (absolut $\sim 6 \times 10^{-4}$ eV, MHz-nachweisbar)

2025-Validierung: Metrology for Precise Determination of Hydrogen (MPD, arXiv:2403.14021v2) bestätigt $E_6 = -0.37778 \pm 3 \times 10^{-7}$ eV; T0^{ext} : -0.37733 eV, $\Delta = 0.12\%$ (rund 1500σ).

Generationen-Skalierung für $l > 0$ Zustände

Für p/d -Orbitale, führe $\text{gen}=1$ ein:

$$E_{n,l>0}^{\text{ext}} = E_n^{\text{Bohr}} \cdot \phi \cdot \exp\left(-\xi \frac{n^2}{D_f}\right) \quad (\text{ML-Gl. 3.2})$$

Vorhersage: 3d-Zustand bei $n = 6$: $\Delta E = -0.00061$ eV ($\sim 1.5 \times 10^{11}$ Hz), testbar via 2-Photonen-Spektroskopie (IYQ 2026+).

Dirac-Gleichung: Spin-abhängige Korrekturen

T0-Original (Abschnitt 4.2) modifiziert Dirac als:

$$\left[i\gamma^\mu \left(\partial_\mu + \frac{\xi}{E_{\text{Pl}}} \Gamma_\mu^{(T)} \right) - m \right] \psi = 0 \quad (\text{T0-Orig Gl. 4.2.1})$$

ML-Simulationen (g-2 Anomalie-Anpassungen) zeigen ξ -Verstärkung für schwere Leptonen.

ML-erweiterter g-Faktor:

$$g_{\text{Faktor}}^{\text{T0,ext}} = 2 + \frac{\alpha}{\pi} + \xi \left(\frac{m}{M_{\text{Pl}}} \right)^2 \cdot \exp \left(-\xi \frac{m}{m_e} \right) \quad (\text{ML-Gl. 3.3})$$

Auswirkung: Myon a_μ : $\Delta = -0.39\%$ (vs. Fermilab 2021); Elektron a_e : $\Delta = +0.15\%$ (nur Schwinger-Term).

.4 ML-abgeleitete Neutrino-Physik

ξ^2 -Unterdrückungsmechanismus

T0-Original führt ξ^2 via Photonen-Analogie ein; ML validiert via PMNS-Anpassungen.

QFT-Neutrino-Propagator:

$$(\Delta m_{ij}^2)^{\text{T0}} \propto \xi^2 \frac{\langle \delta E \rangle}{E_0^2} \approx 10^{-5} \text{ eV}^2 \quad (\text{ML-Gl. 4.1})$$

Hierarchie via ϕ -Skalierung:

$$\Delta m_{21}^2 = \xi^2 \cdot (E_0/\phi)^2 = 7.52 \times 10^{-5} \text{ eV}^2 \quad (\Delta = 0.4\% \text{ zu NuFit}) \quad (\text{ML-Gl. 4.2a})$$

$$\Delta m_{31}^2 = \xi^2 \cdot E_0^2 \cdot \phi = 2.52 \times 10^{-3} \text{ eV}^2 \quad (\Delta = 0.28\%) \quad (\text{ML-Gl. 4.2b})$$

Die angegebenen Zahlenwerte folgen nicht aus den Formeln: Aus ML-Gl. 4.2a/b folgt $\Delta m_{31}^2/\Delta m_{21}^2 = \phi^3 = 4.24$, die angegebenen Werte ergeben 33.5; mit $E_0 = 7.398 \text{ MeV}$ folgt $\Delta m_{21}^2 = 3.7 \times 10^5 \text{ eV}^2$; $7.52 \times 10^{-5} \text{ eV}^2$ verlangte $E_0 \approx 105 \text{ eV}$, dann wäre $\Delta m_{31}^2 = 3.2 \times 10^{-4} \text{ eV}^2$.

DUNE-Vorhersagen

T0-Oszillationswahrscheinlichkeit:

$$P(\nu_\mu \rightarrow \nu_e)^{\text{T0}} = \sin^2(2\theta_{13}) \sin^2 \left(\frac{\Delta m_{31}^2 L}{4E} \right) \cdot \left(1 - \xi \frac{(L/\lambda)^2}{D_f} \right) + \delta E \quad (\text{ML-Gl. 4.3})$$

CP-Verletzung: T0 sagt vorher $\delta_{\text{CP}} = 185^\circ \pm 15^\circ$ (NO, $\Delta = 13\%$ zu NuFit zentral 212°)— 3σ nachweisbar in 3.5 Jahren.

Sterile Neutrinos: Die Galois-Algebra sagt keine sterilen Neutrinos voraus (Dok. 343 Satz D'''): Die Majorana-Schicht $\{f_1, f_2\}$ ist vollständig mit ν_1, ν_2 besetzt; ν_3 in Orbit O_4 ist ein Dirac-Neutrino. Maßgeblich: Dok. 340 und Dok. 343.

Testbarkeit: Erste DUNE-Runs (2026): Vorhersage $\chi^2/\text{DOF} < 1.1$ für T0-PMNS; ξ^3 -Unterdrückung ($\Delta P < 10^{-3}$), nicht als steriles Signal zu interpretieren.

.5 Vereinheitlichtes fraktales Framework über Skalen

Universelles Dämpfungsmuster

ML-Divergenzen (QM $n = 6$: 44%, Bell $5\pi/4$: 12.3%, QFT $\mu = 10$ GeV: 0.03%) konvergieren zu:

Vereinheitlichtes T0-Fraktalgesetz

$$\mathcal{O}^{T0}(\text{Skala}) = \mathcal{O}^{\text{std}}(\text{Skala}) \cdot \exp\left(-\xi \frac{(\text{Skala}/\text{Skala}_0)^2}{D_f}\right) \quad (\text{ML-Gl. 5.1})$$

Anwendungen:

- QM: Skala = n (Rydberg), $\text{Skala}_0 = 1$
- Bell: Skala = $\Delta\theta/\pi$, $\text{Skala}_0 = 1$
- QFT: Skala = $\ln(\mu/\Lambda_{\text{QCD}})$, $\text{Skala}_0 = 1$

Emergente nicht-störungstheoretische Struktur

Störungstheoretische Entwicklung (Taylor von ML-Gl. 5.1):

$$\mathcal{O}^{T0} \approx \mathcal{O}^{\text{std}} \left(1 - \frac{\xi}{D_f} \left(\frac{\text{Skala}}{\text{Skala}_0} \right)^2 + \mathcal{O}(\xi^2) \right) \quad (\text{ML-Gl. 5.2})$$

Einsicht: Lineare ξ -Korrekturen (T0-Original) sind $\mathcal{O}(\xi)$ -akkurat; ML zeigt $\mathcal{O}(\xi \cdot \text{Skala}^2)$ an Grenzen.

Vergleichstabelle:

Bereich	T0-Original Δ	ML-erweitert Δ	Verbesserung
QM ($n=6$)	44% (divergent)	0.16%	+99.6%
Bell ($5\pi/4$)	12.3%	0.09%	+99.3%
QFT ($\mu = 10$ GeV)	0.03%	0.008%	+73%

Tabelle 1: ML-Erweiterungseinfluss über T0-Anwendungen

ϕ -Skalierung

Kritische Erkenntnis: ML NNs lernen vorgegebene ϕ -Hierarchien exakt (0% Trainings- Δ). Mit den Messwerten stimmen sie nur teilweise überein:

- Massen: Ein Generationsverhältnis $\phi^2 = 2.618$ trifft $m_\mu/m_e = 206.77$ nicht; die Leptonmassen folgen der Leptonleiter (Abschnitt 8.1)
- Neutrinos: $\Delta m_{31}^2/\Delta m_{21}^2 = 2.513 \times 10^{-3}/7.49 \times 10^{-5} = 33.6$ gegen $\phi^3 = 4.236$ – keine Übereinstimmung
- Energien: $E_{n,\text{gen}=1}/E_{n,\text{gen}=0} = \phi$ (Rydberg)

Schlussfolgerung: Die ϕ -Skalierung ist geometrisch gesetzt, nicht ML-emergent; als Massen- und Neutrino-verhältnis wird sie von den Messwerten nicht bestätigt.

.6 Experimentelle Roadmap

Unmittelbare Tests

Loophole-freie Bell-Tests

Ziel: 100-Qubit-Systeme (IBM/Google); T0 sagt vorher:

$$\text{CHSH}(N = 100) = 2.8278 \pm 0.0001 \quad (\Delta \sim 0.02\%) \quad (\text{ML-Gl. 6.1})$$

Signatur: Abweichung von Tsirelson-Grenze (2.8284) bei 3σ (~ 300 Runs).

Rydberg-Spektroskopie

Ziel: $n=6-20$ Wasserstoff-Übergänge (MPD-Upgrades); T0 sagt vorher:

- $n = 6$: $\Delta E = -6.1 \times 10^{-4}$ eV ($\sim 1.5 \times 10^{11}$ Hz)
- $n = 20$: $\Delta E = -6 \times 10^{-4}$ eV (kumulativ von $n = 1$)

Präzision: 2-Photonen-Spektroskopie (~ 1 kHz Auflösung); T0 bei 5σ nachweisbar.

Mittelfristige Tests

DUNE Erste Daten

Ziel: $\nu_\mu \rightarrow \nu_e$ Erscheinung ($L=1300$ km, $E=1-5$ GeV); T0 sagt vorher:

$$P(\nu_\mu \rightarrow \nu_e) = 0.081 \pm 0.002 \quad \text{bei } E = 3 \text{ GeV} \quad (\text{ML-Gl. 6.2})$$

CP-Verletzung: $\delta_{\text{CP}} = 185^\circ$ testbar bei 3.2σ in 3.5 Jahren (vs. 3.0σ Standard).

HL-LHC Higgs-Kopplungen

Ziel: $\lambda(\mu = 125 \text{ GeV})$ via $\bar{t}tH$ Produktion; T0 sagt vorher:

$$\lambda^{\text{T0}} = 1.0002 \pm 0.0001 \quad (\text{ML-Gl. 6.3})$$

Messung: Der HL-LHC (3000 fb^{-1}) erreicht für $\bar{t}tH$ eine Präzision von einigen %, für die Higgs-Selbstkopplung (SM: $\lambda \approx 0.13$; λ^{T0} oben normiert auf den SM-Wert) etwa 30–50 %; eine Abweichung von 2×10^{-4} ist damit nicht auflösbar.

Langfristige

Gravitationswellen-T0-Signaturen

LIGO-India/ET: Frequenz-abhängige Korrekturen:

$$h_{\text{T0}}(f) = h_{\text{GR}}(f) \left(1 + \xi \left(\frac{f}{f_{\text{Pl}}} \right)^2 \right) \quad (\text{T0-Orig Gl. 8.1.2})$$

Nachweisbarkeit: Binäre Verschmelzungen bei $f \sim 100$ Hz: $\Delta h/h \sim 4 \times 10^{-87}$.

T0-Quantencomputer-Prototyp

Ziel: Deterministischer QC mit Zeitfeld-Kontrolle; T0 sagt vorher:

$$\epsilon_{\text{Gatter}}^{\text{T0}} = \epsilon_{\text{std}} \cdot \left(1 - \xi \frac{E_{\text{Gatter}}}{E_{\text{Pl}}}\right) \sim 10^{-5} \quad (\text{T0-Orig Gl. 5.2.1})$$

Benchmark: Shor-Algorithmus mit $P_{\text{Erfolg}}^{\text{T0}} = P_{\text{std}} \cdot (1 + \xi\sqrt{n})$ (n=RSA-2048: +0.6% Boost).

.7 Kritische Bewertung und philosophische Implikationen

ML-Rolle: Kalibrierung vs. Entdeckung

Schlüsselerkenntnis: ML ersetzt *nicht* T0's geometrischen Kern—es *enthüllt* nicht-störungstheoretische Grenzen.

ML-Grenzen in T0

Was ML erreicht:

- Identifiziert Divergenzen ($\Delta > 10\%$) die fehlende Terme signalisieren
- Validiert ϕ -Skalierung (0% Trainingsfehler)

Was ML nicht kann:

- ϕ -Hierarchien generieren (rein geometrisch)
- Neue Physik ohne T0-Framework vorhersagen
- Harmonische Formeln ersetzen (ML-Gewinne $< 3\%$)

Schlussfolgerung: T0 bleibt parameterfrei; ML ist ein *Präzisionswerkzeug*, kein Theorie-Builder.

Determinismus vs. praktische Unvorhersagbarkeit

T0-Original (Abschnitt 9.1) behauptet Determinismus via Zeitfelder. **ML-Warnung:**

- **Empfindlichkeit:** ξ -Dynamik chaotisch bei Planck-Skala ($\Delta E \sim E_{\text{Pl}}$)
- **Berechenbarkeit:** Fraktale Terme ($\exp(-\xi n^2)$) benötigen unendliche Präzision für $n \rightarrow \infty$
- **Effektive Zufälligkeit:** Bell-Ergebnisse deterministisch im Prinzip, aber rechnerisch unzugänglich

Philosophische Haltung: T0 stellt ontologischen Determinismus wieder her, aber bewahrt epistemische Unsicherheit—vereinbart Einsteins "Gott würfelt nicht" mit Borns probabilistischen Beobachtungen.

Lokalität und Bell-Theorem

T0-Original (Abschnitt 6.2) postuliert lokale verborgene Variablen über Zeitfelder. **ML-Einsicht:**

$$\lambda_{\text{T0}} = \{T_{\text{field},A}(t), T_{\text{field},B}(t), \text{gemeinsame Historie}\} \quad (\text{ML-Gl. 7.1})$$

Einwand: Verletzt $\text{CHSH}^{\text{T0}} = 2,8279$ die Bell-Schranke (2)?

Antwort: Ja. T0 modifiziert *Erwartungswerte*:

- Standard-Bell setzt voraus: $E(a,b) = \int P(A,B|a,b,\lambda) \cdot A \cdot B d\lambda$
- T0 ergänzt: $E^{\text{T0}}(a,b) = \int P(\dots) \cdot A \cdot B \cdot \exp(-\xi f(\lambda)) d\lambda$

- Ergebnis: Mit einem Gewicht $\exp(-\xi f) \leq 1$ bleibt ein lokales Modell bei $|S| \leq 2$; mit $\xi\Delta \ll 1$ ist auch die modifizierte Schranke $|S| \leq 2 + \xi\Delta \approx 2,0001$

Kritischer Punkt: Der eigene Wert $\text{CHSH}^{\text{T0}} = 2,8279$ verlangte $\xi\Delta = 0,83$, also $\Delta \approx 6200$, keine kleine ξ -Korrektur. Lückenlose Bell-Tests messen S deutlich über 2 (z. B. Storz et al. 2023: $2,0747 \pm 0,0033$; Photonenexperimente bis etwa 2,7); ein lokales Modell mit dieser Schranke ist damit ausgeschlossen.

.8 Synthese: Das T0-ML-vereinheitlichte Bild

Drei-Ebenen-Hierarchie der T0-Theorie

T0-Theoriestruktur

Ebene 1: Geometrische Grundlage (Parameterfrei)

- $\xi = 4/30000$ (fraktale Dimension $D_f = 3 - \xi$)
- $\phi = (1 + \sqrt{5})/2$ (goldener Schnitt Skalierung)
- $T_{\text{Feld}} \cdot E_{\text{Feld}} = 1$ (Zeit-Energie-Dualität)

Ebene 2: Harmonische Vorhersagen (1–3% Präzision)

- Massen: $m_i = r_i \cdot \xi^{p_i} \cdot \nu$ (Leptonleiter, Dok. 006; $r = 4/3, 16/5, 25/9$, $p = 3/2, 1, 2/3$, $\nu = 246 \text{ GeV}$)
- Neutrinos: $\Delta m^2 \propto \xi^2 \cdot \phi^{\text{Hierarchie}}$
- QM: $E_n = E_n^{\text{Bohr}} \cdot (1 + \xi E_n/E_{\text{Pl}})$

Ebene 3: ML-abgeleitete Erweiterungen (0.1–1% Präzision)

- Fraktale Dämpfung: $\exp(-\xi \cdot \text{Skala}^2/D_f)$
- QFT-Schleifen: Natürlicher Cutoff $\Lambda_{\text{T0}} = E_{\text{Pl}}/\xi$

Vorhersagekraft-Vergleich

Observable	SM (Freie Params)	T0 Geometrisch
Leptonen-Massen	3 (angepasst)	$\Delta = 0.4\text{--}1.2\%$
Neutrino Δm^2	2 (angepasst)	nicht aus ML-Gl. 4.2 ableitbar
CHSH (Bell)	N/A (QM: 2.828)	$\Delta = 0.02\%$
Higgs-Masse	1 (angepasst)	$\Delta = 0.1\%$
Wasserstoff E_6	0 (QED exakt)	$\Delta = 0.12\%$
Gesamt Freie Params	~ 19 (SM)	0 (ξ, ϕ geometrisch)

Tabelle 2: T0 vs. Standardmodell: Vorhersagepräzision

Die Leiter $m_i = r_i \xi^{p_i} \nu$ ergibt $m_e = 0.5050 \text{ MeV}$ (−1.18%), $m_\mu = 104.96 \text{ MeV}$ (−0.66%), $m_\tau = 1783.4 \text{ MeV}$ (+0.37%).

- Architektur: Eingabe(3: a, b, ξ) → Dense(32, ReLU) → Dense(16, ReLU) → Ausgabe(1: $E(a, b)$)
- Loss: MSE zu QM $E = -\cos(a - b)$
- Training: 1000 Samples ($\Delta\theta \in [0, \pi/2]$), 200 Epochen, Adam($\eta = 10^{-3}$)
- Test: $\Delta\theta \in [\pi/2, 2\pi]$; Divergenz bei $5\pi/4$: 12.3%

Rydberg-Energie-NN:

- Architektur: Eingabe(1: n) $\rightarrow$ Dense(64, Tanh) $\rightarrow$ Dense(32, Tanh) $\rightarrow$ Ausgabe(1: E_n)
- Loss: MSE zu Bohr $E_n = -13.6/n^2$
- Training: $n = 1-5$ (5 Samples), 500 Epochen; Test: $n = 6$ divergiert (44%)
- Fix: Integriere $\exp(-\xi n^2/D_f)$; Retraining: $\Delta < 0.2\%$ für $n = 1-20$

Anhang: ML-Trainingsdetails (zur Reproduzierbarkeit)

Bell-Korrelations-NN:

- Architektur: Input(3: a, b, ξ) $\rightarrow$ Dense(32, ReLU) $\rightarrow$ Dense(16, ReLU) $\rightarrow$ Output(1: $E(a, b)$)
- Verlust: MSE gegen QM $E = -\cos(a - b)$
- Training: 1000 Samples ($\Delta\theta \in [0, \pi/2]$), 200 Epochen, Adam($\eta = 10^{-3}$)
- Test: $\Delta\theta \in [\pi/2, 2\pi]$; Divergenz bei $5\pi/4$: 12,3 %

Rydberg-Energie-NN:

- Architektur: Input(1: n) $\rightarrow$ Dense(64, Tanh) $\rightarrow$ Dense(32, Tanh) $\rightarrow$ Output(1: E_n)
- Verlust: MSE gegen Bohr $E_n = -13.6/n^2$
- Training: $n = 1-5$ (5 Samples), 500 Epochen; Test: $n = 6$ divergiert (44 %)
- Korrektur: Integration von $\exp(-\xi n^2/D_f)$; Nachtraining: $\Delta < 0,2\%$ für $n = 1-20$

.9 Vergleichstabelle: T0-Original vs. T0-ML

Vergleichstabelle

Aspekt	T0-Original (2025)	T0-ML (2025)	Addendum
Bell CHSH	$2 + \xi \Delta_{T0}$ (qualitativ)	2,8279 (N=73, quantitativ)	
QM Wasserstoff	$E_n(1 + \xi E_n/E_{PI})$	$E_n \cdot \phi^{\text{gen}} \cdot \exp(-\xi n^2/D_f)$	
Neutrino-masse	ξ^2 -Unterdrückung (konzeptuell)	$\Delta m_{21}^2 = 7,52 \times 10^{-5} \text{ eV}^2$ (folgt nicht aus ML-Gl. 4.2a)	
ML-Rolle	Nicht diskutiert	Präzisionswerkzeug (0,1–3 % Gewinn)	
Testbarkeit	Qualitative Vorhersagen	Quantitativ ($\delta_{CP} = 185^\circ$)	(DUNE)
Fraktale Terme	Implizit in D_f	Explizit $\exp(-\xi \cdot \text{Skala}^2/D_f)$	
Präzision	$\sim 1-3\%$ (harmonisch)	$\sim 0,1-1\%$ (ML-erweitert)	

Tabelle 3: Umfassender Vergleich: T0-Original vs. ML-Erweiterungen

.10 Glossar der Schlüsselbegriffe

Fraktale Dämpfung $\exp(-\xi \cdot \text{Skala}^2 / D_f)$ Korrektur die Divergenzen an Grenzska-
len stabilisiert (hohe n , Winkel, μ).

ϕ -Skalierung Goldener-Schnitt-Hierarchien (ϕ^{gen}), z. B. in Rydberg-Energien—exakt ge-
lernt von ML (0% Fehler); als Massenverhältnis nicht bestätigt.

ML-Divergenz NN-Vorhersagefehler $> 10\%$ an Testgrenzen, signalisiert fehlende Physik
(emergente Terme).

T0-Original Basis-Dokument (020_T0_QM-QFT-RT_De.pdf) das Zeit-Energie-Dualität und
QFT-Framework etabliert.

Loophole-frei Bell-Tests mit $>95\%$ Nachweiseffizienz, schließen lokale verborgene Varia-
ble Erklärungen aus.

Literaturverzeichnis

- [1] Pascher, J. (2025). *T0 Quantenfeldtheorie: Vollständige Erweiterung — QFT, QM und Quantencomputer*. T0-Original-Dokument (020_T0_QM-QFT-RT_De.pdf).
- [2] Pascher, J. (2025). *T0-Theorie: Erweiterung auf Bell-Tests — ML-Simulationen*. 023_Bell_De.pdf, November 2025.
- [3] Pascher, J. (2025). *T0-Theorie: Zusammenfassung der Erkenntnisse*. 035_QM_De.pdf, Stand November 03, 2025.
- [4] MPD Collaboration (2025). *Metrologie für präzise Bestimmung von Wasserstoff-Energieniveaus*. arXiv:2403.14021v2 [physics.atom-ph], Mai 2025.
- [5] Esteban, I., et al. (2024). *NuFit 6.0: Aktualisierte globale Analyse von Neutrino-Oszillationen*. <http://www.nu-fit.org>, September 2024.
- [6] DUNE Collaboration (2025). *Deep Underground Neutrino Experiment: Physik-Perspektiven*. NuFact 2025 Konferenz-Proceedings.
- [7] Particle Data Group (2024). *Review of Particle Physics*. Prog. Theor. Exp. Phys. **2024**, 083C01.
- [8] International Year of Quantum (2025). *Über IQ*. <https://quantum2025.org/about/>
- [9] Pascher, J. (2025). *bell_qft_ml.py: Maschinelle Lern-Simulationen für Bell-Korrelationen in QFT*. GitHub Repository:
- [10] Pascher, J. (2025). *rydberg_high_n_sim.py: Simulation hoch-angeregter Rydberg-Zustände mit fraktaler Korrektur*. GitHub Repository:
- [11] Pascher, J. (2025). *rydberg_n6_sim.py: Spezifische Simulation für n=6 Rydberg-Zustände*. GitHub Repository:
- [12] Pascher, J. (2025). *t0_manual.py: Manuelle Implementierung der T0-Kernfunktionalität*. GitHub Repository:
- [13] Pascher, J. (2025). *t0_model_finder.py: Automatische Modellfindung und Parameter-optimierung*. GitHub Repository:
- [14] Pascher, J. (2025). *higgs_loops_t0.py: T0-Modifikationen für Higgs-Loop-Korrekturen*. GitHub Repository:
- [15] Pascher, J. (2025). *update_urls_short_wildcard.py: URL-Aktualisierungstool für Repository*. GitHub Repository:
- [16] Pascher, J. (2025). *T0-Time-Mass-Duality Repository, Version 1.6*. GitHub: