

Masseberechnungen und Galois-Gegenüberstellung

FFGFT-Quantenzahlen, Leptonenmassen und
Galois-Körper $GF(3^n)$ im Vergleich

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

28. August 2026

Inhaltsverzeichnis

Masseberechnungen und Galois-Gegenüberstellung	2
.1 FFGFT-Masseformel und Quantenzahlen	1
.2 Leptonenmassen: bare Vorhersage vs. Experiment	1
.3 Massenverhältnisse (K_{frak} -frei)	1
.4 Galois-Gegenüberstellung	2
Kernidentität: $(m_\mu/m_e)^2 = 43200$	2
Herleitung von ξ aus der Identität	2
Wicklungszahlen aus $\text{GF}(3^n)$	3
Beziehung zwischen FFGFT-bare und Galois	3
.5 Feinstrukturkonstante aus Galois-Zahlen	3
Zwei Schlüsselidentitäten	3
Herleitung — $ \text{GF}(27) $ kürzt sich heraus	4
Ergebnis	4

Masseberechnungen und Galois-Gegenüberstellung

Zusammenfassung

Dieses Dokument stellt die FFGFT-Masseberechnungen der drei Leptonengenerationen den entsprechenden Galois-Strukturen in $GF(3^n)$ gegenüber.

Das Hauptergebnis: $(m_\mu/m_e)^2 = 43200$ ist in beiden Frameworks exakt und identisch — FFGFT aus Quantenzahlen (r_i, p_i) , Galois aus Gruppenordnungen $|GF(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |GF(27)|$. Die Gleichheit ist keine numerische Koinzidenz, sondern eine algebraische Identität, aus der $\xi = 4/30000$ als Galois-Zahl folgt **[K]**.

Die verbleibende Abweichung der bare-Massen vom Experiment (0.5%) ist weder ein Messfehler noch K_{frak} ; sie ist eine empirische Diskrepanz. Kandidat ist die fraktal-rekursive Korrektur höherer Ordnung der Torus-Wicklungszahlen; die physikalische Zuordnung ist offen. Prüfungskripte: pruef_330, pruef_331.

.1 FFGFT-Masseformel und Quantenzahlen

Die Masse eines Fermions i in FFGFT (Dok. 006):

$$m_i^{\text{bare}} = r_i \cdot \xi^{p_i} \cdot \nu, \quad \nu = 246 \text{ GeV}, \quad \xi = \frac{4}{30000} \quad (1)$$

Die Quantenzahlen (r_i, p_i) folgen aus den Wicklungszahlen $(n_{\theta,g}, n_{\phi,g})$ des T^4 -Torus (Dok. 317):

$$r_g = \frac{n_{\phi,g}^2}{n_{\theta,g}}, \quad p_g = \frac{3}{2} \left(\frac{2}{3} \right)^{g-1} \quad (g = 1, 2, 3) \quad (2)$$

Die Werte $3/2, 1, 2/3$ bilden die geometrische Folge mit $p_1 = D/2$ und Verhältnis $2/3$ (Dok. 158, 018).

Tabelle 1: FFGFT-Quantenzahlen der Leptonen (Dok. 006, 317)

Lepton	Gen. g	n_{θ}	n_{ϕ}	r_i	p_i
Elektron	1	3	2	$4/3$	$3/2$
Myon	2	5	4	$16/5$	1
Tau	3	9	5	$25/9$	$2/3$

.2 Leptonenmassen: bare Vorhersage vs. Experiment

Tabelle 2: Leptonenmassen: FFGFT bare vs. PDG-Experiment

Lepton	m_i^{bare} (MeV)	m_i^{exp} (MeV)	Abw. (%)	Korrektur
Elektron	0.5050	0.5110	-1.18	fraktal-rekursiv
Myon	104.960	105.658	-0.66	fraktal-rekursiv
Tau	1783.4	1776.9	+0.37	fraktal-rekursiv

Die bare Vorhersage liegt systematisch 0.5–1.2% vom Experiment. Diese Abweichung ist *nicht*:

- Messfehler (PDG-Fehler $< 10^{-4} \%$)
- K_{frak} -Korrektur (K_{frak} kürzt sich im Verhältnis heraus, Dok. 070)

Sie ist eine empirische Diskrepanz: Beim Quadrat $(m_{\mu}/m_e)^2$ beträgt der Rest $43200 - 42753,1 = 446,9$, weit jenseits jeder Messunsicherheit (Dok. 352). Kandidat ist die **fraktal-rekursive Korrektur höherer Ordnung** der Torus-Wicklungszahlen; die physikalische Zuordnung ist offen.

K_{frak} wird durch den Vergleich mit der Feinstrukturkonstante festgelegt (Dok. 070); die Übereinstimmung von α selbst ist eine Eigenschaft des Ankers E_0 :

$$\alpha = \xi \cdot E_0^2 / K_{\text{frak}}, \quad E_0 = \sqrt{m_e m_{\mu}} \approx 7.348 \text{ MeV} \quad \Rightarrow \quad \alpha^{-1} = 137.06 \text{ (Abw. 0.02 \%)} \quad (3)$$

.3 Massenverhältnisse (K_{frak} -frei)

Im Verhältnis kürzt sich K_{frak} exakt heraus (Dok. 070):

$$\frac{m_{\mu}}{m_e} = \frac{r_{\mu}}{r_e} \cdot \xi^{p_{\mu}-p_e} = \frac{12}{5} \cdot \xi^{-1/2} = \frac{12}{5} \cdot \sqrt{7500} = 120\sqrt{3} \approx 207.846 \quad (\text{exp: } 206.768, \text{ Abw. } 0.52 \%) \quad (4)$$

Tabelle 3: Massenverhältnisse: FFGFT bare vs. Experiment

Verhältnis	FFGFT bare	Experiment (PDG)	Abw. (%)
m_μ/m_e	$120\sqrt{3} = 207.846$	206.768	+0.52
m_τ/m_e	3531.6	3477.2	+1.56
m_τ/m_μ	16.99	16.82	+1.04

.4 Galois-Gegenüberstellung

Kernidentität: $(m_\mu/m_e)^2 = 43200$

Das Quadrat des Massenverhältnisses beseitigt das irrationale $\sqrt{3}$ (in $\text{GF}(3^n)$ nicht definiert, da $3 = 0$ dort) und liefert eine exakte ganzzahlige Identität **[K]**:

$$\underbrace{\frac{(r_\mu/r_e)^2}{\xi}}_{\text{FFGFT}} = \underbrace{|\text{GF}(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |\text{GF}(27)|}_{\text{Galois}} = 8^2 \cdot 25 \cdot 27 = 43200 \quad (5)$$

Tabelle 4: Gegenüberstellung FFGFT vs. Galois für $(m_\mu/m_e)^2$

	FFGFT	Galois
Eingang	$r_e = 4/3, r_\mu = 16/5, \xi$	$ \text{GF}(9)^* = 8, \text{GF}(27) = 27, 5$
Formel	$(r_\mu/r_e)^2/\xi$	$8^2 \cdot 5^2 \cdot 27$
Ergebnis	43200	43200
Status	[K]	[K]

Die Faktoren der Galois-Seite:

- $8 = |\text{GF}(9)^*| = 3^2 - 1$: multiplikative Gruppe der 2. Generation
- $27 = |\text{GF}(27)| = 3^3$: Körper der 3. Generation (alle Elemente)
- $5 = \text{neuer Primteiler}(|\text{GF}(81)^*| = 80)$: einzige neue Primzahl in $|\text{GF}(3^4)^*|$

Herleitung von ξ aus der Identität

Da beide Seiten dieselbe Zahl sind, folgt ξ algebraisch **[K]**:

$$\xi = \frac{(r_\mu/r_e)^2}{43200} = \frac{(12/5)^2}{43200} = \frac{144/25}{43200} = \frac{1}{7500} = \frac{4}{30000} \quad (6)$$

ξ ist keine freie Konstante — sie folgt zwingend aus den Galois-Gruppenordnungen und den Wicklungszahlen des T^4 -Torus.

Wicklungszahlen aus $\text{GF}(3^n)$

Tabelle 5: Wicklungszahlen: Herleitung aus $\text{GF}(3^n)$ [K]

Größe	Wert	Galois-Herkunft	Bemerkung
$n_{\theta,1}$	3	$\text{char}(\text{GF}(3^n))$	axiomatisch
$n_{\phi,1}$	2	$ \text{GF}(3)^* $	mult. Gruppe des Primkörpers
$n_{\theta,2}$	5	Rekursion $3 + 2$	zugleich neuer Primteiler von $ \text{GF}(81)^* = 80$
$n_{\phi,2}$	4	$\varphi(5)$	Euler- φ des Primteilers
$n_{\theta,3}$	9	Rekursion $5 + 4$	zugleich char^2
$n_{\phi,3}$	5	neuer Primteiler $ \text{GF}(81)^* $	

Rekursionsgesetz: $n_{\theta,g} = n_{\theta,g-1} + n_{\phi,g-1}$. $\text{GF}(3^4)^* = 80 = 2^4 \cdot 5$ liefert den neuen Primteiler 5, der in $\text{GF}(3^1)^*$, $\text{GF}(3^2)^*$, $\text{GF}(3^3)^*$ nicht vorkommt. Neu ist 5 nur gegenüber den Primteilern dieser Stufen: $|\text{GF}(27)^*| = 26 = 2 \cdot 13$ bringt bereits den neuen Primteiler 13, und der kleinste Primteiler von 80 ist 2.

Beziehung zwischen FFGFT-bare und Galois

Tabelle 6: Vollständige Gegenüberstellung auf Verhältnisebene

Methode	$(m_\mu/m_e)^2$	m_μ/m_e	Abw. exp.
Experiment (PDG)	42 753.1	206.768	—
FFGFT bare $(r_\mu/r_e)^2/\xi$ [K]	43 200	207.846	+0.52 %
Galois $8^2 \cdot 25 \cdot 27$ [K]	43 200	207.846	+0.52 %

FFGFT und Galois geben exakt denselben bare-Wert, die Abweichung zum Experiment ist daher in beiden Frameworks dieselbe. Verglichen wird in der ganzzahligen Form $(m_\mu/m_e)^2$; der Rest von 0,52 % bei m_μ/m_e ist genau die Hälfte des quadratischen Rests und kein eigenständiger Befund. Die physikalische Zuordnung des Rests ist offen (Dok. 352).

.5 Feinstrukturkonstante aus Galois-Zahlen

Zwei Schlüsselidentitäten

Die Kombination zweier Galois-Identitäten eliminiert ξ vollständig aus der α -Formel.

Identität 1 (pruef_331, Dok. 317):

$$\xi = \frac{(r_\mu/r_e)^2}{|\text{GF}(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |\text{GF}(27)|} = \frac{144/25}{43200} = \frac{1}{7500} \quad (7)$$

Identität 2 (neue Beobachtung):

$$m_e \cdot m_\mu = 53,991 \text{ MeV}^2 \approx 54 = |\text{GF}(3)^*| \cdot |\text{GF}(27)| \text{ MeV}^2 \quad (\text{Abw. } 0,016 \%) \quad (8)$$

Dies gilt für die experimentellen (fraktal korrigierten) Massen; bare Massen ergeben $0,505 \times 104,96 = 53,00 \text{ MeV}^2$ (Abw. 1,85 %).

Herleitung — $|\text{GF}(27)|$ kürzt sich heraus

Einsetzen beider Identitäten in $\alpha = \xi \cdot E_0^2 / K_{\text{frak}}$:

$$\begin{aligned}\alpha &= \frac{1}{7500} \cdot 54 \text{ MeV}^2 / K_{\text{frak}} \\ &= \frac{|\text{GF}(3)^*| \cdot |\text{GF}(27)|}{|\text{GF}(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |\text{GF}(27)|} \cdot \frac{12^2}{5^2} / K_{\text{frak}} \\ &= \frac{|\text{GF}(3)^*| \cdot 12^2}{5^2 \cdot |\text{GF}(9)^*|^2 \cdot 5^2} \cdot \frac{1}{K_{\text{frak}}} = \frac{2 \cdot 144}{40000} \cdot \frac{75}{74} = \frac{27}{3700}\end{aligned}\quad (9)$$

$|\text{GF}(27)| = 27$ kürzt sich zwischen Zähler und Nenner heraus.

Ergebnis

$$\frac{1}{\alpha} = \frac{3700}{27} = 137,037037 \dots \quad (\text{exp: } 137,035999, \text{ Abw. } 0,00076 \% = 7,6 \text{ ppm}) \quad (10)$$

Alle Eingänge sind Galois-Gruppenordnungen:

- $2 = |\text{GF}(3)^*|$, $8 = |\text{GF}(9)^*|$, $27 = |\text{GF}(27)|$, $5 = \text{neuer Primteiler}(|\text{GF}(81)^*|)$
- $12 = n_{\phi, \mu} \cdot n_{\theta, e} = 4 \cdot 3$ (Wicklungszahlen, Galois)
- $K_{\text{frak}} = 74/75$, $74 = 2 \cdot 37$, $37 \mid |\text{GF}(3^{18})^*|$ (Galois)

Kein ξ , kein v , kein m_e als expliziter Eingang. Einzige SI-Brücke: die MeV-Einheit (implizit in $E_0^2 = 54 \text{ MeV}^2$). Die Übereinstimmung mit dem gemessenen α ist damit eine Eigenschaft des Ankers $E_0^2 = 54 \text{ MeV}^2$, keine unabhängige Vorhersage.

Tabelle 7: Präzisionsvergleich: Galois-Ergebnisse vs. Experiment

Größe	Galois-Ergebnis	Abw. vom Exp.
$(m_\mu/m_e)^2 = 43200$	43200 (exakt)	+1,04% (bare)
$m_\mu/m_e = 120\sqrt{3}$	207,846	+0,52% (bare)
$1/\alpha = 3700/27$	137,037	0,00076% (7,6 ppm)

Die α -Formel ist ~ 700 -mal präziser als das bare Massenverhältnis, weil die Identität $m_e m_\mu = 54 \text{ MeV}^2$ für die experimentell gemessenen (fraktal korrigierten) Massen gilt.

Die Identität $m_e \cdot m_\mu \approx 54 \text{ MeV}^2$ ist keine empirische Koinzidenz. Dok. 011 leitet $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu}$ als logarithmisches Mittel auf der T0-Torus-Geometrie her; fraktal korrigiert ist $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}} = 7,398 \text{ MeV}$ (R72). Die Identifikation mit $|\text{GF}(3)^*| \cdot |\text{GF}(27)|$ ist ein neuer Galois-seitiger Ausdruck derselben Größe **[K]**. Prüfskript: `pruef_332_alpha_galois.py`.

Prüfskripte

- `pruef_330_galois_massenverhaeltnis.py`: $(m_\mu/m_e)^2 = 43200$ (FFGFT = Galois), K_{frak} -Gegenprobe
- `pruef_331_xi_aus_galois.py`: $\xi = 4/30000$ vollständig aus $\text{GF}(3^n)$ hergeleitet

Vermerk zur Verwendung von KI-Assistenz

Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von Claude (Anthropic, A-Serie) erstellt. Alle algebraischen Rechnungen wurden durch Python-Prüfskripte mit exakter rationaler Arithmetik (sympy) verifiziert. Die physikalischen Interpretationen und Schlussfolgerungen stammen von Johann Pascher (ORCID 0009-0000-6518-4064).

Literaturverzeichnis

- [1] J. Pascher, *Dok. 006: Teilchenmassen in FFGFT*, FFGFT-Korpus, ORCID 0009-0000-6518-4064. <https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality>
- [2] J. Pascher, *Dok. 070: Mathematische Struktur der T0-Theorie*, FFGFT-Korpus.
- [3] J. Pascher, *Dok. 317: KSAU-FFGFT-Leptonen-Synthese*, FFGFT-Korpus, August 2026.
- [4] J. Pascher, *pruef_330: Galois-Massenverhältnis m_μ/m_e* , FFGFT-Korpus, August 2026.
- [5] J. Pascher, *pruef_331: ξ aus Galois-Körpern*, FFGFT-Korpus, August 2026.
- [6] Particle Data Group, *Review of Particle Physics*, Phys. Rev. D **110** (2024).