

T0-QAT: ξ -Aware Quantization-Aware Training

Inhaltsverzeichnis

.1	Einleitung	1
.2	Theoretische Grundlagen	1
	T0 Zeit-Masse-Dualitätstheorie	1
	Implikationen für AI Quantization	1
.3	Experimenteller Aufbau	2
	Methodik	2
	Datensatz und Architektur	2
.4	Ergebnisse und Analyse	2
	Quantitative Ergebnisse	2
	Interpretation	2
.5	Implementierung	2
	Kernalgorithmus	2
	Vollständiger Experimenteller Code	3
.6	Diskussion	4
	Theoretische Implikationen	4
	Praktische Anwendungen	4
0.1	Theoretische Herleitungen	5

Abstract

Dieses Dokument stellt eine experimentelle Erprobung von ξ -bewusstem Quantization-aware Training vor, wobei $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ aus den physikalischen Grundprinzipien der T0-Theorie (Zeit-Masse-Dualität) hergeleitet ist. Die vorläufigen Ergebnisse zeigen einen relativ geringeren Leistungsabfall unter Quantisierungsrauschen als der Standardansatz, bei absolut höherem Fehler; die Rauschamplitude enthält zusätzlich einen datensatzspezifischen Skalierungsfaktor.

.1 Einleitung

Quantization-aware training (QAT) hat sich als entscheidende Technik für das Deployment von neuronalen Netzen auf ressourcenbeschränkten Geräten etabliert. Allerdings basieren aktuelle Ansätze oft auf empirischen Rausch-Injektionsstrategien ohne theoretische Grundlage. Diese Arbeit führt ξ -aware QAT ein, basierend auf der T0 Zeit-Masse-Dualitätstheorie, die eine fundamentale physikalische Konstante ξ bereitstellt, die numerische Präzisionsgrenzen natürlich regularisiert.

.2 Theoretische Grundlagen

T0 Zeit-Masse-Dualitätstheorie

Der Parameter $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ ist keine empirische Optimierung, sondern leitet sich aus ersten Prinzipien der T0-Theorie der Zeit-Masse-Dualität ab. Diese fundamentale Konstante repräsentiert den minimalen Rauschpegel, der physikalischen Systemen inhärent ist, und bietet eine natürliche Regularisierungsgrenze für numerische Präzisionslimits.

Die vollständige theoretische Herleitung ist im T0 Theory GitHub Repository verfügbar¹, einschließlich:

- Mathematische Formulierung der Zeit-Masse-Dualität
- Herleitung fundamentaler Konstanten
- Physikalische Interpretation von ξ als Quantenrauschgrenze

Implikationen für AI Quantization

Im Kontext der Neural Network Quantization repräsentiert ξ die fundamentale Präzisionsgrenze, unterhalb derer weitere Bit-Reduzierung aufgrund physikalischer Rauschbeschränkungen abnehmende Erträge liefert. Durch die Einbeziehung dieser physikalischen Konstante während des Trainings lernen Modelle, optimal innerhalb dieser natürlichen Präzisionsgrenzen zu operieren.

.3 Experimenteller Aufbau

Methodik

Wir entwickelten ein vergleichendes Framework zur Evaluierung von ξ -aware Training gegenüber standard Quantization-aware Ansätzen. Das experimentelle Design besteht aus:

- **Baseline:** Standard QAT mit empirischer Rausch-Injektion
- **T0-QAT:** ξ -aware Training mit physikalisch-informiertem Rauschen
- **Evaluation:** Quantisierungsrobustheit unter simulierter Präzisionsreduktion

Datensatz und Architektur

Für die initiale Validierung verwendeten wir eine synthetische Regressionsaufgabe mit einer einfachen neuronalen Architektur:

- **Datensatz:** 1000 Samples, 10 Features, synthetisches Regressionsziel
- **Architektur:** Einzelne lineare Schicht mit Bias
- **Training:** 300 Epochen, Adam Optimizer, MSE Loss

.4 Ergebnisse und Analyse

Quantitative Ergebnisse

Interpretation

Die experimentellen Ergebnisse demonstrieren:

¹

Methode	Volle Präzision	Quantisiert	Drop
Standard QAT	0,318700	3,254614	2,935914
T0-QAT (ξ -aware)	9,501066	10,936824	1,435758

Tabelle 1: Leistungsvergleich unter Quantisierungsrauschen

- **Relativ geringerer Drop:** T0-QAT zeigt eine um 51 % kleinere Leistungsver schlechterung durch die Quantisierung (1,44 statt 2,94)
- **Absolut höherer Fehler:** In beiden Spalten liegt der Fehler von T0-QAT über dem Standardansatz (9,50 statt 0,32 in voller Präzision, 10,94 statt 3,25 quantisiert, Faktor 3,4)
- **Rauschresilienz:** Mit ξ -aware Rauschen trainierte Modelle reagieren weniger empfindlich auf Präzisionsvariationen in niedrigeren Bits
- **Rolle von ξ :** Die eingesetzte Rauschamplitude ist $\xi \cdot 80000 = 10,67$; der Skalierungsfaktor 80000 ist datensatzspezifisch gewählt, ξ legt die Amplitude also nicht allein fest

.5 Implementierung

Kernalgorithmus

Der T0-QAT Ansatz modifiziert Standard-Training durch Injektion von physikalisch-informiertem Rauschen während des Forward Pass:

```
# Fundamentale Konstante aus T0 Theorie
xi = 4.0/3 * 1e-4

def forward_with_xi_noise(model, x):
    weight = model.fc.weight
    bias = model.fc.bias

    # Physikalisch-informierte Rausch-Injektion
    noise_w = xi * xi_scaling * torch.randn_like(weight)
    noise_b = xi * xi_scaling * torch.randn_like(bias)

    noisy_w = weight + noise_w
    noisy_b = bias + noise_b

    return F.linear(x, noisy_w, noisy_b)
```

Vollständiger Experimenteller Code

```
import torch
import torch.nn as nn
import torch.optim as optim
import torch.nn.functional as F

# xi aus T0-Theorie (Zeit-Masse-Dualität)
xi = 4.0/3 * 1e-4
```

```

class SimpleNet(nn.Module):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.fc = nn.Linear(10, 1, bias=True)

    def forward(self, x, noisy_weight=None, noisy_bias=None):
        if noisy_weight is None:
            return self.fc(x)
        else:
            return F.linear(x, noisy_weight, noisy_bias)

# T0-QAT Training Loop
def train_t0_qat(model, x, y, epochs=300):
    optimizer = optim.Adam(model.parameters(), lr=0.005)
    xi_scaling = 80000.0 # Datensatz-spezifische Skalierung

    for epoch in range(epochs):
        optimizer.zero_grad()
        weight = model.fc.weight
        bias = model.fc.bias

        # Physikalisch-informierte Rausch-Injektion
        noise_w = xi * xi_scaling * torch.randn_like(weight)
        noise_b = xi * xi_scaling * torch.randn_like(bias)
        noisy_w = weight + noise_w
        noisy_b = bias + noise_b

        pred = model(x, noisy_w, noisy_b)
        loss = F.mse_loss(pred, y)
        loss.backward()
        optimizer.step()

    return model

```

.6 Diskussion

Theoretische Implikationen

Der relativ geringere Drop von T0-QAT ist ein Anlass zu prüfen, ob physikalische Prinzipien AI-Optimierungsstrategien informieren können; ein Beleg ist er bei absolut höherem Fehler und frei gewähltem Skalierungsfaktor noch nicht. Die ξ -Konstante könnte bieten:

- **Prinzipielle Regularisierung:** Physikalisch-basierte Alternative zu empirischen Methoden
- **Optimale Präzisionsgrenzen:** Natürliche Limits für Quantisierungs-Bit-Breiten
- **Cross-Domain Validierung:** Verbindung zwischen physikalischen Theorien und AI-Effizienz

Praktische Anwendungen

- **Low-Precision Inference:** INT4/INT3/INT2 Deployment (noch nicht getestet)

- **Edge AI:** Ressourcenbeschränktes Model Deployment
- **Quantum-Classical Interface:** Brückenschlag zwischen Quantenrauschmodellen und klassischer AI

Reproduzierbarkeit

Vollständiger Code, experimentelle Daten und theoretische Herleitungen sind in den assoziierten GitHub Repositories verfügbar:

- **Theoretische Grundlage:**

Literaturverzeichnis

- [1] Pascher, J. *T0 Time-Mass Duality Theory*. GitHub Repository, 2025.
- [2] Jacob, B. et al. *Quantization and Training of Neural Networks for Efficient Integer-Arithmetic-Only Inference*. CVPR, 2018.
- [3] Carleo, G. et al. *Machine learning and the physical sciences*. Reviews of Modern Physics, 2019.

0.1 Theoretische Herleitungen

Vollständige mathematische Herleitungen der ξ -Konstante und T0 Zeit-Masse-Dualitätstheorie werden im dedizierten Repository gepflegt. Dies beinhaltet:

- Herleitung fundamentaler Gleichungen
- Konstanten-Berechnungen
- Physikalische Interpretationen
- Mathematische Beweise