

T0-Theorie vs Bells Theorem:

Inhaltsverzeichnis

.1	Einführung: Die fundamentale Herausforderung	1
	Die Landschaft der No-Go-Theoreme	1
	Die T0-Herausforderung	1
.2	Bellsches Theorem: Mathematische Grundlagen	2
	CHSH-Ungleichung	2
	Annahmen des Bellschen Theorems	2
	Quantenmechanische Verletzung	2
.3	T0-Antwort auf Bells Theorem	3
	T0-Bell-Zustand-Darstellung	3
	T0-Korrelationsformel	3
	T0-Erweiterte Bell-Ungleichung	3
.4	T0s Umgehungsstrategie: Verletzung der Messfreiheit	4
	Die Schlüsseleinsicht: Räumlich ausgedehnte Energiefelder	4
	Mathematische Formulierung	4
	Superdeterminismus	4
	Experimentelle Konsequenzen	5
.5	Kochen-Specker-Theorem	5
	Das Kontextualitätsproblem	5
	T0-Antwort: Energiefeld-Kontextualität	5
	Mathematisches Rahmenwerk	5
.6	Andere No-Go-Theoreme	6
	PBR-Theorem (Pusey-Barrett-Rudolph)	6
	Hardys Theorem	6
	GHZ-Theorem	6
.7	Kritische Bewertung	6
	Stärken des T0-Ansatzes	6
	Schwächen und Kritik	7
	Experimentelle Tests	7
.8	Philosophische Implikationen	7
	Der Preis der superdeterministischen Lesart	7
	Superdeterminismus und freier Wille	8
.9	Schlussfolgerung: Eine tragfähige Alternative?	8
	Theoretische Durchführbarkeit	8
	Experimentelle Auflösung	8

Abstract

Dieses Dokument präsentiert eine umfassende theoretische Analyse, wie die T0-Energiefeld-Formulierung fundamentale No-Go-Theoreme der Quantenmechanik konfrontiert und möglicherweise umgeht, insbesondere das Bellsche Theorem und das Kochen-Specker-Theorem. Wir zeigen, dass die T0-Theorie eine ausgeklügelte Strategie basierend auf Superdeterminismus und der Verletzung von Messfreiheits-Annahmen verwendet, um quantenmechanische Korrelationen zu reproduzieren. Lokalen Realismus im Sinne Bells stellt T0 damit nicht wieder her: Die ξ -Korrektur ändert CHSH nur in der Größenordnung 10^{-4} , sie stellt keine lokale Schranke her, und die Bell-Verletzung bleibt erhalten. Durch detaillierte mathematische Analyse zeigen wir, dass T0 die Bellschen Ungleichungen durch räumlich ausgedehnte Energiefeld-Korrelationen verletzen kann, die Messapparatur-Orientierungen mit Quantensystem-Eigenschaften koppeln. Obwohl dieser Ansatz mathematisch konsistent ist und unterscheidbare Vorhersagen bietet, deren ξ -Signatur mit heutiger Hardware allerdings nicht auflösbar ist, hat er philosophische Kosten durch die Einschränkung der Messfreiheit und die Einführung kontroverseller superdeterministischer Elemente. Die Analyse enthüllt sowohl die theoretische Eleganz als auch die konzeptionellen Herausforderungen der superdeterministischen Lesart.

.1 Einführung: Die fundamentale Herausforderung

Die Landschaft der No-Go-Theoreme

Die Quantenmechanik sieht sich mehreren fundamentalen No-Go-Theoremen gegenüber, die mögliche Interpretationen einschränken:

1. **Bellsches Theorem (1964)**: Keine lokal realistische Theorie kann alle quantenmechanischen Vorhersagen reproduzieren
2. **Kochen-Specker-Theorem (1967)**: Quantenbeobachtungen können keine simultanen definiten Werte haben
3. **PBR-Theorem (2012)**: Quantenzustände sind ontologisch, nicht nur epistemologisch
4. **Hardys Theorem (1993)**: Quantennichtlokalität ohne Ungleichungen

Die T0-Herausforderung

Die T0-Energiefeld-Formulierung macht scheinbar widersprüchliche Behauptungen:

T0-Behauptungen vs No-Go-Theoreme

T0-Behauptungen:

- Lokale deterministische Dynamik: $\partial^2 E(x, t) = 0$
- Realistische Energiefelder: $E(x, t)(x, t)$ existieren unabhängig
- Perfekte QM-Reproduktion: Identische Vorhersagen für alle Experimente

No-Go-Theoreme: Eine solche Theorie ist unmöglich!

Frage: Wie umgeht T0 diese fundamentalen Beschränkungen?

Dieses Dokument bietet eine umfassende Analyse von T0s Strategie zur Bewältigung von No-Go-Theoremen und bewertet ihre theoretische Durchführbarkeit.

.2 Bellsches Theorem: Mathematische Grundlagen

CHSH-Ungleichung

Die Clauser-Horne-Shimony-Holt (CHSH) Form der Bellschen Ungleichung bietet den allgemeinsten Test:

$$S = E(a, b) - E(a, b') + E(a', b) + E(a', b') \leq 2 \quad (1)$$

wobei $E(a, b)$ die Korrelation zwischen Messungen in Richtungen a und b darstellt.

Annahmen des Bellschen Theorems

Bells Beweis beruht auf drei Schlüsselannahmen:

1. **Lokalität:** Keine überlichtschnellen Einflüsse
2. **Realismus:** Eigenschaften existieren vor der Messung
3. **Messfreiheit:** Freie Wahl der Messeinstellungen

Bells Schlussfolgerung: Jede Theorie, die alle drei Annahmen erfüllt, muss $|S| \leq 2$ erfüllen.

Quantenmechanische Verletzung

Für den Bell-Zustand $|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)$:

$$E_{QM}(a, b) = -\cos(\theta_{ab}) \quad (2)$$

wobei θ_{ab} der Winkel zwischen Messrichtungen ist.

Gewählte Messwinkel: $a = 0^\circ$, $a' = 45^\circ$, $b = 22,5^\circ$, $b' = 67,5^\circ$

$$E(a, b) = -\cos(22,5^\circ) = -0,9239 \quad (3)$$

$$E(a, b') = -\cos(67,5^\circ) = -0,3827 \quad (4)$$

$$E(a', b) = -\cos(22,5^\circ) = -0,9239 \quad (5)$$

$$E(a', b') = -\cos(67,5^\circ) = -0,3827 \quad (6)$$

$$S_{QM} = -0,9239 - (-0,3827) + (-0,9239) + (-0,3827) = -2,389 \quad (7)$$

Bell-Verletzung: $|S_{QM}| = 2,389 > 2$

Diese Winkel sind nicht optimal: Mit $a = 0^\circ$, $a' = 90^\circ$, $b = 45^\circ$, $b' = 135^\circ$ folgt $|S_{QM}| = 2\sqrt{2} = 2,828$ (Tsirelson-Grenze). 2,389 ist daher keine quantenmechanische Grenze; Experimente erreichen $S \approx 2,7-2,8$.

.3 T0-Antwort auf Bells Theorem

T0-Bell-Zustand-Darstellung

In der T0-Formulierung wird der Bell-Zustand zu:

$$\text{Standard: } |\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle) \quad (8)$$

$$\text{T0: } \{E(x, t)_{\uparrow\downarrow} = 0,5, E(x, t)_{\downarrow\uparrow} = -0,5, E(x, t)_{\uparrow\uparrow} = 0, E(x, t)_{\downarrow\downarrow} = 0\} \quad (9)$$

T0-Korrelationsformel

T0-Korrelationen entstehen aus Energiefeld-Wechselwirkungen:

$$E_{T0}(a, b) = \frac{\langle E(x, t)_1(a) \cdot E(x, t)_2(b) \rangle}{\langle |E(x, t)_1| \rangle \langle |E(x, t)_2| \rangle} \quad (10)$$

Mit ξ -Parameter-Korrekturen:

$$E_{T0}(a, b) = E_{QM}(a, b) \times (1 + \xi \cdot f_{corr}(a, b)) \quad (11)$$

wobei $\xi = 1,33 \times 10^{-4}$ und f_{corr} die Korrelationsstruktur darstellt.

T0-Erweiterte Bell-Ungleichung

Die ursprünglichen T0-Dokumente schlagen eine modifizierte Bell-Ungleichung vor:

$$|E(a, b) - E(a, c)| + |E(a', b) + E(a', c)| \leq 2 + \varepsilon_{T0} \quad (12)$$

wobei der T0-Korrekturterm ist:

$$\varepsilon_{T0} = \xi \cdot \left| \frac{E_1 - E_2}{E_1 + E_2} \right| \cdot \frac{2G\langle E \rangle}{r_{12}} \quad (13)$$

Numerische Auswertung: Für typische atomare Systeme mit $r_{12} \sim 1 \text{ m}$, $\langle E \rangle \sim 1 \text{ eV}$:

$$\varepsilon_{T0} \approx 1,33 \times 10^{-4} \times 1 \times \frac{2 \times 6,7 \times 10^{-11} \times 1,6 \times 10^{-19}}{1} \approx 2,85 \times 10^{-33} \quad (14)$$

Dieser Wert ist das bloße Zahlenprodukt in SI-Einheiten: $2G\langle E \rangle/r_{12}$ ist in SI nicht dimensionslos, dimensionslos wird der Ausdruck erst mit $1/c^4$, und dann ist $\varepsilon_{T0} \approx 3,5 \times 10^{-67}$.

Problem: Diese Korrektur ist experimentell unmessbar!

Alternative Interpretation: Direkte ξ -Korrekturen ohne Gravitationsunterdrückung:

$$\varepsilon_{T0,direkt} = \xi = 1,33 \times 10^{-4} \quad (15)$$

Dies ergibt für die oben gewählten Winkel:

$$|S_{T0}| = 2,389 + 1,33 \times 10^{-4} = 2,389133 \quad (16)$$

T0-Vorhersage: Ein Überschuss von 133 ppm gegenüber der QM-Vorhersage für dieselben Winkel. Eine Abweichung dieser Größe liegt weit unter dem Messrauschen heutiger Bell-Tests und ist mit heutiger Hardware nicht prüfbar. Lokalen Realismus stellt sie nicht her: Sie bildet keine lokale Schranke, die Bell-Verletzung bleibt erhalten.

Die quantenmechanische Grenze überschreitet dies nicht: Da sie $2\sqrt{2} = 2,828$ beträgt, liegt $|S_{T0}| = 2,389133$ darunter.

Kritische Frage

Wie kann eine lokal deterministische Theorie Bells Ungleichung verletzen?

Dieser scheinbare Widerspruch erfordert eine sorgfältige Analyse der Annahmen von Bells Theorem.

.4 T0s Umgehungsstrategie: Verletzung der Messfreiheit

Die Schlüsseleinsicht: Räumlich ausgedehnte Energiefelder

T0s Lösung beruht auf einer subtilen Verletzung von Bells Messfreiheits-Annahme:

$$E(x,t)(x,t) = E(x,t)_{\text{intrinsisch}}(x,t) + E(x,t)_{\text{Apparatur}}(x,t) \quad (17)$$

Physikalisches Bild:

- Energiefelder $E(x,t)(x,t)$ sind räumlich ausgedehnt
- Messapparatur an Ort A beeinflusst $E(x,t)(x,t)$ im gesamten Raum
- Dies schafft Korrelationen zwischen Apparatur-Einstellungen und entfernten Messungen
- Die Korrelation ist lokal in der Felddynamik, erscheint aber nichtlokal in den Ergebnissen

Mathematische Formulierung

Die T0-Korrelation schließt apparatur-abhängige Terme ein:

$$E_{T0}(a,b) = E_{\text{intrinsisch}}(a,b) + E_{\text{Apparatur}}(a,b) + E_{\text{Kreuz}}(a,b) \quad (18)$$

wobei:

- $E_{\text{intrinsisch}}$: Direkte Teilchen-Teilchen-Korrelation
- $E_{\text{Apparatur}}$: Apparatur-Teilchen-Korrelationen
- E_{Kreuz} : Kreuzkorrelationen zwischen Apparatur und Teilchen

Superdeterminismus

T0 implementiert eine Form des Superdeterminismus:

T0-Superdeterminismus

Definition: Die Wahl der Messeinstellungen a und b ist nicht wirklich frei, sondern mit den Anfangsbedingungen des Quantensystems durch Energiefeld-Dynamik korreliert.

Mechanismus: Räumlich ausgedehnte Energiefelder schaffen subtile Korrelationen zwischen:

- Experimentators Wahl der Messrichtung
- Quantensystem-Eigenschaften
- Messapparatur-Konfiguration

Ergebnis: Bells Messfreiheits-Annahme wird verletzt

Experimentelle Konsequenzen

T0-Superdeterminismus macht spezifische Vorhersagen:

1. **Messrichtungs-Korrelationen:** Statistische Verzerrung in zufälligen Messwahlen
2. **Räumliche Energiestruktur:** Ausgedehnte Feldmuster um Messapparatur
3. **ξ -Korrekturen:** 133 ppm systematische Abweichungen in Korrelationen
4. **Apparatur-abhängige Effekte:** Messergebnisse hängen von Apparatur-Geschichte ab

.5 Kochen-Specker-Theorem

Das Kontextualitätsproblem

Das Kochen-Specker-Theorem besagt, dass Quantenbeobachtungen keine simultanen definiten Werte unabhängig vom Messkontext haben können.

Klassisches Beispiel: Spin-Messungen in orthogonalen Richtungen

$$\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + \sigma_z^2 = 3 \quad (\text{wenn alle simultan definit}) \quad (19)$$

$$\langle \sigma_x^2 \rangle + \langle \sigma_y^2 \rangle + \langle \sigma_z^2 \rangle = 3 \quad (\text{Quantenvorhersage}) \quad (20)$$

$$\text{Aber individuelle Werte sind kontextabhängig!} \quad (21)$$

T0-Antwort: Energiefeld-Kontextualität

T0 behandelt Kontextualität durch messinduzierte Feldmodifikationen:

$$E(x, t)_{\text{gemessen}, x} = E(x, t)_{\text{intrinsisch}, x} + \Delta E(x, t)_x(\text{Apparatur-Zustand}) \quad (22)$$

Schlüsseleinsicht:

- Alle Energiefeld-Komponenten $E(x, t)_x, E(x, t)_y, E(x, t)_z$ existieren simultan
- Messung in Richtung x modifiziert $E(x, t)_y$ und $E(x, t)_z$ durch Apparatur-Wechselwirkung
- Kontextabhängigkeit entsteht aus Mess-Apparatur-Feld-Kopplung
- Verborgene Variablen sind die vollständige Energiefeld-Konfiguration $\{E(x, t)(x, t)\}$

Mathematisches Rahmenwerk

$$\frac{\partial E(x, t)_i}{\partial t} = f_i(\{E(x, t)_j\}, \{\text{Apparatur}_k\}) \quad (23)$$

Die Evolution jeder Feldkomponente hängt ab von:

- Allen anderen Feldkomponenten (Quantenkorrelationen)
- Allen Messapparatur-Konfigurationen (Kontextualität)
- Räumlicher Feldstruktur (nichtlokale Korrelationen)

.6 Andere No-Go-Theoreme

PBR-Theorem (Pusey-Barrett-Rudolph)

PBR-Behauptung: Quantenzustände müssen ontologisch real sein, nicht nur epistemologisch.

T0-Antwort: Perfekte Kompatibilität

- Energiefelder $E(x, t)(x, t)$ sind ontologisch real
- Quantenzustände entsprechen Energiefeld-Konfigurationen
- Keine epistemologische Interpretation nötig

Hardys Theorem

Hardys Behauptung: Quantennichtlokalität kann ohne Ungleichungen demonstriert werden.

T0-Antwort: Energiefeld-Korrelationen können Hardys paradoxe Situationen durch räumlich ausgedehnte Felddynamik reproduzieren.

GHZ-Theorem

GHZ-Behauptung: Drei-Teilchen-Korrelationen bieten perfekte Demonstration der Quantennichtlokalität.

T0-Antwort: Drei-Teilchen-Energiefeld-Konfigurationen mit ausgedehnten Korrelationsstrukturen.

.7 Kritische Bewertung

Stärken des T0-Ansatzes

1. **Unterscheidbare Vorhersagen:** Macht ****unterschiedliche**** testbare Vorhersagen von Standard-QM
2. **Konkrete Mechanismen:** Bietet spezifische Energiefeld-Dynamik
3. **Mehrere testbare Signaturen:**
 - Verstärkte Bell-Verletzung (133 ppm Überschuss gegenüber der QM-Vorhersage für diesen Winkel, unterhalb der Tsirelson-Grenze $2\sqrt{2}$)
 - Perfekte Quantenalgorithmus-Wiederholbarkeit
 - Räumliche Energiefeld-Struktur
 - Deterministische Einzelmessungs-Vorhersagen
4. **Theoretische Eleganz:** Vereinheitlichtes Rahmenwerk für alle Quantenphänomene
5. **Interpretative Klarheit:** Eliminiert Messproblem und Wellenfunktions-Kollaps
6. **Quantencomputing-Vorteile:** Deterministische Algorithmen mit perfekter Vorhersagbarkeit
7. **Falsifizierbarkeit:** Klare experimentelle Kriterien für Widerlegung

Schwächen und Kritik

1. **Superdeterminismus-Kontroverse:** Von den meisten Physikern als unplausibel betrachtet
2. **Messfreiheits-Verletzung:** Stellt fundamentale experimentelle Methodik in Frage
3. **Mathematische Entwicklung:** Energiefeld-Dynamik nicht vollständig entwickelt
4. **Relativistische Kompatibilität:** Unklar, wie T0 sich mit spezieller Relativitätstheorie integriert
5. **Hohe Präzisionsanforderungen:** 133 ppm liegen weit unter dem Messrauschen heutiger Bell-Tests; mit heutiger Hardware nicht prüfbar
6. **Falsifikationsrisiko:** ****T0-Vorhersagen könnten experimentell widerlegt werden****
7. **Philosophische Kosten:** Eliminiert Messfreiheit und wahre Zufälligkeit

Test	Standard QM	T0-Vorhersage
Bell-Korrelationen	Verletzen Ungleichungen	Verstärkte Verletzung + ξ
Erweiterte Bell-Ungleichung	$ S \leq 2$	$ S \leq 2 + 1,33 \times 10^{-4}$
Algorithmus-Wiederholbarkeit	Statistische Variation	Perfekte Wiederholbarkeit
Einzelmessungen	Probabilistische Ergebnisse	Deterministische Vorhersagen
Räumliche Struktur	Punktartig	Ausgedehnte $E(x,t)$ Muster
Mess-Zufälligkeit	Wahre Zufälligkeit	Subtile Korrelationen
Räumliche Feldstruktur	Punktartig	Ausgedehnte Muster
Apparatur-Abhängigkeit	Minimal	Systematische Effekte
Superdeterminismus	Keine Belege	Statistische Verzerrungen

Tabelle 1: Experimentelle Unterscheidung zwischen Standard-QM und T0

Experimentelle Tests

.8 Philosophische Implikationen

Der Preis der superdeterministischen Lesart

Die superdeterministische Lesart von T0 kommt mit erheblichen philosophischen Kosten, ohne lokalen Realismus wiederherzustellen: Die ξ -Korrektur stellt keine lokale Schranke her, die Bell-Verletzung bleibt erhalten.

Philosophische Abwägungen

Gewonnen:

- Deterministische Physik
- Klare Ontologie (Energiefelder)
- Kein Messproblem

Verloren:

- Traditionelle Messinterpretation
- Scheinbare fundamentale Zufälligkeit
- Einfache nicht-kontextuelle Lokalität
- Einige aktuelle experimentelle Methodiken

Superdeterminismus und freier Wille

T0s Superdeterminismus hat bedeutende Implikationen:

- Experimentelle Wahlentscheidungen zeigen subtile Korrelationen mit Quantensystemen
- Anfangsbedingungen des Universums beeinflussen alle Messergebnisse
- Zufallszahlengeneratoren zeigen systematische Muster
- Bell-Test-Schlupflöcher werden zu fundamentalen Eigenschaften anstatt Fehlern

.9 Schlussfolgerung: Eine tragfähige Alternative?

Theoretische Durchführbarkeit

T0 ist theoretisch durchführbar als ****echte Alternative**** (nicht Neuinterpretation) zur Standard-Quantenmechanik und bietet:

Vorteile:

- ****Unterscheidbare testbare Vorhersagen**** die sich von QM unterscheiden
- ****Deterministisches Quantencomputing**** mit perfekter algorithmischer Äquivalenz
- ****Verstärkte Bell-Verletzung**** um 133 ppm gegenüber der QM-Vorhersage für dieselben Winkel (unterhalb der Tsirelson-Grenze $2\sqrt{2}$)
- ****Perfekte Wiederholbarkeit**** in Quantenmessungen
- ****Räumliche Energiefeld-Struktur**** die über Punktteilchen hinausreicht
- ****Einzelmessungs-Vorhersagbarkeit**** für Quantenalgorithmen

Anforderungen:

- Akzeptanz von Superdeterminismus
- Verletzung der Messfreiheit
- Komplexe Energiefeld-Dynamik
- ****Falsifikationsrisiko****: negative Präzisionstests würden T0 widerlegen

Experimentelle Auflösung

Der entscheidende Test von T0 vs Standard-QM liegt in ****Präzisionsexperimenten**** mit ****klaren Unterscheidungskriterien****:

1. **Verstärkte Bell-Verletzungs-Tests**: Suche nach $|S| > 2,389$ bei den oben gewählten Winkeln (QM-Wert für diese Winkel, keine QM-Grenze)
 - Ziel-Präzision: 133 ppm oder besser
 - T0-Vorhersage: $|S| = 2,389133 \pm \text{Messfehler}$
 - Entscheidender Test: Jeder Überschuss gegenüber dem QM-Wert für dieselben Winkel unterstützt T0
2. **Quantenalgorithmus-Wiederholbarkeit**: 1000× identische Algorithmus-Ausführung
 - QM-Erwartung: Statistische Variation innerhalb Fehlergrenzen
 - T0-Vorhersage: Perfekte Wiederholbarkeit (Null-Varianz)
 - Algorithmen: Deutsch, Grover, Bell-Zustände, Shor
3. **Räumliche Energiefeld-Kartierung**: Erkennung ausgedehnter Feldstrukturen
 - QM-Erwartung: Punktartige Messereignisse
 - T0-Vorhersage: Räumlich ausgedehnte Energiemuster $E(x, t)$
 - Technologie: Hochauflösende Quanteninterferometrie
4. **Superdeterminismus-Signaturen**: Suche nach Messwahl-Korrelationen
 - QM-Erwartung: Wahre Zufälligkeit in Messeinstellungen
 - T0-Vorhersage: Subtile statistische Verzerrungen in zufälligen Wahlentscheidungen
 - Herausforderung: Erfordert sorgfältige statistische Analyse

Abschließende Bewertung

Die T0-Theorie bietet eine mathematisch konsistente, experimentell testbare Alternative zur Standard-Quantenmechanik, die No-Go-Theoreme durch ausgeklügelte superdeterministische Mechanismen umgeht.

Schlüsseleinsicht: T0 ist nicht nur eine Neuinterpretation, sondern macht unterscheidbare, falsifizierbare Vorhersagen, die sie definitiv von Standard-QM durch Präzisionsexperimente unterscheiden können.

Kritische Tests: Verstärkte Bell-Verletzung (133 ppm), perfekte Quantenalgorithmus-Wiederholbarkeit und räumliche Energiefeld-Kartierung bieten klare experimentelle Unterscheidungskriterien; die 133-ppm-Abweichung ist mit heutiger Hardware allerdings nicht auflösbar.

Urteil: Die Entscheidung zwischen T0 und Standard-QM beruht auf experimentellen Belegen, nicht auf theoretischen Vorlieben.

Lokalen Realismus stellt der T0-Ansatz nicht wieder her: Die ξ -Korrektur stellt keine lokale Schranke her, die Bell-Verletzung bleibt erhalten. Unter kontroversen superdeterministischen Annahmen bietet T0 konkrete Vorhersagen zur Debatte zwischen deterministischer und probabilistischer Quantenmechanik; ihre ξ -Signatur ist mit heutiger Hardware jedoch nicht auflösbar.

Literaturverzeichnis

- [1] Bell, J. S. (1964). On the Einstein Podolsky Rosen paradox. *Physics Physique Fizika*, 1(3), 195–200.
- [2] Kochen, S. and Specker, E. P. (1967). The problem of hidden variables in quantum mechanics. *Journal of Mathematics and Mechanics*, 17(1), 59–87.
- [3] Clauser, J. F. and Horne, M. A. (1974). Experimental consequences of objective local theories. *Physical Review D*, 10(2), 526–535.
- [4] Aspect, A., Dalibard, J., and Roger, G. (1982). Experimental test of Bell's inequalities using time-varying analyzers. *Physical Review Letters*, 49(25), 1804–1807.
- [5] Pusey, M. F., Barrett, J., and Rudolph, T. (2012). On the reality of the quantum state. *Nature Physics*, 8(6), 475–478.
- [6] Hardy, L. (1993). Nonlocality for two particles without inequalities for almost all entangled states. *Physical Review Letters*, 71(11), 1665–1668.
- [7] Greenberger, D. M., Horne, M. A., and Zeilinger, A. (1989). Going beyond Bell's theorem. *Bell's Theorem, Quantum Theory and Conceptions of the Universe*, 69–72.
- [8] Brans, C. H. (1988). Bell's theorem does not eliminate fully causal hidden variables. *International Journal of Theoretical Physics*, 27(2), 219–226.
- [9] 't Hooft, G. (2016). *The Cellular Automaton Interpretation of Quantum Mechanics*. Springer.
- [10] Palmer, T. N. (2020). The invariant set postulate: A new geometric framework for the foundations of quantum theory and the role played by gravity. *Proceedings of the Royal Society A*, 476(2243), 20200319.
- [11] T0 Theory Documentation. *Deterministic Quantum Mechanics via T0-Energy Field Formulation*.
- [12] T0 Theory Documentation. *Einfacher Lagrangian: Von Standardmodell-Komplexität zu einem einfachen T0-Lagrangian*.
- [13] Larsson, J. Å. (2014). Loopholes in Bell inequality tests of local realism. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 47(42), 424003.
- [14] Scheidl, T. et al. (2010). Violation of local realism with freedom of choice. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 107(46), 19708–19713.