

Quantencomputing im T0-Rahmenwerk:

Inhaltsverzeichnis

.1	Einführung	2
	Motivation und Kontext	2
	Hauptbeiträge	2
	Struktur	2
.2	T0-Rahmenwerk Grundlagen	2
	Kernprinzipien	2
	Energie-Feld-Qubits	3
	Geometrische Grundlage: Torus-Struktur und numerische Genauigkeit	3
	Modifizierte Quantengatter	6
.3	Haupttheoretische Ergebnisse	6
	ϕ -Hierarchische Quanten-Fourier-Transformation	6
	Periodenfindungskompatibilität	6
	Bell-verstärkte Peak-Detektion	7
	Hauptsatz	7
.4	Bell-Test-Modifikationen	8
	T0-Korrelationsfunktion	8
	CHSH-Ungleichungsmodifikation	9
	Experimentelle Vorhersagen	9
	Räumliche Korrelationsverzögerung	9
.5	Anwendung auf Shors Algorithmus	10
	Standard Shor-Algorithmus	10
	T0-Shor mit ϕ -QFT	11
	Komplexitätsanalyse	11
.6	Strukturelle Einordnung	11
.7	Experimentelle Validierung mit IBM Quantum Hardware	12
	Hardware-Tests an 73-Qubit- und 127-Qubit-Systemen	12
	Bell-Zustands-Treue-Tests	12
	CHSH-Parameter-Messungen	13
	Messaufbau	13
	Abweichung von der Tsirelson-Schranke	13
	Cross-Platform-Befund zur Messbarkeit von ξ	13
	73-Qubit-Bell-Test	14
	Satelliten-Bell-Test	14
.8	Implementierung und Ergebnisse	14
	Python-Implementierung	14
	Benchmark-Ergebnisse	15
	Code-Auszug: Ordnungssuche	15
.9	Diskussion	16
	Theoretische Implikationen	16
	Experimentelle Testbarkeit	16
	Einschränkungen und offene Fragen	16

.10	Schlussfolgerung	16
	Theoretische Errungenschaften	16
	Experimentelle Validierung	17
	Wesentliche Ergebnisse	17
	Kein hardware-angepasstes ξ	17
	Implikationen für Quantencomputing	17
	Falsifikationskriterien	18
	Abschließende Bemerkungen	18
.11	Kosmische Korrekturen für Quantencomputing	19
	Das faltige Torus-Universum und Qubits	19
	Implementierung kosmischer Korrekturen	19
	Experimentelle Tests	20
	Erwartete Verbesserungen	20
.12	Cosmic Corrections for Quantum Computing	20
	The Wrinkled Torus Universe and Qubits	20
	Implementation of Cosmic Corrections	20
	Experimental Tests	21
	Expected Improvements	21
0.1	Detaillierte Beweise	23
	Beweis von Lemma .3.2	23
	Beweis von Theorem .3.4	24
0.2	Implementierungsdetails	25
	Monte-Carlo-Simulation für Bell-Tests	25
	Komplexitätsanalyse von T0-Shor	26
	Python-Code-Auszüge	27
	Fehleranalyse und Robustheit	29
	Numerische Stabilität und Genauigkeit	29

Abstract

Wir untersuchen eine Formulierung der Quanten-Fourier-Transformation im Rahmen der T0 Zeit-Masse-Dualitätstheorie. Untersucht wird, ob die ϕ -hierarchische Variante (ϕ -QFT) für die Periodenfindung in Shors Algorithmus dieselbe Funktion erfüllt wie die Standard-QFT; der Beweis trägt in der vorliegenden Form nicht, und ein Vorteil gegenüber der Standard-QFT ist nicht nachgewiesen. Untersucht werden drei Mechanismen: (1) Energie-Feld-Superposition als deterministische Alternative zum probabilistischen Kollaps, (2) Korrelationsfelder als Beschreibung der Bell-Korrelationen, wobei die fraktale Dämpfung keine lokale Schranke herstellt und die Bell-Verletzung bestehen bleibt, und (3) fraktale Dämpfung, die Dekohärenz unterdrückt. Die Theorie macht präzise theoretische Vorhersagen; die zentrale ist eine CHSH-Abweichung der Größenordnung $\xi \sim 10^{-5}$ von der Tsirelson-Schranke. Hardware-Messungen (Mai 2026, IBM Heron r2) bestätigen klare Bell-Verletzung ($S = 2,74$, 96,9% der Tsirelson-Schranke) und die Lauffähigkeit von T0-Schaltkreisen; der ξ -Effekt selbst liegt jedoch weit unter dem gegenwärtigen NISQ-Rauschen und ist mit heutiger Hardware nicht auflösbar. Eine Python-Implementierung faktorisiert Benchmark-Zahlen bis $N = 143$ vollständig; dies ist ein Funktionsnachweis der Implementierung, kein Skalierungsbeleg. Der Befund ist damit zweiteilig: Die Bell-Verletzung ist bestätigt und die Schaltkreise sind lauffähig; die charakteristische ξ -Vorhersage ist mit gegenwärtiger Hardware nicht prüfbar.

.1 Einführung

Motivation und Kontext

Das Standard-Quantencomputing-Paradigma steht vor konzeptionellen Fragen. Die T0 Zeit-Masse-Dualitätstheorie [1], basierend auf der fundamentalen Relation $T(x, t) \cdot E(x, t) = 1$ und dem Geometrieparameter $\xi = \frac{4}{30000} \approx 1,333 \times 10^{-4}$, bietet eine alternative Perspektive. ξ ist dabei ein fester Strukturparameter – er wird nicht adaptiv optimiert. Resonanzstrukturen in der Periodenfindung beruhen auf Primzahlen als Generatoren, nicht auf ξ (Dok. 316, August 2026).

Hauptbeiträge

Diese Arbeit etabliert:

1. **Theoretische Äquivalenz:** Beweisansatz, dass ϕ -hierarchische QFT die Periodenfindung der Standard-QFT reproduziert (Theorem .3.4); in der vorliegenden Form trägt der Beweis nicht
2. **Bell-Korrekturen:** Mathematischer Rahmen für Bell-Test-Modifikationen mit vorhergesagten Abweichungen in Multi-Qubit-Systemen, die mit heutiger NISQ-Hardware nicht auflösbar sind (Abschnitt .4)
3. **Stabilitätsverbesserung:** Demonstration, dass ξ -Dämpfung natürliche Dekohärenzunterdrückung bietet (Korollar .3.5)
4. **Experimentelle Protokolle:** Detaillierte Vorhersagen für 73-Qubit-Bell-Tests, die erst mit fehlerkorrigierter Hardware prüfbar sind; der Ansatz einer räumlichen Korrelationsverzögerung für Satellitenexperimente ist keine Vorhersage der FFGFT (Abschnitt .4)
5. **Implementierung:** Vollständige algorithmische Implementierung mit verifizierter Leistung (Abschnitt .8)

Struktur

Abschnitt .2 fasst T0-Grundlagen zusammen. Abschnitt .3 präsentiert die zentralen theoretischen Ergebnisse. Abschnitt .4 entwickelt Bell-Test-Modifikationen. Abschnitt .5 wendet das Rahmenwerk auf Shors Algorithmus an. Abschnitt .4 detailliert experimentelle Vorhersagen. Abschnitt .8 beschreibt die Python-Implementierung.

.2 T0-Rahmenwerk Grundlagen

Kernprinzipien

Definition .2.1 (T0 Zeit-Masse-Dualität). Die fundamentale Relation der T0-Theorie ist:

$$T(x, t)(x, t) \cdot E(x, t)(x, t) = 1 \quad (1)$$

wobei $T(x, t)$ das dynamische Zeitfeld und $E(x, t)$ die Energiedichtefeld ist.

Definition .2.2 (Universelle Parameter). Das T0-Rahmenwerk ist charakterisiert durch:

$$\xi = \frac{4}{30000} \approx 1.333 \times 10^{-4} \quad (\text{Kopplungsstärke}) \quad (2)$$

$$\phi_{\text{par}} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.618 \quad (\text{goldener Schnitt}) \quad (3)$$

$$\Delta f = 3 - \xi \approx 2.9999 \quad (\text{fraktale Dimension}) \quad (4)$$

Energie-Feld-Qubits

Anders als Standard-Qubits, die als komplexe Vektoren $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ im Hilbertraum dargestellt werden, werden T0-Qubits durch Energie-Feld-Konfigurationen in Zylinderkoordinaten beschrieben.

Definition .2.3 (T0 Qubit). Ein T0-Qubit ist charakterisiert durch das Tripel (z, r, θ) wobei:

- $z \in [-1, 1]$: Projektion auf die Berechnungsbasisachse ($z = 1 \Leftrightarrow |0\rangle$)
- $r \in [0, 1]$: Superpositionsamplitude (radialer Abstand von der z-Achse)
- $\theta \in [0, 2\pi)$: Phase (Azimutwinkel)

mit Normalisierungsbedingung $z^2 + r^2 = 1$.

Bemerkung .2.4. Der entscheidende konzeptionelle Wechsel: r^2 ist *keine* Wahrscheinlichkeit, sondern repräsentiert *Energiedichte* des Superpositionszustands. Dies ermöglicht deterministische Evolution bei Beibehaltung quantenmechanischer Interferenz.

Geometrische Grundlage: Torus-Struktur und numerische Genauigkeit

Obwohl T0-Qubits aus Recheneffizienzgründen in Zylinderkoordinaten (z, r, θ) dargestellt werden, liegt die zugrundeliegende physikalische Struktur in einem **toroidalen Energie-Wirbel** mit fraktaler Dimension $\Delta f = 3 - \xi$.

Die zylindrische Darstellung ist eine **lokale Näherung**, die gültig ist, wenn der toroidale Hauptradius $R \gg r$ (Schlauchradius). Für $R \rightarrow \infty$ nähert sich der Torus lokal einem Zylinder an:

$$\text{Torus}(R \rightarrow \infty) \xrightarrow{\text{lokal}} \text{Zylinder}(z, r, \theta)$$

Für Quantensysteme auf Protonenskala ist das Seitenverhältnis enorm:

$$\frac{R}{r} \sim 2,5 \times 10^{18} \quad (\text{Protonenskala})$$

Dieses extreme Verhältnis macht die zylindrische Näherung **im Grenzfall exakt** bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung optimaler Recheneffizienz.

Genauigkeitsanalyse:

Umfassende numerische Simulationen, die zylindrische, toroidale und hybride Ansätze vergleichen, zeigen ausgezeichnete Übereinstimmung für große Seitenverhältnisse:

Tabelle 1: Vergleich des CHSH-Parameters: 73-Qubit-System

Methode	CHSH-Wert	Δ vs. IBM	Relativer Fehler (%)
Standard QM	2,828427	$8,84 \times 10^{-2}$	3,23
IBM gemessen (28. Mai 2026)	2,74	—	—
T0 Zylindrisch	2,827888	$8,79 \times 10^{-2}$	3,21
T0 Toroidal	2,827943	$8,79 \times 10^{-2}$	3,21
T0 Hybrid	2,828027	$8,80 \times 10^{-2}$	3,21

Alle Methoden liegen gleich weit ($\approx 3,2\%$) über dem Messwert $S = 2,74$ (Abschnitt .7); zwischen ihnen unterscheidet die Messung nicht.

Wichtigste Erkenntnisse:

- **Zylindrische Optimalität:** Für $R/r > 10^{12}$ liefern zylindrische Berechnungen optimale Genauigkeit mit $O(n^2)$ Rechenkomplexität

- **Konvergenz:** Alle physikalisch konsistenten Methoden konvergieren auf innerhalb von 0,02 Prozent für Protonen-Skalen-Verhältnisse
- **Recheneffizienz:** Die zylindrische Darstellung ermöglicht einen Geschwindigkeitsgewinn um einen Faktor n ($O(n^2)$ gegenüber $O(n^3)$) für Multi-Qubit-Systeme; das ist ein polynomialer, kein exponentieller Gewinn

Physikalische Implementierung:

Die toroidale Geometrie wird durch physikalisch konsistente Korrekturen implementiert, die fundamentale Grenzen respektieren:

1. **Nicht-singuläre Krümmung:** Exponentieller Korrekturfaktor

$$\alpha = \exp\left(-\frac{\xi}{\sqrt{R/r}}\right) \approx 1 \quad \text{für } R/r > 10^{12}$$

2. **Energieerhaltung:** Normierungsfaktor auf $[0,999, 1,001]$ begrenzt, was physikalische Konsistenz gewährleistet

3. **Fraktale Dimension:** Alle Korrekturen respektieren die $\Delta f = 3 - \xi$ -Randbedingung

Physikalische Implikationen:

Die zylindrische Näherung erfasst erfolgreich alle wesentlichen T0-Merkmale:

1. **Bell-Dämpfungserhaltung:** Der fraktale Dämpfungsfaktor $\exp(-\xi \ln(n)/\Delta f)$ entsteht aus der Torusgeometrie und wird in Zylinderkoordinaten exakt erhalten
2. **Ladungsquantisierung:** Die Quantisierung des elektrischen Flusses durch das Torusloch reduziert sich für $R/r \rightarrow \infty$ auf die Phasenquantisierung $\theta_k = 2\pi k/\phi_{\text{par}}^m$ in Zylinderkoordinaten
3. **Spin-Darstellung:** Windungszahlen (n_ϕ, n_θ) auf dem Torus werden bijektiv auf Spin-Zustände $|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle$ abgebildet
4. **Recheneffizienz:** $O(n^2)$ Quantengatter-Operationen gegenüber $O(n^3)$ für vollständige toroidale Berechnungen

Optimale Methodenauswahl nach Seitenverhältnis:

Tabelle 2: Empfohlener Ansatz nach Systemskala

Seitenverhältnis	Systemtyp	Optimale Methode	Genauigkeitsgewinn
$R/r < 10^6$	Makroskopische Ringe	Toroidal	Bis zu 85 Prozent
$10^6 \leq R/r \leq 10^{12}$	Mesoskopisch	Hybrid	~0,1 Prozent
$R/r > 10^{12}$	Atomar/Protonen	Zylindrisch	—

Übergang zum Quantencomputing:

Für die praktische Implementierung von Quantenalgorithmen auf atomarer Skala ($R/r > 10^{12}$) verwenden wir die zylindrische Darstellung mit torus-abgeleiteten Parametern:

$$\text{Bell-Dämpfung: } \mathcal{D}(n) = \exp\left(-\frac{\xi \ln(n)}{\Delta f}\right) \quad (5)$$

$$\text{Phasenquantisierung: } \theta_k = \frac{2\pi k}{\phi_{\text{par}}^m}, \quad k, m \in \mathbb{Z} \quad (6)$$

$$\text{Energie-Normierung: } z^2 + r^2 = 1 \quad (7)$$

$$\text{Torus-Parameter: } \alpha = \exp\left(-\frac{\xi}{\sqrt{R/r}}\right) \approx 1 \quad (8)$$

Dieser Ansatz bewahrt die **konzeptionelle Grundlage** der toroidalen FFGFT-Geometrie, während er die **praktische Effizienz** für skalierbare Quantenberechnungen bereitstellt.

Bemerkung .2.5 (Geometrische Hierarchie). Die vollständige geometrische Beschreibung folgt einer dreistufigen Hierarchie:

1. **Fundamental:** Toroidaler Energie-Wirbel mit fraktaler Dimension $\Delta f = 3 - \xi$
2. **Effektiv:** Zylindrische T0-Qubits mit Bell-Dämpfung und Torus-Parametern
3. **Berechnungsebene:** Quantengatter und Algorithmen (Shor, Grover, etc.)

Die zylindrische Darstellung bietet die optimale Brücke zwischen Ebene 1 und 3, indem sie alle wesentlichen physikalischen Eigenschaften bewahrt und gleichzeitig effiziente Berechnung ermöglicht.

Wann spielt die Torus-Geometrie eine Rolle?

Hypothese: Toroidale Korrekturen werden nur für $R/r < 10^6$ signifikant.

Testsysteme:

- **Supraleitende Ring-Qubits:** $R \sim 10 \mu\text{m}$, $r \sim 1 \mu\text{m} \Rightarrow R/r \sim 10$
 - Vorhergesagte Verbesserung: ~85 Prozent Genauigkeitsgewinn mit toroidalen Berechnungen
 - Testbar mit aktueller SQUID-Technologie
- **Graphen-Torus-Strukturen:** $R \sim 1 \text{ nm}$, $r \sim 0,1 \text{ nm} \Rightarrow R/r \sim 10$
 - Vorhergesagte Verbesserung: ~80 Prozent Genauigkeitsgewinn
 - Herstellung durch Kohlenstoff-Nanoröhren-Manipulation
- **Molekulare Ring-Qubits:** Cyclodextrin oder ähnlich $\Rightarrow R/r \sim 5-10$
 - Maximale toroidale Effekte erwartet
 - Potenzial für Quantencomputing bei Raumtemperatur

Vorhersage: Für $R/r > 10^{12}$ (alle atomaren Systeme) stimmen zylindrische und toroidale Berechnungen innerhalb von <0,02 Prozent überein, was die Gültigkeit der zylindrischen Näherung für Quantencomputing bestätigt.

Numerische Implementierung:

Der vollständige Quellcode für die toroidale vs. zylindrische Analyse, einschließlich der Formulierungen, die numerische Instabilitäten vermeiden, ist verfügbar unter:

<https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/tree/main/2/python/>

Alle Berechnungen respektieren physikalische Grenzen:

- Bell-Korrelationen: $E(a, b) \in [-1, 1]$
- CHSH-Parameter: $S \in [0, 2\sqrt{2}]$
- Torus-Korrekturen: $\alpha \in [0,999, 1,001]$ für $R/r > 10^{12}$

Zusammenfassung:

Für Quantencomputing-Anwendungen, bei denen $R/r > 10^{12}$ (alle praktischen Szenarien), ist die zylindrische Darstellung:

- **Physikalisch exakt:** Äquivalent zur Torusgeometrie im entsprechenden Grenzfall
- **Rechenoptimal:** $O(n^2)$ gegenüber $O(n^3)$ Operationen
- **Numerisch stabil:** Keine Singularitäten oder Konvergenzprobleme
- **Hardware-getestet:** klare Bell-Verletzung gemessen ($S = 2,74$, 96,9% der Tsirelson-Schranke); die ξ -Abweichung liegt unter dem aktuellen NISQ-Rauschen

⇒ **Empfohlene Implementierung für alle T0-Quantencomputing-Anwendungen auf atomarer Skala.**

Für zukünftige Experimente mit makroskopischen Qubits ($R/r < 10^6$) können vollständige toroidale Berechnungen signifikante Genauigkeitsverbesserungen bieten und sollten in Betracht gezogen werden.

Modifizierte Quantengatter

Proposition .2.6 (T0 Hadamard-Gatter). *Das T0-Hadamard-Gatter mit Bell-Dämpfung für ein n -Qubit-System ist:*

$$H_{T0}^{(n)} : (z, r, \theta) \mapsto \left(r \cdot e^{-\xi \ln(n)/\Delta f}, z \cdot e^{-\xi \ln(n)/\Delta f}, \theta + \frac{\pi}{2} \right) \quad (9)$$

Beweis. Die Transformation $(z, r) \rightarrow (r, z)$ implementiert Basiswechsel. Der exponentielle Faktor $\exp(-\xi \ln(n)/\Delta f)$ repräsentiert Bell-Dämpfung, die Multi-Qubit-Verschränkung stabilisiert (siehe Abschnitt .4). $\square$

.3 Haupttheoretische Ergebnisse

ϕ -Hierarchische Quanten-Fourier-Transformation

Definition .3.1 (ϕ -QFT). Die ϕ -hierarchische QFT auf n Qubits wendet Phasen $2\pi/\phi_{\text{par}}^k$ statt $2\pi/2^k$ an:

$$\phi\text{-QFT} : |x\rangle \mapsto \frac{1}{\sqrt{Q_{\phi_{\text{par}}}}} \sum_{y=0}^{Q_{\phi_{\text{par}}}-1} e^{2\pi i x y / Q_{\phi_{\text{par}}}} |y\rangle \quad (10)$$

wobei $Q_{\phi_{\text{par}}} = \phi_{\text{par}}^n$ (verglichen mit $Q = 2^n$ für Standard-QFT).

Periodenfindungskompatibilität

Lemma .3.2 (ϕ -Abdeckung von Perioden). *Für jede Periode $r \in [2, N]$ mit $N < 2^{20}$ existiert $k \in \mathbb{Z}$ so dass:*

$$|r - \phi_{\text{par}}^k \cdot c| < \epsilon \quad (11)$$

für eine rationale Zahl c mit kleinem Nenner und $\epsilon < 1/(2r^2)$.

Beweis. Betrachte die Folge $\{\phi_{\text{par}}^k\}_{k=0}^{\infty}$. Da $\phi_{\text{par}} \approx 1.618$, gilt:

$$\phi_{\text{par}}^k = \phi_{\text{par}}^{k-1} + \phi_{\text{par}}^{k-2} \quad (\text{Fibonacci-Rekurrenz}) \quad (12)$$

Die Verhältnisse $\phi_{\text{par}}^{k+1}/\phi_{\text{par}}^k = \phi_{\text{par}}$ sind irrational verteilt. Nach dem Weylschen Gleichverteilungssatz sind für jedes r in einem endlichen Bereich die gebrochenen Anteile $\{\phi_{\text{par}}^k \bmod r\}$ gleichverteilt modulo r .

Für $N < 2^{20}$ benötigen wir $k \leq \log_{\phi_{\text{par}}}(N) \approx 20/\log_2(\phi_{\text{par}}) \approx 28.8$, also $k \leq 29$. In diesem Bereich:

- $\phi_{\text{par}}^1 = 1.618 \approx 2$
- $\phi_{\text{par}}^2 = 2.618 \approx 3$
- $\phi_{\text{par}}^3 = 4.236 \approx 4$
- $\phi_{\text{par}}^4 = 6.854 \approx 7$

Ein k mit $|\phi_{\text{par}}^k - r| < 0.5$ existiert für $r \in [2, 100]$ nur bei $r = 2, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76$ (den Lucas-Zahlen), nicht für jedes r ; z. B. ist für $r = 5$ $\min_k |\phi_{\text{par}}^k - 5| = 0.764$. Der Kettenbruchalgorithmus ist zudem nur unter Störungen kleiner als $1/(2r^2)$ stabil, nicht unter Störungen bis 0.5. Die Abdeckung aller Perioden ist mit diesem Argument daher nicht bewiesen. Für $r = 2, \dots, 100$ erfüllen nur 9 von 99 Werten $|\phi_{\text{par}}^k - r| < 0.5$, und das Lemma verlangt $\varepsilon < 1/(2r^2) \leq 0.125$. $\square$

Bell-verstärkte Peak-Detektion

Lemma .3.3 (Bell-Dämpfungseffekt). *Mit Bell-korrigierten Phasen erfüllt die QFT-Ausgabe:*

$$|\psi_{T0}\rangle = \frac{1}{Q} \sum_{k,y} e^{2\pi i k r y / Q_{\phi_{\text{par}}}} \cdot e^{-\xi |k r y / Q_{\phi_{\text{par}}} - m|^2 / \Delta f} |y\rangle \quad (13)$$

wobei $m = \text{round}(k r y / Q_{\phi_{\text{par}}})$.

Beweis. Der Bell-Korrekturfaktor (abgeleitet in Abschnitt .4) ist:

$$\mathcal{D}_{\text{Bell}}(\theta) = \exp\left(-\xi \frac{\theta^2}{\pi^2 \Delta f}\right) \quad (14)$$

Für Phasendifferenzen $\Delta\phi = 2\pi k r y / Q_{\phi_{\text{par}}}$ ist die nächste ganze Zahl m . Die Dämpfung unterdrückt Beiträge, bei denen $\Delta\phi$ signifikant von einem ganzzahligen Vielfachen von 2π abweicht, d.h. Off-Peak-Komponenten.

Dies *verstärkt* den korrekten Peak bei $y \approx Q_{\phi_{\text{par}}}/r$ während Rauschpeaks unterdrückt werden, wirkt also effektiv als Filter. $\square$

Hauptsatz

Satz .3.4 (ϕ -QFT-Äquivalenz für Periodenfindung). *Für Shors Algorithmus zur Faktorisierung von $N < 2^{20}$ mit Fehlerwahrscheinlichkeit $\delta < 10^{-6}$:*

$$P_{\text{success}}(\text{Standard-QFT}) \leq P_{\text{success}}(\phi\text{-QFT}) \leq P_{\text{success}}(\text{Standard-QFT}) + \xi \quad (15)$$

Beweis. Wir beweisen dies in drei Schritten:

Schritt 1: Periodendetektion. Nach Lemma .3.2 gilt für jede Periode r , die N teilt:

$$\exists k : \left| \frac{Q_{\phi_{\text{par}}}}{r_{\phi_{\text{par}}}} - \frac{Q}{r} \right| < \frac{0.2Q}{r} \quad (16)$$

wobei $r_{\phi_{\text{par}}} = r \cdot \phi_{\text{par}}^k / 2^k$ für optimales k .

Schritt 2: Kettenbruchstabilität. Der Kettenbruchalgorithmus extrahiert r aus der gemessenen Phase y/Q unter der Bedingung:

$$\left| \frac{y}{Q} - \frac{s}{r} \right| < \frac{1}{2r^2} \quad (17)$$

Für $r < \sqrt{N}$ (was für nützliche Perioden gilt) erfüllt unsere Störung aus Schritt 1 diese Bedingung nicht:

$$\frac{0.2Q}{r} = \frac{0.2 \cdot 2^n}{r} \gg 1 > \frac{1}{2r^2} \quad (18)$$

da $2^n \approx 2N \gg r$. Auch in der relativen Form $0.2/r < 1/(2r^2)$ gilt die Ungleichung nur für $r < 2.5$, also nur für $r = 2$. Die Kettenbruchstabilität ist für allgemeine r damit nicht nachgewiesen, und der Beweis des Theorems trägt an dieser Stelle nicht. Beispiel $r = 3$: $0.067 > 0.056$.

Schritt 3: Bell-Verstärkung. Nach Lemma .3.3 erhöht die Bell-Dämpfung das Signal-zu-Rausch-Verhältnis:

$$\text{SNR}_{\phi\text{-QFT}} = \text{SNR}_{\text{standard}} \cdot \left(1 + \frac{\xi \ln(r)}{\Delta f}\right) \quad (19)$$

Für typische Perioden $r \in [2, 100]$:

$$\frac{\xi \ln(r)}{\Delta f} \approx \frac{1.333 \times 10^{-4} \times 4.6}{2.9999} \approx 2 \times 10^{-4} \quad (20)$$

Diese kleine Verbesserung gewährleistet:

$$P_{\text{success}}(\phi\text{-QFT}) \geq P_{\text{success}}(\text{Standard-QFT}) \quad (21)$$

Die obere Schranke $P_{\text{success}}(\phi\text{-QFT}) \leq P_{\text{success}}(\text{Standard-QFT}) + \xi$ folgt aus der Tatsache, dass $\phi\text{-QFT}$ perfekten Erfolg nicht überschreiten kann und zusätzliche Fehler durch die Störungsanalyse durch ξ begrenzt sind. $\square$

Korollar .3.5 (Dekohärenzunterdrückung). *Unter Phasenrauschen $\epsilon \cdot \sigma_z$ (wobei $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$) hat $\phi\text{-QFT}$ mit Bell-Korrekturen:*

$$|peak|_{\phi\text{-QFT}} \propto \exp\left(-\frac{\xi \epsilon^2}{\Delta f}\right) > 1 - \epsilon \propto |peak|_{\text{standard}} \quad (22)$$

für $\epsilon < 0.1$. Der Dämpfungsfaktor selbst ist $\exp(-\xi \epsilon^2 / \Delta f) < 1$; der Vorteil besteht nur im Vergleich mit der linearen Degradation $1 - \epsilon$.

Beweis. Standard-QFT unter Phasenrauschen: $|peak| \rightarrow |peak| \cdot (1 - \epsilon)$ (lineare Degradation).
Bell-korrigierte $\phi\text{-QFT}$: $|peak| \rightarrow |peak| \cdot \exp(-\xi \epsilon^2 / \Delta f)$ (quadratisch in ϵ).
Für kleine ϵ :

$$e^{-\xi \epsilon^2 / \Delta f} \approx 1 - \frac{\xi \epsilon^2}{\Delta f} > 1 - \epsilon \quad (23)$$

da $\xi \epsilon / \Delta f \ll 1$ für realistische $\epsilon < 0.1$. $\square$

.4 Bell-Test-Modifikationen

T0-Korrelationsfunktion

Definition .4.1 (T0 Bell-Korrelation). Für zwei Qubits mit Messwinkeln a und b ist die T0-modifizierte Korrelation:

$$E^{T0}(a, b) = -\cos(a - b) \cdot (1 - \xi \cdot f(n, l, j)) \quad (24)$$

wobei $f(n, l, j) = (n / \phi_{\text{par}})^l \cdot (1 + \xi j / \pi)$ für Quantenzahlen (n, l, j) . $f(n, l, j)$ ist hier der Quantenzahlfaktor im Dämpfungsglied, keine Frequenz und nicht die Grundwindungszahl $f = 1/\xi$.

Für photon-ähnliche Qubits ($n = 1, l = 0, j = 1$):

$$f(1, 0, 1) = \phi_{\text{par}}^0 \cdot \left(1 + \frac{\xi}{\pi}\right) \approx 1.000042 \quad (25)$$

CHSH-Ungleichungsmodifikation

Proposition .4.2 (T0 CHSH-Wert). Für n verschränkte Qubits ist der CHSH-Parameter:

$$\text{CHSH}^{\text{T0}}(n) = 2\sqrt{2} \cdot \exp\left(-\frac{\xi \ln(n)}{\Delta f}\right) \quad (26)$$

Beweis. Das Standard-CHSH für Singulettzustand:

$$\text{CHSH}^{\text{QM}} = |E(0^\circ, 45^\circ) - E(0^\circ, 135^\circ) + E(90^\circ, 45^\circ) + E(90^\circ, 135^\circ)| = 2\sqrt{2} \quad (27)$$

Mit $E = -\cos(a - b)$ gehören zu $2\sqrt{2}$ die Winkel $a = 0^\circ, 90^\circ$, $b = 45^\circ, 135^\circ$ (wie im Anhang); die Winkel $0^\circ/45^\circ/22.5^\circ/67.5^\circ$ gelten für den Polarisationskorrelator $\cos 2(a - b)$.

Mit T0-Modifikation aus Gl. (24) und n -Qubit-Bell-Dämpfung:

$$E_i^{\text{T0}} = E_i^{\text{QM}} \cdot (1 - \xi f(n, l, j)) \cdot e^{-\xi \ln(n)/\Delta f} \quad (28)$$

$$\approx E_i^{\text{QM}} \cdot (1 - \xi f(n, l, j)) \left(1 - \frac{\xi \ln(n)}{\Delta f}\right) \quad (29)$$

Der Faktor $(1 - \xi f)$ ist nicht vernachlässigbar: $\xi f = 1.33 \times 10^{-4}$ ist größer als $\xi \ln(n)/\Delta f$ bei $n = 2$ (3.1×10^{-5}) und vergleichbar bei $n = 73$ (1.9×10^{-4}). Gl. (26), die folgende Summation und die Zahlenwerte des Dokuments enthalten diesen Faktor nicht; mit ihm ist $\text{CHSH}^{\text{T0}}(73) = 2.827511$ statt 2.827888. Gegenüber dem Messwert $S = 2.74$ ist der Unterschied nicht auflösbar.

Summation über die vier CHSH-Terme:

$$\text{CHSH}^{\text{T0}}(n) = \text{CHSH}^{\text{QM}} \cdot \left(1 - \frac{\xi \ln(n)}{\Delta f}\right) \approx 2\sqrt{2} \cdot e^{-\xi \ln(n)/\Delta f} \quad (30)$$

□

Experimentelle Vorhersagen

73-Qubit-Vorhersage

Für das 73-Qubit-Quantenlängendetektor-Experiment:

$$\text{CHSH}^{\text{QM}} = 2.828427 \quad (31)$$

$$\text{CHSH}^{\text{T0}}(73) = 2.828427 \cdot e^{-1.333 \times 10^{-4} \cdot 4.290/2.9999} \quad (32)$$

$$= 2.827888 \quad (33)$$

Abweichung: $\Delta = 5.39 \times 10^{-4}$ (messbar erst mit $\sigma = 10^{-4}$ und gerätestabiler Präzision; mit heutiger NISQ-Hardware nicht auflösbar, Abschnitt .7). Ohne den Faktor $(1 - \xi f)$; mit ihm ist $\text{CHSH}^{\text{T0}}(73) = 2.827511$.

Räumliche Korrelationsverzögerung

Proposition .4.3 (Ansatz: Räumliche Bell-Verzögerung). Für einen Bell-Test über die Distanz d ergäbe der folgende Ansatz eine Verzögerung:

$$\Delta t = \xi \cdot \frac{d}{c} \quad (34)$$

Tabelle 3: T0 CHSH-Vorhersagen für Multi-Qubit-Systeme (Spalte „Testbar“: mit fehlerkorrigierter Hardware; mit heutiger NISQ-Hardware ist keiner der Werte auflösbar)

n Qubits	QM CHSH	T0 CHSH	Δ (%)	Testbar
2	2.828427	2.828340	0.0031	Marginal
5	2.828427	2.828225	0.0072	Marginal
10	2.828427	2.828138	0.0102	Ja
20	2.828427	2.828051	0.0133	Ja
50	2.828427	2.827935	0.0174	Ja
73	2.828427	2.827888	0.0191	Ja
100	2.828427	2.827848	0.0205	Ja

Beweis. Das Korrelationsfeld propagiert kausal mit Geschwindigkeit c . Die T0-Modifikation führt eine Phasenverzögerung proportional zu ξ ein:

$$\phi_{T0}(d, t) = \phi_{QM}(d, t - \Delta t) \quad (35)$$

wobei $\Delta t = \xi d/c$ kausale Konsistenz gewährleisten soll. $\square$

Dieser Ansatz folgt nicht aus dem Rahmen dieser Arbeit: Eine kausal mit c laufende, um $\xi d/c$ verzögerte Korrelation wäre ein lokaler Mechanismus. Die fraktale Dämpfung stellt aber keine lokale Schranke her, und die Bell-Verletzung bleibt (Abschnitt .4). Die Verzögerung wird daher nicht als Vorhersage der FFGFT geführt.

Satellitentest

Für $d = 1000$ km:

$$\Delta t = 1.333 \times 10^{-4} \times \frac{1000 \text{ km}}{299792 \text{ km/s}} = 444.75 \text{ ns} \quad (36)$$

Eine Verzögerung dieser Größe wäre mit Atomuhren (Präzision ~ 10 ns) auflösbar; da der Ansatz nicht aus dem Rahmen folgt (siehe oben), ist sie keine prüfbare FFGFT-Abweichung.

.5 Anwendung auf Shors Algorithmus

Standard Shor-Algorithmus

Shors Algorithmus faktorisiert N durch Finden der Periode r der Funktion $f(x) = a^x \bmod N$:

Algorithm 1 Standard Shor-Algorithmus

- 1: Wähle zufälliges $a \in [2, N - 1]$ mit $\gcd(a, N) = 1$
- 2: Initialisiere $|\psi_0\rangle = |0\rangle^{\otimes n}$
- 3: Wende Hadamard an: $|\psi_1\rangle = H^{\otimes n}|0\rangle^{\otimes n} = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle$
- 4: Berechne $f(x)$: $|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle |a^x \bmod N\rangle$
- 5: Messung des zweiten Registers, Kollaps zu $|\psi_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n/r}} \sum_{k=0}^{2^n/r-1} |kr\rangle$
- 6: Wende QFT an: $|\psi_4\rangle = \text{QFT}|\psi_3\rangle$
- 7: Messung, erhalte $y \approx 2^n \cdot s/r$
- 8: Extrahiere r via Kettenbrüche
- 9: Berechne Faktoren: $\gcd(a^{r/2} \pm 1, N)$

T0-Shor mit ϕ -QFT

Algorithm 2 T0-Shor-Algorithmus

```

1: Wähle zufälliges  $a$  mit  $\gcd(a, N) = 1$ 
2: Initialisiere T0-Qubits mit  $\phi$ -Hierarchie:  $\theta_k = 2\pi/\phi_{\text{par}}^k$ 
3: Wende Bell-gedämpftes Hadamard an:  $H_{\text{T0}}^{(n)}$  (Gl. 9)
4: Ordnungssuche: Teste  $r \in [2, 100]$  auf  $a^r \equiv 1 \pmod{N}$ 
5: if Periode gefunden then
6:   return Periode  $r$ 
7: end if
8:  $\phi$ -Hierarchiesuche: Teste  $r = \text{round}(\phi_{\text{par}}^k)$  für  $k \in [0, 20]$ 
9: if  $a^r \equiv 1 \pmod{N}$  then
10:  return Periode  $r$ 
11: end if
12: Wende  $\phi$ -QFT mit Bell-Korrekturen an
13: Messung deterministisch (Energiefeldauslesung)
14: Extrahiere  $r$  via Kettenbrüche
15: Berechne Faktoren

```

Komplexitätsanalyse

Proposition .5.1 (T0-Shor-Komplexität). *Der T0-Shor-Algorithmus mit vorgeschalteter Ordnungssuche hat Komplexität:*

$$\mathcal{O}(\log^3 N) \quad (37)$$

Die vorgeschaltete Ordnungssuche kostet $\mathcal{O}(\log^2 N)$ und ändert die Komplexität nicht (Anhang 0.2); ein Zusatzterm in ξ folgt aus keinem Schritt.

.6 Strukturelle Einordnung

[K] Unabhängig von der Hardware-Frage besteht eine strukturelle Grenze für resonanzbasierte Verfahren. Nach dem Weyl-Gesetz wächst die Eigenwertdichte jedes kompakten Zustandsraums – und ein n -Qubit-Register ist ein solcher – nach einem Potenzgesetz $N(\lambda) \sim \lambda^{d/2}$. Arithmetische Zähl-dichten wachsen dagegen wie $T \ln T$ (Riemann-von Mangoldt). Das ist keine Potenz; ein endlicher Zustandsraum kann ein solches Spektrum nicht vollständig tragen (Dok. 316, August 2026).

[K] Die Aufbereitung (modulare Exponentiation) ist das eigentliche Problem und macht etwa **95 %** der Gatterkosten aus; die Quanten-Fouriertransformation nur rund 5 % (Dok. 176, August 2026).

[K] Die Quanten-Fouriertransformation erzeugt zudem keine neue Information. Sie macht Periodizitäten sichtbar, die in den präparierten Zuständen bereits vorhanden sind. Der limitierende Schritt in Shors Algorithmus ist die Zustandspräparation – die Auswertung von $a^x \bmod N$ –, nicht die Transformation selbst.

[K] Die Resonanzstruktur der Periodenfindung beruht auf Primzahlen. Der Bikohärenztest an 2469 Riemann-Nullstellen (Dok. 316) zeigt Phasenkopplung genau bei Primzahlpotenzen und keine bei zusammengesetzten Zahlen. Der Geometrieparameter $\xi = 4/30000$ hat in $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ keine Funktion; die Periode r ist durch $\text{lcm}(p-1, q-1)$ bestimmt.

.7 Experimentelle Validierung mit IBM Quantum Hardware

Hardware-Tests an 73-Qubit- und 127-Qubit-Systemen

Erste Validierungsläufe wurden 2025 auf IBM Quantum (Brisbane, Sherbrooke; je 127 physikalische Qubits) durchgeführt. Eine erweiterte, statistisch belastbare Wiederholung erfolgte am 28. Mai 2026 auf `ibm_kingston` (Heron r2, 156 Qubit) mit 50 unabhängigen Läufen; die Werte dieses Abschnitts beziehen sich auf diese 50-Lauf-Messung.

Bell-Zustands-Treue-Tests

Bell-Zustands-Generierungsprotokoll

Schaltung: Standard-Bell-Zustand $|\Phi^+\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$

- Wende Hadamard-Gatter auf Qubit 0 an
- Wende CNOT mit Kontrolle=0, Ziel=1 an
- Miss beide Qubits
- Wiederhole für 2048 Shots, 50 unabhängige Läufe

Ergebnisse von 50 unabhängigen Läufen auf `ibm_kingston` (28. Mai 2026):

Tabelle 4: Bell-Zustands-Treue: Experimentelle Ergebnisse (50 Läufe)

Größe	$P(00\rangle)$	$P(11\rangle)$	Leckage	Treue
Mittelwert	0.5091	0.4785	0.0124	0.9876
Standardabw.	0.0112	0.0109	—	0.0028

Statistische Analyse:

$$\text{Mittlere Treue} = 0.9876 \pm 0.0028 \quad (38)$$

$$\text{Varianz } P(|00\rangle) = 1.249 \times 10^{-4} \quad (39)$$

$$\text{Shot-Noise-Erwartung} = 0.25/2048 = 1.221 \times 10^{-4} \quad (40)$$

Vergleich mit Standard-QM-Erwartung:

- Verhältnis beobachtete Varianz zu Shot-Noise: 1.02
- Die Wiederholbarkeits-Varianz ist mit gewöhnlicher Quanten-Shot-Noise **statistisch verträglich**.

Wichtig

Befund: Die 50-Lauf-Messung zeigt eine Varianz, die nicht von Shot-Noise unterscheidbar ist (Verhältnis 1.02); eine deterministische Varianzreduktion gegenüber QM besteht nicht. Die hohe Bell-Treue ist bestätigt.

Chi-Quadrat-Test für die Wiederholbarkeit

Nullhypothese: Varianz von $P(|00\rangle)$ gleich Shot-Noise-Varianz.

$$\chi^2 = (n-1)s^2/\sigma_0^2 = 50.14, \quad \text{df} = 49, \quad p = 0.856 \quad (41)$$

Schlussfolgerung: $p \gg 0.05 \Rightarrow$ die beobachtete Varianz ist mit reiner Shot-Noise vollständig verträglich. Kein Hinweis auf sub-Shot-Noise-Determiniertheit.

CHSH-Parameter-Messungen

Am 28. Mai 2026 wurde eine echte CHSH-Parameter-Messung auf Hardware durchgeführt (15 Messungen auf `ibm_kingston`, 10 auf `ibm_marrakesh`, je vier Winkel-Einstellungen, 2048 Shots). Es ist die erste hardware-gemessene, vollständig mit Job-IDs dokumentierte CHSH-Bestimmung dieses Korpus.

Messaufbau

Winkel Alice $a = 0^\circ$, $a' = 45^\circ$; Bob $b = 22,5^\circ$, $b' = -22,5^\circ$. Korrelator $E = [N_{00} - N_{01} - N_{10} + N_{11}]/N$. CHSH-Kombination $S = E(a, b) + E(a, b') + E(a', b) - E(a', b')$.

Tabelle 5: CHSH-Messung: Hardware-Ergebnisse (28. Mai 2026)

Gerät	Messungen	Mittel S	SE	% Tsirelson	Bell-Verletzung
<code>ibm_kingston</code>	15	2.7396	0.0071	96.9%	105σ
<code>ibm_marrakesh</code>	10	2.7016	0.0138	95.5%	51σ
gepooit	25	2.7244	0.0078	96.3%	—

Vergleichswerte: Tsirelson-Schranke $2\sqrt{2} = 2.8284$; klassische Schranke 2.0.

Bell-Verletzung bestätigt

Der gemessene CHSH-Wert $S = 2.74$ liegt 105σ (Kingston) über der klassischen Schranke. Lokaler Realismus ist ausgeschlossen; die erzeugte Verschränkung ist genuin. Mit 96.9% der Tsirelson-Schranke ist dies ein für NISQ-Hardware ausgezeichnetes Resultat.

Abweichung von der Tsirelson-Schranke

Der gemessene Wert liegt 3,14% unter $2\sqrt{2}$. Die mittlere Korrelator-Stärke ist 0,685 statt ideal 0,707 — dies entspricht $\sim 1,5\%$ Gatter- und Auslesefehler (NISQ-Charakteristik). Diese Abweichung ist **Dekohärenz, nicht der ξ -Effekt**: Der vorhergesagte ξ -Effekt liegt bei $\sim 10^{-5}$ (Größenordnung 0,001% von S), rund 3000× kleiner als die gemessene Lücke.

Wichtig

Datenlage: Die einzige belegte CHSH-Bestimmung ist die direkte Messung vom 28. Mai 2026 ($S = 2.74$). Der Hardware-Validierungslauf von 2025 betraf ausschließlich die Bell-Zustands-Generierung, nicht den CHSH-Parameter.

Cross-Platform-Befund zur Messbarkeit von ξ

Zwei baugleiche Heron-r2-Chips unterscheiden sich im gemessenen CHSH-Wert um 0,038 ($\approx 1,4\%$ von S ; Welch- t -Test $t = 2,46$, $p = 0,028$), allein durch Kalibrierungs- und Rauschunterschiede. Da der gesuchte ξ -Effekt $\sim 1400\times$ kleiner ist als diese Geräte-zu-Geräte-Variation,

ist die ξ -Vorhersage mit gegenwärtiger NISQ-Hardware **prinzipiell nicht auflösbar** — ein direkt gemessener, nicht nur abgeschätzter Befund. Der ξ -Test erfordert fehlerkorrigierte Qubits mit sub-ppm-stabiler, gerätestabiler Präzision.

73-Qubit-Bell-Test

Apparatur: fehlerkorrigierter Quantenprozessor; mit NISQ-Prozessoren wie IBM Eagle oder Heron und Google Sycamore ist die Abweichung nicht auflösbar (Abschnitt .7)

Protokoll:

1. Präpariere 73-Qubit-GHZ-Zustand: $|\text{GHZ}_{73}\rangle = (|0\rangle^{\otimes 73} + |1\rangle^{\otimes 73})/\sqrt{2}$
2. Wende Messwinkel an: $a \in \{0^\circ, 90^\circ\}$, $b \in \{45^\circ, 135^\circ\}$ (für $E = -\cos(a-b)$; die Winkel $0^\circ/22.5^\circ/45^\circ/67.5^\circ$ gelten nur für den Polarisationskorrelator $\cos 2(a-b)$)
3. Berechne paarweise Korrelationen $E(a_i, b_j)$ für alle Paare
4. Berechne $\text{CHSH} = \sum_i E(a_i, b_i) - E(a_i, b_{i+1})$
5. Wiederhole 10^6 Mal, berechne Mittelwert und Standardfehler
6. Vergleiche mit Vorhersagen (Tabelle 3)

Erwartetes Ergebnis:

$$\text{CHSH}_{\text{gemessen}} = 2.8279 \pm 0.0001 \quad (42)$$

Falsifikationskriterien:

- Wenn $\text{CHSH}_{\text{gemessen}} = 2.8284 \pm 0.0001$: T0 falsifiziert
- Wenn $\text{CHSH}_{\text{gemessen}} = 2.8279 \pm 0.0001$: T0 bestätigt (5σ)

Satelliten-Bell-Test

Apparatur: Micius-Satellit oder zukünftige ESA-Quantenverbindung

Protokoll:

1. Generiere verschränkte Photonenpaare am Satelliten
2. Sende zu Bodenstationen A und B ($d = 1000$ km entfernt)
3. Synchronisiere via Atomuhren (GPS, Präzision ~ 10 ns)
4. Messe Korrelationsankunftszeiten mit Femtosekundenlasern
5. Vergleiche Zeitstempel: $\Delta t_{AB} = t_B - t_A - d/c$

Einordnung: Das Protokoll prüft den Ansatz der räumlichen Korrelationsverzögerung $\Delta t = \xi d/c \approx 445$ ns (Abschnitt .4), der nicht aus dem Rahmen dieser Arbeit folgt. Es ist daher kein Falsifikationstest der FFGFT.

.8 Implementierung und Ergebnisse

Python-Implementierung

Wir bieten zwei Implementierungen:

1. Vollständige theoretische Implementierung (630 Zeilen):

- Vollständige T0-Qubit-Klasse mit Energie-Feld-Dynamik
- ϕ -QFT mit Bell-Korrekturen
- Bell-korrigierte Verschränkungsämpfung
- Deterministische Messung via Felddauslesung

2. Produktions-Hybrid-Implementierung (400 Zeilen):

- Ordnungssuche (klassischer Test von r auf $a^r \equiv 1 \pmod{N}$)
- ϕ -Hierarchiesuche
- Klassischer Fallback für Robustheit
- Vollständige Benchmark-Suite

Benchmark-Ergebnisse

Tabelle 6: T0-Shor-Leistung auf Benchmark-Suite

N	Faktoren	Periode r	Methode	Zeit (s)	Erfolg
15	3×5	4	Ordnungssuche	0.033	✓
21	3×7	2	Ordnungssuche	0.0003	✓
33	3×11	10	Ordnungssuche	0.0003	✓
35	5×7	12	Ordnungssuche	0.0002	✓
77	7×11	30	Ordnungssuche	0.0003	✓
143	11×13	60	Ordnungssuche	0.0003	✓
Erfolgsrate: 6/6 (100 Prozent)					

Code-Auszug: Ordnungssuche

```
def find_period_xi_resonance(self, a: int) -> Optional[int]:
    '''Nutzt T0-Energie-Feld-Resonanzen'''
    best_r = None
    max_resonance = 0

    for r in range(2, min(self.N, 100)):
        # Energie-Signatur
        power = pow(a, r, self.N)

        # T0-fraktale Dämpfung
        xi_modulation = np.exp(-XI * r * r / DF)

        # Resonanz bei  $a^r = 1 \pmod{N}$ 
        resonance_strength = xi_modulation / (abs(power - 1) + 1)

        if abs(power - 1) < 0.01:
            return r # Starke Resonanz

    return best_r
```

Der Faktor xi_modulation ist streng monoton fallend in r und verschiebt das Ergebnis nicht; die Periode bestimmt allein die Bedingung $a^r \equiv 1 \pmod{N}$. Das Verfahren ist eine klassische Ordnungssuche.

.9 Diskussion

Theoretische Implikationen

1. **Determinismus wiederhergestellt:** Energie-Feld-Qubits bieten deterministischen Rahmen kompatibel mit Quanteninterferenz
2. **Keine lokale Schranke:** Die fraktale Dämpfung ändert CHSH nur weit unter dem Messrauschen; sie stellt keine lokale Schranke her, die Bell-Verletzung bleibt
3. **Messproblem gelöst:** Messung ist Felddauslesung, nicht probabilistischer Kollaps
4. **Verbesserte Stabilität:** ξ -Dämpfung bietet natürliche Dekohärenzunterdrückung

Experimentelle Testbarkeit

Die CHSH-Vorhersagen (73-Qubit-Test, CHSH-Skalierung) sind mit gegenwärtiger NISQ-Hardware nicht auflösbar (Abschnitt .7); sie erfordern fehlerkorrigierte Qubits. Im QM-Sektor gibt es derzeit keine mit heutiger Hardware prüfbare FFGFT-Abweichung.

Einschränkungen und offene Fragen

1. **Skalierbarkeit:** Getestet bis $N = 143$; RSA-2048 erfordert weitere Analyse
2. **Hardware-Implementierung:** Erfordert spezialisierte Qubit-Frequenzen (ϕ -Hierarchie)
3. **Quanten-Fehlerkorrektur:** Integration mit Surface Codes bleibt offen
4. **Vielteilchensysteme:** Erweiterung auf > 100 Qubits benötigt Verfeinerung

.10 Schlussfolgerung

Wir haben einen theoretischen Rahmen und eine Hardware-Prüfung des Quantencomputings im T0 Zeit-Masse-Dualitäts-Rahmenwerk präsentiert. Die wesentlichen Beiträge sind:

Theoretische Errungenschaften

1. Mathematischer Rahmen

- Beweisansatz für die ϕ -QFT-Äquivalenz zur Standard-QFT für Periodenfindung (Theorem .3.4); in der vorliegenden Form nicht bewiesen
- Bell-korrigierter Verschränkungsrahmen mit Vorhersagen, die erst mit fehlerkorrigierter Hardware prüfbar sind
- Demonstration verbesserter Stabilität durch fraktale Dämpfung (Korollar .3.5)

2. Neue physikalische Einsichten

- Energie-Feld-Qubits bieten deterministische Alternative zum probabilistischen Kollaps
- Korrelationsfelder beschreiben die Bell-Korrelationen; die fraktale Dämpfung stellt keine lokale Schranke her, die Bell-Verletzung bleibt
- ξ -Dämpfung wirkt als natürliche Dekohärenzunterdrückung

Experimentelle Validierung

3. IBM Quantum Hardware-Tests (2025 + Mai 2026)

- **Bell-Treue:** 98.8 Prozent (50 Läufe, ibm_kingston, Mai 2026); Varianz mit Shot-Noise verträglich (Verhältnis 1.02), keine Varianzreduktion gegenüber QM
- **CHSH (gemessen):** $S = 2.74$ (96.9 Prozent der Tsirelson-Schranke), klare Bell-Verletzung (105σ über klassisch)
- **ξ -Messbarkeit:** Geräte-zu-Geräte-Variation (≈ 1.4 Prozent) übersteigt den ξ -Effekt um $\sim 1400\times$; mit NISQ-Hardware nicht auflösbar
- **Lauffähigkeit:** T0-Schaltkreise laufen einwandfrei auf Produktionshardware

4. Monte-Carlo-Validierung

- 10.000-Lauf-Simulationen sind mit den IBM-Messwerten verträglich ($p = 0.204$); da der ξ -Effekt weit unter dem Hardware-Rauschen liegt, ist das keine Bestätigung der T0-Vorhersage
- Die Implementierung reproduziert T0-Vorhersagen akkurat
- Bootstrap-Analyse bietet rigorose Unsicherheitsquantifizierung

Wesentliche Ergebnisse

Zentrales Ergebnis

Das T0-Rahmenwerk reproduziert erfolgreich Quantencomputing-Phänomene während es bietet:

1. **Deterministische Grundlage:** Quantenverhalten entsteht aus Energie-Feld-Dynamik
2. **Bell-Verletzung bleibt:** Die fraktale Dämpfung stellt keine lokale Schranke her; lokaler Realismus ist durch die Messung ausgeschlossen
3. **Verbesserte Stabilität:** ξ -Dämpfung unterdrückt Dekohärenz quadratisch
4. **Experimentelle Validierung:** IBM-Tests bestätigen die Bell-Verletzung ($S = 2.74$, 3.1 Prozent unter $2\sqrt{2}$); eine Bestätigung der ξ -Vorhersage auf 0.02 Prozent besteht nicht
5. **Falsifizierbarkeit:** Klare experimentelle Kriterien für Verifikation/Falsifikation

Kein hardware-angepasstes ξ

Eine Differenz zwischen $\xi_{\text{base}} = 1.33 \times 10^{-4}$ und einem an Hardware-Werte angepassten ξ liegt nicht vor: Die einzige belegte CHSH-Messung ($S = 2.74$, Abschnitt .7) löst den ξ -Effekt nicht auf. Ein hardware-angepasstes ξ_{fit} und eine Zerlegung $\xi_{\text{eff}}(N) = \xi_{\text{base}} + \xi_{\text{hardware}}(N)$ mit N -Skalierung sind daher nicht begründet.

Implikationen für Quantencomputing

Praktische Anwendungen:

- **Fehlerkorrektur:** T0-bewusste Protokolle könnten ξ -Dämpfung für natürliche Fehlerunterdrückung nutzen
- **Hardware-Design:** Optimierte Qubit-Frequenzen auf ϕ -harmonische Resonanzen (mit $E_0 = 7.398$ MeV: 5.50 GHz für $n = 9$, 2.10 GHz für $n = 10$)

- **Algorithmenentwicklung:** T0-native Algorithmen nutzen deterministische Evolution
- **Benchmarking:** ξ -Parameter als Qualitätsmerkmal für Quantenprozessoren
- **Fundamentale Physik:**
 - Lösung des Messproblems via Energie-Feld-Auslesung
 - Verbindung zu breiteren Rahmenwerken (Causal Fermion Systems, deterministische QFT)
 - Testbare Vorhersagen für Planck-Skalen-Physik

Falsifikationskriterien

Das T0-Rahmenwerk macht präzise, falsifizierbare Vorhersagen:

Kritische Tests für T0-Theorie

Test 1: CHSH-Skalierung

- Messung CHSH für $N = 10, 20, 50, 100, 200$ Qubits
- T0 vorhersagt: $S(N) = 2\sqrt{2} \cdot \exp(-\xi \ln(N)/D_f)$
- **Falsifiziert wenn:** Systematische Abweichung $> 3\sigma$ vom Skalierungsgesetz

Test 2: Räumliche Korrelationsverzögerung

- Satelliten-Bell-Test über $d = 1000$ km
- Kein FFGFT-Kriterium: Die Verzögerung $\Delta t = \xi d/c \approx 445$ ns setzt eine lokale Ausbreitung der Korrelationen voraus und folgt nicht aus dem Rahmen (Abschnitt .4)

Test 3: Bell-Treue-Varianz

- Messung Varianz über 100+ Läufe auf gleichem System
- T0 vorhersagt: $\sigma^2 < 0.001$; die QM-Shot-Noise-Varianz liegt bei 2048 Shots mit höchstens $0.25/2048 = 1.2 \times 10^{-4}$ ebenfalls darunter, das Kriterium unterscheidet T0 daher nicht von QM
- **Falsifiziert wenn:** $\sigma^2 > 0.005$ (die QM-Erwartung liegt bei $\leq 1.2 \times 10^{-4}$); gemessen ist eine mit Shot-Noise verträgliche Varianz (Verhältnis 1.02, Abschnitt .7)

Test 4: ϕ -harmonische Resonanzen

- Teste Qubit-Leistung bei Frequenzen $f_n = (E_0/h)\xi^2\phi^{-2n}$ mit $E_0 = 7.398$ MeV
- T0 vorhersagt: Reduziertes Phasenrauschen bei 5.50 GHz ($n = 9$), 2.10 GHz ($n = 10$)
- **Falsifiziert wenn:** Keine messbare Verbesserung bei vorhergesagten Frequenzen

Abschließende Bemerkungen

Das T0 Zeit-Masse-Dualitäts-Rahmenwerk bietet eine neue Sicht auf Quantencomputing. Durch Ersetzen probabilistischer Amplituden durch deterministische Energie-Felder erreichen wir:

- **Konzeptionelle Klarheit:** Kein Messparadoxon, kein Wellenfunktionskollaps
- **Mathematischer Rahmen:** Äquivalenz mit Standard-Quantenalgorithmen als Beweisansatz formuliert, in der vorliegenden Form nicht bewiesen
- **Experimentelle Unterstützung:** IBM-Tests bestätigen die Bell-Verletzung ($S = 2.74$); eine Validierung der ξ -Vorhersage auf 0.02 Prozent besteht nicht
- **Praktischer Nutzen:** Natürliche Fehlerunterdrückung und Hardware-Optimierungsstrategien

- **Falsifizierbarkeit:** Klare Kriterien für experimentelle Verifikation/Falsifikation

Während außergewöhnliche Behauptungen außergewöhnliche Beweise erfordern, liefern der hier präsentierte theoretische Rahmen, der Beweisansatz und die Hardware-Messung der Bell-Verletzung einen Anlass für ernsthafte Betrachtung des T0-Rahmenwerks; die charakteristische ξ -Vorhersage ist mit gegenwärtiger Hardware nicht prüfbar.

Wir laden die Quantencomputing-Gemeinschaft ein zu:

1. **Replizieren** unserer experimentellen Protokolle auf unabhängiger Hardware
2. **Überprüfen** unserer theoretischen Herleitungen und Identifizieren möglicher Fehler
3. **Erweitern** des Rahmenwerks auf neue Domänen (Quantenchemie, Vielteilchenphysik)
4. **Testen** der Falsifikationskriterien mit Hochpräzisionsexperimenten
5. **Kollaborieren** an Entwicklung T0-optimierter Quantentechnologien

Der entscheidende Test jeder physikalischen Theorie ist ihre Fähigkeit, Phänomene vorherzusagen, zu erklären und zu vereinheitlichen. Das T0-Rahmenwerk, wie in dieser Arbeit demonstriert, zeigt auf allen drei Fronten Potenzial. Ob es eine fundamentale Wahrheit über die Natur repräsentiert oder eine nützliche effektive Beschreibung bleibt, muss durch rigorose experimentelle Prüfung und theoretische Entwicklung bestimmt werden.

Der Test allen Wissens ist Experiment. Experiment ist der einzige Richter wissenschaftlicher ‚Wahrheit‘.
— Richard Feynman

Wir freuen uns auf die experimentellen Tests, die dieses Rahmenwerk letztendlich validieren oder widerlegen werden, und verpflichten uns zu transparenter Aktualisierung unserer Schlussfolgerungen basierend auf empirischen Beweisen.

.11 Kosmische Korrekturen für Quantencomputing

Das faltige Torus-Universum und Qubits

Basierend auf der Erkenntnis, dass das Universum ein faltiger fraktaler Torus ist ($\Delta f = 3 - \xi$), folgt, dass Qubits lokale Manifestationen dieser universalen Geometrie sind. Dies hat konkrete Auswirkungen auf Quantencomputing.

Implementierung kosmischer Korrekturen

Für die praktische Umsetzung haben wir drei Python-Skripte entwickelt:

1. **T0 Cosmic Qubit Simulator:**
2/python/t0_cosmic_qubit_simulator.py
Simuliert Qubits im faltigen Universum mit Tages-, Mond- und Jahreszyklus-Korrekturen.
2. **T0 Cosmic Error Correction:**
2/python/t0_cosmic_error_correction.py
Implementiert kosmisch-synchrone Fehlerkorrektur für Quantengatter und optimale Startzeiten.
3. **T0 Cosmic Data Analyzer:**
2/python/t0_cosmic_data_analyzer.py
Analysiert IBM Quantum Daten auf periodische kosmische Signaturen und Positionskorrelationen.

Experimentelle Tests

Die Skripte ermöglichen folgende experimentelle Tests mit IBM Quantum Hardware:

- **Positionsabhängigkeit:** Qubits auf "Gyri" vs. "Sulci" der Chip-Geometrie
- **Zeitabhängigkeit:** 24-Stunden- und 12-Stunden-Perioden in Qubit-Performance
- **Fraktale Anordnung:** Optimierte Qubit-Platzierung basierend auf Δf

Erwartete Verbesserungen

Durch Anwendung der kosmischen Korrekturen erwarten wir:

- 10-20 Prozent längere Kohärenzzeiten T_2
- 5-15 Prozent reduzierte Gate-Fehler
- Optimale Algorithmus-Performance bei spezifischen kosmischen Zeiten

Alle Skripte sind im GitHub-Repository verfügbar:

<https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/tree/main/2/python/>

Datenverfügbarkeit

Vollständige Python-Implementierung verfügbar unter:

<https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality>

Alle experimentellen Protokolle und Benchmark-Daten sind in den ergänzenden Materialien bereitgestellt.

.12 Cosmic Corrections for Quantum Computing

The Wrinkled Torus Universe and Qubits

Based on the insight that the universe is a wrinkled fractal torus ($\Delta f = 3 - \xi$), it follows that qubits are local manifestations of this universal geometry. This has concrete implications for quantum computing.

Implementation of Cosmic Corrections

For practical implementation, we have developed three Python scripts:

1. **T0 Cosmic Qubit Simulator:**
2/python/t0_cosmic_qubit_simulator.py
Simulates qubits in the wrinkled universe with day, moon, and annual cycle corrections.
2. **T0 Cosmic Error Correction:**
2/python/t0_cosmic_error_correction.py
Implements cosmically synchronous error correction for quantum gates and optimal start times.
3. **T0 Cosmic Data Analyzer:**
2/python/t0_cosmic_data_analyzer.py

Externe Abhängigkeiten: Die drei Skripte benötigen numpy, scipy, matplotlib, pandas und ephemer. Eine requirements_147.txt liegt unter 2/python/requirements_147.txt;

Installation: `pip install -r requirements_147.txt`. matplotlib ist in den ersten beiden Skripten optional (nur für Grafiken).

Analyzes IBM Quantum data for periodic cosmic signatures and positional correlations.

Experimental Tests

The scripts enable the following experimental tests with IBM Quantum hardware:

- **Position Dependence:** Qubits on gyri vs. sulci of the chip geometry
- **Time Dependence:** 24-hour and 12-hour periods in qubit performance
- **Fractal Arrangement:** Optimized qubit placement based on Δf

Expected Improvements

By applying the cosmic corrections, we expect:

- 10-20 percent longer coherence times T_2
- 5-15 percent reduced gate errors
- Optimal algorithm performance at specific cosmic times

All scripts are available in the GitHub repository:

<https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/tree/main/2/python/>

Literaturverzeichnis

- [1] Pascher, J. (2025). *T0 Zeit-Masse-Dualität: Fundamentale Prinzipien*. Verfügbar unter:
- [2] Pascher, J. (2025). *T0 Quantenfeldtheorie: Vollständige Erweiterung*. T0-Theorie Dokumentation, 020_T0_QM-QFT-RT_De.pdf
- [3] Pascher, J. (2025). *T0 Theorie: Erweiterung auf Bell-Tests*. T0-Theorie Dokumentation, 023_Bell_De.pdf
- [4] Pascher, J. (2025). *T0 Bell-Tests – Teil 2: Erweiterte Analyse*. T0-Theorie Dokumentation, 023a_Bell-Teil2_De.pdf
- [5] Pascher, J. (2025). *Geometrischer Formalismus der T0 Quantenmechanik*. T0-Theorie Dokumentation, 034_T0_QM-optimierung_De.pdf
- [6] Shor, P. W. (1997). *Polynomialzeit-Algorithmen für Primfaktorisation und diskrete Logarithmen auf einem Quantencomputer*. SIAM Journal on Computing, 26(5), 1484–1509.
- [7] Nielsen, M. A. und Chuang, I. L. (2010). *Quantencomputing und Quanteninformation*. Cambridge University Press.
- [8] Bell, J. S. (1964). *Zum Einstein-Podolsky-Rosen-Paradoxon*. Physics, 1(3), 195–200.
- [9] Aspect, A., Dalibard, J., und Roger, G. (1982). *Experimenteller Test der Bell-Ungleichungen mit zeitvariablen Analysatoren*. Physical Review Letters, 49(25), 1804–1807.
- [10] IBM Quantum (2024). *Eagle r3 Prozessor Spezifikationen*. <https://quantum-computing.ibm.com>
- [11] Yin, J., et al. (2017). *Satellitengestützte Verschränkungsverteilung über 1200 Kilometer*. Science, 356(6343), 1140–1144.
- [12] Pascher, J. (2025). *T0 Bell Test: 73-Qubit Monte Carlo Analysis (Fixed)*. Python implementation. Available at: github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/bell_73qubit_FIXED.py
- [13] Pascher, J. (2025). *T0 Bell Test: 73-Qubit Analysis Results*. Visualization and analysis. Available at: github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/bell_73qubit_fixed_analysis.png
- [14] Pascher, J. (2025). *T0-Shor Algorithm: Complete Theoretical Implementation*. Full T0 qubit class with energy field dynamics (630 lines). Available at: github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/t0_shor_complete.py
- [15] Pascher, J. (2025). *T0-Shor Algorithm: Production Hybrid Implementation*. ξ -resonance period finding and ϕ -hierarchy search (400 lines). Available at: github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/t0_shor_production.py

- [16] Pascher, J. (2025). *T0-Geometrieanalyse: Torus-Korrektur und -Optimierung*. Numerische Validierung der zylindrischen Näherung mit korrigierter toroidaler Modellierung, CHSH-Parameteranalyse und optimale Seitenverhältnisbestimmung (450 Zeilen). Verfügbar unter: github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/toroidal_vs_cylindrical_analysis.py

0.1 Detaillierte Beweise

Beweis von Lemma 3.2

Beweisansatz für Lemma 3.2: Für jede Periode $r \in [2, N]$ mit $N < 2^{20}$ existiert $k \in \mathbb{Z}$ und rationale Zahl c mit kleinem Nenner, sodass $|r - \phi_{\text{par}}^k \cdot c| < 1/(2r^2)$.

Schritt 1: Irrationale Verteilung von ϕ_{par} -Potenzen. Der goldene Schnitt $\phi_{\text{par}} = (1 + \sqrt{5})/2$ ist eine Pisot-Zahl mit minimalem Polynom $x^2 - x - 1 = 0$. Nach dem dreidimensionalen Weylschen Gleichverteilungssatz sind die Tripel

$$\left(\left\{ \frac{\phi_{\text{par}}^k}{r} \right\}, \left\{ \frac{\phi_{\text{par}}^{k+1}}{r} \right\}, \left\{ \frac{\phi_{\text{par}}^{k+2}}{r} \right\} \right)$$

für $k = 0, 1, \dots, K$ gleichverteilt im Einheitswürfel $[0, 1)^3$, da ϕ_{par} , ϕ_{par}^2 und ϕ_{par}^3 linear unabhängig über $\mathbb{Q}$ sind.

Schritt 2: Diophantische Approximation. Für jedes $r \in [2, N]$ betrachten wir die Folge $\{\phi_{\text{par}}^k \bmod r\}$ für $k = 0, \dots, \lceil \log_{\phi_{\text{par}}}(2r^2) \rceil$. Da die Folge gleichverteilt ist, existiert nach dem Dirichletschen Schubfachprinzip $k_1 < k_2$ mit:

$$|\phi_{\text{par}}^{k_1} - \phi_{\text{par}}^{k_2}| \bmod r < \frac{r}{M}$$

wobei $M = \lceil \log_{\phi_{\text{par}}}(2r^2) \rceil + 1$.

Schritt 3: Konstruktion der Approximation. Sei $d = k_2 - k_1$. Dann gilt:

$$\phi_{\text{par}}^{k_1} \cdot (\phi_{\text{par}}^d - 1) = m \cdot r + \epsilon$$

mit $|\epsilon| < r/M$, wobei $m \in \mathbb{Z}$. Umstellen ergibt:

$$r = \frac{\phi_{\text{par}}^{k_1}}{m} \cdot (\phi_{\text{par}}^d - 1) - \frac{\epsilon}{m}$$

Setze $c = (\phi_{\text{par}}^d - 1)/m$. Da ϕ_{par}^d ganzzahlig bis auf eine Fibonacci-Rekurrenz, ist m klein. Insbesondere für $d = 1, 2, 3, 4$:

$$\begin{aligned} \phi_{\text{par}}^1 - 1 &= 0.618 \approx \frac{5}{8} \\ \phi_{\text{par}}^2 - 1 &= 1.618 \approx \frac{13}{8} \\ \phi_{\text{par}}^3 - 1 &= 3.236 \approx \frac{26}{8} \\ \phi_{\text{par}}^4 - 1 &= 5.854 \approx \frac{47}{8} \end{aligned}$$

Schritt 4: Fehlerabschätzung. Mit $M > 2r^2$ und $m \leq r$ (da $\phi_{\text{par}}^{k_1} < r^2$) erhalten wir:

$$|r - \phi_{\text{par}}^{k_1} \cdot c| = \left| \frac{\epsilon}{m} \right| < \frac{r/M}{1} < \frac{1}{2r^2}$$

Schritt 5: Begrenzung auf $N < 2^{20}$. Für $N < 2^{20}$ gilt $\log_{\phi_{\text{par}}}(N) < \frac{20}{\log_2(\phi_{\text{par}})} \approx 28.8$. Daher genügen k -Werte bis 29. Die berechneten Approximationen:

$$\begin{aligned} r = 2 : \quad \phi_{\text{par}}^1 &= 1.618, \quad c = 1.236, \quad \text{Fehler} = 0.0001 \\ r = 3 : \quad \phi_{\text{par}}^2 &= 2.618, \quad c = 1, \quad \text{Fehler} = 0.382 \\ r = 4 : \quad \phi_{\text{par}}^3 &= 4.236, \quad c = 1, \quad \text{Fehler} = 0.236 \\ r = 5 : \quad \phi_{\text{par}}^4 &= 6.854, \quad c = 0.729, \quad \text{Fehler} = 0.005 \end{aligned}$$

Wegen $1/(2r^2) \leq 1/8 = 0.125$ für $r \geq 2$ erfüllen die Fehler 0.382 ($r = 3$) und 0.236 ($r = 4$) die Bedingung $< 1/(2r^2)$ nicht. Der Anhangsbeweis des Lemmas trägt damit nicht. Bei $r = 2$ ist $\phi_{\text{par}} \cdot 1.236 = 1.9999$, der Fehler also ≈ 0.0001 .

Beweis von Theorem 3.4

Beweisansatz:

Teil A: Signalanalyse Sei $f(x) = a^x \bmod N$ mit Periode r . Nach der Messung des Funktionsregisters im Standard-Shor-Algorithmus erhalten wir:

$$|\psi_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{j=0}^{M-1} |jr + \ell\rangle$$

wobei $M = \lfloor Q/r \rfloor$ und $\ell \in [0, r-1]$ zufällig.

Die QFT liefert:

$$|\psi_4\rangle = \frac{1}{\sqrt{QM}} \sum_{y=0}^{Q-1} \sum_{j=0}^{M-1} e^{2\pi i(jr+\ell)y/Q} |y\rangle$$

Die Amplitude bei y ist:

$$\alpha(y) = \frac{1}{\sqrt{QM}} e^{2\pi i \ell y/Q} \sum_{j=0}^{M-1} e^{2\pi i j r y/Q}$$

Teil B: ϕ -QFT-Modifikation Für ϕ -QFT ersetzen wir $Q = 2^n$ durch $Q_{\phi_{\text{par}}} = \phi_{\text{par}}^n$ und erhalten:

$$\alpha_{\phi}(y) = \frac{1}{\sqrt{Q_{\phi_{\text{par}}} M_{\phi}}} e^{2\pi i \ell y/Q_{\phi_{\text{par}}}} \sum_{j=0}^{M_{\phi}-1} e^{2\pi i j r y/Q_{\phi_{\text{par}}}}$$

mit $M_{\phi} = \lfloor Q_{\phi_{\text{par}}}/r \rfloor$.

Die Phase $\theta = 2\pi j r y/Q_{\phi_{\text{par}}}$ wird modifiziert durch Bell-Dämpfung:

$$\tilde{\alpha}_{\phi}(y) = \alpha_{\phi}(y) \cdot \exp\left(-\xi \frac{\theta^2}{\pi^2 \Delta f}\right)$$

Teil C: Peak-Positionen Die Hauptpeaks treten auf, wenn $ry/Q_{\phi_{\text{par}}}$ nahe einer ganzen Zahl s ist:

$$y_{\text{peak}} \approx \frac{s \cdot Q_{\phi_{\text{par}}}}{r}$$

Für Standard-QFT: $y_{\text{peak}} \approx s \cdot 2^n/r$ Für ϕ -QFT: $y_{\text{peak}} \approx s \cdot \phi_{\text{par}}^n/r$

Teil D: Fehleranalyse Der maximale Phasenfehler an einem Peak ist:

$$\Delta\phi = 2\pi \left(\frac{ry}{Q_{\phi_{\text{par}}}} - s \right)$$

Nach Lemma 3.2 existiert k mit:

$$\left| \frac{Q_{\phi_{\text{par}}}}{r} - \frac{2^n}{r} \cdot \frac{\phi_{\text{par}}^k}{2^k} \right| < \frac{0.2 \cdot 2^n}{r}$$

Daher:

$$\left| y_{\phi} - y_{\text{std}} \cdot \frac{\phi_{\text{par}}^k}{2^k} \right| < 0.2 y_{\text{std}}$$

Teil E: Kettenbruchstabilität Die Kettenbruchentwicklung extrahiert s/r aus y/Q falls:

$$\left| \frac{y}{Q} - \frac{s}{r} \right| < \frac{1}{2r^2}$$

Unser Fehler ist:

$$\left| \frac{y_{\phi}}{Q_{\phi_{\text{par}}}} - \frac{y_{\text{std}}}{2^n} \cdot \frac{\phi_{\text{par}}^k}{2^k} \right| < \frac{0.2}{r}$$

Mit $\frac{\phi_{\text{par}}^k}{2^k} \approx 1$ für optimale k wäre $0.2/r < 1/(2r^2)$ nötig; das gilt nur für $r < 2.5$, also nur für $r = 2$. Für allgemeine r ist die Kettenbruchbedingung damit nicht nachgewiesen. Beispiel $r = 3$: $0.067 > 0.056$.

Teil F: Erfolgswahrscheinlichkeit Die Erfolgswahrscheinlichkeit für Standard-Shor ist:

$$P_{\text{std}} = \frac{4}{\pi^2} - \frac{1}{3r} + O(r^{-2})$$

Für ϕ -QFT mit Bell-Dämpfung:

$$P_{\phi} = P_{\text{std}} \cdot \left(1 - \frac{\xi \ln(r)}{\Delta f} \right) + \Delta P$$

$$\Delta P = \frac{\xi}{\pi^2} \cdot \frac{\sin^2(\pi r/2)}{r^2}$$

Da $\xi \ln(r)/\Delta f \sim 10^{-4}$ und $\Delta P \sim \xi/r^2$, gilt:

$$P_{\text{std}} \leq P_{\phi} \leq P_{\text{std}} + \xi$$

□

0.2 Implementierungsdetails

Monte-Carlo-Simulation für Bell-Tests

Der vollständige Algorithmus für die Monte-Carlo-Simulation der 73-Qubit-Bell-Tests:

Algorithm 3 Monte-Carlo Bell Test Simulation**Require:** ξ : T0-Kopplungsparameter, n : Anzahl Qubits, N_{runs} : Simulationen**Ensure:** CHSH-Mittelwert, Standardfehler, Verteilung

```

1: Initialisiere  $\Delta f = 3 - \xi$ 
2: Definiere Messwinkel:  $\theta = [(0, \pi/4), (0, 3\pi/4), (\pi/2, \pi/4), (\pi/2, 3\pi/4)]$ 
3: Initialisiere  $\text{chsh\_values} = []$ 
4: for  $i = 1$  to  $N_{\text{runs}}$  do
5:    $\text{correlations} = []$ 
6:   for  $(a, b)$  in  $\theta$  do
7:      $\Delta\theta = a - b$ 
8:      $\text{damping} = \exp(-\xi \cdot \ln(n)/\Delta f)$ 
9:      $E = -\cos(\Delta\theta) \cdot \text{damping}$  {Singulett: negatives Vorzeichen}
10:     $\text{correlations.append}(E)$ 
11:   end for
12:    $\text{chsh} = |\text{correlations}[0] - \text{correlations}[1] + \text{correlations}[2] + \text{correlations}[3]|$ 
13:   Füge Shot-Noise hinzu:  $\text{chsh} \leftarrow \text{chsh} + \mathcal{N}(0, 1/\sqrt{\text{shots}})$ 
14:   Füge Feldfluktuationen hinzu:  $\text{chsh} \leftarrow \text{chsh} + \mathcal{N}(0, \xi^2 \cdot 0.1)$ 
15:    $\text{chsh\_values.append}(\text{chsh})$ 
16: end for
17: Berechne Mittelwert  $\mu = \text{mean}(\text{chsh\_values})$ 
18: Berechne Standardabweichung  $\sigma = \text{std}(\text{chsh\_values})$ 
19: Berechne Standardfehler  $\text{SEM} = \sigma/\sqrt{N_{\text{runs}}}$ 
20: return  $\{\mu, \sigma, \text{SEM}, \text{chsh\_values}\}$ 

```

Komplexitätsanalyse von T0-Shor**Satz:** Der T0-Shor-Algorithmus hat Zeitkomplexität $\mathcal{O}(\log^3 N)$.**Beweis:****Schritt 1: Standard-Shor-Komplexität**

- Modulare Exponentiation: $\mathcal{O}(\log^3 N)$ via wiederholtem Quadrieren
- QFT: $\mathcal{O}(\log^2 N)$
- Gesamt: $\mathcal{O}(\log^3 N)$

Schritt 2: T0-Erweiterungen

- Ordnungssuche: Teste $r \in [2, R]$ mit $R = \min(100, \sqrt{N})$
- Jeder Test: $a^r \bmod N$ via schneller Exponentiation: $\mathcal{O}(\log r \cdot \log^2 N)$
- Gesamt für Scan: $\mathcal{O}(R \cdot \log R \cdot \log^2 N) = \mathcal{O}(\log^2 N)$ für konstantes R
- ϕ -Hierarchie-Suche: Teste $k \in [0, \lceil \log_{\phi_{\text{par}}}(N) \rceil]$
- Jeder Test: $\mathcal{O}(\log^2 N)$
- Gesamt: $\mathcal{O}(\log N \cdot \log^2 N) = \mathcal{O}(\log^3 N)$

Schritt 3: Bell-Dämpfungsrechnung Für jedes Qubit-Gatter: Multiplikation mit $\exp(-\xi \ln(n)/\Delta f)$

- Kosten: $\mathcal{O}(1)$ pro Gatter
- Bei n Qubits und $\mathcal{O}(n^2)$ Gattern: $\mathcal{O}(n^2)$
- Da $n = \mathcal{O}(\log N)$: $\mathcal{O}(\log^2 N)$

Schritt 4: Gesamtkomplexität

$$\begin{aligned}
 T_{\text{T0-Shor}}(N) &= \underbrace{\mathcal{O}(\log^3 N)}_{\text{Standard-Shor}} + \underbrace{\mathcal{O}(\log^2 N)}_{\text{Ordnungssuche}} + \underbrace{\mathcal{O}(\log^3 N)}_{\phi\text{-Suche}} + \underbrace{\mathcal{O}(\log^2 N)}_{\text{Bell-Dämpfung}} \\
 &= \mathcal{O}(\log^3 N)
 \end{aligned}$$

Ein Term $\mathcal{O}(\xi \log N)$ folgt aus keinem Schritt; ein konstanter Faktor ξ hat in $\mathcal{O}(\cdot)$ keine Bedeutung.

Python-Code-Auszüge**Implementierung der Ordnungssuche:****Listing 1: Ordnungssuche**

```

def find_period_xi_resonance(a: int, N: int, max_r: int = 100) ->
    Optional[int]:
    """
    Findet Periode r mittels T0-Energie-Feld-Resonanzen.

    Args:
    a: Basis für modulare Exponentiation
    N: Zu faktorisierte Zahl
    max_r: Maximale zu testende Periode

    Returns:
    Periode r oder None wenn nicht gefunden
    """
    XI = 4/30000 # T0-Kopplungskonstante
    D_F = 3 - XI # Fraktale Dimension

    best_r = None
    best_resonance = -np.inf

    for r in range(2, min(N, max_r) + 1):
        # Berechne a^r mod N
        power = pow(a, r, N)

        # T0-fraktale Dämpfung
        xi_modulation = np.exp(-XI * r * r / D_F)

        # Resonanzstärke: maximale Energie bei a^r ≡ 1 (mod N)
        resonance = xi_modulation / (abs(power - 1) + 1)

        # Starke Resonanz erkannt
        if abs(power - 1) < 1e-10: # Exakte Übereinstimmung
            return r

        if resonance > best_resonance:
            best_resonance = resonance
            best_r = r

    # Falls starke Resonanz (Toleranz 1 Prozent)
    if best_resonance > 100: # Starker Peak
        return best_r

    return None

```

Bell-Dämpfungs-Implementierung für Multi-Qubit-Systeme:**Listing 2: Bell-Dämpfungs-Korrektur**

```

class T0Qubit:
    '''T0-Qubit mit Energie-Feld-Darstellung'''

    def __init__(self, z: float, r: float, theta: float):
        '''
        Args:
        z: Projektion auf Rechenbasis [-1, 1]
        r: Superpositionsamplitude [0, 1]
        theta: Phase [0,  $\pi$ 2)
        '''
        assert -1 ≤ z ≤ 1, f'z={z} außerhalb [-1, 1]'
        assert 0 ≤ r ≤ 1, f'r={r} außerhalb [0, 1]'
        assert abs(z**2 + r**2 - 1) < 1e-10, f'Normverletzung:
        ↪ z2+r2={z**2+r**2}'

        self.z = z
        self.r = r
        self.theta = theta % (2*np.pi)
        self.XI = 4/30000
        self.D_F = 3 - self.XI

    def apply_bell_damping(self, n_qubits: int):
        '''
        Wendet Bell-Dämpfung für n-Qubit-System an.

        Die Dämpfung folgt:  $\exp(-\ln(n)/D\_F)$ 
        '''
        damping = np.exp(-self.XI * np.log(n_qubits) / self.D_F)
        self.z *= damping
        self.r *= damping
        # Renormalisierung
        norm = np.sqrt(self.z**2 + self.r**2)
        self.z /= norm
        self.r /= norm

    def apply_hadamard_t0(self, n_qubits: int):
        '''
        T0-Hadamard-Gatter mit Bell-Dämpfung.

        Transformation:  $(z, r, \theta) \rightarrow (r, z, \theta + \pi/2)$ 
        '''
        # Basiswechsel
        new_z = self.r
        new_r = self.z

        # Bell-Dämpfung anwenden
        self.z = new_z
        self.r = new_r
        self.apply_bell_damping(n_qubits)

        # Phasenverschiebung
        self.theta = (self.theta + np.pi/2) % (2*np.pi)

    return self

```

```

def measure_deterministic(self) -> int:
    """
    Deterministische Messung via Energie-Feld-Auslesung.

    Rückgabe: 0 wenn z > 0, sonst 1
    """
    # Energie-Feld-Stärke
    energy_field = self.z**2 - self.r**2

    if energy_field > 0:
        return 0 # >|0-Zustand dominiert
    else:
        return 1 # >|1-Zustand dominiert

```

Fehleranalyse und Robustheit

Theorem (Robustheit von ϕ -QFT): Unter Phasenrauschen mit Varianz σ^2 hat ϕ -QFT mit Bell-Korrekturen eine Fehlerrate von $\mathcal{O}(\xi\sigma^2)$ im Vergleich zu $\mathcal{O}(\sigma)$ für Standard-QFT.

Beweis: Sei $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ Phasenrauschen. Für Standard-QFT:

$$|\alpha_{\text{std}}(y)| \rightarrow |\alpha_{\text{std}}(y)| \cdot (1 - |\epsilon|) + \mathcal{O}(\epsilon^2)$$

Für ϕ -QFT mit Bell-Dämpfung $\mathcal{D}(\theta) = \exp(-\xi\theta^2/(\pi^2\Delta f))$:

$$\begin{aligned}
 |\alpha_{\phi}(y)| &\rightarrow |\alpha_{\phi}(y)| \cdot \mathcal{D}(2\pi k r y / Q_{\phi_{\text{par}}} + \epsilon) \\
 &= |\alpha_{\phi}(y)| \cdot \exp\left(-\xi \frac{(2\pi k r y / Q_{\phi_{\text{par}}} + \epsilon)^2}{\pi^2 \Delta f}\right) \\
 &= |\alpha_{\phi}(y)| \cdot \left(1 - \frac{\xi \epsilon^2}{\Delta f} + \mathcal{O}(\epsilon^4)\right)
 \end{aligned}$$

Da $\xi \approx 1.333 \times 10^{-4}$, ist der führende Fehlerterm quadratisch in ϵ , während er für Standard-QFT linear ist.

Korollar: Für $\sigma = 0.1$:

$$\begin{aligned}
 \text{Fehler}_{\text{std}} &\approx 10\% \\
 \text{Fehler}_{\phi\text{-QFT}} &\approx \frac{\xi}{\Delta f} \cdot 0.01 \approx 4.44 \times 10^{-7}
 \end{aligned}$$

In den IBM-Tests ist die gemessene Varianz mit Shot-Noise verträglich (Verhältnis 1.02, Abschnitt .7); eine Varianzreduktion gegenüber QM wurde nicht beobachtet.

Numerische Stabilität und Genauigkeit

Die Implementierung verwendet folgende Techniken zur numerischen Stabilität:

1. **Logarithmische Berechnung:** Statt $\exp(-\xi \ln(n)/D_F)$ direkt zu berechnen, verwenden wir:

$$\text{damping} = \exp\left(-\frac{\xi}{D_F} \cdot \ln(n)\right)$$

mit doppelter Genauigkeit (64-bit floats).

2. **Energie-Feld-Normalisierung:** Nach jeder Operation:

$$(z, r) \leftarrow \frac{(z, r)}{\sqrt{z^2 + r^2}}$$

3. **Phasenwrapping:** Winkel werden immer modulo 2π gehalten:

$$\theta \leftarrow \theta \bmod 2\pi$$

4. **Resonanz-Erkennung:** Statt exakter Gleichheit $a^r \equiv 1 \pmod{N}$:

$$\text{resonance_threshold} = \max(1e-10, 1/\sqrt{N})$$

Dies gewährleistet Robustheit auch bei numerischen Ungenauigkeiten.