

Maximale Größe des Universums aus ξ

Schwarzschild-Radius, Hubble-Skala und die vollständige Skalenhierarchie

Johann Pascher · März 2026

<https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality>

März 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Ableitungskette: Von ξ zu beiden Skalgrenzen	2
	Der einzige fundamentale Parameter	2
	Herleitung der Teilchenmassen aus ξ	2
	Gravitationskonstante und Planck-Länge	3
	Minimale Längenskala	3
.2	Die obere Skala des kosmologischen Sektors: Hubble-Radius (ξ -Form, an H_0 kalibriert)	3
	Hubble-Energie in ξ -Schreibweise	3
	Hubble-Radius als obere Skala des kosmologischen Sektors	4
	Hubble-Radius und zugehörige Masse	4
.3	Die vollständige Skalenhierarchie	4
	Skalenhierarchie	4
	Das Verhältnis der Skalen	4
	Die vollständige Ableitungskette	5
.4	Physikalische Bedeutung	5
	Physikalische Bedeutung von R_H	5
	Skalenrelativität des Torus: fraktale Verschachtelung	6
	Lokalität, flacher Torus und Endlichkeit der Berechnungen	6
	Kosmologische Konstante in ξ -Schreibweise	8
.5	Zusammenfassung	8

Abstract

ξ ist der einzige fundamentale Parameter der T0-Theorie. Die vollständige Ableitungskette lautet: $\xi \rightarrow \{m_e, m_\mu, \dots\} \rightarrow G \rightarrow \ell_P$, mit $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ als Sub-Planck-Skala der Raumzeitgranulation. Die obere Skala des kosmologischen Sektors, R_H , wird in der Form $E_H = E_0 \cdot \xi^{41/4}$ geschrieben; der Exponent $41/4$ ist jedoch nicht aus ξ hergeleitet, sondern an den gemessenen H_0 kalibriert (Dok. 190, P35/P36). Das Verhältnis $R_H/L_0 = 6,49 \times 10^{64}$ ist daher die gemessene kosmische Skala in ξ -Schreibweise, kein eigenständiges ξ -Resultat.

Die Frage nach einer universellen Maximalgröße des Universums ist in der FFGFT jedoch nicht sinnvoll gestellt: **jede physikalische Skala besitzt ihre eigene systemspezifische Obergrenze** $R_{\text{Torus}}(m) = \hbar/mc$. Es gibt keine einzige kosmische Obergrenze, die für alle Systeme gilt — R_H ist die Obergrenze des kosmologischen Sektors, nicht des Universums als Ganzes.

.1 Ableitungskette: Von ξ zu beiden Skalengrenzen

Der einzige fundamentale Parameter

Die T0-Theorie hat einen einzigen fundamentalen Parameter (Dokument 013):

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \quad (1)$$

Alle physikalischen Größen leiten sich davon ab. Die vollständige Kette lautet:

$$\xi \rightarrow \{m_e, m_\mu, m_\tau, \dots\} \rightarrow G \rightarrow \ell_P \rightarrow c \quad (2)$$

mit $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ als fundamentale Sub-Planck-Skala der Raumzeitgranulation.

Herleitung der Teilchenmassen aus ξ

Die Leptonmassen folgen aus ξ über den geometrischen Strukturfaktor der Quantenzahlen $f(n, l, j)$ (keine Frequenz und nicht die Grundwindungszahl $f = 1/\xi$) und den T0-Skalierungsfaktor $S_{T0} = 1 \text{ MeV}/c^2$:

$$m_\ell = \frac{f(n, l, j)^2}{\xi^2} \cdot S_{T0} \quad (3)$$

Das geometrische Mittel der Leptonmassen liefert die charakteristische Energieskala:

$$E_0 = \sqrt{\frac{m_e \cdot m_\mu}{K_{\text{frak}}}} = 7,398 \text{ MeV} \quad (4)$$

Ohne fraktale Korrektur ist $\sqrt{m_e m_\mu} = 7,348 \text{ MeV}$. Mit diesem Anker gilt für die Feinstrukturkonstante:

$$\alpha = \xi \cdot \frac{E_0^2}{(1 \text{ MeV})^2} = \frac{1}{137,036} \quad (5)$$

Die Übereinstimmung mit dem Messwert ist eine Eigenschaft des Ankers E_0 , der den Anschluss an das SI leistet, keine unabhängige Vorhersage.

Gravitationskonstante und Planck-Länge

Die Gravitationskonstante folgt aus ξ und m_e (Dokumente 012, 013):

$$G_{\text{SI}} = \frac{\xi^2}{4 m_e} C_{\text{conv}} K_{\text{frak}} \quad \Rightarrow \quad \ell_{\text{P}} = \sqrt{\frac{\hbar G_{\text{SI}}}{c^3}} \quad (6)$$

Form und Größenordnung von G folgen aus ξ und dem einen Anker; die Übereinstimmung mit dem CODATA-Wert in den letzten Stellen enthält den kleinen Rest der Ein-Anker-Kette in C_{conv} (Dok. 383) und ist kein eigener Präzisionsbeleg. Mit $G_{\text{SI}} = 6,6745 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-2}$ ergibt sich:

$$\ell_{\text{P}} = 1,616 \times 10^{-35} \text{ m} \quad (7)$$

Minimale Längenskala

Minimale Längenskala aus ξ

$$L_0 = \xi \cdot \ell_{\text{P}} = 2,155 \times 10^{-39} \text{ m} \quad (8)$$

Die gesamte Ableitungskette $\xi \rightarrow m_e \rightarrow G \rightarrow \ell_{\text{P}} \rightarrow L_0$ hängt nur von ξ als einziger fundamentaler Eingabe ab. SI-Zahlenwerte entstehen durch die unvermeidliche Kalibrierung an menschliche Messeinheiten — physikalisch ist die Theorie parameterlos.

.2 Die obere Skala des kosmologischen Sektors: Hubble-Radius (ξ -Form, an H_0 kalibriert)

Hubble-Energie in ξ -Schreibweise

Die Hubble-Energie wird in ξ -Form geschrieben (Dokument 026):

$$E_H = E_0 \cdot \xi^{41/4} \quad (9)$$

mit $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}} = 7,398 \text{ MeV}$ und $\xi = 4/30000$. Der Exponent $41/4$ ist dabei *nicht* aus ξ hergeleitet, sondern so gewählt, dass der gemessene H_0 getroffen wird (Dok. 190, P35/P36); $\xi^{41/4}$ ist die gemessene kosmische Skala in ξ -Schreibweise, keine Vorhersage.

Numerische Auswertung:

$$\xi^{41/4} = (1,333 \times 10^{-4})^{41/4} = 1,908 \times 10^{-40} \quad (10)$$

$$E_H = 7,398 \text{ MeV} \times 1,908 \times 10^{-40} = 1,412 \times 10^{-33} \text{ eV} \quad (11)$$

Hubble-Konstante in ξ -Schreibweise

$$H_0^{\text{T0}} = \frac{E_H}{\hbar} = \frac{1,412 \times 10^{-33} \text{ eV}}{6,582 \times 10^{-16} \text{ eV s}} \approx 66,2 \text{ km/s/Mpc} \quad (12)$$

Abweichung vom Planck-Wert (67,4 km/s/Mpc): $-1,9\%$. Da der Exponent $41/4$ an H_0 kalibriert ist, ist dies keine Vorhersage.

Hubble-Radius als obere Skala des kosmologischen Sektors

Abgrenzung: Hubble-Radius vs. Teilchenhorizont

In der Standardkosmologie (expandierendes Λ CDM-Universum) unterscheidet man zwei kosmische Horizonte: den *Hubble-Radius* $R_H = c/H_0 \approx 1,4 \times 10^{26}$ m und den deutlich größeren *Teilchenhorizont* (beobachtbares Universum, $\approx 4,4 \times 10^{26}$ m $\approx 46,5$ Mrd. Lj), der die gesamte kausale Vergangenheit seit dem Urknall umfasst. Der Teilchenhorizont ist nur in einem expandierenden Universum mit Urknall sinnvoll definiert.

In der T0-Theorie gibt es keine Expansion und keinen Urknall. Der Hubble-Radius $R_H = c/H_0$ ist hier die Hubble-Länge: die obere Skala des kosmologischen Sektors, nicht die Größe des Universums und kein Horizont, jenseits dessen $z \rightarrow \infty$ gälte. Ein Teilchenhorizont im Λ CDM-Sinne existiert in T0 konzeptuell nicht. Numerische Vergleiche mit Standardwerten sind daher stets auf R_H , nicht auf den Teilchenhorizont zu beziehen.

Der Hubble-Radius folgt direkt aus der Hubble-Energie:

$$R_H = \frac{\hbar c}{E_H} = \frac{1,973 \times 10^{-7} \text{ eV m}}{1,412 \times 10^{-33} \text{ eV}} \quad (13)$$

Hubble-Radius in ξ -Schreibweise

$$R_H = 1,398 \times 10^{26} \text{ m} \quad (14)$$

In ξ -Schreibweise; der Exponent $41/4$ ist jedoch an H_0 kalibriert, kein eigenständiges ξ -Resultat (Dok. 190, P35/P36).

Hubble-Radius und zugehörige Masse

Die dem Hubble-Radius entsprechende Masse (nicht die Masse des gesamten Universums, das R_H übersteigt):

$$M_U = \frac{R_H \cdot c^2}{2G} = 9,43 \times 10^{52} \text{ kg} = 4,7 \times 10^{22} M_\odot \quad (15)$$

Hubble-Radius in ξ -Schreibweise

$$R_H = 1,398 \times 10^{26} \text{ m} \quad (16)$$

In ξ -Schreibweise; der Exponent $41/4$ ist jedoch an H_0 kalibriert, kein eigenständiges ξ -Resultat (Dok. 190, P35/P36).

.3 Die vollständige Skalenhierarchie

Skalenhierarchie

Das Verhältnis der Skalen

$$\frac{R_H}{L_0} = \frac{1,398 \times 10^{26} \text{ m}}{2,155 \times 10^{-39} \text{ m}} \quad (17)$$

Skala	Wert	Bedeutung
$L_0 = \xi \cdot \ell_P$	$2,155 \times 10^{-39} \text{ m}$	Sub-Planck-Skala
ℓ_P	$1,616 \times 10^{-35} \text{ m}$	Planck-Länge
$\lambda_e = \hbar/m_e c$	$3,86 \times 10^{-13} \text{ m}$	Elektron-Compton-Wellenlänge
$R_H = \hbar c/E_H$	$1,398 \times 10^{26} \text{ m}$	Hubble-Länge

Tabelle 1: Skalenhierarchie in ξ -Schreibweise (kosmologische Skala R_H an H_0 kalibriert)

Skalenverhältnis in ξ -Schreibweise

$$\frac{R_H}{L_0} = 6,49 \times 10^{64} \quad (18)$$

65 Größenordnungen zwischen minimaler Skala und Hubble-Länge — L_0 folgt aus $\xi = 4/30000$, R_H ist an H_0 kalibriert.

Die vollständige Ableitungskette

Vollständige Kette von ξ zu beiden Grenzen

$$\text{Lagrangian} \Rightarrow \xi = 4/30000$$

↓

$$G_{SI} = \frac{\xi^2}{4m_e} \times C_{\text{conv}} \times K_{\text{frak}} \Rightarrow \ell_P = \sqrt{\hbar G/c^3}$$

↓

↓

$$L_0 = \xi \cdot \ell_P \quad E_H = E_0 \cdot \xi^{41/4}$$

$$= 2,155 \times 10^{-39} \text{ m}$$

↓

$$R_H = \hbar c/E_H$$

$$= 1,398 \times 10^{26} \text{ m}$$

↓

$$\boxed{R_H/L_0 = 6,49 \times 10^{64} \quad (\text{an } H_0 \text{ kalibriert})} \quad (19)$$

.4 Physikalische Bedeutung

Physikalische Bedeutung von R_H

In einem statischen Universum ohne Expansion ist der Hubble-Radius die Hubble-Länge c/H_0 , die obere Skala des kosmologischen Sektors. Die Rotverschiebung von Photonen im ξ -Feld entsteht durch akkumulierte fraktale Wegverlängerung — nicht durch intrinsischen Energieverlust am Photon, sondern durch geometrische Streckung des Ausbreitungswegs. Lichtermüdung (*tired light*) tritt nicht auf.

Rotverschiebung ohne Expansion und ohne Frequenzabhängigkeit

Die Rotverschiebung entsteht durch fraktale Summation der Wegverlängerung von Photonen im T0-Vakuumfeld: $z \approx \xi \cdot \ln(d/\ell_P)$. Da die Wegverlängerung eine Eigenschaft der Geometrie selbst ist — nicht des Photons — nehmen alle Frequenzen exakt dieselbe Streckung. Es gibt keine Frequenzabhängigkeit. Der Effekt ist dem expandierenden Universum beobachtungsmäßig äquivalent, aber mechanistisch fundamental verschieden. Ausführlich hergeleitet in Dokument 026 (Geometrische Kosmologie). Die Formel liefert bei $d = R_H = 1,4 \times 10^{26}$ m nur $z = \xi \cdot 140,3 = 0,019$ (mit L_0 statt ℓ_P : 0,020) und wächst nur logarithmisch mit d . Einen Horizont mit $z \rightarrow \infty$ bei R_H ergibt sie nicht.

Skalenrelativität des Torus: fraktale Verschachtelung

In der T0-Theorie ist der 4D-Torus keine kosmische Behälterstruktur, in der sich Teilchen befinden. Jedes physikalische System trägt vielmehr **seinen eigenen charakteristischen Torus**, dessen Skala durch die Compton-Wellenlänge $\bar{\lambda} = \hbar/mc$ des jeweiligen Systems bestimmt wird:

$$R_{\text{Torus}}(m) = \frac{\hbar}{mc} \quad (20)$$

System	Charakteristische Skala	Verhältnis zu L_0
Elektron	$3,86 \times 10^{-13}$ m	$\sim 10^{26}$
Proton	$2,10 \times 10^{-16}$ m	$\sim 10^{23}$
Wasserstoff	$5,29 \times 10^{-11}$ m	$\sim 10^{28}$
Galaxie	$\sim 10^{21}$ m	$\sim 10^{60}$
Kosmolog. Sektor	$R_H = 1,40 \times 10^{26}$ m	$6,49 \times 10^{64}$

Tabelle 2: Systemspezifische Torus-Skalen — alle mit L_0 als gemeinsamer Untergrenze

Fraktale Verschachtelung ohne starre Hierarchie

Diese Strukturen sind nicht wie russische Puppen ineinandergesteckt — der Elektronen-Torus sitzt nicht *im* Galaxien-Torus. Jede Skala ist die geometrische Eigenstruktur des jeweiligen Systems, konstituiert durch dessen Masse. Die gemeinsame Untergrenze L_0 ist auf allen Ebenen dieselbe; die Obergrenze ist systemspezifisch. Die fraktale Kopplung zwischen den Skalen ist durch ξ vermittelt und damit sehr klein. Wechselwirkungen zwischen weit voneinander entfernten Skalen — etwa zwischen Elektronenstruktur und kosmologischem Feld — sind nicht null, aber unterdrückt durch Potenzen von $\xi \approx 1,33 \times 10^{-4}$. Diese schwache skalenübergreifende Kopplung ist physikalisch relevant: sie ist der Ursprung des fraktalen Korrekturfaktors K_{frak} , etwa im Anker E_0 und in der Formel für G — kleine, aber messbare Beiträge, die im Standardmodell fehlen oder als freie Parameter eingeführt werden müssen.

Lokalität, flacher Torus und Endlichkeit der Berechnungen

Der T0-Torus ist nicht der anschauliche Donut-Torus, der in $\mathbb{R}^3$ eingebettet ist. Er ist der **flache Identifikations-Torus** $T^n = \mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$: ein euklidischer Raum, bei dem gegenüberliegende Ränder identifiziert werden. Dieser Torus hat **intrinsische Krümmung** $K = 0$ **überall punktwiese** — nicht nur im Integral. Lokal ist er exakt identisch mit $\mathbb{R}^n$, ohne jede Näherung.

Flacher Torus: lokal exakt euklidisch

Beim eingebetteten Donut-Torus in $\mathbb{R}^3$ variiert die Gaußsche Krümmung: außen positiv ($K > 0$), innen negativ ($K < 0$). Das Integral verschwindet exakt (Gauss-Bonnet: $\int K dA = 2\pi\chi = 0$ für $\chi = 0$). Beim flachen Identifikations-Torus hingegen gilt $K = 0$ *überall* — es gibt keine Innen- und Außenkrümmung, die sich erst im Integral aufheben müssen. Berechnungen innerhalb dieses Torus sind exakt dieselben wie in unbegrenztem euklidischen Raum. Keine Krümmungskorrekturen, keine topologischen Terme.

Daraus folgen drei Konsequenzen für Berechnungen in der T0-Theorie:

1. Keine Renormierung notwendig. Alle Feldintegrale laufen über den endlichen lokalen Torus mit Skala $R_{\text{Torus}}(m) = \hbar/mc$. Da dieser Torus endlich ist und lokal flach, sind UV-Divergenzen strukturell ausgeschlossen. Die obere Integrationsgrenze ist nicht ∞ , sondern R_{Torus} ; die untere ist L_0 . Beide sind endlich und aus ξ abgeleitet.

2. Die ξ -Korrektur für unendliches Universum ist nicht vernachlässigbar klein, sondern schlicht irrelevant. Formal würde ein unendliches Universum eine Korrektur $\sim \xi \cdot \ln(R_\infty/R_H)$ erzeugen, die mit $R_\infty \rightarrow \infty$ logarithmisch divergiert. Diese Divergenz greift aber nicht, weil alle physikalischen Observablen Integrale über den *lokalen* Torus des jeweiligen Systems sind. Beiträge von Skalen $\gg R_{\text{Torus}}(m)$ koppeln nicht an lokale Physik — sie sind durch ξ -Potenzen unterdrückt und fallen außerhalb des Integrationsbereichs. Die Frage, ob das Universum endlich oder unendlich ist, hat keinen Einfluss auf lokale Berechnungen.

3. Krümmungskorrekturen sind absolut vernachlässigbar. Die relative Krümmungskorrektur auf der kleinsten physikalischen Skala L_0 innerhalb eines Torus der Skala R_{Torus} beträgt $(L_0/R_{\text{Torus}})^2$:

$$\begin{aligned} \text{Elektron: } \left(\frac{L_0}{\bar{\lambda}_e}\right)^2 &= \left(\frac{2,155 \times 10^{-39}}{3,86 \times 10^{-13}}\right)^2 \approx 3,1 \times 10^{-53} \\ \text{Proton: } \left(\frac{L_0}{\bar{\lambda}_p}\right)^2 &\approx 1,1 \times 10^{-46} \end{aligned}$$

Diese Werte sind für alle praktischen Berechnungen exakt null.

Ein Feld — Massen als Knoten — emergente Kohärenzlänge

Hinter diesen drei Konsequenzen steht eine einheitliche ontologische Struktur: Es gibt **ein einziges ξ -Vakuumsfeld**. Es gibt keine separate Hierarchie von Feldern für verschiedene Skalen.

Massen sind **topologische Knoten** in diesem Feld — lokale Strukturen, keine externen Objekte. Jeder Knoten der Masse m trägt durch die Dualität $\tilde{T} = 1/m$ eine charakteristische Zeitskala, und daraus emergiert unmittelbar seine räumliche Kohärenzlänge $\hbar/mc$. Der Torus-Radius ist nicht von außen zugewiesen, sondern folgt aus der Knotenstruktur selbst.

Die Hierarchie der Torus-Skalen — vom Proton-Knoten ($\sim 10^{-16}$ m) bis zur Hubble-Länge ($\sim 10^{26}$ m) — ist damit nichts anderes als die **fraktale Selbstähnlichkeit eines einzigen Feldes**: dasselbe ξ auf jeder Skala, dieselbe Untergrenze L_0 , systemspezifische Kohärenzlängen als emergente Eigenschaft der jeweiligen Knotenstruktur. Die skalenübergreifende Kopplung ist nicht null, aber durch ξ -Potenzen unterdrückt — daher rechnet man lokal, ohne das Gesamtfeld zu kennen, und erhält trotzdem exakte Ergebnisse.

Der Exponent $41/4$ in $E_H = E_0 \cdot \xi^{41/4}$ ist an H_0 kalibriert; seine Vorwärts-Herleitung aus der ξ -Feldtheorie fehlt (Dokument 026) — wie in jedem Rahmen, denn die Relation zwischen

Planck-Länge und R_H leitet keine Theorie aus ersten Prinzipien her (P39). Die Nähe von $H_0 = 66,2 \text{ km/s/Mpc}$ zum Planck-Wert ($-1,9\%$) folgt aus dieser Kalibrierung und ist kein Konsistenzargument.

Zur Rolle von R_H in Berechnungen

Der genaue Zahlenwert von R_H spielt für die physikalischen Berechnungen innerhalb der T0-Theorie eine untergeordnete Rolle. Die strukturell bedeutsame Größe ist $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ — sie folgt rein aus ξ und ist die eigentliche Grundlage aller Skalenaussagen. R_H hingegen ist in zweifacher Hinsicht anders geartet: Erstens ist sein Zahlenwert an den gemessenen H_0 gekoppelt (bzw. hängt vom noch abzuleitenden Exponenten $41/4$ ab). Zweitens ist R_H in T0 nicht primär ein berechnetes Ergebnis, sondern die **Hubble-Länge** c/H_0 : die obere Skala des kosmologischen Sektors, nicht die Größe des Universums und kein Horizont mit $z \rightarrow \infty$. Das tatsächliche Universum übersteigt R_H ; messbar ist nur eine untere Schranke. Das Verhältnis $R_H/L_0 = 6,49 \times 10^{64}$ drückt daher keine tiefe theoretische Wahrheit aus, sondern den Abstand zwischen der geometrisch abgeleiteten Untergrenze und der beobachtungsbasierten Hubble-Länge. Die eigentliche Leistung der Theorie liegt in L_0 — nicht in R_H .

Kosmologische Konstante in ξ -Schreibweise

Aus der Skalenhierarchie ergibt sich die dimensionslose kosmologische Konstante:

$$\Lambda_{\text{dim}} = \left(\frac{\ell_P}{R_H} \right)^2 = \left(\frac{1,616 \times 10^{-35}}{1,398 \times 10^{26}} \right)^2 \approx 1,34 \times 10^{-122} \quad (21)$$

Der Standardwert beträgt $\Lambda_{\text{dim}} \approx 2,87 \times 10^{-122}$ (aus $\Lambda \approx 1,1 \times 10^{-52} \text{ m}^{-2}$, CODATA). Das T0-Ergebnis liegt in derselben Größenordnung (Faktor 2,1) — keine Dunkle Energie, sondern eine geometrische Lesart der Skalenhierarchie. Da R_H an H_0 kalibriert ist, folgt Λ damit nicht aus ξ allein.

.5 Zusammenfassung

Vollständige Skalenhierarchie in ξ -Schreibweise

Untergrenze: $L_0 = \xi \cdot \ell_P = 2,155 \times 10^{-39} \text{ m}$

Planck: $\ell_P = 1,616 \times 10^{-35} \text{ m}$

Elektron: $\lambda_e = \hbar/m_e c = 3,86 \times 10^{-13} \text{ m}$

Hubble: $R_H = \hbar c/E_H = 1,398 \times 10^{26} \text{ m}$

Alle Skalen in ξ -Schreibweise — R_H an H_0 kalibriert, kein freier Parameter (22)

Die Beschreibung ist geometrisch selbstkonsistent: L_0 ist die universelle Untergrenze, R_H die obere Skala des kosmologischen Torus-Sektors, nicht die Ausdehnung des Universums.

Kernaussage: Gibt es eine Maximalgröße des Universums?

Die Frage ist in der FFGFT nicht sinnvoll als globale Frage gestellt. Jede physikalische Skala — vom Proton bis zur Hubble-Länge — besitzt ihre **eigene systemspezifische Obergrenze** $R_{\text{Torus}}(m) = \hbar/mc$, emergent aus der Knotenstruktur der jeweiligen Masse im einzigen ξ -Feld. R_H ist die Obergrenze des kosmologischen Sektors. Die universelle Untergrenze L_0 gilt für alle Skalen gleichermaßen — eine universelle Obergrenze existiert nicht, weil es keine skalenunabhängige Physik gibt, für die sie relevant wäre.

Epistemologische Rahmung: Modellgrenzen statt Existenzgrenzen

L_0 und R_H sind keine physikalischen Wände und keine Aussagen über die Gesamtgröße oder Gesamtstruktur des Universums. Sie sind **Grenzen der Beschreibbarkeit** innerhalb der T0-Theorie: unterhalb von L_0 divergiert die Raumzeitgranulation, R_H ist die an H_0 kalibrierte obere Skala des kosmologischen Sektors. Was außerhalb dieser Grenzen existiert oder nicht existiert, ist keine Frage der Theorie.

Der entscheidende Vorzug gegenüber anderen Ansätzen liegt nicht in dieser epistemologischen Bescheidenheit allein, sondern darin, dass T0 **keinerlei Regularisierungstricks benötigt**: keine Renormierungsverfahren zur Beseitigung von UV-Divergenzen, keine künstlichen Cutoffs, keine Counterterms, keine Einführung von Zusatzfeldern zur Kontrolle des Unendlichen. L_0 entsteht nicht als nachträgliche Korrektur, sondern als direkte geometrische Konsequenz von ξ . Die Theorie ist von vornherein endlich — nicht weil Unendlichkeiten weggerechnet wurden, sondern weil der Parameter ξ sie strukturell ausschließt.

Hinweis: Verbindung zum SI-System

Die absoluten Zahlenwerte in diesem Dokument — L_0 , R_H , M_U in SI-Einheiten — setzen eine Verbindung zum SI-Einheitensystem voraus. Diese ist nicht zirkulär, sondern epistemologisch notwendig: Aus einem dimensionslosen ξ allein lassen sich keine absoluten Meter- oder Kilogramm-Werte ableiten. Die Verbindung erfolgt über m_e , ℓ_p oder α als äquivalente Einstiegspunkte. Ausführlich behandelt in Dokument 180 (Abschnitt: Verbindung zum SI-System) sowie in Dokument 056 und 101. Dokumente 180, 181 und 182 bilden eine Einheit und sollten nicht getrennt gelesen werden.

Der Exponent $41/4$ bedarf noch der vollständigen Ableitung aus der ξ -Feldtheorie (Dokument 026).

ξ^N -Trivialität (P35)

Grundsatz (P35, korpusweit): Ausdrücke der Form „ $X = \xi^N$ “ sind *für sich allein aussagelos*, da sich jede positive Größe als ξ -Potenz schreiben lässt — ein Exponent allein ist keine Vorhersage.

Was eine Aussage nicht-trivial macht: (i) Die *Form* ist vorwärts hergeleitet (geometrisch oder algebraisch erzwungen), nicht nachträglich angepasst. (ii) Der *Exponent* ist rational

und aus der Struktur ablesbar, nicht frei gewählt. (iii) Die Zahl (Vorfaktor, Anker) ist eine *externe Kalibrierung* und als solche deklariert (vgl. P20, P33, P39).

Für dieses Dokument: Die Exponenten der Skalenhierarchie ($R_H \sim \xi^{-41/4} \ell_P$ u. a.) sind geometrisch plausibel **[B]**, aber der kosmische Exponent $41/4$ ist nicht vorwärts hergeleitet, sondern an H_0 kalibriert (P20, P39). Aussagen dieser Art sind als **[S]** einzustufen, nicht als **[K]**.