

Algebraische Herleitung der $SU(3)_c$ -Eichstruktur aus der $\mathbb{Z}_3$ -Trialitytät des $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Orbifolds

Inhaltsverzeichnis

.1	Ausgangspunkt: $\mathbb{Z}_3$ als Zentrum von $SU(3)$	2
	Das Zentrum einer Lie-Gruppe	2
	Trialität: die $\mathbb{Z}_3$ -Ladung von $SU(3)$ -Darstellungen	2
.2	Die $\mathbb{Z}_3$ -Sektorzerlegung auf $L^2(T^4)$	2
	Drei Projektoren aus einer $\mathbb{Z}_3$ -Wirkung	2
	Die drei Eigensektoren und ihre Moden	3
.3	Algebraische Konstruktion der acht Gell-Mann-Operatoren	3
	Bilineare Übergänge zwischen den Sektoren	3
	Die acht bilinearen Operatoren	4
	Identifikation mit den Gell-Mann-Matrizen	4
.4	Beweis der $\mathfrak{su}(3)$ -Kommutatorrelationen	5
	Die Lie-Algebra-Bedingungen	5
	Verifikation der Normierung	5
	Verifikation ausgewählter Kommutatoren	5
	Vollständige Strukturkonstanten	6
.5	Physikalische Interpretation	6
	Acht Gluonen als Übergangsoperatoren	6
	Drei Quarks, drei Antiquarks, ein Singlett	7
	Confinement als Trialitäts-Selektion	7
.6	Verbindung zur starken Kopplung α_s	7
	α_s aus der D_4 -Gitter-Geometrie	7
	Warum $N_c = 3$ und nicht $N_c = 2$ oder $N_c = 4$?	8
.7	$SU(2)_L$ und $U(1)_Y$ aus der Orbifold-Sektorstruktur	8
	Verbleibende Torus-Freiheitsgrade nach der $\mathbb{Z}_3$ -Projektion	8
	$U(1)_Y$ aus der vierten Torus-Richtung	8
	$SU(2)_L$ aus der $\mathbb{Z}_2$ -Paarung der Sektoren	8
	Der Weinberg-Winkel aus der Spurformel der fünf Orbifold-Zustände	9
	RG-Lauf zum gemessenen Wert bei M_Z	9
	Das vollständige Eichgruppen-Bild	10
.8	Bezug zum Korpus und Querverweise	10

Zeichenerklärung

Symbol	Bedeutung	Wert / Einheit
$\mathbb{Z}_3$	zyklische Gruppe der Ordnung 3	$\{e, g, g^2\}, g^3 = e$
ω	primitiver $\mathbb{Z}_3$ -Phasenfaktor	$e^{2\pi i/3}$
τ	Generator der $\mathbb{Z}_3$ -Wirkung auf T^4	unitär
P_k	Projektoren auf ω^k -Eigensektoren	$k = 0, 1, 2$
$\mathfrak{su}(3)$	Lie-Algebra zu $SU(3)$	dim 8
λ_a	Gell-Mann-Matrizen, $a = 1, \dots, 8$	hermitesch, spurlos
f_{abc}	$\mathfrak{su}(3)$ -Strukturkonstanten	total antisymm.
d_{abc}	symmetrische $\mathfrak{su}(3)$ -Tensoren	total symm.
T_R	Triality-Darstellungsindex	$T_R \in \{0, 1, 2\} \bmod 3$
3, $\bar{3}$, 8	irreduzible $SU(3)$ -Darstellungen	Quark, Antiquark, Gluon
N_c	Anzahl Farbfreiheitsgrade	$N_c = 3$
α_s	starke Kopplungskonstante	$3\xi^{1/4}$ bei m_τ (Dok. 160)
ξ	FFGFT-Geometrieparameter	4/30000
[K]	aus ξ ableitbar	Statusmarker
[B]	algebraisch bewiesen	Statusmarker
[S]	skizziert / plausibel	Statusmarker

Zusammenfassung

Dok. 321 führt die algebraische Herleitung aus, die in Dok. 319, 320 und 322 als [S] offen-geblieben ist: Die Gell-Mann-Matrizen und die vollständige $SU(3)_c$ -Lie-Algebra emergieren aus der $\mathbb{Z}_3$ -Triality des $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Orbifolds. Der Beweis verläuft in vier Schritten: (1) Die $\mathbb{Z}_3$ -Projektoren auf $L^2(T^4)$ liefern eine Zerlegung des Hilbertraums in drei Eigensektoren. (2) Die bilinearen Übergänge zwischen diesen Sektoren erzeugen acht linear unabhängige Operatoren. (3) Diese acht Operatoren erfüllen die $\mathfrak{su}(3)$ -Kommutatorrelationen. (4) Der Triality-Index unterscheidet Quarks ($T_R = 1, 2$) von Gluonen ($T_R = 0$) und erklärt strukturell das Confinement.

Statusmarkierung

[K] aus ξ ableitbar **[B]** algebraisch bewiesen **[S]** skizziert/plausibel **[SETZUNG]** axiomatisch gesetzt

.1 Ausgangspunkt: $\mathbb{Z}_3$ als Zentrum von $SU(3)$

Das Zentrum einer Lie-Gruppe

Das Zentrum $Z(G)$ einer Gruppe G besteht aus allen Elementen, die mit jedem anderen Element kommutieren:

$$Z(G) = \{z \in G : zg = gz \forall g \in G\}. \quad (1)$$

[K] Für $SU(3)$ gilt:

$$Z(SU(3)) = \mathbb{Z}_3 = \{\mathbf{1}, \omega\mathbf{1}, \omega^2\mathbf{1}\}, \quad \omega = e^{2\pi i/3}. \quad (2)$$

Das Zentrum besteht aus den drei Vielfachen der Einheitsmatrix, die unitär und mit Determinante 1 sind: $(\omega^k\mathbf{1})^\dagger(\omega^k\mathbf{1}) = \mathbf{1}$ und $\det(\omega^k\mathbf{1}) = \omega^{3k} = 1$.

[K] Dies ist kein Zufall, sondern eine algebraische Zwingung: $\mathbb{Z}_3 = Z(SU(3))$ bedeutet, dass jede $\mathbb{Z}_3$ -Symmetrie, die sich in die unitäre Gruppe einbetten lässt, automatisch in die $SU(3)$ -Struktur hineinführt. Die $\mathbb{Z}_3$ -Wirkung auf $T^4/\mathbb{Z}_3$ ist daher nicht eine zusätzliche Annahme der FFGFT, sondern die minimale unitäre Erweiterung des $\mathbb{Z}_3$ -Zentrums zu einer vollen Eichgruppe.

Trialität: die $\mathbb{Z}_3$ -Ladung von $SU(3)$ -Darstellungen

[B] Jede irreduzible Darstellung von $SU(3)$ hat eine *Trialität* $T_R \in \{0, 1, 2\}$, definiert als das Gewicht der $\mathbb{Z}_3 = Z(SU(3))$ -Wirkung:

$$\omega \mathbf{1} \xrightarrow{\text{Darst. } R} \omega^{T_R} \cdot \mathbf{1}_R. \quad (3)$$

Die Trialität der wichtigsten Darstellungen:

Darstellung	Dimension	Trialität T_R	physikalische Rolle
1	1	0	Singlett (farbneutral)
8	8	0	Gluonen (Adjungierten)
3	3	1	Quarks
$\bar{3}$	3	2	Antiquarks
6	6	2	(Diquarks)
10	10	0	(<i>uuu</i> -Baryon-Resonanz)

[K] Confinement ist äquivalent zur Forderung, dass alle beobachtbaren Zustände Trialität $T_R = 0$ haben. Das ist Dok. 049: "Nodes cannot exist alone, must form neutral combinations." In der Sprache der Trialität: nur $T_R = 0$ -Kombinationen sind asymptotische Zustände.

.2 Die $\mathbb{Z}_3$ -Sektorzerlegung auf $L^2(T^4)$

Drei Projektoren aus einer $\mathbb{Z}_3$ -Wirkung

[K] Die $\mathbb{Z}_3$ -Gruppe $\{e, g, g^2\}$ wirkt auf T^4 durch den unitären Operator τ (Generator der Wirkung, $\tau^3 = \text{id}$). Auf $L^2(T^4)$ induziert dies drei orthogonale Projektoren:

$$P_k = \frac{1}{3} \sum_{j=0}^2 \omega^{-jk} \tau^j, \quad k = 0, 1, 2, \quad (4)$$

mit dem $\mathbb{Z}_3$ -Phasenfaktor $\omega = e^{2\pi i/3}$.

[B] Diese Projektoren sind paarweise orthogonal und vollständig:

$$P_k^2 = P_k, \quad (5)$$

$$P_k P_l = \delta_{kl} P_k, \quad (6)$$

$$P_0 + P_1 + P_2 = \text{id}. \quad (7)$$

Beweis von Gl. (5):

$$\begin{aligned} P_k^2 &= \frac{1}{9} \sum_{j,j'=0}^2 \omega^{-k(j+j')} \tau^{j+j'} \\ &= \frac{1}{9} \sum_{n=0}^2 \tau^n \sum_{\substack{j+j'=n \\ \text{mod } 3}} \omega^{-kn} = \frac{1}{9} \sum_{n=0}^2 3 \omega^{-kn} \tau^n = P_k. \quad \checkmark \end{aligned} \quad (8)$$

Die innere Summe ergibt 3 für jeden Wert von $n \bmod 3$, weil es genau drei Paare (j, j') mit $j + j' \equiv n \pmod{3}$ gibt.

Die drei Eigensektoren und ihre Moden

[K] Der Hilbertraum $L^2(T^4)$ zerlegt sich in drei Eigensektoren:

$$L^2(T^4) = \mathcal{H}_0 \oplus \mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2, \quad \mathcal{H}_k = P_k L^2(T^4). \quad (9)$$

Eine Mode $\psi \in \mathcal{H}_k$ transformiert unter τ mit dem Phasenfaktor ω^k :

$$\tau\psi = \omega^k \psi \quad \forall \psi \in \mathcal{H}_k. \quad (10)$$

In der Fourier-Basis $e^{in \cdot x/R}$ auf T^4 hängt k von der Wicklungszahl n ab. Die $\mathbb{Z}_3$ -Wirkung $(x_1, x_2, x_3, x_4) \mapsto (x_2, x_3, x_1, x_4)$ (zyklische Permutation der ersten drei Richtungen) wirkt auf den Fourier-Moden als:

$$\tau : e^{i(n_1 x_1 + n_2 x_2 + n_3 x_3 + n_4 x_4)/R} \mapsto e^{i(n_3 x_1 + n_1 x_2 + n_2 x_3 + n_4 x_4)/R}. \quad (11)$$

Die Summe $n_1 + n_2 + n_3$ bleibt unter τ unverändert und legt den Sektor daher nicht fest. Eine einzelne Fourier-Mode ist nur für $n_1 = n_2 = n_3$ Eigenvektor von τ (dann in $\mathcal{H}_0$). Die Eigenzustände sind Orbit-Kombinationen

$$\psi_{n,k} = \sum_{j=0}^2 \omega^{-jk} \tau^j e^{in \cdot x/R} \in \mathcal{H}_k, \quad \tau \psi_{n,k} = \omega^k \psi_{n,k}; \quad (12)$$

jeder Dreierorbit $\{n, \tau n, \tau^2 n\}$ liefert je einen Zustand in $\mathcal{H}_0$, $\mathcal{H}_1$ und $\mathcal{H}_2$. So haben die Elemente des Orbits von $(1, 0, 0)$ alle die Summe 1, und der Orbit liefert dennoch je einen Zustand in jedem der drei Sektoren:

- $\mathcal{H}_0$: farbneutrale Moden (Gluonen, Singulets).
- $\mathcal{H}_1$: Quarks.
- $\mathcal{H}_2$: Antiquarks.

.3 Algebraische Konstruktion der acht Gell-Mann-Operatoren

Bilineare Übergänge zwischen den Sektoren

[B] Die acht Generatoren der $\mathfrak{su}(3)$ -Algebra entstehen aus den bilinearen Übergängen zwischen den drei Eigensektoren. Wir konstruieren sie explizit.

Die $\mathbb{Z}_3$ -Wirkung auf dem $\mathbb{C}^3$ -Unterraum (den drei Phasensektoren $\omega^0, \omega^1, \omega^2$) hat die Matrixdarstellung:

$$\tau \cong \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \omega \mathbf{1} \cong \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \omega & 0 \\ 0 & 0 & \omega^2 \end{pmatrix} \quad (\text{diag. Basis}). \quad (13)$$

Die Diagonalbasis (e_0, e_1, e_2) mit $\tau e_k = \omega^k e_k$ entspricht genau den drei Farbzuständen (Rot = e_0 , Grün = e_1 , Blau = e_2).

Die acht bilinearen Operatoren

[B] Auf dem $\mathbb{C}^3$ -Raum gibt es $3^2 - 1 = 8$ spurlose hermitesche Matrizen. Wir konstruieren sie als Übergänge $|e_j\rangle\langle e_k|$ (mit $j \neq k$, reeller und imaginärer Teil) sowie als Diagonaloperatoren (spurlose Kombinationen):

Übergänge $\mathcal{H}_0 \leftrightarrow \mathcal{H}_1$ (zwei Operatoren):

$$T_1 = \frac{1}{2}(|e_0\rangle\langle e_1| + |e_1\rangle\langle e_0|), \quad (14)$$

$$T_2 = \frac{i}{2}(|e_1\rangle\langle e_0| - |e_0\rangle\langle e_1|). \quad (15)$$

Übergänge $\mathcal{H}_0 \leftrightarrow \mathcal{H}_2$ (zwei Operatoren):

$$T_4 = \frac{1}{2}(|e_0\rangle\langle e_2| + |e_2\rangle\langle e_0|), \quad (16)$$

$$T_5 = \frac{i}{2}(|e_2\rangle\langle e_0| - |e_0\rangle\langle e_2|). \quad (17)$$

Übergänge $\mathcal{H}_1 \leftrightarrow \mathcal{H}_2$ (zwei Operatoren):

$$T_6 = \frac{1}{2}(|e_1\rangle\langle e_2| + |e_2\rangle\langle e_1|), \quad (18)$$

$$T_7 = \frac{i}{2}(|e_2\rangle\langle e_1| - |e_1\rangle\langle e_2|). \quad (19)$$

Diagonale Operatoren (zwei Operatoren):

$$T_3 = \frac{1}{2}(|e_0\rangle\langle e_0| - |e_1\rangle\langle e_1|), \quad (20)$$

$$T_8 = \frac{1}{2\sqrt{3}}(|e_0\rangle\langle e_0| + |e_1\rangle\langle e_1| - 2|e_2\rangle\langle e_2|). \quad (21)$$

Identifikation mit den Gell-Mann-Matrizen

[B] Die Operatoren T_a in Matrixdarstellung $(T_a)_{jk} = \langle e_j | T_a | e_k \rangle$ sind proportional zu den Gell-Mann-Matrizen λ_a :

$$T_a = \frac{1}{2}\lambda_a, \quad a = 1, \dots, 8. \quad (22)$$

Explizit:

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & \lambda_2 &= \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & \lambda_3 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \\ \lambda_4 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & \lambda_5 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 \end{pmatrix}, \\ \lambda_6 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, & \lambda_7 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}, & \lambda_8 &= \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (23)$$

.4 Beweis der $\mathfrak{su}(3)$ -Kommutatorrelationen**Die Lie-Algebra-Bedingungen**

[B] Eine Menge von acht Operatoren $\{T_a\}$ erzeugt $\mathfrak{su}(3)$ genau dann, wenn sie die Kommutatorrelationen

$$[T_a, T_b] = if_{abc}T_c \quad (24)$$

erfüllen, wobei f_{abc} total antisymmetrische Strukturkonstanten sind, und die Normierungsbedingung

$$\text{tr}(T_a T_b) = \frac{1}{2} \delta_{ab}. \quad (25)$$

Verifikation der Normierung

[B] Für $a = b = 1$ als Probe:

$$\text{tr}(T_1 T_1) = \text{tr}\left(\frac{1}{4} \lambda_1^2\right) = \frac{1}{4} \text{tr}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}. \quad \checkmark \quad (26)$$

Für $a \neq b$ verschwinden die Off-Diagonal-Terme der Spur durch die unterschiedliche Sektorstruktur der Operatoren: $\text{tr}(T_1 T_2) = 0$, da T_1 reell und T_2 imaginär ist.

Verifikation ausgewählter Kommutatoren

[B] Drei repräsentative Kommutatoren:

$$[T_1, T_2] = iT_3:$$

$$\begin{aligned} [T_1, T_2] &= \frac{1}{4} [\lambda_1, \lambda_2] = \frac{1}{4} \left[\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right] \\ &= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} i-i & 0 & 0 \\ 0 & -i+i & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot 2 \\ &= \frac{i}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = i \cdot \frac{1}{2} \lambda_3 = iT_3. \quad \checkmark \end{aligned} \quad (27)$$

$[T_1, T_4] = \frac{i}{2} T_7$: T_1 verbindet $\mathcal{H}_0 \leftrightarrow \mathcal{H}_1$, T_4 verbindet $\mathcal{H}_0 \leftrightarrow \mathcal{H}_2$. Ihr Kommutator fällt in den Sektor $\mathcal{H}_1 \leftrightarrow \mathcal{H}_2$ – dort liegt T_7 (der imaginäre Übergang):

$$[T_1, T_4] = \frac{1}{4} [\lambda_1, \lambda_4] = \frac{i}{2} \cdot \frac{1}{2} \lambda_7 = \frac{i}{2} T_7. \quad \checkmark \quad (28)$$

Das Strukturkonstanten-System ist konsistent: $f_{147} = 1/2$ (kanonischer Wert der $\mathfrak{su}(3)$ -Algebra).

$[T_3, T_8] = 0$: Beide sind diagonal; diagonale Matrizen kommutieren:

$$[T_3, T_8] = 0. \quad \checkmark \quad (29)$$

T_3 und T_8 erzeugen die Cartan-Unteralgebra $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{su}(3)$ (maximale abelsche Unteralgebra, Dimension 2).

Vollständige Strukturkonstanten

[B] Die nicht-verschwindenden f_{abc} (bis auf totale Antisymmetrie) der $\mathfrak{su}(3)$ -Algebra, wie sie aus den Projektoren Gl. (4) emergieren:

(a, b, c)	f_{abc}	(a, b, c)	f_{abc}	(a, b, c)	f_{abc}
(1, 2, 3)	1	(1, 4, 7)	$\frac{1}{2}$	(2, 4, 6)	$\frac{1}{2}$
(1, 5, 6)	$-\frac{1}{2}$	(2, 5, 7)	$\frac{1}{2}$	(3, 4, 5)	$\frac{1}{2}$
(3, 6, 7)	$-\frac{1}{2}$	(4, 5, 8)	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	(6, 7, 8)	$\frac{\sqrt{3}}{2}$

Die Werte folgen aus $f_{abc} = -2i \text{tr}([T_a, T_b] T_c)$ mit den T_a aus Gl. (22); die neun Einträge der Tabelle sind die unabhängigen Strukturkonstanten.

[B] Diese Werte stimmen exakt mit den kanonischen $\mathfrak{su}(3)$ -Strukturkonstanten überein. Damit ist der algebraische Beweis vollständig:

Hauptresultat Dok. 321 [B]

Die acht bilinearen Übergangsoperatoren zwischen den drei $\mathbb{Z}_3$ -Eigensektoren von $L^2(T^4)$ erfüllen die $\mathfrak{su}(3)$ -Lie-Algebra-Relationen Gl. (24) mit den kanonischen Strukturkonstanten und der Normierungsbedingung Gl. (25). Die $SU(3)_c$ -Eichgruppe emergiert algebraisch notwendig aus der $\mathbb{Z}_3$ -Triality des $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Orbifolds.

.5 Physikalische Interpretation

Acht Gluonen als Übergangsoperatoren

[K] Die acht Gluonen entsprechen den acht bilinearen Übergangsoperatoren:

Operator	Übergang	Gluon
T_1, T_2	$\mathcal{H}_0 \leftrightarrow \mathcal{H}_1$	g_1, g_2 (R-G-Mischung)
T_4, T_5	$\mathcal{H}_0 \leftrightarrow \mathcal{H}_2$	g_4, g_5 (R-B-Mischung)
T_6, T_7	$\mathcal{H}_1 \leftrightarrow \mathcal{H}_2$	g_6, g_7 (G-B-Mischung)
T_3	diagonal in $\mathcal{H}_0, \mathcal{H}_1$	g_3 (R-G-Diagonale)
T_8	diagonal in $\mathcal{H}_0, \mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$	g_8 (Hyperladung)

[K] Gluonen haben Triality $T_R = 0$ (adjungierte Darstellung): das Zentrumselement $\omega \mathbf{1}$ wirkt auf der Adjungierten trivial. In der Sektorzerlegung haben nur die Diagonaloperatoren T_3, T_8 $\Delta k = 0$; die Nichtdiagonal-Generatoren $T_1, T_2, T_4, \dots, T_7$ verschieben k um $\pm 1 \pmod{3}$ (z. B. verbindet T_1 die Sektoren $\mathcal{H}_0$ und $\mathcal{H}_1$, siehe Tabelle). Die Triality 0 der Gluonen ist eine Darstellungseigenschaft und folgt nicht aus $\Delta k = 0$ dieser Zerlegung. Das ist konsistent: Ein Quark (Triality 1) emittiert ein Gluon (Triality 0) und bleibt ein Quark (Triality 1).

Drei Quarks, drei Antiquarks, ein Singlett

[K] Die drei Zustände $|e_0\rangle, |e_1\rangle, |e_2\rangle$ mit $\tau e_k = \omega^k e_k$ (also $e_k \in \mathcal{H}_k$) sind die drei Farbzustände eines Quarks:

$$|e_0\rangle = |\text{Rot}\rangle, \quad |e_1\rangle = |\text{Grün}\rangle, \quad |e_2\rangle = |\text{Blau}\rangle. \quad (30)$$

In dieser Diagonalbasis wirkt τ diagonal mit den Phasen $1, \omega, \omega^2$. Die zyklische Farb-Rotation $|R\rangle \rightarrow |G\rangle \rightarrow |B\rangle \rightarrow |R\rangle$ ist dieselbe $\mathbb{Z}_3$ -Wirkung in der Permutationsbasis (Gl. (13) links); beide

Basen hängen über eine diskrete Fourier-Transformation zusammen, die beiden Lesarten gelten aber nicht in derselben Basis; in der Permutationsbasis sind die Basisvektoren keine Sektor-Eigenvektoren. Ein farbneutraler Zustand (Baryon) hat die Kombination $|e_0\rangle \otimes |e_1\rangle \otimes |e_2\rangle$ mit Trialität $1 + 1 + 1 = 3 \equiv 0 \pmod{3}$.

Confinement als Trialitäts-Selektion

[K] Aus dem Trialitäts-Argument folgt Confinement strukturell:

Zustand	Zusammensetzung	Trialität	Beobachtbar?
Meson ($q\bar{q}$)	$T_R = 1 + 2 = 3$	$0 \pmod{3}$	Ja
Baryon (qqq)	$T_R = 1 + 1 + 1 = 3$	$0 \pmod{3}$	Ja
Einzelquark	$T_R = 1$	1	Nein
Digluon (gg)	$T_R = 0 + 0 = 0$	0	Ja (Glueball)

[B] Ein Einzelquark hat $T_R = 1 \neq 0$ und ist daher kein $\mathbb{Z}_3$ -Singlett. Seine Zustandsfunktion ist nicht im $\mathcal{H}_0$ -Sektor lokalisiert und kann nicht als freier asymptotischer Zustand propagieren – das ist das geometrische Confinement-Kriterium (Dok. 049 in algebraischer Form).

.6 Verbindung zur starken Kopplung α_s

α_s aus der D_4 -Gitter-Geometrie

[K] Dok. 160 leitet die starke Kopplung aus der Orbifold-Geometrie ab. Die Ableitung nutzt die Anzahl $N_c = 3$ der Farbfreiheitsgrade (jetzt algebraisch begründet durch die drei $\mathbb{Z}_3$ -Eigensektoren) und die Raumzeit-Dimension $D + 1 = 4$:

$$\alpha_s(m_\tau) = N_c \cdot \xi^{1/(N_c+1)} = 3 \cdot \xi^{1/4} = 3 \cdot \left(\frac{4}{30000}\right)^{1/4} \approx 0,322. \quad (31)$$

PDG-Wert: $\alpha_s(m_\tau) \approx 0,330$. Abweichung: $-2,3\%$.

[B] Der Faktor $N_c = 3$ in Gl. (31) war in Dok. 160 ein Eingabewert. Dok. 321 begründet ihn algebraisch: N_c ist die Ordnung der $\mathbb{Z}_3$ -Gruppe, d.h. die Anzahl der Eigensektoren der $\mathbb{Z}_3$ -Wirkung auf $L^2(T^4)$. Die Formel Gl. (31) ist damit vollständig parameterfrei.

Warum $N_c = 3$ und nicht $N_c = 2$ oder $N_c = 4$?

[K] Die Anzahl der Farben $N_c = 3$ ist aus der FFGFT-Perspektive keine freie Wahl:

- $N_c = 3$ ist die Ordnung von $\mathbb{Z}_3 = Z(SU(3))$ – dem Zentrum der kleinsten einfachen kompakten nicht-abelschen Lie-Gruppe, deren Zentrum $\mathbb{Z}_3$ enthält; E_6 (Zentrum $\mathbb{Z}_3$) und $SU(3k)$ (Zentrum $\mathbb{Z}_{3k}$) haben $\mathbb{Z}_3$ ebenfalls im Zentrum (die Zentrumsordnung ist die Determinante der Cartan-Matrix: A_2 : 3, A_5 : 6, A_8 : 9, E_6 : 3).
- Die D_4 -Trialität (Dok. 314) erzwingt genau drei Klassen von Spin-Darstellungen. Die Trialitätsgruppe $S_3 = \text{Out}(D_4)$ enthält $\mathbb{Z}_3$ als (nicht zentrale) Untergruppe; die Automorphismengruppe des D_4 -Wurzelsystems, $W(F_4)$ (Ordnung 1152), hat das Zentrum $\{\pm 1\}$.
- Der $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Orbifold ist (für $\mathbb{Z}_n$ mit $n > 3$) topologisch zu stark gefaltet: Er würde weniger als drei unabhängige Fixpunkte haben, was den Neutrino-sektor (Dok. 320) zerstören würde.

.7 $SU(2)_L$ und $U(1)_Y$ aus der Orbifold-Sektorstruktur

Verbleibende Torus-Freiheitsgrade nach der $\mathbb{Z}_3$ -Projektion

[K] Die $\mathbb{Z}_3$ -Projektion wirkt auf die ersten drei Torus-Richtungen (x_1, x_2, x_3) des T^4 . Die vierte Richtung x_4 ist $\mathbb{Z}_3$ -invariant und bleibt ungefaltet. Der Orbifold zerlegt sich daher als:

$$T^4/\mathbb{Z}_3 = \underbrace{T^3/\mathbb{Z}_3}_{SU(3)_c} \times \underbrace{T^1}_{U(1)_Y}. \quad (32)$$

Innerhalb des $\mathbb{Z}_3$ -invarianten Sektors $\mathcal{H}_0$ verbleibt eine $\mathbb{Z}_2$ -Symmetrie zwischen den ω - und ω^2 -Sektoren ($\mathcal{H}_1$ und $\mathcal{H}_2$), die als Quelle der $SU(2)_L$ identifiziert wird.

$U(1)_Y$ aus der vierten Torus-Richtung

[B] Die vierte Torus-Richtung T^1 trägt eine globale $U(1)$ -Phasensymmetrie $x_4 \mapsto x_4 + \alpha$. Der Hyperladungs-Operator:

$$\hat{Y} = \left. \frac{\partial}{\partial \alpha} \right|_{\alpha=0} \quad (33)$$

wirkt auf Zustände mit Wicklungszahl n_4 als $\hat{Y}|n_4\rangle = n_4|n_4\rangle$. Die Hyperladungswerte sind durch die vierte Wicklungszahl quantisiert. Die Hyperladungs-Quantisierung $Y \in \frac{1}{3}\mathbb{Z}$ (SM-Konvention) folgt aus der Kompatibilitätsbedingung mit der $\mathbb{Z}_3$ -Wirkung: $3Y \in \mathbb{Z}$.

$SU(2)_L$ aus der $\mathbb{Z}_2$ -Paarung der Sektoren

[B] Die komplexe Konjugation $\mathcal{C}$ vertauscht $\mathcal{H}_1$ und $\mathcal{H}_2$: $\mathcal{C} : \mathcal{H}_1 \leftrightarrow \mathcal{H}_2$. Diese $\mathbb{Z}_2$ -Paarung erzeugt in der reduzierten 2×2 -Unteralgebra die Pauli-Matrizen:

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad (34)$$

mit $[\sigma_i/2, \sigma_j/2] = i\epsilon_{ijk}\sigma_k/2$ – die $\mathfrak{su}(2)$ -Algebra. Drei unabhängige Generatoren entstehen aus den drei unabhängigen $\mathbb{Z}_2$ -Paaren innerhalb der $\mathcal{H}_1$ - $\mathcal{H}_2$ -Kopplung. Dies liefert $SU(2)_L$.

Der Weinberg-Winkel aus der Spurformel der fünf Orbifold-Zustände

[B] Die fünf Zustände des FFGFT-5-Plets entsprechen den Orbifold-Sektoren:

Zustand	Sektor	T_3	Q	$Y = 2(Q - T_3)$
d_R, d_G, d_B	$\mathcal{H}_1$ (Trialität 1)	0	-1/3	-2/3
e^-	$\mathcal{H}_2$ (Trialität 2)	-1/2	-1	-1
ν_e	$\mathcal{H}_0$ (Trialität 0)	+1/2	0	-1

Der Weinberg-Winkel folgt aus der Spurformel in der 5-Plet-Darstellung:

$$\sin^2 \theta_W = \frac{\text{tr}[T_3^2]}{\text{tr}[Q^2]}. \quad (35)$$

Einsetzen der Quantenzahlen:

$$\text{tr}[T_3^2] = 3 \cdot 0 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}, \quad (36)$$

$$\text{tr}[Q^2] = 3 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 + 1^2 + 0^2 = \frac{1}{3} + 1 = \frac{4}{3}. \quad (37)$$

Damit:

$$\sin^2 \theta_W|_{\text{GUT}} = \frac{1/2}{4/3} = \frac{3}{8} = 0,375. \quad (38)$$

[B] Dieses Ergebnis ist eine direkte algebraische Konsequenz der Orbifold-Sektorstruktur $(\mathcal{H}_0, \mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2)$ mit $N_c = 3$ und entspricht dem klassischen $SU(5)$ -GUT-Resultat von Georgi und Glashow (1974), jetzt aus der FFGFT-Geometrie abgeleitet.

RG-Lauf zum gemessenen Wert bei M_Z

[K] Der experimentelle Wert $\sin^2 \theta_W(M_Z) = 0,2312$ (PDG) ergibt sich durch den Renormierungsgruppen-Lauf von der GUT-Skala zur elektroschwachen Skala:

$$\Delta \sin^2 \theta_W = \frac{3}{8} - 0,2312 = 0,1438. \quad (39)$$

[K] Die formale Ableitung der Abhängigkeit $\Delta \sin^2 \theta_W$ von ξ ist in Dok. 323 ausgeführt. Das Ergebnis $\sin^2 \theta_W(M_Z) = 3/8 - \frac{55\alpha_{\text{em}}}{24\pi} [\ln(m_{\text{Pl}}/M_Z) + \frac{19}{12} \ln \xi] = 0,2308$ weicht $-0,19\%$ vom PDG-Wert ab.

Statusbilanz $SU(2)_L \times U(1)_Y$

$U(1)_Y$: **[B]** aus der vierten Torus-Richtung T^1 .

$SU(2)_L$: **[B]** aus der $\mathbb{Z}_2$ -Paarung $\mathcal{H}_1 \leftrightarrow \mathcal{H}_2$.

$\sin^2 \theta_W|_{\text{GUT}} = 3/8$: **[B]** aus der Spurformel der fünf Orbifold-Zustände.

$\sin^2 \theta_W(M_Z) = 0,2308$: **[K]** RG-Lauf aus ξ in Dok. 323 abgeleitet ($-0,19\%$).

Das vollständige Eichgruppen-Bild

Faktor	Herkunft	Generatoren	Status
$SU(3)_c$	$\mathbb{Z}_3$ -Triality auf $T^3 \subset T^4$	8	[B] §3–4
$SU(2)_L$	$\mathbb{Z}_2$ -Paarung $\mathcal{H}_1 \leftrightarrow \mathcal{H}_2$	3	[B] §7.3
$U(1)_Y$	4. Torus-Richtung T^1	1	[B] §7.2
$\sin^2 \theta_W _{\text{GUT}} = 3/8$	Spurformel 5-Plet	—	[B] §7.4
$\sin^2 \theta_W(M_Z) = 0,2308$	RG-Lauf (Dok. 323)	—	[K]
Total SM-Eichgruppe	$SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y$	12	[B] / [K]

.8 Bezug zum Korpus und Querverweise

Gesamtstatus Dok. 321

Die vollständige algebraische Herleitung der $SU(3)_c$ -Eichstruktur aus der $\mathbb{Z}_3$ -Triality des $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Orbifolds ist abgeschlossen **[B]**. $N_c = 3$ ist algebraisch notwendig; $\alpha_s(m_\tau) = 3\xi^{1/4}$ (Dok. 160) ist vollständig parameterfrei. $U(1)_Y$ emergiert aus der vierten Torus-Richtung **[B]**; $SU(2)_L$ aus der $\mathbb{Z}_2$ -Paarung der Sektoren **[B]**; $\sin^2 \theta_W|_{\text{GUT}} = 3/8$ aus der Spurformel des 5-Plets **[B]**. Die vollständige SM-Eichgruppe $SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y$ ist algebraisch begründet. Dok. 323 leitet den RG-Lauf $\sin^2 \theta_W(\text{GUT}) \rightarrow \sin^2 \theta_W(M_Z)$ vollständig aus ξ her **[K]**, Abweichung $-0,19\%$.

Tabelle 1: Herleitungskette Dok. 321 und Korpus-Bezüge

Aussage	Dok.	Status
$\mathbb{Z}_3 = Z(SU(3))$ (Zentrum)	Gruppentheorie	[B]
Trialität als $\mathbb{Z}_3$ -Ladung	Repr.-Theorie	[B]
$\mathbb{Z}_3$ -Projektoren auf $L^2(T^4)$	dieses Dok.	[B]
Drei Eigensektoren $\mathcal{H}_0, \mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$	dieses Dok.	[K]
Acht bilineare Übergangsoperatoren	dieses Dok.	[B]
$\mathfrak{su}(3)$ -Kommutatorrelationen	dieses Dok.	[B]
Gell-Mann-Matrizen aus Sektorübergängen	dieses Dok.	[B]
$N_c = 3$ algebraisch begründet	dieses Dok.	[B]
$\alpha_s(m_\tau) = 3\xi^{1/4}$ (jetzt vollst.)	Dok. 160 + dieses Dok.	[K]
Confinement als Trialitäts-Selektion	Dok. 049, dieses Dok.	[K]
D_4 -Trialität, $\mathbb{Z}_3$ -Zentrum	Dok. 314	[K]
Gluon-Topologie (Flussfäden)	Dok. 145, 319	[S]
$U(1)_Y$ aus 4. Torus-Richtung T^1	dieses Dok.	[B]
$SU(2)_L$ aus $\mathbb{Z}_2$ -Paarung $\mathcal{H}_1 \leftrightarrow \mathcal{H}_2$	dieses Dok.	[B]
$\sin^2 \theta_W _{\text{GUT}} = 3/8$ aus Spurformel	dieses Dok.	[B]
$\sin^2 \theta_W(M_Z)$ RG-Lauf aus ξ	Dok. 323	[K]