

T0-Theorie: ξ und e

1. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Einleitung: Die geometrische Basis der T0-Theorie	2
	Historische und konzeptionelle Grundlagen	2
	Die tetraedrische Herkunft von ξ	3
	Die fraktale Raumzeit-Dimension	3
.2	Die Euler'sche Zahl als dynamischer Operator	4
	Mathematische Grundlagen von e	4
	Zeit-Masse-Dualität als fundamentales Prinzip	4
.3	Detaillierte Analyse der Leptonenmassen	5
	Die Massenhierarchie als Verhältnisse	5
	Logarithmische Symmetrie und ihre Konsequenzen	6
.4	Fraktale Raumzeit und Quantenfeldtheorie	6
	Das Renormierungsproblem und seine Lösung	6
	Modifizierte Skalenflussequationen	7
.5	Kosmologische Anwendungen und Vorhersagen	7
	Urknall und CMB-Temperatur	7
	Dunkle Energie und kosmologische Konstante	8
.6	Experimentelle Tests und Vorhersagen	8
	Präzisionstests in der Teilchenphysik	8
	Kosmologische Tests	9
.7	Mathematische Vertiefung	9
	Die π - e - ξ Trinität	9
	Gruppentheoretische Interpretation	10
.8	Experimentelle Konsequenzen	10
	Präzisionsvorhersagen	10

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Abschnitt „Die Massenhierarchie als Verhältnisse“ (vorher „Die exponentielle Massenhierarchie“): Exponentialform $e^{\xi \cdot 7499} = 2.718$ (Faktor 76 unter $m_\mu/m_e = 206.77$) $\rightarrow$ Verhältnisse $\frac{12}{5}\xi^{-1/2}, \frac{125}{144}\xi^{-1/3}$ (Dok. 352); Abschnitt „Gruppentheoretische Interpretation“ entsprechend angepasst.
- Abschnitt „Die Zeit-Masse-Dualität“: T_μ, T_τ korrigiert (6.23×10^{-24} s, 3.70×10^{-25} s); die Zeitskalen sind Compton-Zeiten, nicht Lebensdauern.
- Abschnitt „Das Renormierungsproblem“: $\Lambda_{T0} = E_P/\xi: 7.5 \times 10^{22} \rightarrow 9.2 \times 10^{22}$ GeV.
- Abschnitt „Logarithmische Symmetrie“: $m_\mu = \sqrt{m_e m_\tau}$ (30.1 MeV) $\rightarrow m_\mu = \frac{24\sqrt{3}}{25}\xi^{-1/12}\sqrt{m_e m_\tau} = 105.4$ MeV (bare, Dok. 352).
- Lösung der modifizierten β -Funktion: 2π -Normierung und fehlender Kreuzterm $L \ln(m_e/E_0)$ korrigiert.
- Tetraeder/Umkugel: $V_{\text{sphäre}} = \pi\sqrt{6}/16 \rightarrow \pi\sqrt{6}/8$, Verhältnis $0.513 \rightarrow 0.1225$; $D_f(E)$ und D_f^{eff} -Formel ergeben 4 bzw. 2.203, nicht 2.973 (vermerkt); $T_{\text{CMB}} = T_P e^{-114\xi} = 1.395 \times 10^{32}$ K statt 2.725 K.

Abstract

Dieses Dokument bietet eine umfassende Analyse der fundamentalen Beziehung zwischen dem geometrischen Parameter $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ der T0-Theorie und der Euler'schen Zahl $e = 2.71828 \dots$. Die T0-Theorie basiert auf tiefen geometrischen Prinzipien aus tetraedrischer Packung und postuliert eine fraktale Raumzeit mit lokaler Dimension $D_f^{\text{Raum}} = 3 - \xi \approx 2,9999$ und einer effektiven Dimension $D_f^{\text{eff}} \approx 2,973$ aus dem kumulativen Skalenfluss. Wir zeigen detailliert, wie Potenzen und Exponentialformen von ξ die Hierarchie der Teilchenmassen (als Verhältnisse), Zeitskalen und fundamentalen Konstanten aus ersten Prinzipien beschreiben. Besonderes Augenmerk liegt auf der mathematischen Konsistenz und den experimentell überprüfbaren Vorhersagen der Theorie.

1 Einleitung: Die geometrische Basis der T0-Theorie**Historische und konzeptionelle Grundlagen**

Die T0-Theorie entstand aus der Beobachtung, dass fundamentale physikalische Konstanten und Massenverhältnisse nicht zufällig verteilt sind, sondern tiefen mathematischen Beziehungen folgen. Im Gegensatz zu vielen anderen Ansätzen postuliert T0 keine neuen Teilchen oder zusätzlichen Dimensionen, sondern eine fundamentale geometrische Struktur der Raumzeit selbst.

Das zentrale Paradigma der T0-Theorie:

Die Physik auf fundamentaler Ebene ist nicht durch zufällige Parameter charakterisiert, sondern durch eine zugrundeliegende geometrische Struktur, die durch den

Parameter ξ quantifiziert wird. Die Euler'sche Zahl e dient als der natürliche Operator, der diese geometrische Struktur in dynamische Prozesse übersetzt.

Die tetraedrische Herkunft von ξ

Geometrische Ableitung von $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$:

Die fundamentale Konstante ξ leitet sich aus der Geometrie regelmäßiger Tetraeder ab. Für einen Tetraeder mit Kantenlänge a :

$$V_{\text{tetra}} = \frac{\sqrt{2}}{12} a^3 \quad (1)$$

$$R_{\text{umkugel}} = \frac{\sqrt{6}}{4} a \quad (2)$$


$$V_{\text{sphäre}} = \frac{4}{3} \pi R_{\text{umkugel}}^3 = \frac{\pi \sqrt{6}}{8} a^3 \quad (3)$$

$$\frac{V_{\text{tetra}}}{V_{\text{sphäre}}} = \frac{\sqrt{2}/12}{\pi \sqrt{6}/8} = \frac{2\sqrt{3}}{9\pi} \approx 0.1225 \quad (4)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $V_{\text{sphäre}} = \frac{\pi \sqrt{6}}{16} a^3$ und Verhältnis $\approx 0.513 - \frac{4}{3} \pi (\frac{\sqrt{6}}{4})^3 = \frac{\pi \sqrt{6}}{8} = 0.962$; das Verhältnis $\frac{2\sqrt{3}}{9\pi}$ ist damit richtig, sein Wert aber 0.1225. Ebenso in der Abbildung.)

Durch Skalierung und Normierung ergibt sich:

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} = \left(\frac{V_{\text{tetra}}}{V_{\text{sphäre}}} \right) \times \text{Skalierungsfaktor} \quad (5)$$



Die fraktale Raumzeit-Dimension

Die fraktale Natur der Raumzeit

Eine der radikalsten Aussagen der T0-Theorie ist, dass die Raumzeit auf fundamentaler Ebene fraktale Eigenschaften besitzt. Die effektive Dimension hängt von der Energieskala ab:

$$D_f(E) = 4 - 2\xi \cdot \ln\left(\frac{E_P}{E}\right) \quad (6)$$

Für niedrige Energien ($E \ll E_P$):

$$D_f \approx 4 \quad (\text{klassische Raumzeit}) \quad (7)$$

Für hohe Energien ($E \sim E_P$):

$$D_f^{\text{eff}} \approx 2,973 \quad (\text{effektive fraktale Dimension über kumulativen Skalenfluss}) \quad (8)$$

Physikalische Interpretation:

- Bei kleinen Abständen/hohen Energien wird die fraktale Struktur der Raumzeit sichtbar
- Die effektive Dimension $D_f^{\text{eff}} \approx 2,973$ ist kein Zufall, sondern folgt aus der kumulativen Wirkung der fraktalen Struktur über den Skalenfluss
- Dies erklärt das Renormierungsverhalten der Quantenfeldtheorien
Die fraktale Dimension wird berechnet durch:

$$D_f^{\text{eff}} = 2 + \frac{\ln(1/\xi)}{\ln(E_P/E_0)} \approx 2,97 \quad (9)$$

mit $E_P = 1.221 \times 10^{19}$ GeV (Planck-Energie) und $E_0 = 1$ GeV (Referenzenergie). (Vermerk vom 30. Sept. 2026: Die Formel $D_f(E) = 4 - 2\xi \ln(E_P/E)$ ergibt bei $E = E_P$ genau 4 und fällt zu kleinen Energien hin ab (3.988 bei 1 GeV, 3.983 bei 1 eV); 2.973 verlangte $\ln(E_P/E) \approx 3850$. Die Zuordnung „niedrig ≈ 4 , hoch ≈ 2.973 “ folgt aus ihr nicht. Ebenso ergibt die Formel unten $2 + \ln(7500)/\ln(1.221 \times 10^{19}) = 2.203$, nicht 2.97; der Wert $D_f^{\text{eff}} = 2.973$ stammt aus dem kumulativen Skalenfluss (A040), nicht aus diesen beiden Formeln.)

.2 Die Euler'sche Zahl als dynamischer Operator

Mathematische Grundlagen von e

Die einzigartigen Eigenschaften von e :

Die Euler'sche Zahl ist durch mehrere äquivalente Definitionen charakterisiert:

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad (10)$$

$$e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \quad (11)$$

$$\frac{d}{dx} e^x = e^x \quad (12)$$

$$\int e^x dx = e^x + C \quad (13)$$

In der T0-Theorie erhält e eine besondere Bedeutung als der natürliche Übersetzer zwischen diskreter geometrischer Struktur und kontinuierlicher dynamischer Entwicklung.

Zeit-Masse-Dualität als fundamentales Prinzip

Die Zeit-Masse-Dualität: $T \cdot m = 1$

In natürlichen Einheiten ($\hbar = c = 1$) gilt die fundamentale Beziehung:

$$T \cdot m = 1 \quad (14)$$

Dies bedeutet:

- Jedes Teilchen hat eine charakteristische Zeitskala $T = 1/m$
- Schwere Teilchen leben typischerweise kürzer
- Leichte Teilchen haben längere charakteristische Zeitskalen
- Die ξ -Modulation führt zu Korrekturen der Ordnung ξ

Beispiele:

$$\text{Elektron: } T_e = \hbar/(m_e c^2) \approx 1.29 \times 10^{-21} \text{ s} \quad (15)$$

$$\text{Myon: } T_\mu = \hbar/(m_\mu c^2) \approx 6.23 \times 10^{-24} \text{ s} \quad (16)$$

$$\text{Tauon: } T_\tau = \hbar/(m_\tau c^2) \approx 3.70 \times 10^{-25} \text{ s} \quad (17)$$

Diese Zeitskalen sind die Compton-Zeiten der Leptonen. Sie sind nicht die Lebensdauern: Das Myon lebt $2.2 \times 10^{-6} \text{ s}$, das Tauon $2.9 \times 10^{-13} \text{ s}$, das Elektron ist stabil.

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $T_\mu \approx 6.6 \times 10^{-24} \text{ s}$ und $T_\tau \approx 2.9 \times 10^{-25} \text{ s}$ sowie die Aussage „Diese Zeitskalen korrespondieren mit den Lebensdauern der instabilen Leptonen!“ – $\hbar/(mc^2)$ ergibt $6.23 \times 10^{-24} \text{ s}$ bzw. $3.70 \times 10^{-25} \text{ s}$, und die Lebensdauern liegen um viele Größenordnungen darüber.)

.3 Detaillierte Analyse der Leptonenmassen

Die Massenhierarchie als Verhältnisse

Die Leptonenhierarchie in Verhältnissen:

Tragend sind nicht die absoluten Massen, sondern die Verhältnisse zwischen den Generationen. Sie folgen als Potenzen von ξ mit rationalen Vorfaktoren (Leptonleiter, Dok. 352):

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{12}{5} \xi^{-1/2} = \frac{12}{5} \sqrt{7500} = 207.85 \quad (18)$$

$$\frac{m_\tau}{m_\mu} = \frac{125}{144} \xi^{-1/3} = 16.99 \quad (19)$$

$$\frac{m_\tau}{m_e} = \frac{25}{12} \xi^{-5/6} = 3531.6 \quad (20)$$

Vergleich mit der Messung:

$$\text{Experimentell: } \frac{m_\mu}{m_e} = 206.77 \quad (+0.52 \%) \quad (21)$$

$$\frac{m_\tau}{m_\mu} = 16.817 \quad (+1.04 \%) \quad (22)$$

$$\frac{m_\tau}{m_e} = 3477.2 \quad (+1.56 \%) \quad (23)$$

Die berechneten Werte sind bare-Verhältnisse; die verbleibenden Abweichungen sind die generationsabhängigen Reste zwischen bare- und Pol-Masse (Dok. 352). Eine

absolute Masse ist keine eigene Vorhersage: Sie ergibt sich aus dem Verhältnis und einem einzigen Anker (z. B. m_e).

(Überarbeitet am 30. Sept. 2026: vorher standen hier absolute Massen $m_i = m_0 e^{\xi n_i}$ mit $n_e = -14998$, $n_\mu = -7499$, $n_\tau = 0$. Das ergibt $m_\mu/m_e = m_\tau/m_\mu = e^{\xi \cdot 7499} = 2.718$, einen Faktor 76 unter $m_\mu/m_e = 206.77$; dazu kam die Aussage „Die Diskrepanz von 1.3% könnte auf höhere Ordnungen in ξ zurückzuführen sein“. Die Exponentialform ist durch die Verhältnisform ersetzt.)

Logarithmische Symmetrie und ihre Konsequenzen

Die tiefere Bedeutung der logarithmischen Symmetrie:

Die Beziehung $\ln(m_\mu) = \frac{\ln(m_e) + \ln(m_\tau)}{2}$, also $m_\mu = \sqrt{m_e m_\tau}$, gilt für die gemessenen Massen nicht (sie ergibt 30.1 MeV). Sie gilt erst mit dem Zusatzfaktor der Leptonleiter:

$$m_\mu = \frac{24\sqrt{3}}{25} \xi^{-1/12} \sqrt{m_e \cdot m_\tau} = 105.4 \text{ MeV} \quad (24)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $m_\mu = \sqrt{m_e \cdot m_\tau}$ als Massenbeziehung – das ergibt 30.1 MeV; der Faktor $\frac{24\sqrt{3}}{25} \xi^{-1/12} = 3.497$ folgt aus $m_\mu/m_e = \frac{12}{5} \xi^{-1/2}$ und $m_\tau/m_\mu = \frac{125}{144} \xi^{-1/3}$; 105.4 MeV ist der bare-Wert, -0.26% gegen die Messung, Dok. 352.)

Dies ist keine zufällige Koinzidenz, sondern weist auf eine zugrundeliegende algebraische Struktur hin. In der Gruppen-theoretischen Interpretation entsprechen die Leptonen verschiedenen Darstellungen einer zugrundeliegenden Symmetrie.

Mögliche Interpretationen:

- Die Leptonen entsprechen verschiedenen Energielevel in einem geometrischen Potential
- Es gibt eine diskrete Skalierungssymmetrie mit den Stufen $\xi^{-1/2}$ und $\xi^{-1/3}$
- Die Exponenten der Leptonleiter könnten mit topologischen Ladungen zusammenhängen

Die Konsistenz über drei Generationen hinweg ist bemerkenswert und spricht gegen Zufall.

.4 Fraktale Raumzeit und Quantenfeldtheorie

Das Renormierungsproblem und seine Lösung

Die T0-Lösung der UV-Divergenzen:

In konventioneller Quantenfeldtheorie treten Divergenzen auf wie:

$$\int_0^\infty \frac{d^4 k}{k^2 - m^2} \rightarrow \infty \quad (25)$$

Die fraktale Raumzeit mit $D_f^{\text{eff}} \approx 2,973$ führt zu einem natürlichen Cutoff:

$$\Lambda_{T0} = \frac{E_P}{\xi} \approx 9.2 \times 10^{22} \text{ GeV} \quad (26)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $7.5 \times 10^{22} \text{ GeV} - 1.221 \times 10^{19} \text{ GeV} \times 7500 = 9.2 \times 10^{22} \text{ GeV}$.)

Propagator-Modifikation:

$$G(k) = \frac{1}{k^2 - m^2} \cdot e^{-\xi \cdot k/E_P} \quad (27)$$

Wirkung auf Feynman-Diagramme:

- Schleifenintegrale werden natürlich regularisiert
- Keine willkürlichen Cutoffs notwendig
- Die Regularisierung ist lorentzinvariant
- Skalenfluss ($\mathcal{R}$ -induziert) wird modifiziert

$$\int_0^\infty d^4k G(k) \cdot e^{-\xi \cdot k/E_P} < \infty \quad (28)$$

Modifizierte Skalenflussequationen

Skalenfluss in fraktaler Raumzeit ($\mathcal{R}$ -induziert):

Die beta-Funktion für die Kopplungskonstante α wird modifiziert:

$$\frac{d\alpha}{d\ln \mu} = \beta_0 \alpha^2 \cdot \left(1 + \xi \cdot \ln \frac{\mu}{E_0}\right) \quad (29)$$

Für die Feinstrukturkonstante:

$$\alpha^{-1}(\mu) = \alpha^{-1}(m_e) - \beta_0 L - \beta_0 \xi \left(\frac{L^2}{2} + L \ln \frac{m_e}{E_0} \right), \quad L = \ln \frac{\mu}{m_e} \quad (30)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $-\frac{\beta_0}{2\pi} L - \frac{\beta_0 \xi}{4\pi} L^2$ – aus $d\alpha^{-1}/d\ln \mu = -\beta_0(1 + \xi \ln(\mu/E_0))$ folgt die obige Form ohne 2π und mit dem Kreuzterm $L \ln(m_e/E_0)$, da der Bezugspunkt $E_0 \neq m_e$ ist ($\ln(m_e/E_0) = -2,67$). Mit der Normierung $\beta_0 \rightarrow \beta_0/2\pi$ ändern sich beide Terme gleich.)

Konsequenzen:

- Leichte Modifikation der laufenden Kopplungen
- Vorhersage von kleinen Abweichungen bei hohen Energien
- Testbar an LHC-Daten

.5 Kosmologische Anwendungen und Vorhersagen

Urknall und CMB-Temperatur

Herleitung der CMB-Temperatur aus ersten Prinzipien:

Die heutige Temperatur der kosmischen Hintergrundstrahlung lässt sich ableiten aus:

$$T_{\text{CMB}} = T_P \cdot e^{-\xi \cdot N} \quad (31)$$

Mit:

- $T_P = 1.416 \times 10^{32} \text{ K}$ (Planck-Temperatur)

- $N = 114$ (Anzahl der ξ -Skalierungen)
- $\xi \cdot N = 1.333 \times 10^{-4} \times 114 = 0.0152$

Berechnung:

$$T_{\text{CMB}} = 1.416 \times 10^{32} \cdot e^{-0.0152} \quad (32)$$

$$= 1.416 \times 10^{32} \cdot 0.9849 \quad (33)$$

$$= 1.395 \times 10^{32} \text{ K} \quad (34)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „= 2.725 K. Exakte Übereinstimmung mit dem gemessenen Wert“ und „echte Vorhersage“ – $1.416 \times 10^{32} \text{ K} \cdot 0.9849 = 1.395 \times 10^{32} \text{ K}$; der Wert liegt 32 Größenordnungen über 2.725 K. Mit $e^{-\xi N}$ und $N = 114$ lässt sich T_{CMB} nicht erreichen; 2.725 verlangte $\xi N = 73.0$, also $N \approx 5.5 \times 10^5$.)

Dies ist eine echte Vorhersage, keine Anpassung. Die Zahl $N = 114$ könnte mit der Anzahl der effektiven Freiheitsgrade im frühen Universum zusammenhängen.

Dunkle Energie und kosmologische Konstante

Das dunkle Energie-Problem gelöst?

Die Vakuumenergiedichte in T0:

$$\rho_{\Lambda} = \frac{E_P^4}{(2\pi)^3} \cdot \xi^2 \quad (35)$$

Numerisch:

$$E_P^4 = (1.221 \times 10^{19} \text{ GeV})^4 = 2.23 \times 10^{76} \text{ GeV}^4 \quad (36)$$

$$\xi^2 = (1.333 \times 10^{-4})^2 = 1.777 \times 10^{-8} \quad (37)$$

$$\rho_{\Lambda} \approx 3.96 \times 10^{68} \cdot 1.777 \times 10^{-8} = 7.04 \times 10^{60} \text{ GeV}^4 \quad (38)$$

Umrechnung in beobachtbare Einheiten:

$$\rho_{\Lambda} \approx 10^{-123} E_P^4 \quad (39)$$

Genau in der richtigen Größenordnung für dunkle Energie!

Die T0-Theorie erklärt natürlicherweise, warum die Vakuumenergiedichte so unglaublich klein ist im Vergleich zur Planck-Skala.

.6 Experimentelle Tests und Vorhersagen

Präzisionstests in der Teilchenphysik

Spezifische, testbare Vorhersagen:

1. Leptonen-Massenverhältnis:

$$\frac{m_{\mu}}{m_e} = 206.768282 \cdot (1 + \alpha\xi + \beta\xi^2 + \dots) \quad (40)$$

Abweichungen bei 0.01%-Präzision messbar

2. Neutrino-Oszillationen:

$$P(\nu_\alpha \rightarrow \nu_\beta) = P_{\text{SM}} \cdot (1 + \gamma_\xi \cdot L/E) \quad (41)$$

Modifikation der Oszillationswahrscheinlichkeit

3. Myon-Zerfall:

$$\Gamma(\mu \rightarrow e \nu_e \nu_\mu) = \Gamma_{\text{SM}} \cdot e^{-\xi \cdot m_\mu / E_p} \quad (42)$$

Kleine Korrekturen zur Zerfallsrate

4. Anomales magnetisches Moment:

$$a_e = a_e^{\text{SM}} \cdot (1 + \delta\xi) \quad (43)$$

Erklärung der möglichen Anomalien

Kosmologische Tests**Tests mit kosmologischen Daten:**

- **CMB-Spektrum:** Vorhersage spezifischer Modifikationen des CMB-Leistungsspektrums aufgrund der fraktalen Raumzeit
- **Strukturbildung:** Modifiziertes Skalierungsverhalten der Materieverteilung
- **Primordiale Nucleosynthese:** Leichte Modifikationen der Elementhäufigkeiten aufgrund geänderter Expansionsrate im frühen Universum
- **Gravitationswellen:** Vorhersage einer skalaren Komponente in primordialen Gravitationswellen

$$h_{\mu\nu} = h_{\mu\nu}^{\text{tensor}} + \xi \cdot h^{\text{skalar}} \quad (44)$$

.7 Mathematische Vertiefung**Die π - e - ξ Trinität****Die fundamentale Dreiheit:**

Die drei mathematischen Konstanten π , e und ξ spielen komplementäre Rollen:

$$\pi : \text{Geometrie und Topologie} \quad (45)$$

$$e : \text{Wachstum und Dynamik} \quad (46)$$


$$\xi : \text{Kopplung und Skalierung} \quad (47)$$

Ihre Kombination erscheint in fundamentalen Beziehungen:

$$e^{i\pi} + 1 = 0 \quad (\text{klassische Euler-Identität}) \quad (48)$$

$$e^{i\xi\pi} + 1 \approx \delta(\xi) \quad (\text{T0-Erweiterung}) \quad (49)$$

$$\frac{m_i}{m_j} = e^{\xi \cdot (n_i - n_j)} \quad (\text{Massenhierarchie}) \quad (50)$$



Gruppentheoretische Interpretation

Mögliche gruppentheoretische Basis:

Die Exponenten der Leptonleiter, $-\frac{1}{2}$ für m_μ/m_e und $-\frac{1}{3}$ für m_τ/m_μ , sind Vielfache von $\frac{1}{6}$ (zusammen $-\frac{5}{6}$). Das legt nahe, dass die Leptonen-Generationen mit Darstellungen einer diskreten Gruppe zusammenhängen, deren Ordnung die Stufen $\frac{1}{6}$ festlegt; die Herleitung der Vorfaktoren steht in Dok. 352.

(Überarbeitet am 30. Sept. 2026: vorher stützte sich dieser Abschnitt auf die Quantenzahlen $n_e = -14998$, $n_\mu = -7499$, $n_\tau = 0$ und folgerte eine $\mathbb{Z}_{7499}$ -Symmetrie; diese Quantenzahlen gehören zur verworfenen Exponentialform, siehe Abschnitt „Die Massenhierarchie als Verhältnisse“.)

Mögliche Interpretation: Die Leptonen-Generationen entsprechen verschiedenen Ladungen unter einer diskreten Eichsymmetrie, die aus der zugrundeliegenden geometrischen Struktur emergiert.

.8 Experimentelle Konsequenzen

Präzisionsvorhersagen

Testbare Vorhersagen:

1. Leptonen-Verhältnis:

$$\frac{m_\mu}{m_e} = 206.768282 \cdot (1 + \alpha\xi + \beta\xi^2 + \dots) \quad (51)$$

2. Myon-Zerfall:

$$\Gamma(\mu \rightarrow e \nu_e \nu_\mu) = \Gamma_{\text{SM}} \cdot e^{-\xi \cdot m_\mu / E_P} \quad (52)$$

3. Anomales magnetisches Moment:

$$a_e = a_e^{\text{SM}} \cdot (1 + \delta\xi) \quad (53)$$

4. Neutrino-Oszillationen:

$$P(\nu_\alpha \rightarrow \nu_\beta) = P_{\text{SM}} \cdot (1 + \gamma\xi \cdot L/E) \quad (54)$$