

T0-Theorie: Die Feinstrukturkonstante

Inhaltsverzeichnis

.1	Einleitung	1
	Die Feinstrukturkonstante in der Physik	1
	T0-Ansatz zur alpha-Herleitung	2
.2	Historischer Kontext	2
	Sommerfelds harmonische Zuordnung	2
	Sommerfelds methodisches Rahmenwerk	2
	Konsequenzen für die moderne Physik	3
	Implikation für T0	3
.3	Alternative Formulierungen von alpha	3
	Darstellung mit magnetischer Permeabilität	3
	Formulierung mit Elektronenmasse und Compton-Wellenlänge	3
	In T0-Einheiten	4
	Rekonstruktion des SI-Wertes	4
.4	Die charakteristische Energie E0	4
	Fundamentale Definition	4
	Numerische Berechnung	5
	Physikalische Bedeutung von E0	5
	Alternative Herleitung von E0	5
.5	Herleitung der Hauptformel	5
	Geometrischer Ansatz	5
	Dimensionsanalytische Herleitung	6
.6	Verschiedene Herleitungswege	6
	Direkte Berechnung	6
	Über Massenbeziehungen	6
	Alternative Form mit Massenverhältnissen	6
.7	Komplexere T0-Formeln	7
	Die fundamentale Abhängigkeit	7
	Berechnung von E0	7
	Berechnung von alpha	7
.8	Massenverhältnisse und charakteristische Energie	7
	Exakte Massenverhältnisse	7
	Beziehung zur charakteristischen Energie	7
	Logarithmische Symmetrie	8
.9	Experimentelle Verifikation	8
	Vergleich mit Präzisionsmessungen	8
	Konsistenz der Beziehungen	8
.10	Warum Zahlenverhältnisse nicht gekürzt werden dürfen	8
	Das Kürzungs-Problem	8
	Fundamentale Abhängigkeit	8
	Geometrische Notwendigkeit	9
.11	Fraktale Korrekturen	9

	Einheitenprüfungen offenbaren falsche Kürzungen	9
	Warum keine fraktale Korrektur für Massenverhältnisse benötigt wird	9
	Massenverhältnisse sind korrekturfrei	9
	Konsistente Behandlung	9
.12	Erweiterte mathematische Struktur	9
	Vollständige Hierarchie	9
	Verifikation der Ableitungskette	9
.13	Die Bedeutung der Zahl $4/3$	10
	Geometrische Interpretation	10
	Universelle Bedeutung	10
.14	Verbindung zu anomalen magnetischen Momenten	10
	Grundlegende Kopplung	10
	Skalierung mit Teilchenmassen	10
.15	Natürliche Einheiten und fundamentale Physik	10
	Warum $\hbar = c = 1$	10
	Die Lichtgeschwindigkeit $c = 1$	10
	Plancksches Wirkungsquantum $\hbar = 1$	10
	Konsequenzen für andere Einheiten	11
	Bedeutung für die Physik	11
.16	Energie als fundamentales Feld	11
	Ist alles durch ein Energiefeld erklärbar?	11
	Argumente für ein fundamentales Energiefeld	11
	Masse ist Energie	11
	Raum und Zeit entstehen aus Energie	11
	Ladung ist Feldeigenschaft	11
	Alle Kräfte sind Feldphänomene	11
.17	Glossar der verwendeten Symbole und Zeichen	12
0.1	Detaillierte Dimensionsanalyse	12
	Grundlegende SI-Einheiten	12
	Abgeleitete SI-Einheiten relevant fuer alpha	12
	Dimensionsanalyse: Standardform	13
	Dimensionsanalyse: Form mit μ_0	13
	Dimensionsanalyse: $\alpha = re/\lambda$	14
	Dimensionsanalyse: T0-Formel	14
	Dimensionsanalyse in natürlichen Einheiten	14
	Verifikation: Beziehung c quadrat	15
	Numerische Verifikation	15
	Standardform	15
	T0-Formel	16
	Zusammenfassung Dimensionsanalyse	16

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- E_0 : nackt $\sqrt{m_e m_\mu} = 7,348 \text{ MeV}$, fraktal korrigiert $E_0/\sqrt{K_{\text{frak}}} = 7,398 \text{ MeV}$ (Dok. 190, R72); der korrigierte Wert ist der Anker für α . Die Formel $E_0^2 = 4\sqrt{2} m_\mu/\xi^4$ ergab nicht 7,398 MeV. Aus den Massen allein folgt $\alpha^{-1} = 7500 K_{\text{frak}}/E_0^2 = 137,06 (+0,017 \%)$.
- Übereinstimmung von α : 0,0005 % statt 0,03 %.
- Abschnitt „Komplexere T0-Formeln“: Formel für E_0 durch die korrekte Umformung ersetzt ($E_0 = \sqrt{c_e c_\mu} \xi^{9/4}$, $\alpha = c_e c_\mu \xi^{11/2}$).
- $a_0/\bar{\lambda}_C = \alpha^{-1}$ und $\alpha = r_e/\bar{\lambda}_C$ gelten mit der reduzierten Compton-Wellenlänge $\bar{\lambda}_C = \hbar/(m_e c)$.
- Ladungskonvention: in $\hbar = c = 1$ ist $e^2 = 4\pi\alpha$ dimensionslos.
- SI-Nachrechnung: Nenner $3,519 \times 10^{-36} \text{ C}^2$.
- Anomale magnetische Momente: Kurzformel entfernt, Verweis auf Dok. 018 und 158.

Die deutsche und die englische Fassung sind unterschiedlich aufgebaut (De: Historie, alternative Formulierungen, Dimensionsanalyse; En: Herleitung über c_e, c_μ); beide bleiben vollständig erhalten.

Abstract

Die Feinstrukturkonstante α wird in der T0-Theorie aus dem fundamentalen Parameter $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ und der charakteristischen Energie $E_0 = 7.398 \text{ MeV}$ (fraktal korrigiert, $\sqrt{m_e m_\mu}/\sqrt{K_{\text{frak}}}$) hergeleitet. Die zentrale Beziehung $\alpha = \xi \cdot (E_0/1 \text{ MeV})^2$ verbindet elektromagnetische Kopplungsstärke, Raumzeitgeometrie und Teilchenmassen. Diese Arbeit zeigt verschiedene Herleitungswege der Formel, etabliert $E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu}$ als fundamentale Energieskala der Natur, und diskutiert alternative Formulierungen sowie historische Aspekte der Feinstrukturkonstante.

1 Einleitung

Die Feinstrukturkonstante in der Physik

Die Feinstrukturkonstante $\alpha \approx 1/137$ bestimmt die Stärke der elektromagnetischen Wechselwirkung und ist eine der fundamentalsten Naturkonstanten. Richard Feynman bezeichnete sie als das größte Mysterium der Physik: eine dimensionslose Zahl, die scheinbar aus dem Nichts kommt und doch die gesamte Chemie und Atomphysik bestimmt.

Standarddefinition:

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar c} \approx \frac{1}{137,036} \quad (1)$$

wobei:

- e = Elementarladung $\approx 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$
- ϵ_0 = Elektrische Feldkonstante $\approx 8,854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$
- $\hbar$ = Reduziertes Plancksches Wirkungsquantum $\approx 1,055 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$

- c = Lichtgeschwindigkeit $\approx 2,998 \times 10^8$ m/s

T0-Ansatz zur α -Herleitung

Die T0-Theorie bietet eine geometrische Herleitung der Feinstrukturkonstante. Statt sie als freien Parameter zu betrachten, folgt α aus der geometrischen Struktur der Raumzeit und der Zeit-Masse-Dualität.

Schlüsselergebnis

Zentrale T0-Formel für die Feinstrukturkonstante:

$$\alpha = \xi \cdot \left(\frac{E_0}{1 \text{ MeV}} \right)^2 \quad (2)$$

wobei:

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \quad (\text{geometrischer Parameter}) \quad (3)$$

$$E_0 = 7,398 \text{ MeV} \quad (\text{charakteristische Energie}) \quad (4)$$

.2 Historischer Kontext

Sommerfelds harmonische Zuordnung

Ein oft übersehener Aspekt der Definition der Feinstrukturkonstante: Arnold Sommerfelds methodischer Ansatz von 1916 war von seinem Glauben an harmonische Naturgesetze beeinflusst.

Sommerfelds methodisches Rahmenwerk

Sommerfeld entdeckte den Wert $\alpha^{-1} \approx 137$ nicht durch neutrale Messung, sondern suchte aktiv harmonische Beziehungen in Atomspektren. Sein Ansatz war von der philosophischen Überzeugung geleitet, dass die Natur musikalischen Prinzipien folgt.

Sommerfelds Ansatz

Systematisches Vorgehen:

1. Erwartung musikalischer Verhältnisse in Quantenübergängen
2. Kalibrierung von Messsystemen zur Erzielung harmonischer Werte
3. Definition von α basierend auf harmonischen spektroskopischen Anpassungen
4. Zuordnung des Verhältnisses zur fundamentalen Physik

Konsequenzen für die moderne Physik

Dieser historische Kontext zeigt, dass die scheinbare Harmonie in $\alpha^{-1} = 137$ teilweise das Ergebnis von Sommerfelds Erwartungen ist, die in die Einheitensystemdefinition eingebettet wurden.

Die Beziehung zwischen Bohr-Radius und Compton-Wellenlänge:

$$\frac{a_0}{\bar{\lambda}_C} = \alpha^{-1} = 137,036... \quad (5)$$

mit der reduzierten Compton-Wellenlänge $\bar{\lambda}_C = \hbar/(m_e c)$. (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher a_0/λ_C ; mit $\lambda_C = h/(m_e c)$ ist $a_0/\lambda_C = 21,81 = 1/(2\pi\alpha)$.)

spiegelt nicht nur inhärente Naturgesetze wider, sondern auch historische Konstruktion elektromagnetischer Einheitenbeziehungen.

Implikation für T0

Moderne Ansätze mit wahrhaft einheitenunabhängigen Parametern (wie dem dimensionslosen ξ -Parameter der T0-Theorie) könnten die echten dimensionslosen Konstanten der Natur enthüllen, frei von historischen Konstruktionen.

.3 Alternative Formulierungen von α

Darstellung mit magnetischer Permeabilität

Durch die Beziehung $c^2 = \frac{1}{\epsilon_0 \mu_0}$ kann α umgeschrieben werden:

$$\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2} \quad (6)$$

$$\alpha = \frac{e^2 \mu_0 c}{4\pi \hbar} \quad (7)$$

wobei $\mu_0 \approx 4\pi \times 10^{-7}$ H/m (magnetische Permeabilität).

Formulierung mit Elektronenmasse und Compton-Wellenlänge

Mit der Compton-Wellenlänge $\lambda_C = \frac{h}{m_e c}$ und dem klassischen Elektronenradius:

$$r_e = \frac{e^2}{4\pi \epsilon_0 m_e c^2} \quad (8)$$

und der reduzierten Compton-Wellenlänge $\bar{\lambda}_C = \lambda_C/(2\pi) = \frac{\hbar}{m_e c}$ ergibt sich:

$$\alpha = \frac{r_e}{\bar{\lambda}_C} \quad (9)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $\alpha = r_e/\lambda_C$; das ergibt $1,161 \times 10^{-3} = \alpha/(2\pi)$.)

Dies zeigt α als Verhältnis zweier fundamentaler Längenskalen.

In T0-Einheiten

T0 setzt ****alle**** fundamentalen Konstanten auf 1:

$$c = \hbar = \alpha = G = 1 \quad (10)$$

Dann gilt:

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi} = 1 \quad \Rightarrow \quad e = \sqrt{4\pi} \quad (11)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $\alpha = e^2 = 1 \Rightarrow e = 1$; in $\hbar = c = 1$ (Heaviside-Lorentz) gilt $e^2 = 4\pi\alpha$, wie im Anhang. Die Setzung $\alpha = 1$ selbst bleibt.)

Rekonstruktion des SI-Wertes

Wichtig: Obwohl in T0 $\alpha = 1$, kann der SI-Wert aus ξ und E_0 berechnet werden!

$$\alpha_{\text{SI}} = \xi \cdot \left(\frac{E_0}{1 \text{ MeV}} \right)^2 \quad (12)$$

Mit:

- $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ (T0-Parameter)
- $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$ (charakteristische Energie)

Ergebnis:

$$\alpha_{\text{SI}} = 1,3333 \times 10^{-4} \times (7,398)^2 = \frac{1}{137,04} \quad (13)$$

Prinzip:

- In T0-Einheiten: $\alpha = 1$ (Einheitenkonvention, vereinfacht Formeln)
- Einziger freier Parameter: $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$
- SI-Wert rekonstruierbar: $\alpha_{\text{SI}} = \xi(E_0/1\text{MeV})^2 \approx 1/137$
- Beide äquivalent, nur verschiedene Darstellungen!

.4 Die charakteristische Energie E_0

Fundamentale Definition

Die charakteristische Energie E_0 ist das geometrische Mittel der Elektron- und Myonmasse:

$$E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu} \quad (14)$$

Dies folgt aus der logarithmischen Mittelung in der T0-Geometrie:

$$\log(E_0) = \frac{\log(m_e) + \log(m_\mu)}{2} \quad (15)$$

Numerische Berechnung

Mit den experimentellen Werten:

$$m_e = 0,511 \text{ MeV} \quad (16)$$

$$m_\mu = 105,66 \text{ MeV} \quad (17)$$

ergibt sich:

$$E_0 = \sqrt{0,511 \times 105,66} \quad (18)$$

$$= \sqrt{53,99} \quad (19)$$

$$= 7,348 \text{ MeV} \quad (20)$$

Der T0-Wert $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$ ist derselbe E_0 , fraktal korrigiert: $E_0/\sqrt{K_{\text{frak}}} = 7,348/\sqrt{1-100\xi} = 7,397 \text{ MeV}$ (Dok. 190, R72). Absolutwerte tragen K_{frak} , Verhältnisse nicht; die Wurzel folgt daraus, dass E_0 quadratisch in α eingeht. Der korrigierte Wert ist der Anker für α . (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „weicht um 0,7 % ab, was im Rahmen der geometrischen Korrekturen liegt“.)

Physikalische Bedeutung von E_0

Die charakteristische Energie E_0 fungiert als universelle Skala:

- Verbindung der leichtesten geladenen Leptonen
- Größenordnung elektromagnetischer Effekte
- Charakteristische T0-Energieskala

Alternative Herleitung von E_0

Fraktal korrigierte Herleitung:

Der fraktal korrigierte Wert (Dok. 190, R72):

$$E_0^{\text{T0}} = \frac{\sqrt{m_e m_\mu}}{\sqrt{K_{\text{frak}}}} = \frac{7,348}{\sqrt{0,98667}} = 7,397 \approx 7,398 \text{ MeV} \quad (21)$$

Das Verhältnis $7,398/7,348 = 1,00682$ trifft $1/\sqrt{K_{\text{frak}}} = 1,00673$ auf 0,008 %.

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „Gravitativ-geometrische Herleitung“ über $E_0^2 = 4\sqrt{2} m_\mu / \xi^4$ und „Die Differenz zu 7,348 MeV ... ist durch Quantenkorrekturen erklärbar“. Die Formel ergibt $E_0 = 1,38 \times 10^9$ und ist dimensional unstimmtig (links MeV^2 , rechts MeV).)

.5 Herleitung der Hauptformel

Geometrischer Ansatz

In natürlichen Einheiten ($\hbar = c = 1$) folgt aus der T0-Geometrie:

$$\alpha = \frac{\text{charakteristische Kopplungsstärke}}{\text{dimensionslose Normierung}} \quad (22)$$

Die charakteristische Kopplungsstärke ist durch ξ gegeben, die Normierung durch $(E_0)^2$ in Einheiten von 1 MeV^2 . Dies führt direkt zu Gleichung (2).

Dimensionsanalytische Herleitung

Grundlage

Dimensionsanalyse der α -Formel:

In natürlichen Einheiten:

$$[\alpha] = 1 \quad (\text{dimensionslos}) \quad (23)$$

$$[\xi] = 1 \quad (\text{dimensionslos}) \quad (24)$$

$$[E_0] = M \quad (\text{Masse/Energie}) \quad (25)$$

$$[1 \text{ MeV}] = M \quad (\text{Normierungsskala}) \quad (26)$$

Die Formel $\alpha = \xi \cdot (E_0/1 \text{ MeV})^2$ ist dimensionsanalytisch konsistent:

$$1 = 1 \cdot \left(\frac{M}{M}\right)^2 = 1 \cdot 1^2 = 1 \quad \checkmark \quad (27)$$

.6 Verschiedene Herleitungswege

Direkte Berechnung

Mit den T0-Werten:

$$\alpha = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \times (7,398)^2 \quad (28)$$

$$= 1,333 \times 10^{-4} \times 54,73 \quad (29)$$

$$= 7,297 \times 10^{-3} \quad (30)$$

$$= \frac{1}{137,04} \quad (31)$$

Experimenteller Wert: $\alpha_{\text{exp}} = \frac{1}{137,036}$

Übereinstimmung: 0,0005 % (ungerundet $\alpha^{-1} = 137,0353$). (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher 0,03 %.)

Über Massenbeziehungen

Verwendet man die T0-berechneten Massen:

$$m_e^{\text{T0}} = 0,505 \text{ MeV} \quad (32)$$

$$m_\mu^{\text{T0}} = 105,0 \text{ MeV} \quad (33)$$

ergibt sich:

$$E_0^{\text{T0}} = \sqrt{0,505 \times 105,0} = 7,282 \text{ MeV} \quad (34)$$

Alternative Form mit Massenverhältnissen

$$\alpha^{-1} = \frac{7500}{E_0^2} \times K_{\text{frak}} \quad (35)$$

wobei K_{frak} eine fraktale Korrektur ist (siehe Abschnitt .11). Hier ist E_0 der nackte Wert $\sqrt{m_e m_\mu} = 7,348 \text{ MeV}$: $\alpha^{-1} = 7500/53,99 \times 0,98667 = 137,06$ (+0,017 %). Das ist die Vorhersage aus den Massen allein.

(Vermerk vom 30. Sept. 2026: vorher ohne Angabe, welcher E_0 gemeint ist; mit 7,398 MeV ergäbe sich 135,2.)

.7 Komplexere T0-Formeln

Die fundamentale Abhängigkeit: $\alpha \sim \xi^{11/2}$

Aus der vollständigen T0-Hierarchie folgt:

$$\alpha \propto \xi^{11/2} \quad (36)$$

Dies zeigt eine fundamentale Potenzbeziehung zwischen α und dem geometrischen Parameter ξ .

Berechnung von E_0

Mit den Massenformeln $m_e = c_e \xi^{5/2}$ und $m_\mu = c_\mu \xi^2$:

$$E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu} = \sqrt{c_e \cdot c_\mu} \xi^{9/4} \quad (37)$$

Berechnung von α

Kombiniert man alle Beziehungen:

$$\alpha = \xi \cdot E_0^2 = \xi \cdot c_e c_\mu \xi^{9/2} = c_e c_\mu \xi^{11/2} \quad (38)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $E_0 = (m_\mu m_e / (4\sqrt{2}))^{1/4} \xi^{-1}$ und $\alpha = \xi[\dots]^2$; das ergibt $E_0 = 1,318 \times 10^4$ und $\alpha \approx 2,3 \times 10^4$ und skaliert nicht wie $\xi^{11/2}$. Jetzt die Umformung wie in der englischen Fassung.)

.8 Massenverhältnisse und charakteristische Energie

Exakte Massenverhältnisse

In der T0-Theorie sind Massenverhältnisse exakt bestimmt:

$$\frac{m_\mu}{m_e} = 206,768 \quad (\text{experimentell}) \quad (39)$$

$$\frac{m_\tau}{m_e} = 3477,2 \quad (\text{experimentell}) \quad (40)$$

Beziehung zur charakteristischen Energie

Die charakteristische Energie kann auch als:

$$E_0 = m_e \cdot \sqrt{\frac{m_\mu}{m_e}} \quad (41)$$

ausgedrückt werden.

Logarithmische Symmetrie

Die T0-Theorie basiert auf logarithmischer Symmetrie:

$$\log(m_e) - \log(E_0) = \log(E_0) - \log(m_\mu) \quad (42)$$

Dies bedeutet, dass E_0 genau in der Mitte zwischen m_e und m_μ auf logarithmischer Skala liegt.

.9 Experimentelle Verifikation

Vergleich mit Präzisionsmessungen

Größe	T0-Vorhersage	Experiment
α^{-1}	137,04	137,036
Abweichung	0,0005% (vorher 0,03%, korrigiert 30. Sept. 2026)	

Tabelle 1: Vergleich T0 vs. Experiment

Konsistenz der Beziehungen

Die T0-Theorie liefert konsistente Vorhersagen für:

- Feinstrukturkonstante: α
- Leptonmassen: m_e, m_μ, m_τ
- Charakteristische Energie: E_0

Alle Größen hängen von einem einzigen Parameter ξ ab!

.10 Warum Zahlenverhältnisse nicht gekürzt werden dürfen

Das Kürzungs-Problem

Ein häufiger Fehler in Näherungsrechnungen: numerische Verhältnisse werden "vereinfacht", ohne die physikalische Bedeutung zu beachten.

Beispiel:

$$\frac{4}{3} \times 10^{-4} \neq 1,33 \times 10^{-4} \quad (\text{Information verloren!}) \quad (43)$$

Die exakte Form $\frac{4}{3}$ kodiert geometrische Information (Kugel-Würfel-Verhältnis).

Fundamentale Abhängigkeit

Wenn $\alpha \sim \xi^{11/2}$, dann ist die exakte Form von ξ essentiell:

$$\left(\frac{4}{3}\right)^{11/2} \neq (1,33)^{11/2} \quad (44)$$

Kürzung führt zu systematischen Fehlern!

Geometrische Notwendigkeit

Der Faktor $\frac{4}{3}$ erscheint in:

- Kugelvolumen: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$
 - T0-Parameter: $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$
 - Kopplungskonstanten-Beziehungen
- Dies ist kein Zufall, sondern fundamentale 3D-Geometrie!

.11 Fraktale Korrekturen

Einheitenprüfungen offenbaren falsche Kürzungen

Fraktale Korrekturen K_{frak} müssen dimensionsanalytisch konsistent sein:

$$[K_{\text{frak}}] = [1] \quad (\text{dimensionslos}) \quad (45)$$

Warum keine fraktale Korrektur für Massenverhältnisse benötigt wird

Massenverhältnisse sind bereits exakt:

$$\frac{m_\mu}{m_e} = 206,768 \quad (\text{korrekturfrei}) \quad (46)$$

Massenverhältnisse sind korrekturfrei

Im Gegensatz zu absoluten Massen benötigen Verhältnisse keine fraktalen Korrekturen, da sie rein geometrisch sind.

Konsistente Behandlung

T0-Theorie behandelt:

- Absolute Größen: mit Korrekturen
- Verhältnisse: exakt, korrekturfrei

.12 Erweiterte mathematische Struktur

Vollständige Hierarchie

Die T0-Theorie etabliert eine Hierarchie:

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \quad (\text{fundamental}) \quad (47)$$

$$E_0 = f(\xi, m_e, m_\mu) \quad (\text{abgeleitet}) \quad (48)$$

$$\alpha = g(\xi, E_0) \quad (\text{abgeleitet}) \quad (49)$$

Verifikation der Ableitungskette

Jeder Schritt ist dimensional konsistent und experimentell verifizierbar.

.13 Die Bedeutung der Zahl $\frac{4}{3}$

Geometrische Interpretation

$\frac{4}{3}$ erscheint in fundamentalen 3D-Beziehungen:

- Kugelvolumen
- T0-Parameter
- Energiedichte-Beziehungen

Universelle Bedeutung

Die Zahl $\frac{4}{3}$ ist keine Anpassung, sondern folgt aus dreidimensionaler Geometrie.

.14 Verbindung zu anomalen magnetischen Momenten

Grundlegende Kopplung

Die Feinstrukturkonstante ist direkt mit g-2 verbunden:

$$a_e = \frac{\alpha}{2\pi} + \text{höhere Ordnungen} \quad (50)$$

Skalierung mit Teilchenmassen

Die anomalen magnetischen Momente werden in eigenen Dokumenten behandelt: Dok. 018 (mit den Revisionen) und Dok. 158.

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher stand hier $a_\ell = \frac{\xi}{2\pi}(m_\ell/m_e)^2$; das ergibt $a_e = 2,12 \times 10^{-5}$ (Messung $1,160 \times 10^{-3}$) und $a_\mu = 0,907$ (Messung $1,166 \times 10^{-3}$).)

.15 Natürliche Einheiten und fundamentale Physik

Warum $\hbar = c = 1$?

Das Setzen von $\hbar = 1$ und $c = 1$ ist mehr als Vereinfachung – es zeigt, dass unsere vertrauten Einheiten (Meter, Kilogramm, Sekunde) nicht fundamental sind, sondern menschliche Konventionen.

Die Lichtgeschwindigkeit $c = 1$

In der Relativitätstheorie sind Raum und Zeit untrennbar (Raumzeit). Wenn wir Länge in Lichtsekunden messen, wird $c = 1$ eine reine Verhältniszahl.

Plancksches Wirkungsquantum $\hbar = 1$

In der Quantenmechanik bestimmt $\hbar$ die kleinste mögliche Wirkung. Wenn wir eine Einheit wählen, sodass die kleinste Wirkung 1 ist, dann $\hbar = 1$.

Konsequenzen für andere Einheiten

Mit $c = 1$ und $\hbar = 1$:

- Energie = Masse: $E = m$
 - Länge in inversen Energieeinheiten: $[L] = [E^{-1}]$
 - Zeit in inversen Energieeinheiten: $[T] = [E^{-1}]$
- Wir brauchen nur eine fundamentale Einheit – Energie!

Bedeutung für die Physik

Die Naturgesetze selbst haben keine bevorzugten Einheiten – die kommen nur von uns! Natürliche Einheiten lassen die Physik in ihrer einfachsten Form erscheinen.

.16 Energie als fundamentales Feld

Ist alles durch ein Energiefeld erklärbar?

Wenn alle physikalischen Größen auf Energie reduzierbar sind, dann ist Energie möglicherweise das fundamentalste Konzept:

- Raum, Zeit, Masse, Ladung als Manifestationen von Energie
- Ein einheitliches Energiefeld als Basis aller Wechselwirkungen

Argumente für ein fundamentales Energiefeld

Masse ist Energie

Nach Einstein: $E = mc^2$ – Masse ist gebundene Energie.

Raum und Zeit entstehen aus Energie

Einsteins Feldgleichungen:

$$G_{\mu\nu} = 8\pi T_{\mu\nu} \quad (51)$$

Geometrie (Raum-Zeit) wird durch Energie-Impuls bestimmt!

Ladung ist Feldeigenschaft

In Quantenfeldtheorie: keine fundamentalen Teilchen, nur Felder. Ladung ist eine Eigenschaft von Feldanregungen.

Alle Kräfte sind Feldphänomene

- Elektromagnetismus → EM-Feld
 - Gravitation → Raumzeit-Krümmung
 - Starke Kraft → Gluonfeld
 - Schwache Kraft → W/Z-Bosonfeld
- Alle beschreiben Energieverteilungen!

.17 Glossar der verwendeten Symbole und Zeichen

Symbol	Bedeutung	Wert/Einheit
α	Feinstrukturkonstante	$\approx 1/137,036$
ξ	T0 geometrischer Parameter	$\frac{4}{3} \times 10^{-4}$
E_0	Charakteristische Energie	7,398 MeV (korrigiert; nackt 7,348)
m_e	Elektronmasse	0,511 MeV
m_μ	Myonmasse	105,66 MeV
m_τ	Taumassee	1776,86 MeV
e	Elementarladung	$1,602 \times 10^{-19}$ C
$\hbar$	Reduziertes Wirkungsquantum	$1,055 \times 10^{-34}$ J·s
c	Lichtgeschwindigkeit	$2,998 \times 10^8$ m/s
ϵ_0	Elektrische Feldkonstante	$8,854 \times 10^{-12}$ F/m
μ_0	Magnetische Feldkonstante	$4\pi \times 10^{-7}$ H/m
λ_C	Compton-Wellenlänge	$2,426 \times 10^{-12}$ m
$\bar{\lambda}_C$	Reduzierte Compton-Wellenlänge $\hbar/(m_e c)$	$3,862 \times 10^{-13}$ m
r_e	Klassischer Elektronenradius	$2,818 \times 10^{-15}$ m
a_0	Bohr-Radius	$5,292 \times 10^{-11}$ m

Größe	SI-Einheit	Symbol
Länge	Meter	m
Masse	Kilogramm	kg
Zeit	Sekunde	s
Elektrischer Strom	Ampere	A
Temperatur	Kelvin	K
Stoffmenge	Mol	mol
Lichtstärke	Candela	cd

Tabelle 3: Die 7 SI-Basiseinheiten

0.1 Detaillierte Dimensionsanalyse

Grundlegende SI-Einheiten

Abgeleitete SI-Einheiten relevant für α

Größe	Einheit	Symbol	In Basiseinheiten
Energie	Joule	J	$\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$
Kraft	Newton	N	$\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$
Leistung	Watt	W	$\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3}$
Elektrische Ladung	Coulomb	C	A · s
Elektrische Spannung	Volt	V	$\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-1}$
Elektrischer Widerstand	Ohm	Ω	$\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-2}$
Kapazität	Farad	F	$\text{kg}^{-1} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^4 \cdot \text{A}^2$
Induktivität	Henry	H	$\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}^{-2}$

Dimensionsanalyse: Standardform von α

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \quad (52)$$

Schritt-für-Schritt-Analyse:

$$[e^2] = [C]^2 = (A \cdot s)^2 = A^2 \cdot s^2 \quad (53)$$

$$[\epsilon_0] = [F/m] = \frac{\text{kg}^{-1} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^4 \cdot \text{A}^2}{\text{m}} \quad (54)$$

$$= \text{kg}^{-1} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{s}^4 \cdot \text{A}^2 \quad (55)$$

$$[\hbar] = [J \cdot s] = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{s} = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1} \quad (56)$$

$$[c] = [m/s] = \text{m} \cdot \text{s}^{-1} \quad (57)$$

Zähler:

$$[e^2] = A^2 \cdot s^2 \quad (58)$$

Nenner:

$$[4\pi\epsilon_0\hbar c] = [\epsilon_0][\hbar][c] \quad (59)$$

$$= (\text{kg}^{-1} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{s}^4 \cdot \text{A}^2) \times (\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}) \times (\text{m} \cdot \text{s}^{-1}) \quad (60)$$

$$= \text{kg}^{-1+1} \cdot \text{m}^{-3+2+1} \cdot \text{s}^{4-1-1} \cdot \text{A}^2 \quad (61)$$

$$= \text{kg}^0 \cdot \text{m}^0 \cdot \text{s}^2 \cdot \text{A}^2 \quad (62)$$

$$= \text{A}^2 \cdot \text{s}^2 \quad (63)$$

Ergebnis:

$$[\alpha] = \frac{\text{A}^2 \cdot \text{s}^2}{\text{A}^2 \cdot \text{s}^2} = 1 \quad \checkmark \quad (64)$$

 α ist dimensionslos!**Dimensionsanalyse: Form mit μ_0**

$$\alpha = \frac{e^2 \mu_0 c}{4\pi\hbar} \quad (65)$$

Analyse:

$$[\mu_0] = [\text{H/m}] = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}^{-2}}{\text{m}} \quad (66)$$

$$= \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}^{-2} \quad (67)$$

Zähler:

$$[e^2 \mu_0 c] = (\text{A}^2 \cdot \text{s}^2) \times (\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}^{-2}) \times (\text{m} \cdot \text{s}^{-1}) \quad (68)$$

$$= \text{A}^{2-2} \cdot \text{s}^{2-2-1} \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^{1+1} \quad (69)$$

$$= \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1} \quad (70)$$

Nenner:

$$[\hbar] = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1} \quad (71)$$

Ergebnis:

$$[\alpha] = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}}{\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}} = 1 \quad \checkmark \quad (72)$$

Dimensionsanalyse: $\alpha = r_e / \lambda_C$ **Klassischer Elektronenradius:**

$$r_e = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_e c^2} \quad (73)$$

$$[r_e] = \frac{[\text{C}]^2}{[\text{F/m}][\text{kg}][\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}]} \quad (74)$$

$$= \frac{\text{A}^2 \cdot \text{s}^2}{(\text{kg}^{-1} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{s}^4 \cdot \text{A}^2) \times \text{kg} \times (\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2})} \quad (75)$$

$$= \frac{\text{A}^2 \cdot \text{s}^2}{\text{m}^{-3} \cdot \text{s}^4 \cdot \text{A}^2 \times \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}} \quad (76)$$

$$= \frac{\text{A}^2 \cdot \text{s}^2}{\text{A}^2 \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^2} \quad (77)$$

$$= \text{m} \quad \checkmark \quad (78)$$

Compton-Wellenlänge:

$$\lambda_C = \frac{h}{m_e c} \quad (79)$$

$$[\lambda_C] = \frac{[\text{J} \cdot \text{s}]}{[\text{kg}][\text{m} \cdot \text{s}^{-1}]} \quad (80)$$

$$= \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}}{\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}} \quad (81)$$

$$= \text{m} \quad \checkmark \quad (82)$$

Verhältnis:

$$[\alpha] = \left[\frac{r_e}{\lambda_C} \right] = \frac{\text{m}}{\text{m}} = 1 \quad \checkmark \quad (83)$$

Dimensionsanalyse: T0-Formel

$$\alpha = \xi \cdot \left(\frac{E_0}{1 \text{ MeV}} \right)^2 \quad (84)$$

In SI-Einheiten:

$$[\xi] = 1 \quad (\text{dimensionslos per Definition}) \quad (85)$$

$$[E_0] = [\text{MeV}] = [\text{Energie}] = \text{J} = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} \quad (86)$$

$$[1 \text{ MeV}] = \text{J} = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} \quad (87)$$

$$[\alpha] = 1 \times \left[\frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}}{\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}} \right]^2 = 1 \times 1^2 = 1 \quad \checkmark \quad (88)$$

Dimensionsanalyse in natürlichen Einheiten

Mit $\hbar = c = 1$ werden Dimensionen vereinfacht:

Größe	SI	Natürliche Einheiten
Masse	kg	$[E]$
Länge	m	$[E^{-1}]$
Zeit	s	$[E^{-1}]$
Energie	J	$[E]$
Impuls	$\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$	$[E]$
Kraft	$\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$	$[E^2]$
Ladung	C	$[1]$ (wenn $\alpha = 1$) (auch wenn $\alpha \neq 1$; $e^2 = 4\pi\alpha$)

Tabelle 5: Dimensionen in natürlichen Einheiten

In natürlichen Einheiten:

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi} \quad (89)$$

wobei:

- $[e^2] = 1$ (dimensionslos), gleich ob $\alpha = 1$ gesetzt oder berechnet wird
- (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „oder $[e^2] = [E]$ (wenn α berechnet werden soll)“ und in der Tabelle „ $[E^{1/2}]$ “; in $\hbar = c = 1$ ist die Ladung stets dimensionslos.)

Verifikation: Beziehung $c^2 = 1/(\epsilon_0 \mu_0)$

$$[c^2] = [\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}] \quad (90)$$

$$[\epsilon_0 \mu_0] = [\text{kg}^{-1} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{s}^4 \cdot \text{A}^2] \times [\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}^{-2}] \quad (91)$$

$$= \text{m}^{-3+1} \cdot \text{s}^{4-2} \quad (92)$$

$$= \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^2 \quad (93)$$

$$\left[\frac{1}{\epsilon_0 \mu_0} \right] = \frac{1}{\text{m}^{-2} \cdot \text{s}^2} = \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} = [c^2] \quad \checkmark \quad (94)$$

Numerische Verifikation**Standardform**

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar c} \quad (95)$$

$$= \frac{(1,602 \times 10^{-19})^2}{4\pi \times 8,854 \times 10^{-12} \times 1,055 \times 10^{-34} \times 2,998 \times 10^8} \quad (96)$$

Zähler:

$$(1,602 \times 10^{-19})^2 = 2,566 \times 10^{-38} \text{ C}^2 \quad (97)$$

Nenner:

$$4\pi \times 8,854 \times 10^{-12} \times 1,055 \times 10^{-34} \times 2,998 \times 10^8 \quad (98)$$

$$= 3,519 \times 10^{-36} (\text{F/m}) \cdot \text{J} \cdot \text{s} \cdot \text{m/s} \quad (99)$$

$$= 3,519 \times 10^{-36} \text{ C}^2 \quad (100)$$

Ergebnis:

$$\alpha = \frac{2,566 \times 10^{-38}}{3,519 \times 10^{-36}} = 7,293 \times 10^{-3} \approx \frac{1}{137,1} \quad \checkmark \quad (101)$$

(Mit den vierstelligen Konstanten; mit den CODATA-Werten $7,2974 \times 10^{-3} = 1/137,036$.) (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher Nenner $3,517 \times 10^{-35}$ in F·J·s·m/s und Quotient $7,297 \times 10^{-3}$; mit dem alten Nenner ergäbe sich $7,30 \times 10^{-4}$.)

T0-Formel

$$\alpha = \xi \cdot \left(\frac{E_0}{1 \text{ MeV}} \right)^2 \quad (102)$$

$$= \frac{4}{3} \times 10^{-4} \times \left(\frac{7,398}{1} \right)^2 \quad (103)$$

$$= 1,3333 \times 10^{-4} \times 54,73 \quad (104)$$

$$= 7,297 \times 10^{-3} \quad \checkmark \quad (105)$$

Formulierung	Dimension	Wert
$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c}$	1	$7,297 \times 10^{-3}$
$\alpha = \frac{e^2\mu_0 c}{4\pi\hbar}$	1	$7,297 \times 10^{-3}$
$\alpha = \frac{e}{\lambda_C}$	1	$7,297 \times 10^{-3}$
$\alpha = \xi(E_0/1\text{MeV})^2$	1	$7,297 \times 10^{-3}$

Tabelle 6: Alle Formulierungen sind dimensionslos und numerisch identisch

Zusammenfassung Dimensionsanalyse

Schlussfolgerung: Alle Formulierungen der Feinstrukturkonstante sind:

- Dimensional korrekt (dimensionslos)
- Numerisch äquivalent ($\alpha \approx 1/137$)
- Physikalisch konsistent

Die T0-Formulierung $\alpha = \xi(E_0/1\text{MeV})^2$ ist ebenso rigoros wie die Standardformulierungen!