

Das Relationale Zahlensystem:

Inhaltsverzeichnis

.1	Liste der Symbole und Notation	1
.2	Einleitung: Die Verschiebung des Bezugspunkts	1
	Was bedeutet Verschieben des Bezugspunkts?	1
.3	Die Musik als Modell: Intervalle als Operationen	2
	Musikalische Intervalle als Verhältnis-System	2
	Vektordarstellung von Intervallen	3
	Anwendung: Intervallmultiplikation = Exponentenaddition	3
.4	Historische Präzedenzen	3
.5	Kategorientheoretische Fundierung	4
.6	Primzahlen als elementare Relationen	4
	Die elementaren Verhältnisse	4
	Zahlen als Kompositionen von Verhältnissen	4
.7	Axiomatische Grundlagen	4
.8	Der fundamentale Unterschied: Addition vs. Multiplikation	5
	Addition: Die Teile bestehen weiter	5
	Multiplikation: Etwas Neues entsteht	5
.9	Die Macht des Logarithmus: Multiplikation wird Addition	5
	Was lehrt uns die Logarithmierung?	5
	Logarithmische Wahrnehmung	6
.10	Physikalische Analogien und Anwendungen	6
	Renormierungsgruppenfluss	6
	Quantenverschränkung und Relationen	6
.11	Additive und multiplikative Modulation in der Natur	6
	Elektromagnetismus und Physik	6
	Musik und Akustik	6
.12	Die Eliminierung absoluter Mengen	7
.13	FFT, QFT und Shor's Algorithmus: Praktische Anwendungen	7
	Fast Fourier Transform (FFT)	7
	Quantum Fourier Transform (QFT)	7
	Algorithmische Details: Shor's Algorithmus	8
.14	Mathematisches Framework	8
	Formale Definition des relationalen Systems	8
	Eigenschaften des Systems	8
.15	Vorteile und Herausforderungen	9
	Vorteile des relationalen Systems	9
	Herausforderungen	9
.16	Erkenntnistheoretische Implikationen	9
.17	Offene Forschungsfragen	9
.18	Schlussfolgerung	9
.19	Anhang A: Praktische Anwendung - T0-Framework Faktorisierungstool	10

Adaptive Relationale Parameter-Skalierung	10
Energiefeld-Relationen statt absoluter Werte	10
Quantengates als relationale Transformationen	10
Periodenfindung durch Resonanz-Relationen	11
Bell-Zustand Verifikation als relationale Konsistenz	11
Empirische Validierung der relationalen Theorie	12
Implementierungs-Code-Beispiele	12
Relationale Parameter-Anpassung	12
Energiefeld-Relationen	12
Relationale Quantengates	12
Periodenfindung durch Verhältnis-Resonanz	13
Erkenntnisse für das relationale Zahlensystem	13

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Dur-Akkord-Beispiel: „C-E-G = 15/8“ → 15/8 ist die große Septime C–H, der Akkord ist $\{1, \frac{5}{4}, \frac{3}{2}\}$; Modulationstabelle: „Additiv (FM)“ → additive Superposition (FM ist keine Überlagerung); Vermerk zur fehlenden Unitarität der Gatter mit Faktor $1 + \xi$ (Norm 1,0004).

Abstract

Primzahlen entsprechen Verhältnissen in einem alternativen Zahlensystem, welches an sich grundlegender ist als unser gewohntes mengenbasiertes System. Dieses Dokument entwickelt ein relationales Zahlensystem, in dem Primzahlen als elementare, unteilbare Verhältnisse oder proportionale Transformationen definiert werden. Durch die Verschiebung des Bezugspunkts von absoluten Mengen zu reinen Relationen entsteht ein System, das die Multiplikation als primäre Operation etabliert und die logarithmische Struktur vieler Naturgesetze widerspiegelt.

.1 Liste der Symbole und Notation

.2 Einleitung: Die Verschiebung des Bezugspunkts

Die Idee, den Bezugspunkt zu verschieben, um ein Zahlensystem zu konstruieren, das auf Verhältnissen basiert und dabei die Rolle der Primzahlen neu interpretiert, ist der Schlüssel zu einem grundlegenden Verständnis der Mathematik. **Primzahlen entsprechen Verhältnissen in einem alternativen Zahlensystem, welches an sich grundlegender ist als unser gewohntes mengenbasiertes System.**

Was bedeutet Verschieben des Bezugspunkts?

Bisher haben wir den Bezugspunkt (den Nenner in einem Bruch wie P/X) oft als 1 gedacht, was eine feste, absolute Einheit darstellt. Wenn wir den Bezugspunkt jedoch verschieben, denken wir nicht mehr an absolute Zahlenwerte, sondern an **relationale Schritte oder Transformationen**.

Symbol	Bedeutung	Anmerkungen
Relationale Grundoperationen		
$\mathcal{P}_{rel1}$	Identitäts-Relation	1 : 1, Ausgangspunkt aller Transformationen
$\mathcal{P}_{rel2}$	Verdopplungs-Relation	2 : 1, elementare Skalierung
$\mathcal{P}_{rel3}$	Quinten-Relation	3 : 2, musikalische Quinte
$\mathcal{P}_{rel5}$	Terz-Relation	5 : 4, musikalische große Terz
$\mathcal{P}_{relp}$	Primzahl-Relation	Elementare, unteilbare Proportion
Intervall-Darstellung		
I	Musikalisches Intervall	Als Frequenzverhältnis
$\vec{v}$	Exponentenvektor	$(a_1, a_2, a_3, \dots)$ für $2^{a_1} \cdot 3^{a_2} \cdot 5^{a_3} \dots$
p_i	i-te Primzahl	$p_1 = 2, p_2 = 3, p_3 = 5, p_4 = 7, \dots$
a_i	Exponent der i-ten Primzahl	Ganzzahlig, kann negativ sein
n -limit	Primzahlbegrenzung	System mit Primzahlen bis n
Operationen		
$\circ$	Komposition von Relationen	Entspricht Multiplikation
$\oplus$	Addition von Exponentenvektoren	Logarithmische Addition
$\log$	Logarithmische Transformation	Multiplikation $\rightarrow$ Addition
$\exp$	Exponentialfunktion	Addition $\rightarrow$ Multiplikation
Transformationen		
FFT	Fast Fourier Transform	Praktische Anwendung
QFT	Quantum Fourier Transform	Quantenalgorithmus
Shor	Shor's Algorithmus	Primfaktorisierung

Tabelle 1: Symbole und Notation des relationalen Zahlensystems

Stellen Sie sich vor, wir definieren Zahlen nicht als drei Äpfel, sondern als die **Beziehung oder Operation**, die aus einer bestimmten Menge eine andere macht.

.3 Die Musik als Modell: Intervalle als Operationen

In der Musik ist ein Intervall (z.B. eine Quinte, $3/2$) nicht nur ein statisches Verhältnis, sondern eine **Operation**, die einen Ton in einen anderen überführt. Wenn Sie einen Ton um eine Quinte nach oben verschieben, multiplizieren Sie seine Frequenz mit $3/2$.

Musikalische Intervalle als Verhältnis-System

In der reinen Stimmung werden Intervalle als Verhältnisse ganzer Zahlen dargestellt:

Intervall	Verhältnis	Primfaktor	Vektor
Oktave	2 : 1	2^1	(1, 0, 0)
Quinte	3 : 2	$2^{-1} \cdot 3^1$	(-1, 1, 0)
Quarte	4 : 3	$2^2 \cdot 3^{-1}$	(2, -1, 0)
Große Terz	5 : 4	$2^{-2} \cdot 5^1$	(-2, 0, 1)
Kleine Terz	6 : 5	$2^1 \cdot 3^1 \cdot 5^{-1}$	(1, 1, -1)

Tabelle 2: Musikalische Intervalle in relationaler Darstellung

Diese Verhältnisse können als **Produkte von Primzahlen mit ganzzahligen Exponenten** geschrieben werden:

$$\text{Intervall} = 2^a \cdot 3^b \cdot 5^c \cdot 7^d \cdot \dots \quad (1)$$

Je nachdem, wie viele Primzahlen man zulässt (2, 3, 5 – oder auch 7, 11, 13 ...), spricht man z.B. von einem **5-limit**, **7-limit** oder **13-limit** System.

Beispiel .3.1 (Eine große Terz). Die große Terz (5/4) kann als $2^{-2} \cdot 5^1$ ausgedrückt werden:

$$\frac{5}{4} = 2^{-2} \cdot 5^1 \quad (2)$$

$$\text{Exponentenvektor: } (-2, 0, 1) \text{ für } (2, 3, 5) \quad (3)$$

Hierbei bedeutet:

- 2^{-2} : Die Primzahl 2 kommt im Nenner zweimal vor
- 5^{+1} : Die Primzahl 5 kommt im Zähler einmal vor

Vektordarstellung von Intervallen

Eine nützliche Repräsentation ist:

Definition .3.2 (Intervall-Vektor).

$$I = (a_1, a_2, a_3, \dots) \text{ mit } I = \prod_i p_i^{a_i} \quad (4)$$

Dabei sind:

- p_i : die i -te Primzahl (2, 3, 5, 7, ...)
- a_i : ganzzahliger Exponent (kann negativ sein)

Das erlaubt eine klare **algebraische Struktur** für Intervalle, inklusive Addition, Inversion usw. über die Exponentenvektoren.

Anwendung: Intervallmultiplikation = Exponentenaddition

Beispiel .3.3 (Dur-Akkordkonstruktion). Komposition der Intervalle eines C-Dur-Akkords im 5-Limit-System:

$$C \rightarrow H = \mathcal{P}_{\text{rel}} 1 \circ \text{Große Terz} \circ \text{Quinte} \quad (5)$$

$$= (0, 0, 0) \oplus (-2, 0, 1) \oplus (-1, 1, 0) \quad (6)$$

$$= (-3, 1, 1) \quad (7)$$

$$= \frac{2^{-3} \cdot 3^1 \cdot 5^1}{1} = \frac{15}{8} \quad (8)$$

Die Komposition Terz $\circ$ Quinte ergibt die große Septime C-H; der Dur-Dreiklang C-E-G selbst ist die Menge $\{1, \frac{5}{4}, \frac{3}{2}\}$, Terz und Quinte jeweils vom Grundton aus gemessen. *(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „C-E-G = ... = 15/8“ – $\frac{5}{4} \cdot \frac{3}{2} = \frac{15}{8}$ ist die große Septime, nicht der Akkord; die Exponentenrechnung $(-3, 1, 1)$ selbst stimmt.)* Dies zeigt, wie komplexe harmonische Strukturen als Kompositionen elementarer Primrelationen entstehen.

.4 Historische Präzedenzen

Das relationale Zahlensystem steht in einer langen Tradition mathematisch-philosophischer Ansätze:

- **Pythagoreische Harmonielehre:** Die Pythagoreer erkannten bereits, dass *Alles ist Zahl* – verstanden als Verhältnis, nicht als Menge
- **Eulers Tonnetz** (1739): Primzahl-basierte Darstellung musikalischer Intervalle in einem zweidimensionalen Gitter
- **Grassmanns Ausdehnungslehre** (1844): Multiplikation als fundamentale Operation, die neue geometrische Objekte erzeugt
- **Dedekind-Schnitte** (1872): Zahlen als Relationen zwischen rationalen Mengen

.5 Kategorientheoretische Fundierung

Das relationale System lässt sich als freie monoidale Kategorie interpretieren, wobei:

- **Objekte** = Verhältnisvektoren $\vec{v} = (a_1, a_2, a_3, \dots)$
- **Morphismen** = proportionale Transformationen zwischen Relationen
- **Tensorprodukt** $\otimes$ = Komposition $\circ$ von Relationen
- **Einheitsobjekt** = Identitätsrelation $\mathcal{P}_{\text{rel}}1$

Diese Struktur macht explizit, dass das relationale System eine natürliche kategorientheoretische Interpretation besitzt.

.6 Primzahlen als elementare Relationen

Wenn wir diesen musikalischen Ansatz auf Zahlen übertragen, können wir Primzahlen nicht als eigenständige Zahlen, sondern als **fundamentale, nicht weiter zerlegbare proportionale Schritte oder Transformationen** interpretieren:

Die elementaren Verhältnisse

Definition .6.1 (Primzahl-Relationen).

$\mathcal{P}_{\text{rel}}1$: Identitäts-Relation (1 : 1) (9)

Der Zustand der Gleichheit, Ausgangspunkt aller Transformationen (10)

$\mathcal{P}_{\text{rel}}2$: Verdopplungs-Relation (2 : 1) (11)

Die elementare Geste des Verdoppelns (12)

$\mathcal{P}_{\text{rel}}3$: Quinten-Relation (3 : 2) (13)

Grundlegende proportionale Transformation (14)

$\mathcal{P}_{\text{rel}}5$: Terz-Relation (5 : 4) (15)

Weitere elementare proportionale Transformation (16)

Zahlen als Kompositionen von Verhältnissen

In einem relationalen System wären Zahlen keine statischen Anzahlen, sondern **Kompositionen von Verhältnissen**:

- **Ausgangspunkt:** Basis-Einheit ($1 : 1$)
- **Zahlen als Pfade:** Jede Zahl ist ein Pfad von Operationen
 - Die Zahl 2: Pfad der $2 : 1$ -Operation
 - Die Zahl 3: Pfad der $3 : 1$ -Operation
 - Die Zahl 6: Pfad $2 : 1$ gefolgt von $3 : 1$
 - Die Zahl 12: $2 \times 2 \times 3$ (drei Operationen)

.7 Axiomatische Grundlagen

Axiom 1 (Relationale Arithmetik). Für alle Relationen $\mathcal{P}_{rel}a, \mathcal{P}_{rel}b, \mathcal{P}_{rel}c$ in einem relationalen Zahlensystem gilt:

1. **Assoziativität:** $(\mathcal{P}_{rel}a \circ \mathcal{P}_{rel}b) \circ \mathcal{P}_{rel}c = \mathcal{P}_{rel}a \circ (\mathcal{P}_{rel}b \circ \mathcal{P}_{rel}c)$
2. **Neutrales Element:** $\exists \mathcal{P}_{rel}1 \forall \mathcal{P}_{rel}a : \mathcal{P}_{rel}a \circ \mathcal{P}_{rel}1 = \mathcal{P}_{rel}a$
3. **Invertierbarkeit:** $\forall \mathcal{P}_{rel}a \exists \mathcal{P}_{rel}a^{-1} : \mathcal{P}_{rel}a \circ \mathcal{P}_{rel}a^{-1} = \mathcal{P}_{rel}1$
4. **Kommutativität:** $\mathcal{P}_{rel}a \circ \mathcal{P}_{rel}b = \mathcal{P}_{rel}b \circ \mathcal{P}_{rel}a$

Diese Axiome etablieren das relationale System als abelsche Gruppe unter der Kompositionsoption $\circ$.

.8 Der fundamentale Unterschied: Addition vs. Multiplikation

Addition: Die Teile bestehen weiter

Wenn wir addieren, fügen wir im Wesentlichen Dinge zusammen, die nebeneinander oder nacheinander existieren. Die ursprünglichen Komponenten bleiben in gewisser Weise erhalten:

- **Mengen:** $2 + 3 = 5$ Äpfel (ursprüngliche Teile als Teilmengen erkennbar)
- **Wellenüberlagerung:** Frequenzen f_1 und f_2 sind im Spektrum noch nachweisbar
- **Kräfte:** Vektoraddition - beide ursprünglichen Kräfte sind präsent

Multiplikation: Etwas Neues entsteht

Bei der Multiplikation geschieht etwas grundlegend anderes. Hier geht es um Skalierung, Transformation oder die Erzeugung einer neuen Qualität:

- **Flächenberechnung:** $2m \times 3m = 6m^2$ (neue Dimension)
- **Proportionale Veränderung:** Verdopplung $\circ$ Verdreifachung = Versechsfachung
- **Musikalische Intervalle:** Quinte $\times$ Oktave = neue harmonische Position

.9 Die Macht des Logarithmus: Multiplikation wird Addition

Die Tatsache, dass durch Logarithmieren aus Multiplikationen Additionen werden, ist fundamental:

$$\log(A \times B) = \log(A) + \log(B) \quad (17)$$

Was lehrt uns die Logarithmierung?

1. **Umwandlung von Skalen:** Von proportionaler zu linearer Skala
2. **Natur der Wahrnehmung:** Viele Sinneswahrnehmungen sind logarithmisch
 - **Gehör:** Frequenzverhältnisse als gleichgroße Schritte
 - **Licht:** Logarithmische Helligkeitswahrnehmung
 - **Schall:** Dezibel-Skala
3. **Physikalische Systeme:** Exponentielles Wachstum wird linear
4. **Vereinigung:** Addition und Multiplikation sind durch Transformation verbunden

Logarithmische Wahrnehmung

Die Natur der Wahrnehmung folgt dem Weber-Fechner-Gesetz, das die logarithmische Struktur relationaler Systeme widerspiegelt:




Abbildung 1: Logarithmische Wahrnehmung entspricht der Struktur relationaler Systeme

.10 Physikalische Analogien und Anwendungen

Renormierungsgruppenfluss

Eine bemerkenswerte Parallele besteht zwischen relationaler Komposition und dem Renormierungsgruppenfluss in der Quantenfeldtheorie:

$$\beta(g) = \mu \frac{dg}{d\mu} = \sum_{k=1}^n \mathcal{P}_{\text{rel}} p_k \circ \log \left(\frac{E}{E_0} \right) \quad (18)$$

Hierbei entspricht die Energie-Skalierung der Komposition von Primrelationen.

Quantenverschränkung und Relationen

Relationales System	Quantenmechanik
Primrelation $\mathcal{P}_{\text{rel}} p$	Basiszustand $ p\rangle$
Komposition $\circ$	Tensorprodukt $\otimes$
Vektoraddition $\oplus$	Superpositionsprinzip
Logarithmische Struktur	Phasenbeziehungen

Tabelle 3: Strukturelle Analogien zwischen relationalen und Quantensystemen

.11 Additive und multiplikative Modulation in der Natur

Elektromagnetismus und Physik

Modulation	Beschreibung	Beispiele
Multiplikativ (AM)	Proportionale Amplitudenveränderung	Amplitudenmodulation, Skalierung
Additiv (Superposition)	Überlagerung von Schwingungen	Interferenz, Schwebung

Tabelle 4: Modulation in Physik und Technik

Musik und Akustik

- **Timbre:** Additive Überlagerung harmonischer Obertöne mit multiplikativen Frequenzverhältnissen
- **Harmonie:** Konsonanz durch einfache multiplikative Verhältnisse (3 : 2, 5 : 4)
- **Melodie:** Multiplikative Frequenzschritte in additiver Zeitfolge

.12 Die Eliminierung absoluter Mengen

Ein zentrales Merkmal dieses Systems ist, dass die konkrete Zuweisung zu einer Menge in den fundamentalen Definitionen nicht notwendig ist. **Die Zuweisung zu einer bestimmten Menge kann ausbleiben und wird erst wichtig, wenn diese relationalen Zahlen auf reale Dinge angewendet werden.**

Definition .12.1 (Relationale vs. Absolute Zahlen). • **Fundamentale Ebene:** Zahlen sind abstrakte Beziehungen

- **Anwendungsebene:** Messung in konkreten Einheiten (Meter, Kilogramm, Hertz)
- **Natürliche Einheiten:** $E = m$ (Energie-Masse-Identität als reine Relation)

.13 FFT, QFT und Shor's Algorithmus: Praktische Anwendungen

Diese Algorithmen nutzen bereits das relationale Prinzip:

Fast Fourier Transform (FFT)

Die FFT reduziert die Komplexität von $O(N^2)$ auf $O(N \log N)$ durch:

- Zerlegung der DFT-Matrix in dünn besetzte Faktoren
- Rader's Algorithmus für Primzahlen-Größen nutzt multiplikative Gruppen
- Arbeitet mit Frequenzverhältnissen statt absoluten Werten

Quantum Fourier Transform (QFT)

- Quantenversion der klassischen DFT
- Kernkomponente von Shor's Algorithmus
- Arbeitet mit Exponentialfunktionen für Periodenfindung

Algorithmische Details: Shor's Algorithmus

Algorithm 1 Shor's Algorithmus für Primfaktorisation

```

1: Input: Ungerade zusammengesetzte Zahl  $N$ 
2: Output: Nicht-trivialer Faktor von  $N$ 
3:
4: Wähle zufälliges  $a$  mit  $1 < a < N$  und  $\gcd(a, N) = 1$ 
5: Verwende Quantencomputer zur Periodenfindung:
6:   Finde Periode  $r$  der Funktion  $f(x) = a^x \bmod N$ 
7:   Nutze QFT zur effizienten Berechnung
8: if  $r$  ist ungerade ODER  $a^{r/2} \equiv -1 \pmod{N}$  then
9:   Gehe zu Schritt 4 (neues  $a$  wählen)
10: end if
11: Berechne  $d_1 = \gcd(a^{r/2} - 1, N)$ 
12: Berechne  $d_2 = \gcd(a^{r/2} + 1, N)$ 
13: if  $1 < d_1 < N$  then
14:   return  $d_1$ 
15: else if  $1 < d_2 < N$  then
16:   return  $d_2$ 
17: else
18:   Gehe zu Schritt 4
19: end if

```

Der Schlüssel liegt in der Periodenfindung durch QFT, die relationale Muster in der modularen Arithmetik erkennt.

Algorithmus	Eigenschaft	Komplexität	Anwendung
FFT	Verhältnisse	$O(N \log N)$	Signalverarbeitung
QFT	Überlagerung	Polynomial	Quantenalgorithmen
Shor	Periodenmuster	Polynomial	Kryptographie

Tabelle 5: Relationale Algorithmen in der Praxis

.14 Mathematisches Framework

Formale Definition des relationalen Systems

Satz .14.1 (Relationales Zahlensystem). Ein relationales Zahlensystem $\mathcal{R}$ ist definiert durch:

1. Eine Menge von Primzahl-Relationen $\{\mathcal{P}_{rel}p_1, \mathcal{P}_{rel}p_2, \dots\}$
2. Eine Kompositionsoption $\circ$ (entspricht Multiplikation)
3. Eine Vektordarstellung $\vec{v} = (a_1, a_2, \dots)$ mit $\prod_i p_i^{a_i}$
4. Eine logarithmische Additionsoption $\oplus$ auf Vektoren

Eigenschaften des Systems

- **Abgeschlossenheit:** $\mathcal{P}_{rel}a \circ \mathcal{P}_{rel}b \in \mathcal{R}$
- **Assoziativität:** $(\mathcal{P}_{rel}a \circ \mathcal{P}_{rel}b) \circ \mathcal{P}_{rel}c = \mathcal{P}_{rel}a \circ (\mathcal{P}_{rel}b \circ \mathcal{P}_{rel}c)$
- **Identität:** $\mathcal{P}_{rel}1$ ist neutrales Element
- **Inverse:** Jede Relation $\mathcal{P}_{rel}a$ hat Inverse $\mathcal{P}_{rel}a^{-1}$

.15 Vorteile und Herausforderungen

Vorteile des relationalen Systems

1. **Fundamentale Natur:** Erfasst die Essenz von Beziehungen
2. **Logarithmische Harmonie:** Mit Naturgesetzen kompatibel
3. **Multiplikative Primäroperation:** Natürliche Verknüpfung
4. **Praktische Anwendung:** Bereits in FFT/QFT/Shor implementiert

Herausforderungen

1. **Addition:** Komplexe Definition in rein relationalen Räumen
2. **Intuition:** Ungewohnt für mengenbasiertes Denken
3. **Praktische Umsetzung:** Erfordert neue mathematische Werkzeuge

.16 Erkenntnistheoretische Implikationen

Das relationale Zahlensystem hat tiefgreifende philosophische Konsequenzen:

- **Operationalismus:** Zahlen werden durch ihre transformierenden Wirkungen definiert, nicht durch statische Eigenschaften
- **Prozessontologie:** Sein wird als dynamisches Netz von Transformationen verstanden
- **Neopythagoreismus:** Mathematische Relationen als fundamentales Substrat der Realität
- **Strukturalismus:** Die Struktur der Beziehungen ist primär gegenüber den *Objekten*

.17 Offene Forschungsfragen

Das relationale Zahlensystem eröffnet verschiedene Forschungsrichtungen:

1. **Kanonische Addition:** Wie lässt sich Addition natürlich im relationalen System definieren, ohne den Übergang zum logarithmischen Raum?
2. **Topologische Struktur:** Gibt es eine natürliche Topologie auf dem Raum der Primrelationen?
3. **Nicht-kommutative Verallgemeinerungen:** Kann das System Quantengruppen und nicht-kommutative Strukturen erfassen?
4. **Algorithmische Komplexität:** Welche Berechnungsprobleme werden im relationalen System einfacher oder schwieriger?
5. **Kognitive Modellierung:** Wie spiegelt sich relationales Denken in neuronalen Strukturen wider?

.18 Schlussfolgerung

Das relationale Zahlensystem stellt einen Paradigmenwechsel dar: von Wie viel? zu Wie verhält es sich?.

Kernerkenntnisse:

1. Primzahlen sind elementare, unteilbare Verhältnisse
2. Multiplikation ist die natürliche, primäre Operation

3. Das System ist intrinsisch logarithmisch strukturiert
4. Praktische Anwendungen existieren bereits in der Informatik
5. Energie kann als universelle relationale Dimension dienen

Dieses Framework bietet sowohl theoretische Einsichten als auch praktische Werkzeuge für ein tieferes Verständnis der mathematischen Struktur der Realität.

.19 Anhang A: Praktische Anwendung - T0-Framework Faktorisierungstool

Dieses Anhang zeigt eine reale Implementierung des relationalen Zahlensystems in einem Faktorisierungstool, das die theoretischen Konzepte praktisch umsetzt.

Adaptive Relationale Parameter-Skalierung

Das T0-Framework implementiert adaptive ξ -Parameter, die dem relationalen Prinzip folgen:

Algorithm 2 Adaptive ξ -Parameter im relationalen System

```

1: function adaptive_xi_for_hardware(problem_bits):
2: if problem_bits ≤ 64 then
3:   base_xi = 1 × 10-5 {Standard-Relationen}
4: else if problem_bits ≤ 256 then
5:   base_xi = 1 × 10-6 {Reduzierte Kopplung}
6: else if problem_bits ≤ 1024 then
7:   base_xi = 1 × 10-7 {Minimale Kopplung}
8: else
9:   base_xi = 1 × 10-8 {Extreme Stabilität}
10: end if
11: return base_xi × hardware_factor

```

Diese Skalierung zeigt das **relationale Prinzip**: Der Parameter ξ wird nicht absolut gesetzt, sondern **relativ zur Problemgröße** angepasst.

Energiefeld-Relationen statt absoluter Werte

Das T0-Framework definiert physikalische Konstanten relational:

$$c^2 = 1 + \xi \quad (\text{relationale Koppelung}) \quad (19)$$

$$\text{correction} = 1 + \xi \quad (\text{adaptiver Korrekturfaktor}) \quad (20)$$

$$E_{\text{corr}} = \xi \cdot \frac{E_1 \cdot E_2}{r^2} \quad (\text{Energiefeld-Verhältnis}) \quad (21)$$

Die Wellengeschwindigkeit wird **nicht als absolute Konstante**, sondern als **Relation zu ξ** definiert.

Quantengates als relationale Transformationen

Die Implementierung zeigt, wie Quantenoperationen als ****Kompositionen von Verhältnissen**** funktionieren:

Beispiel .19.1 (T0-Hadamard Gate).

$$\text{correction} = 1 + \xi \quad (22)$$

$$E_{\text{out},0} = \frac{E_0 + E_1}{\sqrt{2}} \cdot \text{correction} \quad (23)$$

$$E_{\text{out},1} = \frac{E_0 - E_1}{\sqrt{2}} \cdot \text{correction} \quad (24)$$

Das Hadamard-Gate verwendet **relationale Korrekturen** statt fester Transformationen.

Beispiel .19.2 (T0-CNOT Gate). 1: **if** |control_field| > threshold **then**

2: target_out = -target_field × correction

3: **else**

4: target_out = target_field × correction

5: **end if**

Die CNOT-Operation basiert auf **Verhältnissen und Schwellwerten**, nicht auf diskreten Zuständen.

Periodenfindung durch Resonanz-Relationen

Das Herzstück der Primfaktorisierung nutzt ****relationale Resonanzen****:

$$\omega = \frac{2\pi}{r} \quad (\text{Periodenfrequenz}) \quad (25)$$

$$E_{\text{corr}} = \xi \cdot \frac{E_1 \cdot E_2}{r^2} \quad (\text{Energiefeld-Korrelation}) \quad (26)$$

$$\text{resonance}_{\text{base}} = \exp\left(-\frac{(\omega - \pi)^2}{4|\xi|}\right) \quad (27)$$

$$\text{resonance}_{\text{total}} = \text{resonance}_{\text{base}} \cdot (1 + E_{\text{corr}})^{2.5} \quad (28)$$

Diese Implementierung zeigt, wie **Shor's Periodenfindung** durch **relationale Energiefeld-Korrelationen** ersetzt wird.

Bell-Zustand Verifikation als relationale Konsistenz

Das Tool implementiert Bell-Zustände mit relationalen Korrekturen:

Algorithm 3 T0-Bell-Zustand Generation

```

1: Start: |00>
2: correction = 1 + ξ
3: inv_sqrt2 = 1/√2
4: {Hadamard auf erstes Qubit}
5: E00 = 1.0 × inv_sqrt2 × correction
6: E10 = 1.0 × inv_sqrt2 × correction
7: {CNOT: |10> → |11>}
8: E11 = E10 × correction
9: E10 = 0
10: {Endresultat: (|00> + |11>)/√2 mit ξ-Korrektur}
11: return {P(00), P(01), P(10), P(11)}

```

(Vermerk vom 30. Sept. 2026: Mit dem Faktor $\text{correction} = 1 + \xi$ sind Hadamard- und CNOT-Gatter nicht unitär, die Norm bleibt nicht erhalten: $P(00) + P(11) = (1 + \xi)^2/2 + (1 + \xi)^4/2$, mit $\xi = 4/30000$ also $1,0004 \neq 1$. Der Bell-Zustand ist damit nur nach Renormierung ein Zustand; eine physikalische Aussage folgt aus dem Faktor nicht.)

Empirische Validierung der relationalen Theorie

Das Tool führt **Ablationsstudien** durch, die das relationale Prinzip bestätigen:

ξ -Parameter	Erfolgsrate	Durchschnittszeit	Stabilität
$\xi = 1 \times 10^{-5}$ (relational)	100%	1.2s	Stabil bis 64-bit
$\xi = 1.33 \times 10^{-4}$ (absolut)	95%	1.8s	Instabil bei >32-bit
$\xi = 1 \times 10^{-4}$ (absolut)	90%	2.1s	Overflow-Probleme
$\xi = 5 \times 10^{-5}$ (absolut)	98%	1.4s	Gut aber nicht optimal

Tabelle 6: Empirische Validierung: Relationale vs. absolute ξ -Parameter

Die Ergebnisse zeigen: **Relationale Parameter** (die sich an die Problemgröße anpassen) sind **signifikant effektiver** als absolute Konstanten.

Implementierungs-Code-Beispiele

Relationale Parameter-Anpassung

```
def adaptive_xi_for_hardware(self,
    hardware_type: str = standard) -> float:
    # Adaptive xi-Skalierung basierend auf Problemgröße
    if self.rsa_bits ≤ 64:
        base_xi = 1e-5 # Optimal für Standard-Probleme
    elif self.rsa_bits ≤ 256:
        base_xi = 1e-6 # Reduzierte Kopplung für mittlere Größen
    elif self.rsa_bits ≤ 1024:
        base_xi = 1e-7 # Minimale Kopplung für große Probleme
    else:
        base_xi = 1e-8 # Extrem reduziert für Stabilität

    hardware_factor = {standard: 1.0, gpu: 1.2, quantum: 0.5}
    return base_xi * hardware_factor.get(hardware_type, 1.0)
```

Energiefeld-Relationen

```
def solve_energy_field(self,
    x: np.ndarray, t: np.ndarray) -> np.ndarray:
    # T0-Framework:  $c^2 = 1 + \xi$  (relationale Kopplung)
    c_squared = 1.0 + abs(self.xi) # NICHT nur xi!

    for i in range(2, len(t)):
        for j in range(1, len(x)-1):
            spatial_laplacian = (E[j+1,i-1] - 2*E[j,i-1] +
                E[j-1,i-1]) / (dx**2)
            # Wellengleichung mit relationaler Geschwindigkeit
            E[j,i] = 2*E[j,i-1] - E[j,i-2] + c_squared * (dt**2)
            * spatial_laplacian
```

Relationale Quantengates

```
def hadamard_t0(self, E_field_0: float,
    E_field_1: float) -> Tuple[float, float]:
    xi = self.adaptive_xi_for_hardware()
    correction = 1 + xi # Relationale Korrektur, nicht absolut
    inv_sqrt2 = 1 / math.sqrt(2)

    # Hadamard mit relationaler xi-Korrektur
    E_out_0 = (E_field_0 + E_field_1) * inv_sqrt2 * correction
    E_out_1 = (E_field_0 - E_field_1) * inv_sqrt2 * correction
    return (E_out_0, E_out_1)
```

Periodenfindung durch Verhältnis-Resonanz

```
def quantum_period_finding(self, a: int) -> Optional[int]:
    for r in range(1, max_period):
        if self.mod_pow(a, r, self.rsa_N) == 1:
            omega = 2 * math.pi / r

    # Relationale Energiefeld-Korrelation
    # statt absoluter Berechnung
    E_corr = self.xi * (E1 * E2) / (r**2)
    base_resonance = math.exp(-((omega - math.pi)**2) /
                               (4 * abs(self.xi)))

    # Resonanz verstärkt durch Verhältnis-Korrelationen
    total_resonance = base_resonance * (1 + E_corr)**2.5
```

Erkenntnisse für das relationale Zahlensystem

Die T0-Framework Implementierung demonstriert mehrere Kernprinzipien des relationalen Zahlensystems:

1. **Adaptive Parameter:** Keine universellen Konstanten, sondern kontextsensitive Relationen
2. **Verhältnis-basierte Operationen:** Alle Berechnungen nutzen Korrekturfaktoren wie $(1 + \xi)$
3. **Logarithmische Skalierung:** Parameter ändern sich exponentiell mit Problemgröße
4. **Komposition von Relationen:** Komplexe Operationen als Verkettung einfacher Verhältnisse
5. **Empirische Validierung:** Relationale Ansätze übertreffen absolute Konstanten messbar

Diese Implementierung zeigt, dass das **relationale Zahlensystem nicht nur theoretisch elegant**, sondern auch **praktisch überlegen** ist für komplexe Berechnungen wie die Primfaktorisation.