

Umfassende Analyse: T0-Theorie und Matsas et al.
(2024)

Inhaltsverzeichnis

.1	Einleitung: Die Suche nach fundamentalen Konstanten	2
	Historischer Kontext	2
	Lösung von Matsas et al.	2
	Geometrische Reduktion der T0-Theorie	2
	Zweck dieser Analyse	3
.2	Konzeptuelle Überlappungen und Konvergenzen	3
	Reduktion der Anzahl fundamentaler Konstanten	3
	Ableitbarkeit von G , c , $\hbar$, k_B	4
	Lichtgeschwindigkeit c	4
	Gravitationskonstante G	4
	Planck-Konstante $\hbar$	4
	Boltzmann-Konstante k_B	4
	Raumzeit als Ausgangspunkt	5
	SI-Reform 2019	5
.3	Konkrete Berührungspunkte zwischen T0-Theorie und Matsas et al.	5
	Compton-Wellenlänge als zentrales Konzept	5
	Reduktion auf das MS- oder S-System	6
	Boltzmann-Konstante als Umrechnung	6
.4	Die Flexibilität der Basiseinheit	6
	Matsas-Perspektive	6
	T0-Perspektive	7
	Konvergenz bezüglich Flexibilität	7
.5	Mathematische Herleitungen	7
	Herleitung der Feinstrukturkonstante	7
	Behandlung durch Matsas	7
	T0-Herleitung	7
	Herleitung der Gravitationskonstante	8
	Behandlung durch Matsas	8
	T0-Herleitung	8
	Herleitung der Lichtgeschwindigkeit	9
	Herleitung der Planck-Konstante	10
.6	Alternative Formulierungen der T0-Theorie: Geschlossene Ableitungskette	11
	Die entscheidende Bedingung	11
	Die Standardkette	11
	Alternative 1: Feinstrukturkonstante als Fundamental	12
	Alternative 2: Gemessene Konstante als Ausgangspunkt	12
.7	Die Vereinheitlichung von QM, QFT und RT	12
	Das zentrale Vereinheitlichungsprinzip	12
	Integration der Quantenmechanik	13
	Integration der Quantenfeldtheorie	13
	Integration der Relativitätstheorie	13
	Das vereinheitlichte Bild	14

.8	Philosophische Reflexionen über fundamentale Konstanten	14
	Was macht eine Konstante „fundamental“?	14
	T0-Lösung: Hierarchie der Fundamentalität	15
	Die Rolle von Geometrie vs. Konvention	15
	Implikationen für die fundamentale Physik	15
	Historische Referenzen zu physikalischen Konstanten	16
	T0-Theorie-Dokumente	16
	Verwandte experimentelle und theoretische Arbeiten	16

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Herleitung der Feinstrukturkonstante, Schritt 5: $\xi(E_0/m_e)^2$ mit 206,8 $\rightarrow \xi E_0^2$ mit $E_0 = 7,398$ (MeV als reine Zahl); $\xi(E_0/m_e)^2$ ergibt 1/36,3.
- Herleitung von G , Schritt 3: $l_p = \bar{\lambda}_e/\sqrt{\alpha} \rightarrow \bar{\lambda}_e/\sqrt{\alpha} \approx 4,5 \times 10^{-12} \text{ m} \neq l_p$; Schritt 6 verweist nun auf das Kernresultat mit C_{conv} (Dok. 127).
- Herleitung der Lichtgeschwindigkeit: $1/(\xi D_f)$: $2,5 \times 10^7 \rightarrow 2,5 \times 10^3$; „ $c \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ in geeigneten Einheiten“ $\rightarrow$ keine Brücke, 299 792 458 m/s ist SI-Anker.
- Keyresult und Formelkette: $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu} \rightarrow \sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}} = 7,398 \text{ MeV}$ (sonst 1/138,9).
- Alternative 2, Schritt 3: $\alpha = \xi(\sqrt{m_e m_\mu}/m_e)^2 (= 1/36,3) \rightarrow \xi m_e m_\mu / K_{\text{frak}} = 1/137,06$.
- QFT-Kopplungen: $\alpha_s \sim \xi(m_{\text{QCD}}/m_e)^2$, $g_w^2 \sim \xi(m_W/m_e)^2$ liefern 20–56 bzw. $3,3 \times 10^6$; vermerkt.
- Wirkungsquantum: $\hbar \sim \sqrt{\xi} l_{pc}$ ist dimensional unvollständig (es fehlt eine Masse) und ergibt $5,6 \times 10^{-29} \text{ m}^2/\text{s}$, nicht $1,055 \times 10^{-34} \text{ Js}$; vermerkt.
- (2. Okt. 2026) Bezeichnung f : Strukturfaktor $f(n, l, j)$ — keine Frequenz; Vermerk im Text (Dok. 190, R147).

Abstract

Dieses Dokument bietet eine vergleichende Analyse, die die T0-Theorie, welche die physikalischen Konstanten auf den einen geometrischen Parameter $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ zurückführt, mit dem Paper von Matsas et al. (2024) in Beziehung setzt: „The number of fundamental constants from a spacetime-based perspective“ (Scientific Reports, DOI: 10.1038/s41598-024-71907-0). Das Paper von Matsas et al. schlägt eine Lösung der langjährigen Duff-Okun-Veneziano-Kontroverse vor, indem es zeigt, dass in relativistischen Raumzeiten nur eine fundamentale Konstante (verbunden mit der Zeiteinheit) notwendig ist. Die T0-Theorie ergänzt diesen Ansatz durch eine geometrische Reduktion auf den einen Parameter ξ , aus dem die physikalischen Konstanten – einschließlich dimensionsloser wie der Feinstrukturkonstante α – abgeleitet werden; SI-Anker wie m_e dienen dabei der Umrechnung in Einheiten, nicht der Ableitung. Die Analyse umfasst mathematische Herleitungen, philosophische Reflexionen und experimentelle Vorschläge und zeigt, wo beide Ansätze in Richtung eines vereinheitlichten Verständnisses von Quantenmechanik, Quantenfeldtheorie und Relativitätstheorie zusammenlaufen. Viele Kernideen – insbesondere die Ableitbarkeit von Massen über die Compton-Wellenlänge und die Interpretation von Konstanten wie c , G und k_B als Umrechnungsfaktoren – überlappen erheblich zwischen beiden Rahmenwerken.

Die Parallelen sind eine Einordnung dieses Dokuments, keine Stellungnahme von Matsas et al.

Statusmarker. Aussagen mit **[S]** sind *spekulativ*: ein Hinweis oder eine Vermutung, die im Korpus noch nicht hergeleitet oder numerisch geprüft ist.

.1 Einleitung: Die Suche nach fundamentalen Konstanten

Historischer Kontext

Die Frage „Wie viele fundamentale Konstanten braucht die Physik wirklich?“ ist seit dem frühen 20. Jahrhundert ein zentrales philosophisches und praktisches Anliegen. Als Max Planck 1899 seine natürlichen Einheiten einführte, schlug er vor, dass c , G und $\hbar$ fundamentale Skalen der Natur darstellen könnten. Die Debatte verschärfte sich jedoch mit der Entwicklung der Quantenfeldtheorie und der Standardisierung von Messsystemen.

Die Duff-Okun-Veneziano-Kontroverse (DOV), die Anfang der 2000er Jahre ausgelöst wurde, kristallisierte verschiedene Perspektiven zu dieser Frage heraus:

- **Michael Duff:** Argumentierte, dass nur dimensionslose Konstanten (wie α , Massenverhältnisse) wirklich fundamental sind, da dimensionsbehaftete Konstanten durch Einheitenwahl auf 1 gesetzt werden können.
- **Lev Okun:** Behauptete, dass dimensionsbehaftete Konstanten (c , $\hbar$, G) fundamental sind, weil sie verschiedene physikalische Dimensionen verbinden.
- **Gabriele Veneziano:** Nahm eine Zwischenposition ein und schlug vor, dass die Antwort vom theoretischen Rahmen abhängt.

Lösung von Matsas et al.

Das Paper von Matsas et al. (2024) schlägt eine Lösung vor, indem es zeigt, dass die Anzahl fundamentaler Konstanten **rahmenabhängig** ist:

- In Galileischer (nicht-relativistischer) Raumzeit: **drei** Konstanten werden benötigt
- In relativistischer Raumzeit (spezielle Relativitätstheorie): **eine** Konstante genügt
- In allgemein-relativistischer Raumzeit: **null oder eine**, je nach Interpretation

Ihre zentrale Erkenntnis: In relativistischen Raumzeiten genügt eine einzige Zeiteinheit (operationell definiert durch reale Uhren), um alle Observablen auszudrücken. Raum, Masse und andere Größen werden ableitbar statt unabhängig.

Geometrische Reduktion der T0-Theorie

Die T0-Theorie treibt die Reduktion noch weiter, indem sie Physik in reiner Geometrie gründet. Die zentrale Behauptung:

Schlüsselergebnis

Die physikalischen Konstanten werden auf einen einzigen geometrischen Parameter zurückgeführt:

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$$

der das Verhältnis zwischen tetraedrischer und sphärischer Packung in der Raumzeit auf der Planck-Skala darstellt.

Dieser Parameter ξ wird nicht an experimentelle Daten angepasst, sondern ergibt sich aus fundamentalen geometrischen Prinzipien, die mit den effizientesten Packungsstrukturen im 3D-Raum zusammenhängen. Aus ξ leitet die T0-Theorie ab (ganzzahlige Strukturwahlen sind dabei motivierte Setzungen, SI-Anker wie m_e dienen der Umrechnung in Einheiten):

1. Alle Teilchenmassen (Elektron, Myon, Proton usw.)
2. Die Lichtgeschwindigkeit c
3. Die Gravitationskonstante G
4. Die Planck-Konstante $\hbar$
5. Die Feinstrukturkonstante α
6. Kopplungskonstanten und Massenhierarchien

Zweck dieser Analyse

Beide Arbeiten verfolgen das gemeinsame Ziel, die Anzahl „fundamentaler“ physikalischer Konstanten zu minimieren, aber von verschiedenen Ausgangspunkten:

- **Matsas et al.:** Starten von der Raumzeitstruktur und zeigen operationell, dass in relativistischen Raumzeiten eine einzige Einheit (Zeit, definiert durch reale Uhren) genügt, um alle Observablen auszudrücken.
- **T0-Theorie:** Geht einen Schritt weiter und reduziert alles auf einen einzigen geometrischen Parameter ξ , wobei selbst die Lichtgeschwindigkeit c und die Gravitationskonstante G als abgeleitete Größen betrachtet werden.

Diese umfassende Analyse untersucht:

1. Konzeptuelle Überlappungen zwischen den Ansätzen
2. Wo die T0-Theorie an den Rahmen von Matsas anschließt und ihn erweitert
3. Vollständige mathematische Herleitungen von Konstanten aus ξ
4. Die Flexibilität bei der Wahl verschiedener Ausgangsparameter
5. Philosophische Implikationen für unser Verständnis fundamentaler Physik
6. Vorschläge zur experimentellen Verifikation
7. Die Vereinheitlichung von Quantenmechanik, Quantenfeldtheorie und Relativitätstheorie

.2 Konzeptuelle Überlappungen und Konvergenzen

Reduktion der Anzahl fundamentaler Konstanten

Beide Rahmenwerke reduzieren die Zahl der unabhängigen Eingaben deutlich:

- **Matsas et al.:** Gelangen zu genau **einer** Konstante (Zeiteinheit) in relativistischen Raumzeiten. Indem sie zeigen, dass Raum ($x = c \cdot t$) und Masse ($m = \hbar/(c\lambda)$) aus Zeitmessungen ableitbar sind, reduzieren sie den Standard-Drei-Konstanten-Rahmen auf eine einzige Eingabe.
- **T0-Theorie:** Kommt mit dem **einen Parameter** ξ aus (plus motivierte ganzzahlige Strukturwahlen; SI-Anker dienen der Umrechnung), wobei Einheiten wie Zeit oder Länge zu sekundären Konsequenzen der geometrischen Struktur werden. Selbst die Zeiteinheit ergibt sich aus ξ durch die Planck-Zeit $t_p = \sqrt{G/c^5}$, wobei sowohl G als auch c aus ξ abgeleitet sind.

Die philosophische Gemeinsamkeit: Beide lehnen die Vorstellung ab, dass mehrere unabhängige Konstanten in irgendeinem tiefen Sinne „fundamental“ sind. Sie sind entweder:

1. Umrechnungsfaktoren zwischen menschlich praktischen Einheiten (Matsas-Perspektive)
2. Manifestationen einer einzigen zugrundeliegenden geometrischen Struktur (T0-Perspektive)

Ableitbarkeit von $G, c, \hbar, k_B$

Beide Rahmenwerke sehen diese Konstanten nicht als fundamental im traditionellen Sinne:

Lichtgeschwindigkeit c

- **Matsas (Gl. 20):** c ist ein Umrechnungsfaktor zwischen Raum- und Zeitmessungen, dessen Wert durch operationelle Protokolle bestimmt wird (z. B. Radar-Entfernungsmessung).
- **T0-Theorie:** c ergibt sich geometrisch aus dem Verhältnis l_P/t_P der Planck-Skalen, die ihrerseits aus ξ folgen:

$$c^2 \sim \frac{1}{\xi \cdot D_f}$$

wobei $D_f = 3 - \xi$ die fraktale Dimension der Raumzeit nahe der Planck-Skala ist.

Gravitationskonstante G

- **Matsas:** G ist indirekt über Massen durch Gravitationsgesetze und Compton-Wellenlängen-Beziehungen ableitbar. In geometrisierten Einheiten kann sie auf 1 gesetzt werden.
- **T0-Theorie:** G wird explizit aus ξ abgeleitet (detailliert in Abschnitt .5):

$$G = \frac{\xi^2}{4m_e} \times C_{\text{conv}} \times K_{\text{frak}}$$

Dies verbindet die Planck-Länge $l_P = \sqrt{G}$ direkt mit ξ und zeigt, dass die Gravitationsstärke eine geometrische Konsequenz ist.

Planck-Konstante $\hbar$

- **Matsas:** $\hbar$ erscheint in der Compton-Wellenlängen-Beziehung $\bar{\lambda} = \hbar/(mc)$ und ist Teil des Reduktionsprozesses, letztlich durch die Festlegung der Zeitskala bestimmt.
- **T0-Theorie:** $\hbar$ skaliert mit $\sqrt{\xi}$, was hierarchische Energie-Zeit-Beziehungen widerspiegelt:

$$\hbar \sim \sqrt{\xi} \times (\text{Energieskala}) \times (\text{Zeitskala})$$

Dies verbindet die Quantenwirkung mit der geometrischen Struktur.

Boltzmann-Konstante k_B

Beide Arbeiten eliminieren k_B als fundamental:

- **Matsas:** Bei der Reduktion $\text{SI} \rightarrow \text{MKS} \rightarrow \text{MS}$ wird die Temperatur über $E = k_B T$ in die Energie absorbiert, was k_B zu einer historischen Konvention macht.
- **T0-Theorie:** Behandelt k_B explizit als „historischen Umrechnungsfaktor“ für die Temperatur-Energie-Äquivalenz, ohne fundamentale Rolle in der geometrischen Struktur.

Raumzeit als Ausgangspunkt

- **Matsas et al.:** Starten mit der operationellen Konstruktion der Raumzeit unter Verwendung von Uhren und Linealen. Zeit wird durch Cäsium-Atomübergänge definiert, Raum durch Lichtausbreitung. Das Unruh-DeWitt-Detektorprotokoll liefert eine relativistisch kovariante Definition von Zeitintervallen.
- **T0-Theorie:** Interpretiert Raumzeit als „reine ξ -Geometrie“ mit einer Sub-Planck-Skala:

$$L_0 = \xi \cdot l_P$$

Dies markiert den Übergangsbereich, in dem Quanteneffekte die klassische Raumzeitgeometrie modifizieren, was zu „Raumzeitgranulierung“ oder fraktaler Struktur führt.

Die Konvergenz: Beide sehen die Raumzeitstruktur (nicht Materie oder Kräfte) als die fundamentale Schicht, aus der alles andere emergiert.

SI-Reform 2019

Beide Ansätze lassen sich auf die SI-Reform 2019 beziehen:

- **Matsas:** Die Reform (Festlegung von c , $\hbar$, e , k_B) stellt eine Verschiebung von materiellen Artefakten zu fundamentalen Konstanten dar und passt zu ihrem operationellen Ansatz.
- **T0-Theorie:** Deutet die Reform als Festlegung von Umrechnungsfaktoren; die festgelegten Werte der Konstanten im neuen SI sind mit den aus ξ abgeleiteten Beziehungen verträglich.

.3 Konkrete Berührungspunkte zwischen T0-Theorie und Matsas et al.

Compton-Wellenlänge als zentrales Konzept

Schlüsselergebnis

Die reduzierte Compton-Wellenlänge

$$\bar{\lambda} = \frac{\hbar}{mc}$$

dient als Brücke zwischen Masse und Raumzeitskalen in beiden Rahmenwerken.

In Matsas et al. (Abschnitte „Two units...“ und „Time...“) wird die reduzierte Compton-Wellenlänge verwendet, um die Masse in Längen- oder Zeiteinheiten auszudrücken:

$$m_e^{\text{MS}} = \frac{\hbar^{\text{MS}}}{c\bar{\lambda}_e}$$

Die T0-Theorie greift dieses Erkenntnis auf: Die Elektronenmasse m_e wird nicht als unabhängiger Parameter betrachtet, sondern direkt aus ξ durch die Quantisierungsformel abgeleitet:

$$m_e = \frac{f(1, 0, 1/2)^2}{\xi^2} \cdot S_{T0}$$

Hierbei:

- $f(1, 0, 1/2)$ ist eine Quantenzahlfunktion, die den Quantenzustand des Elektrons kodiert

- $S_{T0} = 1 \text{ MeV}/c^2$ ist eine fundamentale Energieskala in der T0-Theorie
- Der $1/\xi^2$ -Faktor spiegelt die geometrische Verstärkung von Sub-Planck- zu beobachtbaren Skalen wider

(Vermerk vom 2. Okt. 2026 zur Bezeichnung: $f(1,0,1/2)$ ist hier der Strukturfaktor der Quantenzahlen des Elektrons, keine Frequenz und nicht die Grundwindungszahl $f = 1/\xi$. Vgl. Dok. 190, R147.)

Dies passt zu Matsas' Idee, dass Masse keine fundamentale Dimension ist, sobald eine Basiseinheit (z. B. Zeit) festgelegt ist. T0 gibt dafür einen geometrischen Mechanismus an.

Reduktion auf das MS- oder S-System

Matsas et al. führen eine schrittweise Reduktion durch:

$$\text{SI} \rightarrow \text{MKS} \rightarrow \text{MS} \rightarrow \text{S}$$

wobei S „nur Sekunden“ bedeutet.

Die T0-Theorie ergänzt dies, indem sie die Planck-Länge direkt aus ξ und m_e ableitet:

$$l_p = \sqrt{G} = \frac{\xi}{2\sqrt{m_e}} \times (\text{Umrechnungsfaktoren})$$

Dies liefert eine *physikalische Begründung* dafür, warum eine solche Reduktion möglich ist: Die Planck-Skala selbst ergibt sich aus derselben geometrischen Struktur (ξ), die auch die Massen bestimmt. Planck-Einheiten sind somit keine willkürlichen theoretischen Konstrukte, sondern spiegeln die zugrundeliegende ξ -Geometrie wider.

Die anschließende Umrechnung in SI-Einheiten wird rein konventionell und ist mit Matsas' operationeller Reduktion verträglich.

Boltzmann-Konstante als Umrechnung

Beide Arbeiten eliminieren k_B als fundamental:

- **Matsas:** Bei der Reduktion auf MKS wird die Temperatur über $k_B T = E$ absorbiert
- **T0-Theorie:** Identifiziert k_B explizit als „historische Konvention“ für die Temperatur-Energie-Umrechnung, ohne geometrische Bedeutung

In diesem Punkt stimmen beide überein: Keines der beiden Rahmenwerke weist der Temperatur einen unabhängigen dimensional Status zu.

.4 Die Flexibilität der Basiseinheit

Ein besonders interessanter Gemeinsamkeitspunkt ist die Erkenntnis, dass – sobald die Ableitbarkeit aller Observablen geklärt ist – die Wahl der „Ausgangseinheit“ weitgehend konventionell wird.

Matsas-Perspektive

In relativistischen Raumzeiten ist **Zeit** (definiert durch reale Uhren) die natürliche Wahl, da:

1. Raum ableitbar ist: $x = c \cdot t$ (Radar-Messprotokoll)
2. Masse ableitbar ist: $m = \hbar/(c\lambda)$ über die Compton-Wellenlänge
3. Das Unruh-DeWitt-Protokoll (Gl. 18) eine kovariante Zeitdefinition liefert

T0-Perspektive

Da alles aus ξ folgt, könnte man prinzipiell von folgendem ausgehen:

1. **Länge** (l_P): Planck-Länge als fundamental $\rightarrow$ Zeit über $t_P = l_P/c$
2. **Zeit** (t_P): Planck-Zeit als fundamental $\rightarrow$ Länge über $l_P = c \cdot t_P$
3. **Energie** (S_{T0}): Energieskala als fundamental $\rightarrow$ Massen über Quantisierung
4. **Direkt aus ξ** : Geometrischer Parameter $\rightarrow$ alle Skalen gleichzeitig
5. **Feinstrukturkonstante** α : Dimensionslose Konstante $\rightarrow$ alles andere über geschlossene Formelkette (siehe Abschnitt .6)

Konvergenz bezüglich Flexibilität

Dies entspricht einer Erweiterung von Duffs flexibler Haltung (keine feste Anzahl von Standards), aber mit einem entscheidenden Unterschied:

Erkenntnis .4.1. Der geometrische Anker

Während Matsas operationelle Flexibilität bei der Einheitenwahl zeigt, liefert T0 einen *geometrischen Anker* ξ , der sicherstellt, dass alle Wahlen zur selben Physik führen. Die Flexibilität ist nicht willkürlich, sondern durch die geschlossene mathematische Struktur eingeschränkt.

.5 Mathematische Herleitungen

Herleitung der Feinstrukturkonstante

Die Feinstrukturkonstante $\alpha \approx 1/137,036$ ist vielleicht die am präzisesten gemessene dimensionslose Konstante in der Physik. Die T0-Theorie führt sie auf einen geometrischen Ursprung zurück.

Behandlung durch Matsas

Matsas et al. erkennen α als physikalisch bedeutsamen dimensionslosen Parameter (im Duffsch Sinne) an, der nicht auf eine fundamentale Konstante reduziert werden muss, da er ohne zusätzliche Standards vergleichbar ist. Sie verwenden ihn in der Elektrodynamik zur Reduktion der Ampere-Einheit (Abschnitt „Recovering the MKS system“):

$$\alpha = \frac{e^2 k_e}{\hbar c}$$

Dies hilft, elektrische Größen in mechanische Einheiten umzurechnen.

Allerdings leitet Matsas α nicht aus fundamentalen Prinzipien ab – es bleibt ein Eingabeparameter.

T0-Herleitung

Die T0-Theorie leitet α explizit aus dem geometrischen Parameter ξ ab:

Schlüsselergebnis

$$\alpha = \xi \cdot E_0^2$$

wobei $E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu / K_{\text{frak}}} = 7,398 \text{ MeV}$ eine fundamentale Energieskala (geometrisches Mittel der Elektronen- und Myonmassen, 7,348 MeV, fraktal korrigiert, Dok. 190, R72) ist. (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu}$ – damit ergibt $\xi E_0^2 = \xi \cdot 53,99 = 1/138,9$; erst mit $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ folgt $1/137,06$, mit 7,398 genau $1/137,04$.)

Schrittweise Herleitung:

1. Starte mit $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ aus der Tetraedergeometrie
2. Leite die Elektronenmasse ab: $m_e = 0,511 \text{ MeV}/c^2$ aus der Quantisierungsformel
3. Leite die Myonmasse ab: $m_\mu = 105,66 \text{ MeV}/c^2$ analog
4. Berechne die geometrische Mittelenergie:

$$E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu} = \sqrt{0,511 \times 105,66} \text{ MeV}/c^2 \approx 7,35 \text{ MeV}/c^2$$

5. Wende die Beziehung an:

$$\begin{aligned} \alpha &= \xi \cdot E_0^2 = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \times (7,398)^2 \\ &= \frac{4}{3} \times 10^{-4} \times 54,73 \approx \frac{1}{137,04} \end{aligned}$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $\xi(E_0/m_e)^2 = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \times (7,35/0,511)^2 = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \times 206,8 \approx 1/137,036$ – diese Rechnung ergibt $1/36,3$; der Wert $1/137,036$ gehört zu $\alpha = \xi E_0^2$ mit $E_0 = 7,398$ als reiner Zahl in MeV. Mit $\sqrt{m_e m_\mu} = 7,35$ aus Schritt 4 ergäbe sich $1/138,8$.)

Physikalische Interpretation:

Die Feinstrukturkonstante repräsentiert die Stärke der elektromagnetischen Wechselwirkung. In der T0-Theorie wird diese Stärke bestimmt durch:

- Den geometrischen Strukturparameter ξ (räumliche Packungseffizienz)
- Die Massenhierarchie $E_0^2 = m_e \cdot m_\mu$ (Struktur des Leptonsektors)

Die Stärke des Elektromagnetismus ist also nicht willkürlich, sondern folgt aus der Raumzeitgeometrie und der Massenquantisierung.

Herleitung der Gravitationskonstante

Behandlung durch Matsas

Matsas et al. behandeln G als einen Umrechnungsfaktor, der Massen in Raum- und Zeiteinheiten transformiert (Abschnitt „Two units... in Galilean spacetime“). Sie leiten G nicht direkt ab, zeigen aber, dass in geometrisierten Einheiten (S-System) G auf 1 gesetzt werden kann, da Observablen allein in Zeiteinheiten ausdrückbar sind.

Indirekt ergibt sich G aus der Ableitbarkeit von Massen über die Compton-Wellenlänge und Gravitationsgesetze.

T0-Herleitung

In der T0-Theorie wird G explizit aus ξ abgeleitet:

Schlüsselergebnis

$$G = \frac{\xi^2}{4m_e} \times C_{\text{conv}} \times K_{\text{frak}}$$

Herleitung:

1. Starte mit der Planck-Längendefinition:

$$l_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}}$$

2. In der T0-Theorie ergibt sich die Planck-Länge aus der Sub-Planck-Skala:

$$l_P = \frac{L_0}{\xi} = \frac{\xi \cdot l_P}{\xi} \implies L_0 = \xi \cdot l_P$$

3. Beziehe auf die Elektronenmasse:

$$\frac{\bar{\lambda}_e}{\sqrt{\alpha}} = \frac{\hbar}{m_e c \sqrt{\alpha}} \approx 4,5 \times 10^{-12} \text{ m} \neq l_P$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $l_P = \bar{\lambda}_e / \sqrt{\alpha}$ – der Ausdruck ergibt $4,5 \times 10^{-12} \text{ m}$, nicht $1,6 \times 10^{-35} \text{ m}$; die Schritte 4–6 leiten G daher nicht her. Der Wert von G folgt aus dem Kernresultat $G = \frac{\xi^2}{4m_e} C_{\text{conv}} K_{\text{frak}}$ mit C_{conv} als SI-Umrechnung, siehe Dok. 127.)

4. Löse nach G auf:

$$G = \frac{l_P^2 c^3}{\hbar} = \frac{\hbar c}{m_e^2 \alpha}$$

5. Drücke mittels ξ aus:

$$G = \frac{\xi^2}{4m_e} \times \frac{\hbar c}{m_e \alpha} = \frac{\xi^2 \hbar c}{4m_e^2 \alpha}$$

6. Aus dem Kernresultat $G = \frac{\xi^2}{4m_e} C_{\text{conv}} K_{\text{frak}}$ (nicht aus den Schritten 3–5): (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „Mit $\alpha = \xi \cdot E_0^2$ und m_e aus ξ .“ – aus dieser Kette folgt der G -Wert nicht, siehe Vermerk zu Schritt 3.)

$$G \approx 6,674 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$$

Physikalische Interpretation:

Die Schwäche der Gravitationskonstante ($G \ll 1$ in Planck-Einheiten) ergibt sich aus:

- Dem ξ^2 -Faktor (sehr klein, da $\xi \sim 10^{-4}$)
- Der inversen Elektronenmassen-Beziehung
- Dem fraktalen Korrekturfaktor K_{frak} aus der Raumzeitgranulierung

Im T0-Rahmen ergibt sich damit eine Deutung des Hierarchieproblems: Gravitation ist schwach, weil sie an die Sub-Planck-geometrische Struktur koppelt, die in ξ^2 kodiert ist.

Herleitung der Lichtgeschwindigkeit**Schlüsselergebnis**

$$c^2 \sim \frac{1}{\xi \cdot D_f}$$

wobei $D_f = 3 - \xi$ die effektive fraktale Dimension der Raumzeit ist.

Herleitung:

1. Die Raumzeit auf der Planck-Skala hat eine fraktale Struktur mit Dimension:

$$D_f = 3 - \xi \approx 2,99987$$

2. Lichtausbreitung in fraktaler Raumzeit erfährt eine effektive Impedanz:

$$Z_{\text{eff}} = \xi \cdot D_f$$

3. Die Lichtgeschwindigkeit hängt mit der Impedanz zusammen:

$$c^2 = \frac{1}{\epsilon_0 \mu_0} \sim \frac{1}{Z_{\text{eff}}} = \frac{1}{\xi \cdot D_f}$$

4. Numerische Auswertung:

$$c^2 = \frac{1}{\frac{4}{3} \times 10^{-4} \times 2,99987} \approx 2,5 \times 10^3$$

also $c \approx 50$ in diesen Einheiten; eine Brücke zu 3×10^8 m/s ergibt sich daraus nicht. (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „ $\approx 2,5 \times 10^3 \times 10^4 = 2,5 \times 10^7$. In geeigneten Einheiten: $c \approx 3 \times 10^8$ m/s“ – $1/(\xi D_f) = 2,5 \times 10^3$; der Faktor 10^4 hatte keine Grundlage. Der Zahlenwert 299 792 458 m/s ist der SI-Anker.)

Physikalische Interpretation:

Im T0-Rahmen ist die Lichtgeschwindigkeit keine fundamentale Konstante; sie spiegelt wider:

- Die geometrische Packungseffizienz ξ (wie dicht die Raumzeit strukturiert ist)
- Die fraktale Dimension D_f (wie die Raumzeit vom perfekten 3D-euklidischen Raum abweicht)

Licht bewegt sich mit c , weil dies die maximale Geschwindigkeit ist, mit der kausale Signale durch ξ -strukturierte Raumzeit propagieren können.

Herleitung der Planck-Konstante

Schlüsselergebnis

$$\hbar \sim \sqrt{\xi} \times E_{\text{Skala}} \times T_{\text{Skala}}$$

Herleitung:

1. Die Planck-Konstante verknüpft Energie und Frequenz: $E = \hbar \omega$
2. In der T0-Theorie skaliert Energie mit der ξ -Hierarchie:

$$E_{\text{Skala}} = S_{T0} = 1 \text{ MeV}/c^2$$

3. Zeit skaliert invers mit der Energie:

$$T_{\text{Skala}} = \frac{\hbar}{E_{\text{Skala}}}$$

4. Selbstkonsistente Beziehung:

$$\hbar = E_{\text{Skala}} \cdot T_{\text{Skala}} \sim \sqrt{\xi} \times \frac{l_{\text{pc}}^2}{c} = \sqrt{\xi} \times l_{\text{pc}}$$

5. Mit $l_p = \xi / (2\sqrt{m_e})$ und numerischen Faktoren:

$$\hbar \approx 1,055 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$$

(Vermerk vom 30. Sept. 2026: $[l_{pc}] = m^2/s$, $[\hbar] = kg\,m^2/s$; der Ausdruck $\sqrt{\xi}l_{pc}$ ist um eine Masse unvollständig. Numerisch ist $\sqrt{\xi}l_{pc} = 0,01155 \cdot 1,616 \times 10^{-35} \text{ m} \cdot 2,998 \times 10^8 \text{ m/s} = 5,6 \times 10^{-29} \text{ m}^2/s$; kein angegebener Faktor führt auf $1,055 \times 10^{-34} \text{ Js}$. Das gilt auch für $\hbar \sim \sqrt{\xi} \times l_{pc}$ in der Physikalischen Interpretation unten.)

Physikalische Interpretation:

Die Planck-Konstante repräsentiert das Wirkungsquantum. In der T0-Theorie ergibt sie sich aus:

- Dem $\sqrt{\xi}$ -Faktor, der die Energie-Zeit-Hierarchie widerspiegelt
- Der Planck-Längenskala l_p (geometrisch)
- Der Lichtgeschwindigkeit c (geometrisch)

Die Quantenwirkung erscheint im T0-Rahmen somit als geometrische Größe, nicht als separates Axiom.

.6 Alternative Formulierungen der T0-Theorie: Geschlossene Ableitungskette

Die entscheidende Bedingung

Schlüsselergebnis

Eine geschlossene Formelkette

Man kann in der T0-Theorie nicht willkürlich zwischen ξ , α , einer Massenskala oder einer gemessenen Konstante als dem „fundamentalen“ Parameter wechseln, *ohne* eine vollständig geschlossene, konsistente Kette von Ableitungsformeln zu kennen. Nur wenn diese Kette mathematisch exakt und intern konsistent ist, bleibt die Physik identisch, unabhängig davon, von welchem Punkt man startet.

Die Standardkette

In der aktuellen T0-Theorie ist die Kette wie folgt aufgebaut:

$$\xi \rightarrow m_e \quad (\text{über Massenquantisierungsformel})$$

$$m_e = \frac{f(1, 0, 1/2)^2}{\xi^2} \cdot S_{T0} \quad (1)$$

$$m_e \rightarrow E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu / K_{\text{frak}}} \quad (\text{geometrische Mittelenergie, fraktal korrigiert}) \quad (2)$$

$$\xi, E_0 \rightarrow \alpha = \xi \cdot E_0^2 \quad (3)$$

$$m_e, \xi \rightarrow G = \frac{\xi^2}{4m_e} \times \text{Umrechnungsfaktoren} \quad (4)$$

$$G \rightarrow l_p = \sqrt{G} \quad (5)$$

Diese Kette ist geschlossen und erlaubt daher mehrere äquivalente Ausgangspunkte.

Alternative 1: Feinstrukturkonstante als Fundamental

Dies ist besonders attraktiv, da α sehr präzise gemessen ist ($\alpha^{-1} = 137,035999177(21)$).

Umgekehrte Kette ausgehend von α :

1. Starte mit gemessenem $\alpha \approx 1/137,036$
2. Leite ξ aus der invertierten Beziehung ab:

$$\xi = \frac{\alpha}{E_0^2}$$

Aber dies erfordert die Kenntnis von $E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu} \dots$

3. Löse selbstkonsistent:
 - Nehme ξ -Ansatz aus der Geometrie an ($\xi \sim 1,33 \times 10^{-4}$)
 - Berechne m_e, m_μ aus Quantisierungsformeln
 - Verifiziere, dass $\alpha = \xi \cdot E_0^2$ mit dem Experiment übereinstimmt
4. Alle anderen Konstanten folgen:

$$\alpha \rightarrow m_e \text{ (über inverse Quantisierung)} \quad (6)$$

$$m_e, \xi \rightarrow G \rightarrow l_P \quad (7)$$

$$\xi, D_f \rightarrow c \quad (8)$$

Dies funktioniert nur, weil E_0 und S_{T0} durch dieselbe geometrische Logik festgelegt sind. Die Geschlossenheit der Kette gewährleistet Konsistenz.

Alternative 2: Gemessene Konstante als Ausgangspunkt

Theoretisch möglich, aber weniger günstig, da G und m_e weniger präzise bekannt sind als α .

Beispiel: Ausgehend von der Elektronenmasse

1. Gemessen: $m_e = 0,51099895000(15) \text{ MeV}/c^2$
2. Invertiere die Quantisierungsformel:

$$\xi = \frac{f(1, 0, 1/2)}{\sqrt{m_e/S_{T0}}}$$

3. Berechne α :

$$\alpha = \xi \cdot \frac{m_e \cdot m_\mu}{K_{\text{frak}} (1 \text{ MeV})^2}$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $\alpha = \xi \cdot (\sqrt{m_e \cdot m_\mu}/m_e)^2$ – das ist $\xi m_\mu/m_e = 1,3333 \times 10^{-4} \times 206,77 = 1/36,3$; richtig $\xi \cdot 53,99/0,98667 = 1/137,06$.)

4. Verifiziere gegen das Experiment
5. Leite $G, c, \hbar$ wie zuvor ab

Auch hier muss die Kette auf denselben Wert von ξ (oder α) konvergieren, um Konsistenz zu wahren.

.7 Die Vereinheitlichung von QM, QFT und RT

Das zentrale Vereinheitlichungsprinzip

Schlüsselergebnis

Fundamentale Vereinheitlichung

Die konsistente Reduktion auf *nur eine* fundamentale Eingabe (Zeiteinheit für Matsas oder geometrischer Parameter ξ/α für TO) legt eine Vereinheitlichung der drei großen Säulen der modernen Physik:

- Quantenmechanik (QM)
 - Quantenfeldtheorie (QFT)
 - Relativitätstheorie (RT)
- nahe.

Integration der Quantenmechanik

Standard-QM: Postuliert $\hbar$ als fundamental, mit Massen als Eingabeparametern.

Matsas-Ansatz: Massen werden über die Compton-Wellenlänge $\bar{\lambda} = \hbar/(mc)$ ableitbar, wobei $\hbar$ durch den Zeitstandard festgelegt ist.

TO-Ansatz: Sowohl $\hbar$ als auch Massen ergeben sich aus ξ :

- Massen: $m_i = f_i^2 / \xi^2 \cdot S_{T0}$ (Quantisierungsformel)
- $\hbar$: $\hbar \sim \sqrt{\xi} \times l_{pc}$ (Wirkungsquantum)

Ergebnis: QM wird zu einer geometrischen Theorie, in der Quanteneigenschaften (diskrete Massen, quantisierte Wirkung) die zugrundeliegende Raumzeitstruktur widerspiegeln.

Integration der Quantenfeldtheorie

Standard-QFT: Kopplungskonstanten (α , starke Kopplung α_s , schwache Kopplung g_w) sind freie Parameter, die an Experimente angepasst werden.

Matsas-Ansatz: Adressiert Kopplungskonstanten nicht explizit, aber die dimensionelle Reduktion entfernt etwas Willkür.

TO-Ansatz: Kopplungskonstanten werden geometrisch:

- $\alpha = \xi \cdot E_0^2$ (elektromagnetische Kopplung)
- Starke Kopplung: $\alpha_s \sim \xi \cdot (m_{QCD}/m_e)^2$ (QCD-Skala)
- Schwache Kopplung: $g_w^2 \sim \xi \cdot (m_W/m_e)^2$ (elektroschwache Skala)

(Vermerk vom 30. Sept. 2026: Diese beiden Skalierungen liefern die Kopplungen nicht – $\xi(m/m_e)^2$ ergibt mit $m_{QCD} = 200\text{--}330\text{ MeV}$ Werte von 20–56 statt $\alpha_s \approx 0,118$, mit $m_W = 80,4\text{ GeV}$ $3,3 \times 10^6$; derselbe Fehler wie der in der α -Herleitung, Schritt 5, korrigierte Ausdruck $\xi(E_0/m_e)^2$.)

Ergebnis **[S]**: QFT-Kopplungen wären nicht mehr willkürlich, sondern durch Massenhierarchien und ξ bestimmt; für die starke und schwache Kopplung sind oben nur Skalierungsbeziehungen angegeben. Für das „Landschaftsproblem“ der Stringtheorie (viele mögliche Kopplungswerte) ergäbe sich daraus eine Antwort: Nur ein Satz von Kopplungen wäre geometrisch konsistent.

Integration der Relativitätstheorie

Standard-RT: Postuliert die Raumzeitmetrik mit c als fundamentaler Geschwindigkeit und G als Gravitationskopplung.

Matsas-Ansatz: Die Raumzeitstruktur (operationell definiert durch Uhren und Lineale) wird zum Fundament. c ist ein Umrechnungsfaktor, G ist ableitbar.

T0-Ansatz: Die Raumzeitmetrik selbst ergibt sich aus der ξ -Geometrie:

- Metriksignatur: $(+, -, -, -)$ aus der Tetraederpackungssymmetrie
- c : Maximale kausale Geschwindigkeit aus $c^2 \sim 1/(\xi \cdot D_f)$
- G : Gravitationskopplung aus $G \sim \xi^2/m_e$
- Planck-Skala: $l_p = \xi/(2\sqrt{m_e})$ (Quantengravitationsschwelle)

Ergebnis: RT wird zu einer Niedrigenergie-effektiven Theorie der ξ -strukturierten Raumzeit. Die Einstein-Gleichungen

$$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$

stellen die geometrische Antwort der ξ -Raumzeit auf die Materie-Energie-Verteilung dar.

Das vereinheitlichte Bild

In der Standardphysik erscheinen QM, QFT und RT als separate Theorien mit verschiedenen fundamentalen Konstanten:

- QM: $\hbar$, Massen
- QFT: α , Kopplungskonstanten
- RT: c , G

Die Reduktion auf eine einzige Ausgangsvariable (Zeit für Matsas, ξ für T0) offenbart, dass diese Trennung künstlich ist:

Erkenntnis .7.1. Alle drei Bereiche sind Manifestationen derselben zugrundeliegenden geometrischen Struktur.

Physikalische Interpretation in T0:

- Die Sub-Planck-Skala $L_0 = \xi \cdot l_p$ markiert den Übergangsbereich, in dem Quanteneffekte die Raumzeitgeometrie modifizieren („Raumzeitgranulierung“).
- Die geometrische Fixierung von α ist der Ausgangspunkt, um elektromagnetische, schwache und starke Wechselwirkung sowie die Gravitation auf denselben ξ -Parameter zurückzuführen **[S]** (für die schwache und starke Kopplung liegen hier nur Skalierungsbeziehungen vor).
- Die Herleitung von G aus derselben Geometrie, die auch die Quantenmassen bestimmt, verbindet Quanten- und Gravitationstheorie über denselben Parameter.

Matsas et al. legen das Fundament mit ihrer operationellen Reduktion auf eine Zeiteinheit: Sobald Raum, Masse und Ladung aus der Zeit ableitbar sind, verschwinden die scheinbaren Unterschiede zwischen relativistischer Mechanik, Quantenmechanik und Elektrodynamik.

Die T0-Theorie führt diesen Gedanken weiter, indem sie selbst diese eine Zeiteinheit (oder ihre Skala) auf eine rein geometrische Zahl (ξ oder α) zurückführt.

Im T0-Rahmen wird die Vereinheitlichung von Quantentheorie und Gravitation nicht durch Hinzufügen neuer Felder oder Dimensionen angestrebt, sondern durch Reduktion auf eine einzige fundamentale Eingabe.

.8 Philosophische Reflexionen über fundamentale Konstanten

Was macht eine Konstante „fundamental“?

Die DOV-Kontroverse und die Lösung von Matsas et al. werfen grundlegende philosophische Fragen auf:

1. **Operationelle Definition:** Ist eine Konstante fundamental, wenn sie mit operationellen Protokollen direkt messbar ist? (Matsas-Perspektive)
2. **Dimensionale Unabhängigkeit:** Ist eine Konstante fundamental, wenn sie unabhängige physikalische Dimensionen verbindet? (Okun-Perspektive)
3. **Mathematische Notwendigkeit:** Ist eine Konstante fundamental, wenn sie nicht aus physikalischen Gleichungen eliminiert werden kann? (Duff-Perspektive)
4. **Geometrischer Ursprung:** Ist eine Konstante fundamental, wenn sie reine geometrische Struktur ohne dimensionalen Inhalt repräsentiert? (T0-Perspektive)

T0-Lösung: Hierarchie der Fundamentalität

Die T0-Theorie schlägt eine Hierarchie vor:

1. **Am fundamentalsten:** ξ (reines geometrisches Verhältnis, dimensionslos)
2. **Abgeleitet fundamental:** α (dimensionslose Konstante aus ξ)
3. **Geometrische Skalen:** l_P, t_P, m_P (Planck-Einheiten aus ξ und m_e)
4. **Konventionelle Einheiten:** $c, \hbar, G, k_B$ (Umrechnungsfaktoren zwischen menschlich praktischen Einheiten)

Die Rolle von Geometrie vs. Konvention

Erkenntnis von Matsas: Viele „Konstanten“ sind bloße konventionelle Umrechnungsfaktoren, die unsere Wahl von Messstandards widerspiegeln (Meter, Sekunde, Kilogramm).

T0-Erweiterung: Selbst die „natürlichen“ Skalen (Planck-Länge, Planck-Zeit) sind nicht willkürlich, sondern spiegeln die in ξ kodierte geometrische Struktur der Raumzeit wider.

Konvergenz: Beide lehnen die Vorstellung ab, dass die Physik mehrere unabhängige „Fundamentale“ enthält. Beide gehen von einer fundamentalen Struktur aus (Raumzeit für Matsas, ξ -Geometrie für T0), aus der das Übrige folgt.

Implikationen für die fundamentale Physik

Erkenntnis .8.1. Folgerung für das Landschaftsproblem [S]

Wenn sich die Konstanten tatsächlich von einem geometrischen Parameter ableiten, gibt es keine „Landschaft“ möglicher Universen mit verschiedenen Konstantenwerten. Unser Universum hätte dann seine spezifischen Konstanten, weil sie die einzige Lösung der ξ -geometrischen Struktur sind.

Erkenntnis .8.2. Deutung der Feinabstimmung [S]

Konstanten wären dann nicht zufällig oder durch anthropische Selektion „feinabgestimmt“ für Leben, sondern Ausdruck einer selbstkonsistenten geometrischen Struktur. Das Universum könnte nicht „anders“ sein, ohne geometrische Konsistenz zu verletzen.

Erkenntnis .8.3. Vereinheitlichung ohne Zusatzdimensionen [S]

Eine vereinheitlichte Beschreibung muss Kräfte nicht durch zusätzliche Dimensionen oder Supersymmetrie zusammenführen. Sie lässt sich auch anstreben, indem gezeigt wird, dass die Physik von einem geometrischen Prinzip (ξ -Struktur) abgeleitet wird. QM, QFT, RT erscheinen dann als verschiedene Aspekte derselben Geometrie.

Historische Referenzen zu physikalischen Konstanten

- **Planck, M.** (1899). Über irreversible Strahlungsvorgänge. *Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften*, 440–480.
Einführung der Planck-Konstanten und natürlichen Einheiten. Im T0-Rahmen leiten sich Planck-Skalen aus ξ ab, anstatt fundamental zu sein.
- **Duff, M. J.** (2004). Comment on time-variation of fundamental constants. *Physical Review D*, 70, 087505. DOI: <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.70.087505>.
Duffs Perspektive auf dimensionslose Konstanten als wahrhaft fundamental. Passt zu T0, insofern α als alternativer Ausgangspunkt zu ξ dienen kann.
- **Okun, L. B.** (1989). The concept of mass. *Physics Today*, 42(6), 31–36. DOI: <https://doi.org/10.1063/1.881171>.
Diskussion der Masse als fundamentale Konstante. Kontrastiert mit der T0-Herleitung aller Massen aus ξ über die Quantisierungsformel.

T0-Theorie-Dokumente

- 008_T0_xi-und-e_En.pdf: Verbindung zwischen ξ und Elementarladung e . Zeigt den geometrischen Ursprung der elektromagnetischen Kopplung, ergänzt den Vergleich mit Matsas um eine explizite Ladungsherleitung.
- 009_T0_xi_origin_En.pdf: Ursprung von ξ aus der Tetraederpackungsgeometrie. Führt die fraktale Dimension $D_f = 3 - \xi$ ein, die die Raumzeitstruktur nahe der Planck-Skala erklärt.
- 042_xi_parameter_particles_En.pdf: ξ -basiertes Teilchenmassenspektrum. Zeigt, wie sich Elektron, Myon, Tau, Quarks aus derselben Quantisierungsformel ableiten. Ergänzt die Matsas-Reduktion mit Implikationen für die Quantenfeldtheorie und experimentelle Verifikation.
- 011_T0_Feinstruktur_En.pdf: Detaillierte Herleitung der Feinstrukturkonstante $\alpha = \xi \cdot E_0^2$ aus geometrischen Prinzipien.
- 012_T0_Gravitationskonstante_En.pdf: Herleitung der Gravitationskonstante G aus ξ , erklärt die Gravitations-Quanten-Hierarchie.

Verwandte experimentelle und theoretische Arbeiten

- **Koide, Y.** (1982). Quark and lepton masses speculated from a subquark model. *Lettere al Nuovo Cimento*, 34(7), 201–205.
Koide-Formel für geladene Leptonmassen. Unabhängige empirische Massenbeziehung, die eine Parallele zur T0-Quantisierungsstruktur bildet.
- **CODATA Recommended Values** (2018). *Reviews of Modern Physics*, 93, 025010. DOI: <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.93.025010>.
Präzisionswerte fundamentaler Konstanten zum Vergleich mit T0-Vorhersagen.

Diese Analyse stellt die Berührungspunkte
zwischen operationeller Reduktion (Matsas et al.) und geometrischer Reduktion
(T0-Theorie) dar,
verbunden mit der These der T0-Theorie, dass Physik auf ihrer tiefsten Ebene Geometrie
ist.