

Ultraviolett-Katastrophe, Plancks Quantisierung und Einsteins Lichtquanten:

Was die klassische Physik nicht erklären konnte —
und wie die T0-Theorie beide Aspekte geometrisch löst

Johann Pascher

Februar 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Einleitung: Zwei Krisen, ein geometrisches Prinzip	3
	Der historische Kontext	3
	Was dieses Dokument leistet	3
.2	Die Ultraviolett-Katastrophe: Eine präzise Diagnose	4
	Das Hohlraumstrahlungs-Problem	4
	Der klassische Ansatz und sein Scheitern	4
	Das Ausmaß der Katastrophe	5
	Die zwei empirischen Teillösungen	5
.3	Plancks Lösung: Ein Akt der Verzweiflung	6
	Plancks Strategie	6
	Der Preis: Quantisierung als Postulat	6
	Was Planck nicht erklärte	6
.4	Einsteins Lichtquanten: Thermodynamisch erzwungen	7
	Ein weitverbreitetes Missverständnis	7
	Das Strukturproblem	7
	Einsteins Methode: Thermodynamik statt Modell	7
	Die thermodynamische Herleitung	7
	Der Photoelektrische Effekt als Bestätigung	8
	Was Einstein offen ließ	9
.5	T0-Perspektive I: Der Ursprung von $\epsilon = hf$	10
	Der geometrische Parameter ξ	10
	Die Bindungsbedingung	10
	Was passiert beim Photon?	10
	Die Planck-Konstante als emergente Größe	10
	Die Verbindung zu Einsteins Argument	11
.6	T0-Perspektive II: Warum die UV-Divergenz verschwindet	12
	Das klassische Dilemma nochmals	12
	Die Sub-Planck-Skala in T0	12
	Die maximale physikalische Frequenz	12
	Das Integral konvergiert	13
	Die klassische Voraussetzung aus T0-Sicht	13
	Fraktale Raumzeit und natürliche Regularisierung	13
.7	Synthese: Was T0 leistet und was offen bleibt	15
	Die vollständige Tabelle	15
	Was T0 zusätzlich anbietet	15
	Testbare Vorhersagen	15
	Methodologische Parallelen	15
.8	Zusammenfassung	17

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Dok. 163, fraktale Modendichte: Faktor $(f/f_{\max})^{-\xi D_{\text{frak}}} \approx 1$, nahe $f_{\max}$ „Unterdrückung“ vermerkt (tatsächlich $\approx 1,03$ im Laborbereich, fällt zu $f_{\max}$ auf 1).
- Dok. 163, g-2: Abweichung mit $K_{\text{frak}}^{3/2}$: 0,014 % $\rightarrow$ 0,033 % (wie Dok. 018/158).
- Dok. 163, Ursprung von $\epsilon = hf$: $E = f\hbar/\xi$ vermerkt (um $1/(2\pi\xi) = 1194$ zu groß gegen $E = 2\pi\hbar f$).
- (2. Okt. 2026) Bezeichnung f : allgemeine Abhängigkeit $f(\text{Geometrie})$ — keine Frequenz; Vermerk im Text (Dok. 190, R147).

Abstract

Die Ultraviolett-Katastrophe und Einsteins Lichtquantenhypothese markieren zwei zentrale Wendepunkte in der Geschichte der Physik. Dieses Dokument analysiert beide Aspekte aus dreifacher Perspektive: erstens die historische und physikalische Entwicklung — von Maxwells elektromagnetischer Wellentheorie über Plancks verzweifelten Quantisierungsansatz bis zu Einsteins thermodynamisch erzwungenem Schluss, dass Licht aus unabhängigen Energiequanten besteht; zweitens die verbliebenen offenen Fragen der Standardphysik — warum $\epsilon = hf$? warum ist h genau dieser Wert? was begrenzt die Frequenz nach oben?; und drittens die T0-Antworten auf beide Fragen: Die Planck-Konstante h folgt über die Kette $\xi \rightarrow \alpha \rightarrow h$ aus dem geometrischen Parameter $\xi = 4/30000$ — alle SI-Werte sind aus ξ und der einen Einheiten-Kalibrierung ableitbar, eine zusätzliche Konvention braucht es nicht; und die Ultraviolett-Divergenz wird im T0-Rahmen als Folge der Annahme gedeutet, Raumzeit sei kontinuierlich bis zu beliebig kleinen Skalen. Die Sub-Planck-Skala $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ setzt eine geometrisch festgelegte maximale Frequenz $f_{\max}$, unterhalb derer keine Moden mehr existieren.

.1 Einleitung: Zwei Krisen, ein geometrisches Prinzip

Der historische Kontext

Ende des 19. Jahrhunderts herrschte in der Physik eine eigentümliche Kombination aus Triumph und Ratlosigkeit. Maxwells Theorie des Elektromagnetismus hatte Licht, Elektrizität und Magnetismus in einem einzigen, mathematisch geschlossenen Rahmenwerk vereint. Phänomene wie Interferenz und Beugung schienen das Wellenbild des Lichts eindeutig zu bestätigen. Viele Physiker hielten Maxwells Theorie für einen der Höhepunkte der Wissenschaftsgeschichte.

Gleichzeitig aber versagte eben diese Theorie deutlich, sobald man sie auf eine der einfachsten denkbaren Situationen anwandte: auf die Wärmestrahlung heißer Körper. Das Ergebnis war eine Vorhersage, die physikalisch absurd war — unendliche Energiedichte.

Diese Krise wurde zur Geburtsstunde der Quantenphysik.

Was dieses Dokument leistet

Wir verfolgen in diesem Dokument drei parallele Fäden:

1. **Die klassische Krise:** Warum divergiert die klassische Theorie bei hohen Frequenzen? Was genau geht falsch und warum ist das nicht trivial?
2. **Die historischen Antworten:** Wie lösten Planck (1900) und Einstein (1905) das Problem — und was blieb dabei offen? Es wird gezeigt, dass Einstein die Lichtquanten *nicht postulierte*, sondern aus der Thermodynamik *extrahierte*.
3. **Die T0-Perspektive:** Wie beschreibt die T0-Theorie beide Aspekte geometrisch? Die Planck-Konstante wird auf ξ zurückgeführt, und die UV-Divergenz entfällt, weil die Raumzeit im T0-Rahmen eine geometrische Mindeststruktur besitzt.

Leitfrage

Warum ist $\epsilon = hf$? Warum hat die Planck-Konstante genau diesen Wert? Und warum gibt es überhaupt eine natürliche Hochfrequenzgrenze? Die klassische Physik beantwortet diese Fragen nicht. T0 bietet dafür eine geometrische Antwort an.

.2 Die Ultraviolett-Katastrophe: Eine präzise Diagnose

Das Hohlraumstrahlungs-Problem

Stellen Sie sich einen vollständig geschlossenen Hohlraum vor, dessen Wände gleichmäßig auf eine Temperatur T erhitzt wurden und sich im thermischen Gleichgewicht befinden. Bohrt man ein winziges Loch in die Wand, so tritt Strahlung aus. Diese *Hohlraumstrahlung* (auch: *Schwarzkörperstrahlung*) besitzt eine wichtige Eigenschaft: ihr Spektrum hängt *ausschließlich* von der Temperatur ab, nicht vom Material oder der Form des Hohlraums.

Die experimentell gemessene Größe ist die *spektrale Energiedichte* $\rho(f, T)$: die Energie pro Volumeneinheit pro Frequenzintervall. Bei verschiedenen Temperaturen erhält man charakteristische Kurven mit klaren Signaturen:

- Das Maximum der Kurve verschiebt sich mit steigender Temperatur zu höheren Frequenzen (Wiensches Verschiebungsgesetz).
- Die Gesamtfläche unter der Kurve wächst mit der vierten Potenz der Temperatur (Stefan-Boltzmann-Gesetz: $u \propto T^4$).
- Ein heißes Stück Metall leuchtet zunächst dunkelrot, dann heller orangegelb, schließlich weißglühend — die dominante Frequenz wandert sichtbar nach oben.

Die Herausforderung an die theoretische Physik um 1900 war präzise: Leite diese Kurve aus den Grundgesetzen der Physik ab.

Der klassische Ansatz und sein Scheitern

Der natürliche Ausgangspunkt war Maxwells Theorie in Kombination mit der bewährten statistischen Mechanik. Die Vorgehensweise ist konzeptuell einfach:

Schritt 1: Zählen der Moden. Im Hohlraum können sich nur stehende elektromagnetische Wellen ausbilden — genau jene Wellenlängen, für die eine ganzzahlige Anzahl von halben Wellenlängen zwischen die Wände passt. Die Anzahl der elektromagnetischen Moden pro Volumeneinheit im Frequenzintervall $[f, f + df]$ beträgt:

$$g(f) df = \frac{8\pi f^2}{c^3} df \quad (1)$$

Das Entscheidende: die Modendichte wächst quadratisch mit der Frequenz. Für jede Verdoppelung der Frequenz gibt es viermal so viele unabhängige Schwingungsmuster. Und es gibt *keine obere Grenze* — die Wellenlänge kann beliebig klein werden, die Frequenz beliebig groß.

Schritt 2: Äquipartitionstheorem. Die klassische statistische Mechanik (Boltzmann, Maxwell) liefert das Äquipartitionstheorem: Im thermischen Gleichgewicht bei Temperatur T trägt jeder quadratische Freiheitsgrad im Mittel die Energie $\frac{1}{2}k_B T$. Eine elektromagnetische Welle hat zwei quadratische Freiheitsgrade (elektrisches und magnetisches Feld), also erhält jede Mode im Mittel die Energie:

$$\langle E_{\text{Mode}} \rangle = k_B T \quad (2)$$

Dies gilt *unabhängig von der Frequenz der Mode*. Eine Mode bei 10^{15} Hz bekommt dieselbe mittlere Energie wie eine Mode bei 10^3 Hz.

Schritt 3: Spektrale Energiedichte. Die spektrale Energiedichte ergibt sich einfach als Produkt:

$$\rho_{\text{klass}}(f, T) = g(f) \cdot \langle E_{\text{Mode}} \rangle = \frac{8\pi f^2}{c^3} \cdot k_B T \quad (3)$$

Dies ist das *Rayleigh-Jeans-Gesetz*. Es stimmt bei niedrigen Frequenzen gut mit dem Experiment überein. Bei hohen Frequenzen aber divergiert es.

Das Ausmaß der Katastrophe

Die Gesamtenergie erhält man durch Integration über alle Frequenzen:

$$u_{\text{klass}} = \int_0^\infty \rho_{\text{klass}}(f, T) df = \frac{8\pi k_B T}{c^3} \int_0^\infty f^2 df = \infty \quad (4)$$

Das Integral divergiert. Die klassische Physik sagt: Ein Hohlraum im thermischen Gleichgewicht enthält *unendlich viel Energie*. Das ist physikalisch unsinnig.

Diese Divergenz wird die **Ultraviolett-Katastrophe** genannt, weil sie sich bei hohen (ultravioletten und höheren) Frequenzen am deutlichsten zeigt. Der Name ist etwas irreführend — die Divergenz erstreckt sich in Wahrheit über das gesamte Hochfrequenzspektrum, nicht nur über den UV-Bereich.

Warum das Scheitern tief ist

Das Rayleigh-Jeans-Gesetz ist kein handwerklicher Fehler. Es ist die korrekte Anwendung zweier gut bestätigter Theorien: Maxwells Elektrodynamik und Boltzmanns statistischer Mechanik. Das Scheitern zeigt daher, dass eine dieser Grundlagen fundamental falsch sein muss — oder dass eine wichtige physikalische Tatsache fehlt.

Die zwei empirischen Teillösungen

Vor der vollständigen Lösung gab es zwei wichtige empirische Hinweise:

Das Rayleigh-Jeans-Gesetz (abgeleitet ca. 1900) passt bei *niedrigen* Frequenzen sehr gut:

$$\rho_{\text{RJ}}(f, T) \approx \frac{8\pi f^2}{c^3} k_B T \quad (\text{für } f \rightarrow 0) \quad (5)$$

Das Wiensche Strahlungsgesetz (1896) beschreibt die *hohen* Frequenzen gut:

$$\rho_{\text{Wien}}(f, T) = a f^3 \exp\left(-\frac{bf}{T}\right) \quad (6)$$

wobei a und b empirische Konstanten sind. Bei hohen Frequenzen fällt die Exponentialfunktion stärker ab als f^2 wächst — das Integral konvergiert.

Das Problem: Beide Gesetze gelten nur in ihrem jeweiligen Grenzbereich. Zwischen ihnen liegen die experimentell bestimmten Daten, die eine glatte Verbindung zeigen. Eine einheitliche Theorie fehlte.

.3 Plancks Lösung: Ein Akt der Verzweiflung

Plancks Strategie

Max Planck näherte sich dem Problem anders als seine Zeitgenossen. Statt von einer bestimmten mikroskopischen Modellvorstellung auszugehen, arbeitete er *thermodynamisch rückwärts*: Er suchte nach dem mathematischen Ausdruck für die Entropie der Hohlraumstrahlung, der zu dem empirisch bekannten Spektrum passt.

Der entscheidende Schritt: Planck fand eine Formel, die bei niedrigen Frequenzen in das Rayleigh-Jeans-Gesetz und bei hohen Frequenzen in das Wiensche Gesetz übergeht:

$$\rho_{\text{Planck}}(f, T) = \frac{8\pi h f^3}{c^3} \cdot \frac{1}{\exp\left(\frac{hf}{k_B T}\right) - 1} \quad (7)$$

Diese Formel beschreibt das experimentelle Spektrum über den gesamten Frequenzbereich mit hoher Präzision — und das mit nur einer einzigen neuen Konstante: der *Planck-Konstante* h .

Der Preis: Quantisierung als Postulat

Um seine Formel herzuleiten, musste Planck eine Annahme machen, die er selbst als einen *Akt der Verzweiflung* bezeichnete: Er nahm an, dass Energie nur in *diskreten Vielfachen* von hf ausgetauscht werden kann. Die Energie einer einzelnen Portion (*Quantum*) beträgt:

$$\epsilon = hf \quad (8)$$

Mit dieser Annahme ergibt sich die mittlere Energie einer Mode bei Frequenz f nicht mehr als $k_B T$ (Äquipartitionstheorem), sondern als:

$$\langle E_{\text{Mode}} \rangle = \frac{hf}{\exp\left(\frac{hf}{k_B T}\right) - 1} \quad (9)$$

Für $hf \ll k_B T$ (niedrige Frequenzen) nähert sich dieser Ausdruck $k_B T$ — das klassische Resultat wird reproduziert. Für $hf \gg k_B T$ (hohe Frequenzen) fällt die mittlere Energie exponentiell ab — genau das, was nötig ist, um die Divergenz zu unterdrücken.

Was Planck nicht erklärte

Die Quantisierung löste das Spektralproblem mathematisch. Aber Planck selbst betrachtete sie als eine rechnerische Hilfskonstruktion, nicht als eine physikalische Aussage über die Natur des Lichts. In seiner Vorstellung war das elektromagnetische Feld nach wie vor eine kontinuierliche Welle. Die Quantisierung war eine Eigenschaft der *Wechselwirkung* zwischen Materie und Strahlung — nicht der Strahlung selbst.

Plancks offene Frage

Planck hatte die Kurve gefunden. Aber er hatte nicht erklärt, *warum* Energie in diskreten Portionen ausgetauscht wird. Die Zahl h war ein freier Parameter — aus den Daten gemessen, nicht aus tieferen Prinzipien abgeleitet. Was ist h ? Warum genau dieser Wert?

.4 Einsteins Lichtquanten: Thermodynamisch erzwungen

Ein weitverbreitetes Missverständnis

Einsteins Beitrag aus dem Jahr 1905 wird typischerweise als *die Erklärung des Photoelektrischen Effekts* zusammengefasst. Das ist irreführend. Der Photoeffekt erscheint erst am Ende des Papiers als eine von mehreren Konsequenzen. Einstein beginnt nicht mit Metallen, Elektronen oder Experimenten.

Er beginnt mit einem *strukturellen Problem innerhalb der Physik selbst*.

Das Strukturproblem

Auf der einen Seite steht die Theorie der Materie: Gase und andere ponderable Körper werden durch eine *endliche* Anzahl diskreter Größen beschrieben — die Positionen und Geschwindigkeiten von Atomen. Der Zustand des Systems ist durch eine endliche Liste spezifiziert.

Auf der anderen Seite steht Maxwells Theorie: Der Zustand des elektromagnetischen Feldes ist *nicht* durch eine endliche Liste gegeben, sondern durch kontinuierliche Felder — glatte Funktionen, die an *jedem* Punkt des Raumes definiert sind. Das sind unendlich viele Freiheitsgrade.

In Einsteins eigenen Worten: Es gibt einen *tiefen formalen Unterschied* zwischen diesen beiden Beschreibungsweisen der Natur. Die Frage ist: Wenn beide Systeme im thermischen Gleichgewicht sein können — haben sie dann wirklich eine so grundlegend verschiedene Struktur?

Einsteins Methode: Thermodynamik statt Modell

Einstein lehnte es ab, von einem spekulativen mikroskopischen Modell des Lichts auszugehen. Stattdessen wollte er herausfinden, was die verlässlichsten verfügbaren Fakten über die Natur des Lichts aussagen.

Diese Fakten kamen aus zwei Quellen:

1. Das experimentell bestätigte Schwarzkörperspektrum (insbesondere das Wiensche Gesetz im Hochfrequenzbereich).
2. Das allgemeinste und mächtigste verfügbare Gleichgewichtsprinzip: der zweite Hauptsatz der Thermodynamik — insbesondere Boltzmanns statistische Interpretation.

Die thermodynamische Herleitung

Schritt 1: Entropie der Strahlung. Einstein führt eine *spektrale Entropiedichte* $\sigma(f, T)$ ein — analog zur spektralen Energiedichte $\rho(f, T)$. Im thermischen Gleichgewicht gilt die thermodynamische Beziehung:

$$\frac{\partial \sigma}{\partial \rho} = \frac{1}{T} \quad (10)$$

Diese Beziehung folgt direkt aus der Thermodynamik und setzt kein Modell voraus.

Schritt 2: Entropie aus dem Wienchen Gesetz. Indem Einstein das Wiensche Gesetz (6) in die thermodynamische Relation (10) einsetzt und integriert, erhält er die Entropiedichte in der Wien-Region:

$$\sigma(f, T) = -\frac{\rho}{bf} \left[\ln \left(\frac{\rho}{af^3} \right) - 1 \right] \quad (11)$$

Schritt 3: Entropieänderung bei Volumenänderung. Einstein betrachtet nun einen schmalen, quasi-monochromatischen Strahlungsausschnitt mit Gesamtenergie E bei Frequenz f , eingeschlossen im Volumen V_0 . Er berechnet die Entropieänderung, wenn dieses Volumen auf V verändert wird:

$$\Delta S = S(V) - S(V_0) = \frac{E}{bf} \ln \left(\frac{V}{V_0} \right) \quad (12)$$

Schritt 4: Der Vergleich mit einem idealen Gas. Dies ist der entscheidende Moment. Für ein ideales Gas aus N unabhängigen Teilchen, die sich frei im Volumen bewegen, liefert Boltzmanns Entropieformel $S = k_B \ln W$ (mit W als Anzahl der Mikrozustände):

$$\Delta S_{\text{Gas}} = Nk_B \ln \left(\frac{V}{V_0} \right) \quad (13)$$

Die beiden Ausdrücke (12) und (13) haben *identische Struktur*. Der Vergleich der Exponenten liefert:

$$\frac{E}{bf} = Nk_B \implies N = \frac{E}{k_B b f} \quad (14)$$

Schritt 5: Energie eines Quants. Wenn die Gesamtenergie E von N unabhängigen Entitäten getragen wird, und jede die Energie ϵ trägt, dann gilt $E = N\epsilon$, also:

$$\epsilon = \frac{E}{N} = k_B b f \quad (15)$$

Da sich die Wiensche Konstante b durch Vergleich mit Plancks Gesetz als $b = h/k_B$ herausstellt, ergibt sich schließlich:

$$\boxed{\epsilon = hf} \quad (16)$$

Einsteins entscheidende Einsicht

Das Lichtquant wurde nicht postuliert. Es wurde aus der Thermodynamik *erzwungen*. Die einzigen Eingaben waren: (1) das empirische Wiensche Gesetz, (2) die thermodynamische Definition des Gleichgewichts, (3) Boltzmanns Entropie-Wahrscheinlichkeits-Relation. Nirgends wurde eine Teilchennatur des Lichts angenommen — sie ergab sich als logische Konsequenz.

Der Photoelektrische Effekt als Bestätigung

Erst nach dieser Herleitung wendet Einstein seine Hypothese auf den Photoeffekt an. Das Ergebnis ist die berühmte Gleichung:

$$E_{\text{kin, max}} = hf - \Phi \quad (17)$$

wobei Φ die *Austrittsarbeit* des Metalls ist. Diese Gleichung ist linear in f mit Steigung h — eine sehr scharfe, experimentell prüfbare Vorhersage.

Die experimentelle Bestätigung kam durch Robert Millikan (1916), der trotz jahrelanger Bestätigung der Gleichung am Lichtquanten-Bild zweifelte. Planck empfahl Einstein 1913 für die Preußische Akademie, warnte aber gleichzeitig, dass Einsteins Lichtquantenhypothese als Fehler zu bewerten sei. Der Nobelpreis (1921) ehrte die Gleichung — nicht die dahinterstehende Interpretation.

Was Einstein offen ließ

Auch nach Einsteins Arbeit blieben fundamentale Fragen unbeantwortet:

- **Warum $\epsilon = hf$?** Einstein zeigte, dass monochromatische Strahlung im Wienchen Regime thermodynamisch so verhält, als bestünde sie aus unabhängigen Quanten. Aber *was* sind diese Quanten mikroskopisch?
- **Warum genau dieser Wert von h ?** Die Planck-Konstante ist $h \approx 6,626 \times 10^{-34}$ J·s. Warum dieser Zahlenwert? Woher kommt er? In der Standardphysik ist h ein freier Parameter — gemessen, nicht abgeleitet.
- **Was begrenzt die Frequenz nach oben?** Die UV-Divergenz ist durch Plancks Quantisierung zwar unterdrückt, aber die fundamentale Frage bleibt: Ist der Frequenzraum wirklich bis $f \rightarrow \infty$ offen? Gibt es keine physikalische Grenze?

.5 T0-Perspektive I: Der Ursprung von $\epsilon = hf$

Der geometrische Parameter ξ

Die T0-Theorie führt die Naturkonstanten auf einen einzigen dimensionslosen geometrischen Parameter zurück (SI-Anker dienen der Umrechnung in Einheiten):

$$\xi = \frac{4}{30000} \approx 1,333 \times 10^{-4} \quad (18)$$

Dieser Parameter beschreibt das Verhältnis zwischen der fundamentalen Sub-Planck-Skala und der kosmischen Skala. Er ist nicht frei — er folgt aus der Geometrie des dreidimensionalen Raumes auf der Planck-Skala.

Die Bindungsbedingung

Das Herzstück der T0-Theorie ist die Zeit-Masse-Dualität:

$$T(x, t) \cdot m(x, t) = 1 \quad (\text{in natürlichen Einheiten}) \quad (19)$$

Das intrinsische Zeitfeld eines Teilchens mit Masse m ist:

$$T(x, t) = \frac{\hbar}{m(x, t) \cdot c^2} \quad (20)$$

Zeit und Masse sind keine unabhängigen Größen — sie sind reziproke Aspekte einer einzigen geometrischen Realität.

Was passiert beim Photon?

Das Photon hat keine Ruhemasse: $m_\gamma = 0$. In der T0-Bindungsbedingung $T \cdot m = 1$ würde das naiv $T \rightarrow \infty$ implizieren. Die physikalische Interpretation: Das Photon ist sein Zeitfeld — es existiert *nicht in der Zeit*, es ist eine zeitartige Struktur. Aus der Perspektive des Photons vergeht keine Eigenzeit.

Für ein Photon mit Frequenz f gilt:

$$E_\gamma = hf = \frac{\hbar}{T(x, t)_\gamma} \quad (21)$$

In T0 ist dies keine externe Gleichung, sondern eine Konsequenz der Bindungsbedingung: Die Energie ist die reziproke intrinsische Zeit des Feldes.

Die Planck-Konstante als emergente Größe

In der Standardphysik ist h eine fundamentale Naturkonstante mit dem Wert $6,626 \times 10^{-34}$ J·s. In T0 ist h keine freie Konstante, sondern emergiert aus ξ :

$$h = \xi \cdot \hbar_{\text{Planck}} \cdot f(\text{Geometrie}) \quad (22)$$

(Vermerk vom 2. Okt. 2026 zur Bezeichnung: $f(\text{Geometrie})$ ist hier eine allgemeine Abhängigkeit, keine Frequenz und nicht die Grundwindungszahl $f = 1/\xi$. An anderen Stellen dieses Dokuments steht f für eine Frequenz. Vgl. Dok. 190, R147.)

Konkret: Die SI-Reform 2019 legte h durch Definition fest (bei der Kalibrierung von $\alpha = 1$ in rationalen T0-Einheiten). Der numerische Wert von h ist nicht willkürlich — er kodiert die geometrische Beziehung zwischen der Sub-Planck-Skala $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ und der makroskopischen Welt.

T0-Antwort auf Frage 1

Warum gilt $\epsilon = hf$? In T0 ist die Antwort: weil die Energie eines Photons gleich der reziproken intrinsischen Zeit seines Feldes ist ($E = 1/T$), und die Frequenz die inverse Zeit ist ($f = 1/T$). Die Gleichung $\epsilon = hf$ ist in T0 kein Postulat, sondern folgt direkt aus der Zeitfeld-Bindungsbedingung $T \cdot E = 1$ für masselose Felder.

Die Verbindung zu Einsteins Argument

Einsteins thermodynamische Herleitung und T0s geometrische Herleitung konvergieren auf dasselbe Ergebnis durch zwei verschiedene Wege:

Tabelle 1: Zwei Wege zur Gleichung $\epsilon = hf$

Aspekt	Einstein 1905	T0-Theorie
Ausgangspunkt	Entropie der Wienchen Strahlung	Zeitfeld-Bindung $T \cdot E = 1$
Methode	Thermodynamischer Vergleich	Geometrische Deduktion
Ergebnis	$\epsilon = hf$ (thermodynamisch erzwungen)	$\epsilon = hf$ (geometrisch emergiert)
Status von h	Freier Fit-Parameter	Emergiert aus $\xi = 4/30000$
Was offen bleibt	Warum dieser h -Wert?	h -Wert über $\xi \rightarrow \alpha \rightarrow h$ festgelegt

.6 T0-Perspektive II: Warum die UV-Divergenz verschwindet

Das klassische Dilemma nochmals

Die Ultraviolett-Katastrophe entsteht aus der Kombination von zwei Fakten:

1. Die Anzahl der Moden wächst wie f^2 — ohne obere Grenze.
2. Jede Mode erhält dieselbe mittlere Energie $k_B T$.

Plancks Lösung unterdrückt die Divergenz, indem sie die mittlere Energie bei hohen Frequenzen exponentiell abfallen lässt. Die fundamentalere Frage bleibt aber unbeantwortet: *Ist der Frequenzraum wirklich bis $f \rightarrow \infty$ physikalisch sinnvoll?*

Die implizite Annahme der klassischen Physik — und auch der Quantenfeldtheorie — ist: Ja. Der Frequenzraum ist unbegrenzt. Raumzeit ist kontinuierlich bis zu beliebig kleinen Skalen.

T0 ersetzt diese Annahme durch eine geometrische Mindeststruktur.

Die Sub-Planck-Skala in T0

Der geometrische Parameter ξ definiert eine fundamentale Minimalstruktur der Raumzeit unterhalb der Planck-Skala:

$$L_0 = \xi \cdot \ell_P = \frac{4}{30000} \cdot \ell_P \approx 1,333 \times 10^{-4} \cdot \ell_P \quad (23)$$

$$T_0 = \xi \cdot t_P = \frac{4}{30000} \cdot t_P \approx 1,333 \times 10^{-4} \cdot t_P \quad (24)$$

Dabei sind $\ell_P = \sqrt{\hbar G / c^3} \approx 1,616 \times 10^{-35}$ m und $t_P = \ell_P / c \approx 5,39 \times 10^{-44}$ s die gewöhnlichen Planck-Einheiten.

Die Skala L_0 ist die geometrisch kleinstmögliche Länge, auf der die Raumzeit noch wohldefinierte Freiheitsgrade trägt. Unterhalb von L_0 existiert keine Struktur mehr — nicht weil wir sie nicht messen können, sondern weil die Raumzeit selbst dort keine weiteren Freiheitsgrade besitzt.

Die maximale physikalische Frequenz

Wenn T_0 die kleinste physikalisch sinnvolle Zeitskala ist, dann gibt es eine maximale Frequenz:

$$f_{\max} = \frac{1}{T_0} = \frac{c}{L_0} = \frac{c}{\xi \cdot \ell_P} \quad (25)$$

Numerisch:

$$f_{\max} = \frac{c}{\xi \cdot \ell_P} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{1,333 \times 10^{-4} \cdot 1,616 \times 10^{-35} \text{ m}} \approx 1,39 \times 10^{47} \text{ Hz} \quad (26)$$

Zum Vergleich: Die Planck-Frequenz beträgt $f_P = 1/t_P \approx 1,85 \times 10^{43}$ Hz. Es gilt $f_{\max} = f_P / \xi \approx 1,85 \times 10^{43} / 1,333 \times 10^{-4} \approx 1,39 \times 10^{47}$ Hz — *größer* als die Planck-Frequenz, aber dennoch endlich. Der entscheidende Punkt: Es gibt eine endliche obere Schranke.

Das Integral konvergiert

In T0 ist das Frequenzintegral kein uneigentliches Integral mehr:

$$u_{T0} = \int_0^{f_{\max}} \rho(f, T) df < \infty \quad (27)$$

Die Divergenz aus (4) entfällt im T0-Rahmen nicht durch eine Rechenvorschrift, sondern weil die obere Grenze physikalisch aus L_0 folgt. Oberhalb von $f_{\max}$ gibt es schlicht keine Moden mehr — die Raumzeit trägt dort keine elektromagnetischen Freiheitsgrade.

Der Unterschied zu Plancks Lösung

Planck unterdrückt die Divergenz bei hohen Frequenzen durch einen abfallenden Boltzmann-Faktor: $\langle E \rangle \propto \exp(-hf/k_B T) \rightarrow 0$. Das Integral konvergiert, weil der Integrand exponentiell klein wird.

T0 behandelt die Divergenz anders: Es gibt keine Moden über $f_{\max}$ hinaus. Die obere Integrationsgrenze ist endlich, nicht unendlich. Im T0-Rahmen muss die Divergenz daher nicht unterdrückt werden — sie tritt physikalisch gar nicht erst auf.

Die klassische Voraussetzung aus T0-Sicht

Das klassische Rayleigh-Jeans-Integral divergiert, weil es von folgender physikalischer Voraussetzung ausgeht: Raumzeit ist ein kontinuierliches Medium, das unendlich viele Freiheitsgrade auf beliebig kleinen Skalen trägt.

T0 identifiziert diese Annahme als die eigentliche Ursache der Katastrophe:

$$\text{UV-Katastrophe} = \text{falsche Annahme: } L_{\min} = 0 \quad (28)$$

Im T0-Rahmen gilt stattdessen:

$$L_{\min} = L_0 = \xi \cdot \ell_P \neq 0 \quad (29)$$

Die Raumzeit ist auf der Skala L_0 *diskret* — nicht im Sinne eines Gittermodells, sondern im Sinne einer fraktalen geometrischen Struktur, die keine weiteren Freiheitsgrade unterhalb von L_0 enthält.

Fraktale Raumzeit und natürliche Regularisierung

Die T0-Raumzeit ist fraktal mit der Hausdorff-Dimension:

$$D_{\text{frak}} = 3 - \xi \approx 2,999867 \quad (30)$$

Diese leichte Abweichung von 3 wirkt sich auf die Modenzählung aus. In einer fraktalen Raumzeit wächst die Anzahl der Moden nicht exakt wie f^2 , sondern wie:

$$g_{T0}(f) df = \frac{8\pi f^2}{c^3} \cdot \left(\frac{f}{f_{\max}} \right)^{-\xi \cdot D_{\text{frak}}} df \quad (31)$$

Bei Frequenzen weit unterhalb von $f_{\max}$ ist dieser Korrekturfaktor ≈ 1 — die klassische Modendichte wird reproduziert. Nahe $f_{\max}$ sorgt der Faktor für eine zusätzliche Unterdrückung, die mit der geometrischen Grenze zusammenfällt. (Vermerk vom 30. Sept. 2026: Wegen $f/f_{\max} < 1$ und negativem Exponenten ist der Faktor $(f/f_{\max})^{-\xi D_{\text{frak}}}$ größer als 1 und fällt zu $f_{\max}$ hin auf genau 1: mit $f_{\max} = c/(\xi \ell_P) = 1,39 \times 10^{47}$ Hz ergeben sich 1,0358 bei

1 GHz, 1,0338 bei 100 GHz, 1,0300 bei 10^{15} Hz und 1,000 bei $f_{\max}$ – also eine Überhöhung um etwa 3 % im ganzen Laborbereich, keine Unterdrückung nahe $f_{\max}$. Über das CMB-Band (60–600 GHz) ändert sich der Faktor von 1,0341 auf 1,0331, eine Spektralverzerrung von etwa 10^{-3} , weit über der FIRAS-Grenze von etwa 5×10^{-5} .)

.7 Synthese: Was T0 leistet und was offen bleibt

Die vollständige Tabelle

Tabelle 2: Vergleich: Klassische Physik — Planck/Einstein — T0

Problem	Klassisch	Planck 1900	Einstein 1905	T0
UV-Divergenz	Divergiert	Unterdrückt (Quantisierung)	Nicht adressiert	Entfällt ($f_{\max}$)
Spektrum	Falsches Gesetz	Richtiges Gesetz	Bestätigt	$f_{\max}$ -Korrektur
Status von h	Kein h	Freier Parameter	Freier Parameter	Emergiert aus ξ
Warum $\epsilon = hf$?	Keine Antwort	Postulat	Thermodynamisch	Geometrisch ($T \cdot E = 1$)
Maximale Frequenz	Keine	Keine	Keine	$f_{\max} = c/(\xi \cdot \ell_p)$
Natur des Photons	Welle	Quantisiert	Quantisiert	Zeitfeldzustand
Freie Parameter	Viele	h frei	h frei	Nur ξ

Was T0 zusätzlich anbietet

Planck und Einstein haben das Spektralproblem gelöst: Planck durch Postulierung der Quantisierung, Einstein durch thermodynamischen Nachweis der Quantenstruktur. Offen blieb in ihren Arbeiten:

- Warum Energie in Quanten hf geteilt wird.
- Warum h genau diesen numerischen Wert hat.
- Was die physikalische Grenze des Frequenzraums ist.

T0 adressiert alle drei Fragen durch einen einzigen Mechanismus: die geometrische Struktur der Raumzeit auf der Sub-Planck-Skala $L_0 = \xi \cdot \ell_p$.

Testbare Vorhersagen

Die T0-Antworten führen auf konkrete, prinzipiell prüfbare Abweichungen:

1. **Plancksches Spektrum mit $f_{\max}$ -Schnitt:** Bei extrem hohen Energien sollte das Schwarzkörperspektrum einen harten Abschnitt bei $f_{\max} \approx 10^{47}$ Hz zeigen. Dies liegt weit jenseits aktueller Experimentalmöglichkeiten, ist aber prinzipiell testbar.
2. **Fraktale Korrekturen im g-2:** Der Korrekturfaktor $K_{\text{frak}}^{3/2}$ des T0-Zeitfeldes erscheint in der anomalen magnetischen Dipolmoment-Berechnung und reduziert die theoretische Abweichung vom Experiment auf 0,033%. (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher 0,014% – mit $k_{\text{geom}} = 2,22357$ ist $k_{\text{eff}} = 2,22357/(74/75)^{3/2} = 2,2688$ und $a_e = 2\pi^2/(7500 \cdot 2,2688) = 1,1600 \times 10^{-3}$, +0,033%; wie in Dok. 018/158 korrigiert.)
3. **Photoeffekt-Grenzkorrektur:** Bei sehr hohen Photonenfrequenzen sollte die Einstein-Gleichung (17) durch einen ξ -Korrekturfaktor modifiziert werden:

$$E_{\text{kin, max}}^{\text{T0}} = hf \left(1 - \xi \cdot \frac{f}{f_{\max}} \right) - \Phi \quad (32)$$

Methodologische Parallele

Einstein und T0 gehen methodisch ähnlich vor. Einstein lehnte es ab, ein mikroskopisches Modell des Lichts vorauszusetzen. Er folgte der Thermodynamik, wohin sie führte. Das Lichtquant war das Ergebnis, nicht die Annahme.

T0 verfährt ebenso. Es wird kein spezifisches Modell der Raumzeit-Diskretheit postuliert. Es wird gefragt: Was ergibt sich aus der geometrischen Bindungsbedingung $T \cdot m = 1$

und dem Parameter ξ ? Die maximale Frequenz, die emergente Planck-Konstante, und die Unterdrückung der UV-Divergenz sind die Ergebnisse — nicht die Annahmen.

Die vereinheitlichte Sicht

Die Ultraviolett-Katastrophe und das Planck-Einstein-Quantenproblem sind *dasselbe Problem auf zwei verschiedenen Ebenen*. Auf der Energie-Ebene: Warum gilt $\epsilon = hf$? Auf der Frequenz-Ebene: Warum gibt es eine obere Grenze? In T0 haben beide dieselbe Antwort: weil die Raumzeit auf der Skala $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ eine geometrisch definierte Grundstruktur besitzt, die weder h als freien Parameter noch den Frequenzraum als unbegrenzt zulässt.

.8 Zusammenfassung

Wir haben in diesem Dokument zwei historisch und physikalisch tiefe Probleme untersucht und dargelegt, wie die T0-Theorie beide auf einen einzigen geometrischen Mechanismus zurückführt.

Das erste Problem: die Ultraviolett-Katastrophe. Die klassische Theorie sagt unendliche Energiedichte voraus, weil sie stillschweigend annimmt, dass der Frequenzraum nach oben unbegrenzt ist. Planck unterdrückt die Divergenz durch Quantisierung — aber ohne physikalische Begründung der oberen Grenze. In T0 entfällt die Divergenz: Die Sub-Planck-Skala $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ setzt eine maximale Frequenz $f_{\max}$, oberhalb derer die Raumzeit keine elektromagnetischen Freiheitsgrade mehr trägt.

Das zweite Problem: der Ursprung von $\epsilon = hf$. Planck postulierte die Gleichung als Hilfsmittel. Einstein erzwang sie thermodynamisch. Aber beide ließen h als freien Parameter. T0 gibt einen Ursprung an: Die Zeitfeld-Bindungsbedingung $T \cdot E = 1$ legt für masselose Felder direkt $E = 1/T = f \cdot \hbar/(\xi)$ fest. Der Wert von h wird auf ξ zurückgeführt. *(Vermerk vom 30. Sept. 2026: Die Planck-Beziehung lautet $E = hf = 2\pi\hbar f$; $f\hbar/\xi = 7500 \hbar f$ ist um den Faktor $1/(2\pi\xi) = 1194$ zu groß. In dieser Form folgt h nicht aus ξ .)*

Die gemeinsame Ursache. Beide Probleme haben dieselbe Wurzel: Die klassische Physik behandelt die Raumzeit als kontinuierliches Medium ohne geometrische Mindeststruktur. T0 ersetzt diese Annahme durch eine Mindeststruktur auf der Skala L_0 — mit dem einen Parameter $\xi = 4/30000$ werden so beide hier behandelten Probleme aufgelöst.

Literaturverzeichnis

- [1] A. Einstein, Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt, *Annalen der Physik* **17**, 132–148 (1905).
- [2] M. Planck, Zur Theorie des Gesetzes der Energieverteilung im Normalspektrum, *Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft* **2**, 237–245 (1900).
- [3] R. A. Millikan, A direct photoelectric determination of Planck's h , *Physical Review* **7**, 355–388 (1916).
- [4] J. Pascher, Der geometrische Ursprungsparameter $\xi = 4/30000$, T0-Dokumentationsreihe, Dokument 009 (2025).
- [5] J. Pascher, T0-Theorie: Zeit-Masse-Dualität als fundamentales Prinzip, T0-Dokumentationsreihe, Dokument 003 (2025).
- [6] J. Pascher, Sub-Planck-Struktur und geometrische Regularisierung in T0, T0-Dokumentationsreihe, Dokument 145 (2025).
- [7] J. Pascher, Fraktale Korrekturen und die g-2-Anomalie (Rev. 12), T0-Dokumentationsreihe, Dokument 018 (2025).
- [8] J. Pascher, T0-Quantenmechanik: Geometrischer Formalismus und Optimierungsstrategien, T0-Dokumentationsreihe, Dokument 034 (2025).