

Lepton-Lebensdauer-Verhältnisse aus der T0-Torus-Geometrie

Johann Pascher

22. Februar 2026

Abstract

Die vorliegende Arbeit leitet das Lebensdauer-Verhältnis τ_μ/τ_τ aus der T0-Torus-Geometrie ab. Die starke Kopplungskonstante wird erstmals geometrisch als $\alpha_s(m_\tau) = D \cdot \xi^{1/4} = 0,3224$ abgeleitet ($-2,3\%$ vom Experiment). Zusammen mit dem fraktalen Korrekturfaktor $K_{\text{frak}} = 144/125$ und dem effektiven Farbfaktor $N_{c,\text{eff}} = 3 + \alpha_s/2$ ergibt sich eine Vorhersage mit **0,19% Abweichung** vom experimentellen Wert – vollständig aus T0-Parametern, ohne experimentelle Eingabe außer den Leptonmassen. Der geometrische Faktor K_{frak} absorbiert dabei implizit die elektroschwachen Korrekturen, CKM-Unitarität und höheren QCD-Ordnungen.

Schlüsselwörter: Lepton-Lebensdauer, Myon, Tau, Branching Ratio, Farbfaktor, starke Kopplungskonstante, fraktale Korrektur, T0-Theorie

1 Ausgangslage

Das Myon (μ) und das Tau-Lepton (τ) zerfallen über die schwache Wechselwirkung. Ihre Lebensdauern sind experimentell hochpräzise bekannt:

$$\tau_\mu = 2,1969 \times 10^{-6} \text{ s} \quad (1)$$

$$\tau_\tau = 2,903 \times 10^{-13} \text{ s} \quad (2)$$

Das Verhältnis beträgt:

$$\frac{\tau_\mu}{\tau_\tau} = 7.567.689 \quad (3)$$

Im Standardmodell wird dieses Verhältnis aus der Fermi-Theorie berechnet. Die Zerfallsbreite eines Leptons ℓ skaliert wie $\Gamma_\ell \propto G_F^2 m_\ell^5$, modifiziert durch Phasenraumkorrekturen und die Verzweigungsverhältnisse (Branching Ratios) der verschiedenen Zerfallskanäle. Die Rechnung ist exakt, erfordert aber zahlreiche experimentelle Eingabeparameter.

Ziel dieser Arbeit ist es, dasselbe Verhältnis aus T0-Parametern abzuleiten – mit minimalen Eingaben und maximaler geometrischer Motivation.

.2 Verhältnisbasierte Strategie

Grundformel

Die zentrale Gleichung lautet:

$$\frac{\tau_\mu}{\tau_\tau} = \left(\frac{m_\tau}{m_\mu} \right)^5 \cdot \frac{f_{\tau \rightarrow e}}{f_{\mu \rightarrow e}} \cdot \frac{1}{BR(\tau \rightarrow e \bar{\nu})} \quad (4)$$

wobei $f_{\tau \rightarrow e}$ und $f_{\mu \rightarrow e}$ die Phasenraumkorrekturen sind und $BR(\tau \rightarrow e \bar{\nu})$ das Verzweigungsverhältnis des elektronischen Tau-Zerfalls.

Die drei Komponenten

1. Massenverhältnis: Das experimentelle Massenverhältnis beträgt $m_\tau/m_\mu = 16,8171$. In T0 ergibt sich aus der Koide-Formel $m_\tau/m_\mu = (125/144) \cdot f^{1/3} = 16,9916$, was einer Abweichung von 1,04% entspricht. Da die fünfte Potenz diese Abweichung auf 5,3% verstärkt, verwenden wir die experimentellen Massen für vergleichbare Ergebnisse.

2. Phasenraumkorrekturen: Die Funktion

$$f(x) = 1 - 8x + 8x^3 - x^4 - 12x^2 \ln x, \quad x = \left(\frac{m_{\text{Tochter}}}{m_{\text{Mutter}}} \right)^2 \quad (5)$$

liefert:

$$f_{\mu \rightarrow e} = 0,999813 \quad (6)$$

$$f_{\tau \rightarrow e} = 0,999999 \quad (7)$$

$$f_{\tau \rightarrow \mu} = 0,972560 \quad (8)$$

3. Branching Ratio: Dies ist der Schlüssel – und hier kommt T0 ins Spiel.

.3 Branching Ratio aus der Torus-Geometrie

Zerfallskanäle des Tau-Leptons

Das Tau kann in drei Kanaltypen zerfallen:

- Elektronisch: $\tau \rightarrow e + \nu_\tau + \bar{\nu}_e$ (Rate Γ_e)
- Myonisch: $\tau \rightarrow \mu + \nu_\tau + \bar{\nu}_\mu$ (Rate Γ_μ)

- Hadronisch: $\tau \rightarrow \text{Hadronen} + \nu_\tau$ (Rate Γ_{had})

Das Verhältnis der hadronischen zur elektronischen Rate definiert R_{had} :

$$R_{\text{had}} = \frac{\Gamma_{\text{had}}}{\Gamma_e} \quad (9)$$

Damit wird das elektronische Verzweigungsverhältnis:

$$BR(\tau \rightarrow e) = \frac{1}{1 + \frac{f_{\tau \rightarrow \mu}}{f_{\tau \rightarrow e}} + R_{\text{had}}} \quad (10)$$

T0-Bestimmung von R_{had}

In T0 hat R_{had} zwei Faktoren:

Farbfaktor $N_{c,\text{eff}}$: Die drei Farbladungen der QCD entsprechen den $D = 3$ räumlichen Windungsdimensionen des Torus. Die starke Kopplungskonstante ergibt sich aus der T0-Geometrie (siehe Abschnitt .8):

$$\alpha_s(m_\tau) = D \cdot \xi^{1/(D+1)} = 3 \cdot \xi^{1/4} = 0,3224 \quad (11)$$

Damit wird der effektive Farbfaktor:

$$N_{c,\text{eff}} = 3 + \frac{\alpha_s(m_\tau)}{2} = 3 + \frac{0,3224}{2} = 3,1612 \quad (12)$$

Fraktaler Korrekturfaktor K_{frak} : Aus der Torus-Geometrie (Dokument 018) ergibt sich der Brückenfaktor:

$$K_{\text{frak}} = \frac{144}{125} = \left(\frac{6}{5}\right)^2 = 1,1520 \quad (13)$$

Dieser Faktor beschreibt die fraktale Korrektur der Windungsüberlappung auf dem Torus und tritt identisch in der Koide-Massenformel und der $g - 2$ -Brücke auf.

R_{had} aus T0

$$R_{\text{had}} = N_{c,\text{eff}} \cdot K_{\text{frak}} = \left(3 + \frac{D \cdot \xi^{1/4}}{2}\right) \cdot \frac{144}{125} = 3,642 \quad (14)$$

Experimentell: $R_{\text{had}}^{\text{exp}} = \Gamma_{\text{had}}/\Gamma_e = 3,636$. **Abweichung:** +0,16%.

.4 Ergebnis

Lebensdauer-Verhältnis

Einsetzen in Gl. (4) mit Gl. (10):

$$\frac{\tau_\mu}{\tau_\tau}\Big|_{T0} = \left(\frac{m_\tau}{m_\mu}\right)^5 \cdot \frac{f_{\tau \rightarrow e}}{f_{\mu \rightarrow e}} \cdot \left(1 + \frac{f_{\tau \rightarrow \mu}}{f_{\tau \rightarrow e}} + N_{c,\text{eff}} \cdot K_{\text{frak}}\right) \quad (15)$$

Numerisch:

$$\left(\frac{m_\tau}{m_\mu}\right)^5 = 16,8171^5 = 1.345.099 \quad (16)$$

$$\frac{f_{\tau \rightarrow e}}{f_{\mu \rightarrow e}} = \frac{0,999999}{0,999813} = 1,000186 \quad (17)$$

$$1 + \frac{f_{\tau \rightarrow \mu}}{f_{\tau \rightarrow e}} + R_{\text{had}} = 1 + 0,9726 + 3,642 = 5,614 \quad (18)$$

$$\frac{\tau_\mu}{\tau_\tau}\Big|_{T0} = 1.345.099 \times 1,000186 \times 5,614 = \mathbf{7.553.123} \quad (19)$$

Hauptergebnis

$$\frac{\tau_\mu}{\tau_\tau}\Big|_{T0} = 7.553.123 \quad \text{vs.} \quad \frac{\tau_\mu}{\tau_\tau}\Big|_{\text{exp}} = 7.567.689 \quad (20)$$

Abweichung: $-0,19\%$

Absolute Lebensdauer des Tau-Leptons

Mit τ_μ als Eingabe:

$$\tau_\tau\Big|_{T0} = \frac{\tau_\mu}{7.553.123} = 2,908 \times 10^{-13} \text{ s} \quad (21)$$

Experimentell: $\tau_\tau = 2,903 \times 10^{-13} \text{ s}$. Abweichung: $+0,17\%$.

Branching Ratios

Alle Vorhersagen stimmen auf besser als $0,4\%$ mit dem Experiment überein.

Größe	T0	Experiment	Abweichung
$\alpha_s(m_\tau)$	0,3224	0,330	−2,3%
τ_μ/τ_τ	7.553.123	7.567.689	−0,19%
τ_τ	$2,908 \times 10^{-13} \text{ s}$	$2,903 \times 10^{-13} \text{ s}$	+0,17%
$BR(\tau \rightarrow e)$	17,81%	17,82%	−0,05%
$BR(\tau \rightarrow \mu)$	17,32%	17,39%	−0,38%
$BR(\tau \rightarrow \text{had})$	64,87%	64,79%	+0,12%
R_{had}	3,642	3,636	+0,16%

Tabelle 1: Vergleich T0-Vorhersage mit experimentellen Werten. α_s aus T0-Geometrie.

.5 Systematische Suche nach optimalen Parametern

Um zu zeigen, dass die Wahl $K_{\text{frak}} = 144/125$ und $N_{\text{c,eff}} = 3 + \alpha_s/2$ nicht willkürlich ist, wurde ein systematischer Scan über alle physikalisch motivierten Kombinationen durchgeführt.

Kandidaten für K_{QCD}

Bezeichnung	Formel	Wert
Trivial	1	1,0000
SM perturbativ	$1 + \alpha_s/\pi$	1,1050
Fraktal (Koide)	144/125	1,1520
Fraktal $^{4/3}$	$(144/125)^{4/3}$	1,2076
Rational 17/14	17/14	1,2143
Rational 11/9	11/9	1,2222
Fraktal $^{3/2}$	$(144/125)^{3/2}$	1,2365

Tabelle 2: Kandidaten für den Korrekturfaktor K_{QCD}

Bezeichnung	Formel	Wert
Fraktal	$D_f = 3 - \xi$	2,9999
Ganzzahlig	3	3,0000
QCD: α_s/π	$3 + \alpha_s/\pi$	3,1050
QCD: $\alpha_s/2$	$3 + \alpha_s/2$	3,1650
QCD: NLO	$3 \cdot (1 + \alpha_s/\pi)$	3,3151

Tabelle 3: Kandidaten für den effektiven Farbfaktor

K_{QCD}	$N_{\text{c,eff}}$	R_{had}	Abweichung
144/125	$3 + \alpha_s/2$	3,646	−0,11%
17/14	3	3,643	−0,17%
$1 + \alpha_s/\pi$	$3(1 + \alpha_s/\pi)$	3,663	+0,19%
11/9	3	3,667	+0,25%
$(144/125)^{4/3}$	3	3,623	−0,53%
$(144/125)^{3/2}$	3	3,709	+1,01%
144/125	π	3,619	−0,59%
1	$3(1 + \alpha_s/\pi)$	3,315	−6,00%

Tabelle 4: Ergebnis des systematischen Scans. Die Kombination $K_{\text{frak}} = 144/125$ mit $N_{\text{c,eff}} = 3 + \alpha_s/2$ liefert die beste Übereinstimmung.

Kandidaten für $N_{\text{c,eff}}$

Ergebnis des Scans

Eindeutigkeit der Lösung

Die Kombination $K_{\text{frak}} = 144/125$ (Torus-Geometrie) und $N_{\text{c,eff}} = 3 + \alpha_s/2$ (Farbe + QCD-Korrektur) ist die einzige, die gleichzeitig drei Kriterien erfüllt: (1) Übereinstimmung besser als 0,2%, (2) beide Faktoren unabhängig physikalisch motiviert, (3) keine freien Parameter.

.6 Rückrechnung: Benötigter N_c für K_{frak}

Fixiert man $K_{\text{frak}} = 144/125$, so ergibt die Rückrechnung für exakte Übereinstimmung:

$$N_{c,\text{exact}} = \frac{R_{\text{had}}^{\text{exp}}}{K_{\text{frak}}} = \frac{3,6525}{1,152} = 3,1706 \quad (22)$$

Dies entspricht:

$$N_{c,\text{exact}} = 3 + 0,1706 = 3 + \alpha_s \cdot 0,517 \approx 3 + \frac{\alpha_s}{2} \quad (23)$$

Der Koeffizient $0,517 \approx 1/2$ ist kein Zufall – er entspricht dem führenden perturbativen Koeffizienten der hadronischen Tau-Zerfallsbreite in der QCD-Analyse.

.7 Interaktives Berechnungstool

Beschreibung

Zur Exploration des Parameterraums wurde ein interaktives HTML/JavaScript-Tool entwickelt: `T0_Lifetime_Explorer.html` (gespeichert unter `/2/html/`).

Das Tool bietet:

- **Schieberegler** für K_{QCD} (Bereich 0,8–1,5) und $N_{c,\text{eff}}$ (Bereich 2,5–4,0)
- **Preset-Buttons** für physikalisch motivierte Werte (K_{frak} , $K_{\text{frak}}^{3/2}$, $17/14$, $11/9$, $1 + \alpha_s/\pi$, D_f , $3 + \alpha_s/2$ etc.)
- **Echtzeit-Balkendiagramm** der Abweichungen (farbcodiert: grün $< 1\%$, gelb $< 3\%$, orange $< 10\%$, rot $> 10\%$)
- **Ergebnistabelle** mit τ_μ/τ_τ , τ_τ absolut, $BR(e)$, $BR(\mu)$, $BR(\text{had})$, R_{had}
- **Phasenraum-Korrekturen** ein/ausschaltbar
- **Info-Box** mit dem optimalen K_{QCD} für exakte Übereinstimmung bei gegebenem N_c

Standardeinstellung

Das Tool startet mit den optimalen T0-Werten:

$$K_{\text{QCD}} = K_{\text{frak}} = 144/125 = 1,1520 \quad (24)$$

$$N_{\text{c,eff}} = 3 + \alpha_s/2 = 3,165 \quad (25)$$

was direkt die Abweichung $-0,11\%$ zeigt.

.8 Die starke Kopplungskonstante aus der Torus-Geometrie

Herleitung

In T0 ergibt sich die elektromagnetische Kopplungskonstante als $\alpha_{\text{EM}} \propto \xi$, wobei der Exponent 1 der einen (elektromagnetischen) Ladungsdimension entspricht. Für die starke Kopplung, die über $D = 3$ Farbdimensionen im $(D + 1)$ -dimensionalen Raumzeit-Torus wirkt, ergibt sich die Verallgemeinerung:

$$\alpha_s(m_\tau) = D \cdot \xi^{1/(D+1)} = N_c \cdot \xi^{1/4} \quad (26)$$

Physikalische Motivation:

- **Vorfaktor** $D = 3$: Die räumliche Dimensionalität des Torus (drei spatiale Windungsrichtungen). In der SM-Korrespondenz entspricht dies dem Vorfaktor, der dort als N_c ($N_c = 3$ Farbladungen) erscheint.
- **Exponent** $1/(D + 1) = 1/4$: Die starke Kopplung wird über alle $D + 1 = 4$ Raumzeit-Dimensionen "verdünnt". Jede Dimension trägt den Faktor $\xi^{1/4}$ bei.

Numerisch:

$$\alpha_s(m_\tau) = 3 \cdot \left(\frac{4}{30000} \right)^{1/4} = 3 \times 0,10746 = 0,3224 \quad (27)$$

Vergleich mit dem Experiment

Der experimentelle Wert $\alpha_s(m_\tau) = 0,330 \pm 0,014$ hat eine Unsicherheit von etwa 4%. Die T0-Vorhersage 0,3224 weicht um $-2,3\%$ ab und liegt damit **innerhalb der experimentellen Unsicherheit** ($0,5\sigma$).

Alternative: $\pi \cdot \xi^{1/4}$

Ein alternativer Kandidat ist $\alpha_s = \pi \cdot \xi^{1/4} = 0,3376$ (+2,3%). Da $\pi \approx D$, liefern beide Formeln ähnliche Werte. Die Variante $D \cdot \xi^{1/4}$ wird bevorzugt, weil:

- $D = 3$ ist ganzzahlig und entspricht den drei Windungsdimensionen des Torus (SM-Korrespondenz: $N_c = 3$ -Vorfaktor)
- Die Einzelgrößen ($R_{\text{had}}, BR_e, BR_{\mu}, BR_{\text{had}}$) mit $D \cdot \xi^{1/4}$ konsistenter übereinstimmen
- $\pi \cdot \xi^{1/4}$ das Gesamtverhältnis durch Fehlerkompensation besser trifft, aber bei den Einzelgrößen größere Abweichungen zeigt

.9 Was K_{frak} absorbiert: Höhere Ordnungen

Im Standardmodell wird die hadronische Tau-Zerfallsrate durch eine perturbative Reihe beschrieben:

$$R_{\tau}^{\text{SM}} = N_c \cdot |V_{\text{CKM}}|^2 \cdot S_{\text{EW}} \cdot \left(1 + \frac{\alpha_s}{\pi} + 5,20 \left(\frac{\alpha_s}{\pi} \right)^2 + 26,4 \left(\frac{\alpha_s}{\pi} \right)^3 + \dots \right) \quad (28)$$

mit dem elektroschwachen Faktor $S_{\text{EW}} = 1,0194$ und den CKM-Matrixelementen $|V_{ud}|^2 + |V_{us}|^2 = 0,9980$.

In T0 lautet die kompakte Formel:

$$R_{\text{had}}^{\text{T0}} = \left(3 + \frac{\alpha_s}{2} \right) \cdot \frac{144}{125} \quad (29)$$

Der Vergleich zeigt, dass $K_{\text{frak}} = 144/125$ implizit absorbiert:

- Die elektroschwache Korrektur $S_{\text{EW}} = 1,0194$
- Die CKM-Unitarität $|V_{ud}|^2 + |V_{us}|^2 = 0,9980$
- Die höheren QCD-Ordnungen ($\alpha_s^2, \alpha_s^3, \alpha_s^4$)
- Nicht-perturbative Korrekturen

Der SM-Wert mit voller perturbativer Reihe ergibt $R_{\tau}^{\text{SM}} = 3,662$ (Abweichung +0,73%), während die einfache T0-Formel $R_{\text{had}} = 3,642$ liefert (Abweichung +0,16%). Die geometrische Kodierung in K_{frak} ist also **präziser** als die SM-Reihe in gleicher Ordnung.

Geometrische Absorption

Der Faktor $K_{\text{frak}} = 144/125$ aus der Torus-Geometrie kodiert die gesamte perturbative QCD-Reihe, die elektroschwachen Korrekturen und die CKM-Unitarität in einem einzigen geometrischen Verhältnis. Es sind keine separaten höheren Ordnungen nötig.

.10 Diskussion

Was T0 erklärt

Die Vorhersage enthält ausschließlich T0-Parameter und experimentelle Leptonmassen:

- $\alpha_s(m_\tau) = D \cdot \xi^{1/4} = 0,3224$: starke Kopplung aus Raumzeit-Geometrie
- $K_{\text{frak}} = 144/125$: identischer Faktor wie in Koide-Massenformel und $g - 2$ -Brücke
- $D = 3$: räumliche Windungsdimensionen des Torus (SM-Korrespondenz: $N_c = 3$)
- Experimentelle Leptonmassen (in T0 aus Koide ableitbar, hier für Präzision direkt verwendet)

Einordnung

Das Standardmodell berechnet dasselbe Verhältnis auf $-0,24\%$ Genauigkeit (mit experimentellen Branching Ratios und α_s). Die T0-Vorhersage mit $-0,19\%$ ist **vergleichbar genau**, leitet aber α_s und die QCD-Korrekturen geometrisch ab.

Verbleibende Eingaben

- Die Leptonmassen werden experimentell verwendet. Die Koide-Formel $(125/144) \cdot f^{1/3}$ liefert 1% Abweichung bei m_τ/m_μ , was sich auf 5,3% bei der fünften Potenz verstärkt.
- Eine vollständige T0-Vorhersage mit Koide-Massen ergibt τ_μ/τ_τ mit +5% Abweichung – konsistent mit dem Massenfehler, aber weniger präzise.

.11 Zusammenfassung

Zentrale Formel

$$\frac{\tau_\mu}{\tau_\tau} = \left(\frac{m_\tau}{m_\mu} \right)^5 \cdot \frac{f_{\tau e}}{f_{\mu e}} \cdot \left(1 + \frac{f_{\tau\mu}}{f_{\tau e}} + \underbrace{\left(3 + \frac{D \cdot \xi^{1/4}}{2} \right)}_{\text{Farbe + QCD}} \cdot \underbrace{\frac{144}{125}}_{\text{Torus-Geometrie}} \right) \quad (30)$$

Ergebnis: 7.553.123 vs. Experiment 7.567.689 (−0,19%)

Die starke Kopplungskonstante $\alpha_s(m_\tau) = D \cdot \xi^{1/4} = 0,3224$ folgt aus der Raumzeit-Geometrie des Torus ($D = 3$ Farben, $D + 1 = 4$ Dimensionen). Der fraktale Korrekturfaktor $K_{\text{frak}} = 144/125$ absorbiert die höheren QCD-Ordnungen, elektroschwachen Korrekturen und CKM-Unitarität in einem einzigen geometrischen Faktor. Das Lebensdauer-Verhältnis der Leptonen ist damit **vollständig aus T0-Parametern ableitbar** – auf 0,19% Genauigkeit.