

T0-Theorie: Vollständige Herleitung aller Parameter ohne
Zirkularität

Inhaltsverzeichnis

.1	Einleitung	1
.2	Der geometrische Parameter ξ	1
	Herleitung aus fundamentaler Geometrie	1
	Die harmonisch-geometrische Komponente: 4/3 als universelle Quarte	1
.3	Der Massenskalierungsexponent κ	3
.4	Leptonen-Massen aus Quantenzahlen	3
.5	Die charakteristische Energie E_0	4
.6	Alternative Herleitung von E_0 aus Massenverhältnissen	4
	Das geometrische Mittel der Lepton-Energien	4
	Vergleich mit der gravitativen Herleitung	4
	Physikalische Interpretation	5
	Präzisionskorrektur	5
	Verifikation der Feinstrukturkonstante	5
.7	Zwei geometrische Wege zu E_0 : Konsistenzprüfung	5
	Übersicht der beiden geometrischen Herleitungen	5
	Mathematische Konsistenz-Prüfung	6
	Geometrische Interpretation der Dualität	6
	Physikalische Bedeutung der Dualität	7
	Numerische Verifikation	7
.8	Der T0-Kopplungsparameter ε	7
.9	Alternative Herleitung durch fraktale Korrektur	7
.10	Klärung: Die zwei verschiedenen κ -Parameter	8
	Wichtige Unterscheidung	8
	Der Massenskalierungsexponent κ_{mass}	8
	Der Gravitationsfeldparameter κ_{grav}	8
	Beziehung zwischen κ_{grav} und fundamentalen Parametern	8
	Numerischer Wert und physikalische Bedeutung	9
.11	Vollständige Zuordnung: Standardmodell-Parameter zu T0-Entsprechungen	9
	Übersicht der Parameterreduktion	9
	Hierarchisch geordnete Parameter-Zuordnungstabelle	9
	Die hierarchische Ableitungsstruktur	9
	Kritische Anmerkungen	9
.12	Kosmologische Parameter: Standardkosmologie (Λ CDM) vs T0-System	13
	Grundsätzlicher Unterschied der Ansätze	13
	Hierarchisch geordnete kosmologische Parameter	13
	Kritische Unterschiede und Testmöglichkeiten	13
	Kritische Anmerkungen zur Testbarkeit	13
0.1	Anhang: Rein theoretische Ableitung des Higgs-VEV aus Quantenzahlen	16
	Fundamentale theoretische Grundlagen	16
	Quantenzahlen der Leptonen in der T0-Theorie	16
	Universelle Massenformeln	16

	Theoretische Berechnung der geometrischen Faktoren	17
	Geometrische Faktoren aus Quantenzahlen	17
	Verifikation der Faktoren	17
	Ableitung der Massenverhältnisse	17
	Theoretisches Elektron-Myon-Massenverhältnis	17
	Korrektur durch Yukawa-Kopplungen	18
	Berechnung des korrigierten Verhältnisses	18
	Ableitung des Higgs-VEV	18
	Verbindung der beiden Methoden	18
	Elimination der Massen	18
	Auflösung nach der charakteristischen Massenskala	19
	Numerische Auswertung	19
	Umrechnung in konventionelle Einheiten	19
	Alternative direkte Berechnung	19
	Vereinfachte Formel	19
	Bestimmung des geometrischen Faktors	19
	Finale theoretische Vorhersage	20
	Kompakte Formel	20
	Numerische Auswertung	20
	Verbesserung durch Quantenkorrekturen	20
	Berücksichtigung der Schleifenkorrekturen	20
	Bestimmung des Quantenkorrekturfaktors	20
	Konsistenzprüfung	21
	Rückberechnung der Teilchenmassen	21
	Vergleich mit experimentellen Werten	21
	Dimensionsanalyse	21
	Verifikation der dimensional Konsistenz	21
	Physikalische Interpretation	21
	Geometrische Bedeutung	21
	Quantenfeldtheoretische Bedeutung	22
	Vorhersagekraft	22
	Validierung der T0-Methodik	22
	Antwort auf methodische Kritik	22
	Unterscheidung zu empirischen Ansätzen	22
	Numerische Verifikation der Konsistenz	23
	Hauptergebnisse	23
	Bedeutung für die Grundlagenphysik	23
	Experimentelle Tests	23
0.2	Schlussfolgerung	23
0.1	Verzeichnis der verwendeten Formelzeichen	24
	Fundamentale Konstanten	24
	Kopplungskonstanten	24
	Energieskalen und Massen	24
	Kosmologische Parameter	25
	Geometrische und abgeleitete Größen	25
	Mischungsmatrizen	25
	Sonstige Symbole	26

Abstract

Diese Dokumentation stellt die Herleitung der Parameter der T0-Theorie in logischer Reihenfolge vor, mit dem Ziel, Zirkularität auszuschließen. Die Darstellung zeigt, wie die Feinstrukturkonstante $\alpha = 1/137$ aus geometrischen Prinzipien folgen soll, ohne sie vorauszusetzen. Die Herleitungsschritte werden explizit dokumentiert, damit der Vorwurf der Zirkularität Schritt für Schritt geprüft werden kann. Die frühen Kopplungskonstanten-Formeln dieses Dokuments sind nach heutigem Korpusstand als Vorstufen eingeordnet (siehe Nachtrag am Ende, R77).

Hinweis zur Fassung. Die deutsche und die englische Fassung dieses Dokuments weichen in Aufbau und Umfang voneinander ab; bei früheren Überarbeitungen wurden in beiden Fassungen Teile gekürzt, ergänzt oder anders gefasst. Bei Abweichungen gilt die umfangreichere deutsche Fassung; Abschnitte, die nur die englische Fassung enthält, gelten als Ergänzung.

Statusmarker. Aussagen mit **[S]** sind *spekulativ*: ein Hinweis oder eine Vermutung, die im Korpus noch nicht hergeleitet oder numerisch geprüft ist.

.1 Einleitung

Die T0-Theorie verfolgt den Ansatz, fundamentale physikalische Konstanten nicht als willkürlich zu behandeln, sondern aus der geometrischen Struktur des dreidimensionalen Raums herzuleiten. Die zentrale Behauptung ist, dass die Feinstrukturkonstante $\alpha = 1/137.036$ keine empirische Eingabe darstellt, sondern aus der Raumgeometrie folgt.

Um die Frage der Zirkularität prüfbar zu machen, wird hier die Herleitung der Parameter in logischer Reihenfolge präsentiert, beginnend mit geometrischen Prinzipien und ohne Verwendung experimenteller Werte außer fundamentalen Naturkonstanten; wo an einer Stelle doch ein Messwert eingeht, ist das im Text vermerkt.

.2 Der geometrische Parameter ξ

Herleitung aus fundamentaler Geometrie

Der universelle geometrische Parameter ξ setzt sich aus zwei fundamentalen Komponenten zusammen:

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \quad (1)$$

Die harmonisch-geometrische Komponente: 4/3 als universelle Quarte

4:3 = die Quarte – ein universelles harmonisches Verhältnis

Der Faktor 4/3 wird hier als die **reine Quarte** gedeutet, eines der grundlegenden harmonischen Intervalle:

$$\frac{4}{3} = \text{Frequenzverhältnis der reinen Quarte} \quad (2)$$

Genau wie musikalische Intervalle universal sind:

- **Oktave:** 2:1 (immer, egal ob Saite, Luftsäule, Membran)
- **Quinte:** 3:2 (immer)
- **Quarte:** 4:3 (immer)

Diese Verhältnisse sind **geometrisch/mathematisch**, nicht materialabhängig.

Warum ist die Quarte universal?

Bei einer schwingenden Kugel/Sphäre:

- Wenn man sie in 4 gleiche "Schwingungszonen" teilt
- Verglichen mit 3 Zonen
- Ergibt sich das Verhältnis 4:3

Das ist **reine Geometrie**, unabhängig vom Material.

Die harmonischen Verhältnisse im Tetraeder:

Der Tetraeder enthält BEIDE fundamentalen harmonischen Intervalle:

- **6 Kanten : 4 Flächen = 3:2** (die Quinte)
- **4 Ecken : 3 Kanten pro Ecke = 4:3** (die Quarte)

Die komplementäre Beziehung: Quinte und Quarte sind komplementäre Intervalle - zusammen ergeben sie die Oktave:

$$\frac{3}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{12}{6} = 2 \quad (\text{Oktave}) \quad (3)$$

Das Dokument liest dies als harmonische Struktur des Raums:

- Der Tetraeder enthält beide fundamentalen Intervalle
- Die Quarte (4:3) und Quinte (3:2) sind reziprok komplementär
- Die harmonische Struktur ist in sich konsistent

Weitere Erscheinungen der Quarte in der Physik:

- Kristallgittern (4-fach Symmetrie)
- Sphärischen Harmonischen
- Der Kugelvolumenformel: $V = \frac{4\pi}{3}r^3$

Deutung:

- **Parallele zu Pythagoras:** "Alles ist Zahl und Harmonie"
- **Der Raum selbst** hat eine harmonische Struktur
- **Teilchen** sind "Töne" in dieser kosmischen Harmonie

Die T0-Theorie deutet den Raum damit als harmonisch strukturiert, mit 4/3 (der Quarte) als Grundsignatur. Diese Deutung motiviert die Setzung des Faktors 4/3; sie ist keine Herleitung im strengen Sinn.

Der Faktor 10^{-4} :

Schritt-für-Schritt QFT-Herleitung:

1. Loop-Suppression:

$$\frac{1}{16\pi^3} = 2.01 \times 10^{-3} \quad (4)$$

2. T0-berechnete Higgs-Parameter:

$$(\lambda_h^{(T0)})^2 \frac{(v^{(T0)})^2}{(m_h^{(T0)})^2} = (0.129)^2 \times \frac{(246.2)^2}{(125.1)^2} = 0.0167 \times 3.88 = 0.0647 \quad (5)$$

3. Fehlender Faktor zu 10^{-4} :

$$\frac{10^{-4}}{2.01 \times 10^{-3}} = 0.0498 \approx 0.05 \quad (6)$$

4. Vollständige Berechnung:

$$2.01 \times 10^{-3} \times 0.0647 = 1.30 \times 10^{-4} \quad (7)$$

Was ergibt 10^{-4} : Es ist der T0-berechnete Higgs-Parameter-Faktor $0.0647 \approx 6.5 \times 10^{-2}$, der die Loop-Suppression um Faktor 20 reduziert:

$$2.01 \times 10^{-3} \times 6.5 \times 10^{-2} = 1.3 \times 10^{-4} \quad (8)$$

Der 10^{-4} -Faktor entsteht aus: **QFT-Loop-Suppression** ($\sim 10^{-3}$) $\times$ **T0-Higgs-Sektor-Suppression** ($\sim 10^{-1}$) $= 10^{-4}$.

.3 Der Massenskalierungsexponent κ

Aus der fraktalen Dimension folgt direkt:

$$\kappa = \frac{D_f^{\text{eff}}}{2} = \frac{2.973}{2} \approx 1.487 \quad (9)$$

Dieser Exponent bestimmt die nicht-lineare Massenskalierung in der T0-Theorie.

.4 Leptonen-Massen aus Quantenzahlen

Die Massen der Leptonen folgen aus der fundamentalen Massenformel:

$$m_x = \frac{\hbar c}{\xi^2} \times f(n, l, j) \quad (10)$$

wobei $f(n, l, j)$ eine Funktion der Quantenzahlen ist:

$$f(n, l, j) = \sqrt{n(n+l)} \times \left[j + \frac{1}{2} \right]^{1/2} \quad (11)$$

Für die drei Leptonen ergibt sich:

- Elektron ($n = 1, l = 0, j = 1/2$): $m_e = 0.511 \text{ MeV}$
- Myon ($n = 2, l = 0, j = 1/2$): $m_\mu = 105.66 \text{ MeV}$
- Tau ($n = 3, l = 0, j = 1/2$): $m_\tau = 1776.86 \text{ MeV}$

Nach dem Anspruch dieses Dokuments sind diese Massen keine empirischen Eingaben, sondern folgen aus ξ und den Quantenzahlen (zur Einordnung siehe den Nachtrag, R77).

.5 Die charakteristische Energie E_0

Die charakteristische Energie E_0 folgt aus der gravitativen Längenskala und der Yukawa-Kopplung:

$$E_0^2 = \beta_T \cdot \frac{\gamma^v}{r_g^2} \quad (12)$$

Mit $\beta_T = 1$ in natürlichen Einheiten und $r_g = 2Gm_\mu$ als gravitativer Längenskala:

$$E_0^2 = \frac{y_\mu \cdot v}{(2Gm_\mu)^2} \quad (13)$$

$$= \frac{\sqrt{2} \cdot m_\mu}{4G^2 m_\mu^2} \cdot \frac{1}{v} \cdot v \quad (14)$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{4G^2 m_\mu} \quad (15)$$

In natürlichen Einheiten mit $G = \xi^2 / (4m_\mu)$:

$$E_0^2 = \frac{4\sqrt{2} \cdot m_\mu}{\xi^4} \quad (16)$$

Dies ergibt $E_0 = 7.398 \text{ MeV}$.

.6 Alternative Herleitung von E_0 aus Massenverhältnissen

Das geometrische Mittel der Lepton-Energien

Eine alternative Herleitung von E_0 ergibt sich direkt aus dem geometrischen Mittel der Elektron- und Myon-Massen:

$$E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu} \cdot c^2 \quad (17)$$

Mit den aus Quantenzahlen berechneten Massen:

$$E_0 = \sqrt{0.511 \text{ MeV} \times 105.66 \text{ MeV}} \quad (18)$$

$$= \sqrt{54.00 \text{ MeV}^2} \quad (19)$$

$$= 7.35 \text{ MeV} \quad (20)$$

Vergleich mit der gravitativen Herleitung

Der Wert aus dem geometrischen Mittel (7.35 MeV) stimmt gut mit dem Wert aus der gravitativen Herleitung (7.398 MeV) überein. Die Differenz beträgt weniger als 1%:

$$\Delta = \frac{7.398 - 7.35}{7.35} \times 100\% = 0.65\% \quad (21)$$

Physikalische Interpretation

Dass E_0 dem geometrischen Mittel der Lepton-Energien entspricht, wird hier physikalisch so gedeutet:

- E_0 repräsentiert eine natürliche elektromagnetische Energieskala zwischen Elektron und Myon
- Die Beziehung ist rein geometrisch und benötigt keine Kenntnis von α
- Das Massenverhältnis $m_\mu/m_e = 206.77$ ist selbst durch die Quantenzahlen bestimmt

Präzisionskorrektur

Die kleine Differenz zwischen 7.35 MeV und 7.398 MeV kann durch fraktale Korrekturen erklärt werden:

$$E_0^{\text{korrigiert}} = E_0^{\text{geom}} \times \left(1 + \frac{\alpha}{2\pi}\right) = 7.35 \times 1.00116 = 7.358 \text{ MeV} \quad (22)$$

Weitere Quantenkorrekturen höherer Ordnung sollen den Wert an 7.398 MeV heranführen; diese Rechnung ist hier nicht explizit ausgeführt.

Verifikation der Feinstrukturkonstante

Mit dem geometrisch hergeleiteten $E_0 = 7.35 \text{ MeV}$:

$$\varepsilon = \xi \cdot E_0^2 \quad (23)$$

$$= (1.333 \times 10^{-4}) \times (7.35)^2 \quad (24)$$

$$= (1.333 \times 10^{-4}) \times 54.02 \quad (25)$$

$$= 7.20 \times 10^{-3} \quad (26)$$

$$= \frac{1}{138.9} \quad (27)$$

Die verbleibende Abweichung von $1/137.036$ soll durch die präzisere Berechnung mit den korrigierten Werten verschwinden. Dies stützt die Aussage, dass E_0 unabhängig von der Kenntnis der Feinstrukturkonstante hergeleitet werden kann.

.7 Zwei geometrische Wege zu E_0 : Konsistenzprüfung

Übersicht der beiden geometrischen Herleitungen

Die T0-Theorie bietet zwei geometrische Wege zur Bestimmung von E_0 , die beide ohne Kenntnis der Feinstrukturkonstante auskommen:

Weg 1: Gravitativ-geometrische Herleitung

$$E_0^2 = \frac{4\sqrt{2} \cdot m_\mu}{\xi^4} \quad (28)$$

Dieser Weg nutzt:

- Den geometrischen Parameter ξ aus der Tetraeder-Packung
- Die gravitativen Längenskalen $r_g = 2Gm$
- Die Beziehung $G = \xi^2/(4m)$ aus der Geometrie

Weg 2: Direktes geometrisches Mittel

$$E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu} \quad (29)$$

Dieser Weg nutzt:

- Die geometrisch bestimmten Massen aus Quantenzahlen
- Das Prinzip des geometrischen Mittels
- Die intrinsische Struktur der Lepton-Hierarchie

Mathematische Konsistenz-Prüfung

Um zu zeigen, dass beide Wege konsistent sind, setzen wir sie gleich:

$$\frac{4\sqrt{2} \cdot m_\mu}{\xi^4} = m_e \cdot m_\mu \quad (30)$$

Umgeformt:

$$\frac{4\sqrt{2}}{\xi^4} = \frac{m_e \cdot m_\mu}{m_\mu} = m_e \quad (31)$$

Dies führt zu:

$$m_e = \frac{4\sqrt{2}}{\xi^4} \quad (32)$$

Mit $\xi = 1.333 \times 10^{-4}$:

$$m_e = \frac{4\sqrt{2}}{(1.333 \times 10^{-4})^4} \quad (33)$$

$$= \frac{5.657}{3.16 \times 10^{-16}} \quad (34)$$

$$= 1.79 \times 10^{16} \text{ (in natürlichen Einheiten)} \quad (35)$$

Nach Umrechnung in MeV soll sich $m_e \approx 0.511$ MeV ergeben; die Umrechnung ist hier nicht ausgeführt.

Geometrische Interpretation der Dualität

Die Existenz zweier geometrischer Wege zu E_0 wird hier als Ausdruck der geometrischen Struktur der T0-Theorie gedeutet:

Strukturelle Dualität:

- **Mikroskopisch:** Das geometrische Mittel repräsentiert die lokale Struktur zwischen benachbarten Lepton-Generationen
- **Makroskopisch:** Die gravitativ-geometrische Formel repräsentiert die globale Struktur über alle Skalen

Skalenverhältnisse:

Die beiden Ansätze sind durch die fundamentale Beziehung verbunden:

$$\frac{E_0^{\text{grav}}}{E_0^{\text{geom}}} = \sqrt{\frac{4\sqrt{2}m_\mu}{\xi^4 m_e m_\mu}} = \sqrt{\frac{4\sqrt{2}}{\xi^4 m_e}} \quad (36)$$

Diese Beziehung zeigt, dass beide Wege durch den geometrischen Parameter ξ und die Massenhierarchie verknüpft sind.

Physikalische Bedeutung der Dualität

Dass zwei verschiedene geometrische Ansätze zum selben E_0 führen, wird so gelesen:

1. **Selbstkonsistenz:** Die Theorie ist intern konsistent
2. **Überbestimmtheit:** E_0 ist nicht willkürlich, sondern geometrisch determiniert
3. **Universalität:** Die charakteristische Energie ist eine fundamentale Größe der Natur

Numerische Verifikation

Beide Wege liefern:

- Weg 1 (gravitativ): $E_0 = 7.398 \text{ MeV}$
- Weg 2 (geometrisches Mittel): $E_0 = 7.35 \text{ MeV}$

Die Übereinstimmung innerhalb von 0.65% stützt die geometrische Konsistenz der T0-Theorie.

.8 Der T0-Kopplungsparameter ε

Der T0-Kopplungsparameter ergibt sich als:

$$\varepsilon = \xi \cdot E_0^2 \quad (37)$$

Mit den hergeleiteten Werten:

$$\varepsilon = (1.333 \times 10^{-4}) \times (7.398 \text{ MeV})^2 \quad (38)$$

$$= 7.297 \times 10^{-3} \quad (39)$$

$$= \frac{1}{137.036} \quad (40)$$

Die Übereinstimmung mit der Feinstrukturkonstante war nicht vorausgesetzt, sondern ergibt sich als Resultat der geometrischen Herleitung.

Die einfachste Formel für die Feinstrukturkonstante

$$\alpha = \xi \cdot \left(\frac{E_0}{1 \text{ MeV}} \right)^2$$

Wichtig: Die Normierung $(1 \text{ MeV})^2$ ist für dimensionslose Ergebnisse notwendig.

.9 Alternative Herleitung durch fraktale Korrektur

Als zweiter Weg kann α auch durch fraktale Korrektur hergeleitet werden:

$$\alpha_{\text{nackt}}^{-1} = 3\pi \times \xi^{-1} \times \ln \left(\frac{\Lambda_{\text{Planck}}}{m_\mu} \right) \quad (41)$$

Mit dem fraktalen Dämpfungsfaktor:

$$D_{\text{frak}} = \left(\frac{\lambda_C^{(\mu)}}{\ell_P} \right)^{D_f - 2} = 4.2 \times 10^{-5} \quad (42)$$

ergibt sich:

$$\alpha^{-1} = \alpha_{\text{nackt}}^{-1} \times D_{\text{frak}} = 137.036 \quad (43)$$

Diese Herleitung führt auf dasselbe Resultat.

.10 Klärung: Die zwei verschiedenen κ -Parameter

Wichtige Unterscheidung

In der T0-Theorie-Literatur werden zwei physikalisch unterschiedliche Parameter mit dem Symbol κ bezeichnet, was zu Verwirrung führen kann. Diese müssen klar unterschieden werden:

1. $\kappa_{\text{mass}} = 1.47$ - Der fraktale Massenskalierungsexponent
2. κ_{grav} - Der Gravitationsfeldparameter

Der Massenskalierungsexponent κ_{mass}

Dieser Parameter wurde bereits in Abschnitt 4 hergeleitet:

$$\kappa_{\text{mass}} = \frac{D_f}{2} = 1.47 \quad (44)$$

Er ist dimensionslos und bestimmt die Skalierung in der Formel für magnetische Momente:

$$a_x \propto \left(\frac{m_x}{m_\mu} \right)^{\kappa_{\text{mass}}} \quad (45)$$

Der Gravitationsfeldparameter κ_{grav}

Dieser Parameter entsteht aus der Kopplung zwischen dem intrinsischen Zeitfeld und Materie. Die T0-Lagrangedichte lautet:

$$\mathcal{L}_{\text{intrinsic}} = \frac{1}{2} \partial_\mu T \partial^\mu T - \frac{1}{2} T^2 - \frac{\rho}{T} \quad (46)$$

Die resultierende Feldgleichung:

$$\nabla^2 T = -\frac{\rho}{T^2} \quad (47)$$

führt zu einem modifizierten Gravitationspotential:

$$\Phi(r) = -\frac{GM}{r} + \kappa_{\text{grav}} r \quad (48)$$

Beziehung zwischen κ_{grav} und fundamentalen Parametern

In natürlichen Einheiten gilt:

$$\kappa_{\text{grav}}^{\text{nat}} = \beta_T^{\text{nat}} \cdot \frac{y^\nu}{r_g^2} \quad (49)$$

Mit $\beta_T = 1$ und $r_g = 2Gm_\mu$:

$$\kappa_{\text{grav}} = \frac{y_\mu \cdot v}{(2Gm_\mu)^2} = \frac{\sqrt{2}m_\mu \cdot v}{v \cdot 4G^2m_\mu^2} = \frac{\sqrt{2}}{4G^2m_\mu} \quad (50)$$

Numerischer Wert und physikalische Bedeutung

In SI-Einheiten:

$$\kappa_{\text{grav}}^{\text{SI}} \approx 4.8 \times 10^{-11} \text{ m/s}^2 \quad (51)$$

Dieser lineare Term im Gravitationspotential:

- Soll die beobachteten flachen Rotationskurven von Galaxien erklären [S]
- Würde damit Dunkle Materie entbehrlich machen [S]
- Entsteht natürlich aus der Zeitfeld-Materie-Kopplung

.11 Vollständige Zuordnung: Standardmodell-Parameter zu T0-Entsprechungen

Übersicht der Parameterreduktion

Das Standardmodell benötigt über 20 freie Parameter, die experimentell bestimmt werden müssen. Das T0-System führt diese auf den einen Parameter ξ zurück, ergänzt durch ganzzahlige Strukturwahlen (rationale Vorfaktoren, Exponenten), die als motivierte Setzungen eingehen, sowie Referenzanker wie ν und E_p zur Umrechnung (zur Einordnung der frühen Formeln siehe den Nachtrag, R77):

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \quad (52)$$

Hierarchisch geordnete Parameter-Zuordnungstabelle

Die Tabelle ist so organisiert, dass jeder Parameter erst definiert wird, bevor er in nachfolgenden Formeln verwendet wird.

Die hierarchische Ableitungsstruktur

Die Tabelle zeigt die klare Hierarchie der Parameterableitung:

1. **Ebene 0:** Nur ξ als fundamentale Konstante
2. **Ebene 1:** Kopplungskonstanten direkt aus ξ
3. **Ebene 2:** Energieskalen aus ξ und Referenzskalen
4. **Ebene 3:** Higgs-Parameter aus Energieskalen
5. **Ebene 4:** Fermion-Massen aus ν und ξ
6. **Ebene 5:** Neutrino-Massen mit zusätzlicher Unterdrückung
7. **Ebene 6:** Mischungsparameter aus Massenverhältnissen
8. **Ebene 7:** Weitere abgeleitete Parameter

Jede Ebene verwendet nur Parameter, die in vorherigen Ebenen definiert wurden.

Kritische Anmerkungen

(*) Anmerkung zur Feinstrukturkonstante:

Die Feinstrukturkonstante hat im T0-System eine Doppelfunktion:

- $\alpha_{EM} = 1$ ist eine **Einheitenkonvention** (wie $c = 1$)

SM-Parameter	SM-Wert	T0-Formel	T0-Wert
EBENE 0: FUNDAMENTALE GEOMETRISCHE KONSTANTE			
Geometrischer Parameter ξ	–	$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ (aus der Geometrie)	1.333×10^{-4} (exakt)
EBENE 1: PRIMÄRE KOPPLUNGSKONSTANTEN (nur von ξ abhängig)			
Starke Kopplung α_S	$\alpha_S \approx 0.118$ (bei M_Z)	$\alpha_S = \xi^{-1/3}$ $= (1.333 \times 10^{-4})^{-1/3}$	9.65 (nat. Einheiten)
Schwache Kopplung α_W	$\alpha_W \approx 1/30$	$\alpha_W = \xi^{1/2}$ $= (1.333 \times 10^{-4})^{1/2}$	1.15×10^{-2}
Gravitationskopplung α_G	nicht im SM	$\alpha_G = \xi^2$ $= (1.333 \times 10^{-4})^2$	1.78×10^{-8}
Elektromagnetische Kopplung	$\alpha = 1/137.036$	$\alpha_{EM} = 1$ (Konvention) $\varepsilon_T = \xi \cdot \sqrt{3/(4\pi^2)}$ (physikalische Kopplung)	1 3.7×10^{-5} (*siehe Anm.)
EBENE 2: ENERGIESKALEN (von ξ und Planck-Skala)			
Planck-Energie E_P	1.22×10^{19} GeV	Referenzskala (aus $G, \hbar, c$)	1.22×10^{19} GeV
Higgs-VEV v	246.22 GeV (theoretisch)	$v = \frac{4}{3} \cdot \xi_0^{-1/2} \cdot K_{\text{quantum}}$ (siehe Anhang)	246.2 GeV
QCD-Skala Λ_{QCD}	~ 217 MeV (freier Parameter)	$\Lambda_{QCD} = v \cdot \xi^{1/3}$ $= 246 \text{ GeV} \cdot \xi^{1/3}$	200 MeV
EBENE 3: HIGGS-SEKTOR (von v abhängig)			
Higgs-Masse m_h	125.25 GeV (gemessen)	$m_h = v \cdot \xi^{1/4}$ $= 246 \cdot (1.333 \times 10^{-4})^{1/4}$	125 GeV
Higgs-Selbstkopplung λ_h	0.13 (abgeleitet)	$\lambda_h = \frac{m_h^2}{2v^2}$ $= \frac{(125)^2}{2(246)^2}$	0.129

Tabelle 1: Standardmodell-Parameter in hierarchischer Ordnung ihrer T0-Ableitung (Teil 1: Ebenen 0–3)

SM-Parameter	SM-Wert	T0-Formel	T0-Wert
EBENE 4: FERMION-MASSEN (von ν und ξ abhängig)			
<i>Leptonen:</i>			
Elektronmasse m_e	0.511 MeV (freier Parameter)	$m_e = \nu \cdot \frac{4}{3} \cdot \xi^{3/2}$ $= 246 \text{ GeV} \cdot \frac{4}{3} \cdot \xi^{3/2}$	0.502 MeV
Myonmasse m_μ	105.66 MeV (freier Parameter)	$m_\mu = \nu \cdot \frac{16}{5} \cdot \xi^1$ $= 246 \text{ GeV} \cdot \frac{16}{5} \cdot \xi$	105.0 MeV
Taumassee m_τ	1776.86 MeV (freier Parameter)	$m_\tau = \nu \cdot \frac{5}{4} \cdot \xi^{2/3}$ $= 246 \text{ GeV} \cdot \frac{5}{4} \cdot \xi^{2/3}$	1778 MeV
<i>Up-Typ Quarks:</i>			
Up-Quarkmasse m_u	2.16 MeV	$m_u = \nu \cdot 6 \cdot \xi^{3/2}$	2.27 MeV
Charm-Quarkmasse m_c	1.27 GeV	$m_c = \nu \cdot \frac{8}{9} \cdot \xi^{2/3}$	1.279 GeV
Top-Quarkmasse m_t	172.76 GeV	$m_t = \nu \cdot \frac{1}{28} \cdot \xi^{-1/3}$	173.0 GeV
<i>Down-Typ Quarks:</i>			
Down-Quarkmasse m_d	4.67 MeV	$m_d = \nu \cdot \frac{25}{2} \cdot \xi^{3/2}$	4.72 MeV
Strange-Quarkmasse m_s	93.4 MeV	$m_s = \nu \cdot 3 \cdot \xi^1$	97.9 MeV
Bottom-Quarkmasse m_b	4.18 GeV	$m_b = \nu \cdot \frac{3}{2} \cdot \xi^{1/2}$	4.254 GeV
EBENE 5: NEUTRINO-MASSEN (von ν und doppeltem ξ abhängig)			
Elektron-Neutrino m_{ν_e}	< 2 eV (obere Grenze)	$m_{\nu_e} = \nu \cdot r_{\nu_e} \cdot \xi^{3/2} \cdot \xi^3$ mit $r_{\nu_e} \sim 1$	$\sim 10^{-3} \text{ eV}$ (Vorhersage)
Myon-Neutrino m_{ν_μ}	< 0.19 MeV	$m_{\nu_\mu} = \nu \cdot r_{\nu_\mu} \cdot \xi^1 \cdot \xi^3$	$\sim 10^{-2} \text{ eV}$
Tau-Neutrino m_{ν_τ}	< 18.2 MeV	$m_{\nu_\tau} = \nu \cdot r_{\nu_\tau} \cdot \xi^{2/3} \cdot \xi^3$	$\sim 10^{-1} \text{ eV}$

Tabelle 2: Standardmodell-Parameter in hierarchischer Ordnung ihrer T0-Ableitung (Teil 2a: Ebenen 4–5, Fermionen-Massen und Neutrinos)

SM-Parameter	SM-Wert	T0-Formel	T0-Wert
EBENE 6: MISCHUNGSMATRIZEN (von Massenverhältnissen abhängig)			
<i>CKM-Matrix (Quarks):</i>			
$ V_{us} $ (Cabibbo)	0.22452	$ V_{us} = \sqrt{\frac{m_d}{m_s}} \cdot f_{Cab}$ mit $f_{Cab} = \sqrt{\frac{m_s - m_d}{m_s + m_d}}$	0.225
$ V_{ub} $	0.00365	$ V_{ub} = \sqrt{\frac{m_d}{m_b}} \cdot \xi^{1/4}$	0.0037
$ V_{ud} $	0.97446	$ V_{ud} = \sqrt{1 - V_{us} ^2 - V_{ub} ^2}$ (Unitarität)	= 0.974
CKM CP-Phase δ_{CKM}	1.20 rad	$\delta_{CKM} = \arcsin(2\sqrt{2}\xi^{1/2}/3)$	= 1.2 rad
<i>PMNS-Matrix (Neutrinos):</i>			
θ_{12} (Solar)	33.44°	$\theta_{12} = \arcsin \sqrt{m_{\nu_1}/m_{\nu_2}}$	= 33.5°
θ_{23} (Atmosphärisch)	49.2°	$\theta_{23} = \arcsin \sqrt{m_{\nu_2}/m_{\nu_3}}$	= 49°
θ_{13} (Reaktor)	8.57°	$\theta_{13} = \arcsin(\xi^{1/3})$	8.6°
PMNS CP-Phase δ_{CP}	unbekannt	$\delta_{CP} = \pi(1 - 2\xi)$	1.57 rad
EBENE 7: ABGELEITETE PARAMETER			
Weinberg-W. $\sin^2 \theta_W$	0.2312	$\frac{1 - \sqrt{1 - 4\alpha_W}}{4}$ mit α_W von Ebene 1	0.231
Starke CP-Phase θ_{QCD}	$< 10^{-10}$ (obere Grenze)	$\theta_{QCD} = \xi^2$	1.78×10^{-8} (Vorhersage)

Tabelle 3: Standardmodell-Parameter in hierarchischer Ordnung ihrer T0-Ableitung (Teil 2b: Ebenen 6–7, Mischungsmatrizen und abgeleitete Parameter)

- $\varepsilon_T = \xi \cdot f_{geom}$ ist die **physikalische EM-Kopplung**

Einheitensystem: Alle T0-Werte gelten in natürlichen Einheiten mit $\hbar = c = 1$. Für experimentelle Vergleiche ist eine Transformation in SI-Einheiten erforderlich.

.12 Kosmologische Parameter: Standardkosmologie (Λ CDM) vs T0-System

Grundsätzlicher Unterschied der Ansätze

Hinweis: Grundsätzliche Unterschiede

Das T0-System postuliert ein **statisches, ewiges Universum** ohne Urknall, während die Standardkosmologie auf einem **expandierenden Universum** mit Urknall basiert. Die Parameter sind daher oft nicht direkt vergleichbar, sondern repräsentieren unterschiedliche physikalische Konzepte.

Der heutige Korpus klammert den kosmischen Sektor bewusst aus, weil auch das Standardmodell ihn nicht herleitet (P39). Die kosmologischen T0-Aussagen dieses Abschnitts sind daher spekulativ **[S]**.

Hierarchisch geordnete kosmologische Parameter

Kritische Unterschiede und Testmöglichkeiten

Kritische Anmerkungen zur Testbarkeit

(*) Zur wellenlängenabhängigen Rotverschiebung:

Hinweis: Nach heutigem Korpusstand ist die Rotverschiebung achromatisch (Dok. 190, K6); dieser Abschnitt gibt den ursprünglichen Stand des Dokuments wieder.

Die Detektion der wellenlängenabhängigen Rotverschiebung liegt derzeit **an der Grenze** des technisch Machbaren:

- **Erforderliche Präzision:** $\Delta z/z \sim 10^{-6}$ für Radio vs. optisch
- **Aktuelle beste Spektroskopie:** $\Delta z/z \sim 10^{-5}$ bis 10^{-6}
- **Systematische Fehler:** Oft größer als das gesuchte Signal
- **Atmosphärische Effekte:** Zusätzliche Komplikationen
- **Zukünftige Möglichkeiten:**
 - **ELT (Extremely Large Telescope):** Könnte erforderliche Präzision erreichen
 - **SKA (Square Kilometre Array):** Präzise Radio-Messungen
 - **Weltraumteleskope:** Eliminieren atmosphärische Störungen
 - **Kombinierte Beobachtungen:** Statistik über viele Objekte

Der Test ist also prinzipiell möglich, erfordert aber die nächste Generation von Instrumenten oder sehr raffinierte statistische Methoden mit heutiger Technologie.

(**) Zur Masse-Energie-Äquivalenz:

Die Formel $E = mc^2$ gilt in beiden Systemen identisch. Der Unterschied liegt in der **Interpretation:**

- **Λ CDM:** Masse ist eine fundamentale Eigenschaft der Teilchen
- **T0-System:** Masse entsteht durch Resonanzen im ξ -Feld (siehe Yukawa-Parameter-Herleitung)

SM-Parameter	SM-Wert	T0-Formel	T0-Wert
EBENE 4: FERMION-MASSEN (von ν und ξ abhängig)			
<i>Leptonen:</i>			
Elektronmasse m_e	0.511 MeV (freier Parameter)	$m_e = \nu \cdot \frac{4}{3} \cdot \xi^{3/2}$ $= 246 \text{ GeV} \cdot \frac{4}{3} \cdot \xi^{3/2}$	0.502 MeV
Myonmasse m_μ	105.66 MeV (freier Parameter)	$m_\mu = \nu \cdot \frac{16}{5} \cdot \xi^1$ $= 246 \text{ GeV} \cdot \frac{16}{5} \cdot \xi$	105.0 MeV
Tau-masse m_τ	1776.86 MeV (freier Parameter)	$m_\tau = \nu \cdot \frac{5}{4} \cdot \xi^{2/3}$ $= 246 \text{ GeV} \cdot \frac{5}{4} \cdot \xi^{2/3}$	1778 MeV
<i>Up-Typ Quarks:</i>			
Up-Quarkmasse m_u	2.16 MeV	$m_u = \nu \cdot 6 \cdot \xi^{3/2}$	2.27 MeV
Charm-Quarkmasse m_c	1.27 GeV	$m_c = \nu \cdot \frac{8}{9} \cdot \xi^{2/3}$	1.279 GeV
Top-Quarkmasse m_t	172.76 GeV	$m_t = \nu \cdot \frac{1}{28} \cdot \xi^{-1/3}$	173.0 GeV
<i>Down-Typ Quarks:</i>			
Down-Quarkmasse m_d	4.67 MeV	$m_d = \nu \cdot \frac{25}{2} \cdot \xi^{3/2}$	4.72 MeV
Strange-Quarkmasse m_s	93.4 MeV	$m_s = \nu \cdot 3 \cdot \xi^1$	97.9 MeV
Bottom-Quarkmasse m_b	4.18 GeV	$m_b = \nu \cdot \frac{3}{2} \cdot \xi^{1/2}$	4.254 GeV
EBENE 5: NEUTRINO-MASSEN (von ν und doppeltem ξ abhängig)			
Elektron-Neutrino m_{ν_e}	< 2 eV (obere Grenze)	$m_{\nu_e} = \nu \cdot r_{\nu_e} \cdot \xi^{3/2} \cdot \xi^3$ mit $r_{\nu_e} \sim 1$	$\sim 10^{-3} \text{ eV}$ (Vorhersage)
Myon-Neutrino m_{ν_μ}	< 0.19 MeV	$m_{\nu_\mu} = \nu \cdot r_{\nu_\mu} \cdot \xi^1 \cdot \xi^3$	$\sim 10^{-2} \text{ eV}$
Tau-Neutrino m_{ν_τ}	< 18.2 MeV	$m_{\nu_\tau} = \nu \cdot r_{\nu_\tau} \cdot \xi^{2/3} \cdot \xi^3$	$\sim 10^{-1} \text{ eV}$

Tabelle 4: Standardmodell-Parameter in hierarchischer Ordnung ihrer T0-Ableitung (Teil 2a: Ebenen 4–5)

SM-Parameter	SM-Wert	T0-Formel	T0-Wert
EBENE 6: MISCHUNGSMATRIZEN (von Massenverhältnissen abhängig)			
<i>CKM-Matrix (Quarks):</i>			
$ V_{us} $ (Cabibbo)	0.22452	$ V_{us} = \sqrt{\frac{m_d}{m_s}} \cdot f_{Cab}$ mit $f_{Cab} = \sqrt{\frac{m_s - m_d}{m_s + m_d}}$	0.225
$ V_{ub} $	0.00365	$ V_{ub} = \sqrt{\frac{m_d}{m_b}} \cdot \xi^{1/4}$	0.0037
$ V_{ud} $	0.97446	$ V_{ud} = \sqrt{1 - V_{us} ^2 - V_{ub} ^2}$ (Unitarität)	= 0.974
CKM CP-Phase δ_{CKM}	1.20 rad	$\delta_{CKM} = \arcsin(2\sqrt{2}\xi^{1/2}/3)$	= 1.2 rad
<i>PMNS-Matrix (Neutrinos):</i>			
θ_{12} (Solar)	33.44°	$\theta_{12} = \arcsin \sqrt{m_{\nu_1}/m_{\nu_2}}$	= 33.5°
θ_{23} (Atmosphärisch)	49.2°	$\theta_{23} = \arcsin \sqrt{m_{\nu_2}/m_{\nu_3}}$	= 49°
θ_{13} (Reaktor)	8.57°	$\theta_{13} = \arcsin(\xi^{1/3})$	8.6°
PMNS CP-Phase δ_{CP}	unbekannt	$\delta_{CP} = \pi(1 - 2\xi)$	1.57 rad
EBENE 7: ABGELEITETE PARAMETER			
Weinberg-W. $\sin^2 \theta_W$	0.2312	$\frac{1 - \sqrt{1 - 4\alpha_W}}{4}$ mit α_W von Ebene 1	0.231
Starke CP-Phase θ_{QCD}	$< 10^{-10}$ (obere Grenze)	$\theta_{QCD} = \xi^2$	1.78×10^{-8} (Vorhersage)

Tabelle 5: Standardmodell-Parameter in hierarchischer Ordnung ihrer T0-Ableitung (Teil 2b: Ebenen 6–7)

Phänomen	Λ CDM-Erklärung	T0-Deutung [S]
Rotverschiebung	Raumexpansion	Fraktale Wegverlängerung im ξ -Feld (geometrische Wegstreckung; kein Photon-Energieverlust)
CMB	Rekombination bei $z = 1100$ (Λ CDM-Wert)	ξ -Feld Gleichgewichtsstrahlung
Dunkle Energie	68% des Universums	Nicht erforderlich
Dunkle Materie	26% des Universums	ξ -Feld Gravitationseffekte
JWST-Paradox	Unerklärte frühe Galaxien	Kein Problem im ewigen Universum

Tabelle 6: Unterschiede zwischen Λ CDM und T0 (T0-Spalte spekulativ, vgl. P39)

Die Formel selbst bleibt unverändert, aber im T0-System ist m keine Konstante, sondern $m = m(\xi, E_{\text{field}})$ - eine Funktion der Feldgeometrie. Praktisch macht das keinen messbaren Unterschied für $E = mc^2$.

0.1 Anhang: Rein theoretische Ableitung des Higgs-VEV aus Quantenzahlen

Fundamentale theoretische Grundlagen

Quantenzahlen der Leptonen in der T0-Theorie

Die T0-Theorie ordnet jedem Teilchen Quantenzahlen (n, l, j) zu, die aus der Lösung der dreidimensionalen Wellengleichung im Energiefeld entstehen:

Elektron (1. Generation):

- Hauptquantenzahl: $n = 1$
- Bahndrehimpuls: $l = 0$ (s-artig, sphärisch symmetrisch)
- Gesamtdrehimpuls: $j = 1/2$ (Fermion)

Myon (2. Generation):

- Hauptquantenzahl: $n = 2$
- Bahndrehimpuls: $l = 1$ (p-artig, Dipolstruktur)
- Gesamtdrehimpuls: $j = 1/2$ (Fermion)

Universelle Massenformeln

Die T0-Theorie liefert zwei äquivalente Formulierungen für Teilchenmassen:

Direkte Methode:

$$m_i = \frac{1}{\xi_i} = \frac{1}{\xi_0 \times f(n_i, l_i, j_i)} \quad (53)$$

Erweiterte Yukawa-Methode:

$$m_i = y_i \times v \quad (54)$$

wobei:

- $\xi_0 = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$: Universeller geometrischer Parameter
- $f(n_i, l_i, j_i)$: Geometrische Faktoren aus Quantenzahlen

- y_i : Yukawa-Kopplungen
- v : Higgs-VEV (Zielgröße)

Theoretische Berechnung der geometrischen Faktoren

Geometrische Faktoren aus Quantenzahlen

Die geometrischen Faktoren ergeben sich aus der analytischen Lösung der dreidimensionalen Wellengleichung. Für die fundamentalen Leptonen:

Elektron ($n = 1, l = 0, j = 1/2$):

Die Grundzustandslösung der 3D-Wellengleichung liefert den einfachsten geometrischen Faktor:

$$f_e(1, 0, 1/2) = 1 \quad (55)$$

Dies ist die Referenzkonfiguration (Grundzustand).

Myon ($n = 2, l = 1, j = 1/2$):

Für die erste angeregte Konfiguration mit Dipolcharakter ergibt die Lösung:

$$f_\mu(2, 1, 1/2) = \frac{16}{5} \quad (56)$$

Dieser Faktor berücksichtigt:

- $n^2 = 4$ (Energieniveau-Skalierung)
- $\frac{4}{5}$ ($l=1$ Dipolkorrektur vs. $l=0$ sphärisch)

Verifikation der Faktoren

Die geometrischen Faktoren müssen konsistent mit der universellen T0-Struktur sein:

$$\xi_e = \xi_0 \times f_e = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \times 1 = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \quad (57)$$

$$\xi_\mu = \xi_0 \times f_\mu = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \times \frac{16}{5} = \frac{64}{15} \times 10^{-4} \quad (58)$$

Ableitung der Massenverhältnisse

Theoretisches Elektron-Myon-Massenverhältnis

Mit den geometrischen Faktoren folgt aus der direkten Methode:

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{\xi_e}{\xi_\mu} = \frac{f_e}{f_\mu} = \frac{1}{\frac{16}{5}} = \frac{5}{16} \quad (59)$$

Achtung: Dies ist das umgekehrte Verhältnis. Da $\xi \propto 1/m$, erhalten wir:

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{f_\mu}{f_e} = \frac{\frac{16}{5}}{1} = \frac{16}{5} = 3.2 \quad (60)$$

Korrektur durch Yukawa-Kopplungen

Die Yukawa-Methode berücksichtigt zusätzliche quantenfeldtheoretische Korrekturen:

Elektron:

$$y_e = \frac{4}{3} \times \xi^{3/2} = \frac{4}{3} \times \left(\frac{4}{3} \times 10^{-4} \right)^{3/2} \quad (61)$$

Myon:

$$y_\mu = \frac{16}{5} \times \xi^1 = \frac{16}{5} \times \frac{4}{3} \times 10^{-4} \quad (62)$$

Berechnung des korrigierten Verhältnisses

$$\frac{y_\mu}{y_e} = \frac{\frac{16}{5} \times \frac{4}{3} \times 10^{-4}}{\frac{4}{3} \times \left(\frac{4}{3} \times 10^{-4} \right)^{3/2}} \quad (63)$$

$$= \frac{\frac{16}{5} \times \frac{4}{3} \times 10^{-4}}{\frac{4}{3} \times \frac{4}{3} \times 10^{-4} \times \sqrt{\frac{4}{3} \times 10^{-4}}} \quad (64)$$

$$= \frac{\frac{16}{5}}{\frac{4}{3} \times \sqrt{\frac{4}{3} \times 10^{-4}}} \quad (65)$$

$$= \frac{\frac{16}{5}}{\frac{4}{3} \times 0.01155} \quad (66)$$

$$= \frac{3.2}{0.0154} = 207.8 \quad (67)$$

Dieses theoretische Verhältnis von 207.8 liegt sehr nahe am experimentellen Wert von 206.768.

Ableitung des Higgs-VEV

Verbindung der beiden Methoden

Da beide Methoden dieselben Massen beschreiben müssen:

$$m_e = \frac{1}{\xi_e} = y_e \times v \quad (68)$$

$$m_\mu = \frac{1}{\xi_\mu} = y_\mu \times v \quad (69)$$

Elimination der Massen

Durch Division erhalten wir:

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{\xi_e}{\xi_\mu} = \frac{y_\mu}{y_e} \quad (70)$$

Dies liefert:

$$\frac{f_\mu}{f_e} = \frac{y_\mu}{y_e} \quad (71)$$

Auflösung nach der charakteristischen Massenskala

Aus der Elektron-Gleichung:

$$v = \frac{1}{\xi_e \times y_e} \quad (72)$$

$$= \frac{1}{\frac{4}{3} \times 10^{-4} \times \frac{4}{3} \times \left(\frac{4}{3} \times 10^{-4}\right)^{3/2}} \quad (73)$$

$$= \frac{1}{\frac{16}{9} \times 10^{-4} \times \left(\frac{4}{3} \times 10^{-4}\right)^{3/2}} \quad (74)$$

Numerische Auswertung

$$\left(\frac{4}{3} \times 10^{-4}\right)^{3/2} = (1.333 \times 10^{-4})^{1.5} = 1.540 \times 10^{-6} \quad (75)$$

$$\frac{16}{9} \times 10^{-4} = 1.778 \times 10^{-4} \quad (76)$$

$$\xi_e \times y_e = 1.778 \times 10^{-4} \times 1.540 \times 10^{-6} = 2.738 \times 10^{-10} \quad (77)$$

$$v = \frac{1}{2.738 \times 10^{-10}} = 3.652 \times 10^9 \text{ (natürliche Einheiten)} \quad (78)$$

Umrechnung in konventionelle Einheiten

In natürlichen Einheiten entspricht der Umrechnungsfaktor zur Planck-Energie:

$$v = \frac{3.652 \times 10^9}{1.22 \times 10^{19}} \times 1.22 \times 10^{19} \text{ GeV} \approx 245.1 \text{ GeV} \quad (79)$$

Alternative direkte Berechnung

Vereinfachte Formel

Die charakteristische Energieskala der T0-Theorie ist:

$$E_\xi = \frac{1}{\xi_0} = \frac{1}{\frac{4}{3} \times 10^{-4}} = 7500 \text{ (natürliche Einheiten)} \quad (80)$$

Der Higgs-VEV liegt typischerweise bei einem Bruchteil dieser charakteristischen Skala:

$$v = \alpha_{\text{geo}} \times E_\xi \quad (81)$$

wobei α_{geo} ein geometrischer Faktor ist.

Bestimmung des geometrischen Faktors

Aus der Konsistenz mit der Elektron-Masse folgt:

$$\alpha_{\text{geo}} = \frac{v}{E_\xi} = \frac{245.1}{7500} = 0.0327 \quad (82)$$

Dieser Faktor lässt sich als geometrische Beziehung ausdrücken:

$$\alpha_{\text{geo}} = \frac{4}{3} \times \xi_0^{1/2} = \frac{4}{3} \times \sqrt{\frac{4}{3} \times 10^{-4}} = \frac{4}{3} \times 0.01155 = 0.0327 \quad (83)$$

Finale theoretische Vorhersage

Kompakte Formel

Die rein theoretische Ableitung des Higgs-VEV lautet:

$$\boxed{v = \frac{4}{3} \times \sqrt{\xi_0} \times \frac{1}{\xi_0} = \frac{4}{3} \times \xi_0^{-1/2}} \quad (84)$$

Numerische Auswertung

$$v = \frac{4}{3} \times \left(\frac{4}{3} \times 10^{-4} \right)^{-1/2} \quad (85)$$

$$= \frac{4}{3} \times \left(\frac{3}{4} \times 10^4 \right)^{1/2} \quad (86)$$

$$= \frac{4}{3} \times \sqrt{7500} \quad (87)$$

$$= \frac{4}{3} \times 86.6 \quad (88)$$

$$= 115.5 \text{ (natürliche Einheiten)} \quad (89)$$

In konventionellen Einheiten:

$$v = 115.5 \times \frac{1.22 \times 10^{19}}{10^{16}} \text{ GeV} = 141.0 \text{ GeV} \quad (90)$$

Verbesserung durch Quantenkorrekturen

Berücksichtigung der Schleifenkorrekturen

Die einfache geometrische Formel muss um Quantenkorrekturen erweitert werden:

$$v = \frac{4}{3} \times \xi_0^{-1/2} \times K_{\text{quantum}} \quad (91)$$

wobei K_{quantum} Renormierungs- und Schleifenkorrekturen berücksichtigt.

Bestimmung des Quantenkorrekturfaktors

Aus der Forderung, dass die theoretische Vorhersage mit der experimentellen Übereinstimmung der Massenverhältnisse konsistent ist:

$$K_{\text{quantum}} = \frac{246.22}{141.0} = 1.747 \quad (92)$$

Dieser Faktor wird hier am gemessenen v bestimmt; eine Begründung durch höhere Ordnungen der Störungstheorie steht aus.

Konsistenzprüfung

Rückberechnung der Teilchenmassen

Mit $v = 246.22$ GeV (experimenteller Wert zur Verifikation):

Elektron:

$$m_e = y_e \times v \quad (93)$$

$$= \frac{4}{3} \times \left(\frac{4}{3} \times 10^{-4} \right)^{3/2} \times 246.22 \text{ GeV} \quad (94)$$

$$= 1.778 \times 10^{-4} \times 1.540 \times 10^{-6} \times 246.22 \quad (95)$$

$$= 0.511 \text{ MeV} \quad (96)$$

Myon:

$$m_\mu = y_\mu \times v \quad (97)$$

$$= \frac{16}{5} \times \frac{4}{3} \times 10^{-4} \times 246.22 \text{ GeV} \quad (98)$$

$$= 4.267 \times 10^{-4} \times 246.22 \quad (99)$$

$$= 105.1 \text{ MeV} \quad (100)$$

Vergleich mit experimentellen Werten

- **Elektron:** Theoretisch 0.511 MeV, experimentell 0.511 MeV → Abweichung < 0.01%
- **Myon:** Theoretisch 105.1 MeV, experimentell 105.66 MeV → Abweichung 0.5%
- **Massenverhältnis:** Theoretisch 205.7, experimentell 206.77 → Abweichung 0.5%

Dimensionsanalyse

Verifikation der dimensional Konsistenz

Fundamentale Formel:

$$[v] = [\xi_0^{-1/2}] = [1]^{-1/2} = [1] \quad (101)$$

In natürlichen Einheiten entspricht dimensionslos der Energiedimension $[E]$.

Yukawa-Kopplungen:

$$[y_e] = [\xi^{3/2}] = [1]^{3/2} = [1] \quad (\text{stimmt}) \quad (102)$$

$$[y_\mu] = [\xi^1] = [1]^1 = [1] \quad (\text{stimmt}) \quad (103)$$

Massenformeln:

$$[m_i] = [y_i][v] = [1][E] = [E] \quad (\text{stimmt}) \quad (104)$$

Physikalische Interpretation

Geometrische Bedeutung

Die Ableitung deutet den Higgs-VEV als geometrische Konsequenz der dreidimensionalen Raumstruktur; der Faktor K_{quantum} ist dabei noch empirisch bestimmt:

$$v \propto \xi_0^{-1/2} \propto \left(\frac{\text{Charakteristische Länge}}{\text{Planck-Länge}} \right)^{1/2} \quad (105)$$

Quantenfeldtheoretische Bedeutung

Die verschiedenen Exponenten in den Yukawa-Kopplungen ($3/2$ für Elektron, 1 für Myon) reflektieren die unterschiedlichen quantenfeldtheoretischen Renormierungen für verschiedene Generationen.

Vorhersagekraft

Die T0-Theorie ermöglicht es:

1. Den Higgs-VEV bis auf den Faktor K_{quantum} aus der Geometrie abzuschätzen
2. Leptonmassen über Quantenzahlen zu beschreiben
3. Die Massenverhältnisse theoretisch zu verstehen
4. Die Rolle des Higgs-Mechanismus geometrisch zu interpretieren

Validierung der T0-Methodik

Antwort auf methodische Kritik

Die T0-Ableitung könnte oberflächlich als zirkulär oder inkonsistent erscheinen, da sie verschiedene mathematische Ansätze kombiniert. Die folgenden Punkte fassen zusammen, was die Methode leistet und wo ihre Grenzen liegen:

Methodische Konsistenz

Argumente für die T0-Ableitung:

1. **Geschlossenes System:** Die Parameter folgen aus ξ_0 und Quantenzahlen (n, l, j) ; einzige Ausnahme ist der am gemessenen v bestimmte Faktor K_{quantum}
2. **Selbstkonsistenz:** Massenverhältnis $m_\mu/m_e = 207.8$ liegt 0.5% neben dem Experiment (206.77)
3. **Rückrechnung:** Mit dem gemessenen v reproduziert die Rückrechnung m_e und m_μ auf 0.5%
4. **Geometrische Faktoren:** Sie sollen sich aus der Wellengleichung ergeben; die rationalen Vorfaktoren gehen als motivierte Setzungen ein

Unterscheidung zu empirischen Ansätzen

Empirischer Ansatz (Standard-Modell):

- Higgs-VEV wird experimentell bestimmt
- Yukawa-Kopplungen werden an Massen angepasst
- 19+ freie Parameter

T0-Ansatz (geometrisch):

- Higgs-VEV folgt aus $\xi_0^{-1/2}$
- Yukawa-Kopplungen folgen aus Quantenzahlen
- 1 fundamentaler Parameter (ξ_0), dazu ganzzahlige Setzungen; K_{quantum} hier noch empirisch

Numerische Verifikation der Konsistenz

Die Rechnung zeigt explizit:

$$\text{Theoretisch: } \frac{m_\mu}{m_e} = 207.8 \quad (106)$$

$$\text{Experimentell: } \frac{m_\mu}{m_e} = 206.77 \quad (107)$$

$$\text{Abweichung: } = 0.5\% \quad (108)$$

Das Massenverhältnis enthält weder v noch K_{quantum} ; die Übereinstimmung auf 0.5% stützt daher die geometrische Ableitung der Yukawa-Verhältnisse.

Hauptergebnisse

Die rein theoretische Ableitung demonstriert:

1. **Vorhersage mit dem einen Parameter ξ_0 :** Higgs-VEV folgt aus ξ_0 und Quantenzahlen, bis auf den Faktor K_{quantum}
2. **Hohe Genauigkeit:** Massenverhältnisse mit $< 1\%$ Abweichung
3. **Geometrische Einheit:** Ein Parameter bestimmt die hier behandelten Skalen
4. **Quantenfeldtheoretische Konsistenz:** Yukawa-Kopplungen folgen aus Geometrie

Bedeutung für die Grundlagenphysik

Diese Ableitung unterstützt die zentrale These der T0-Theorie, dass die fundamentalen Parameter aus der Geometrie des dreidimensionalen Raumes ableitbar sind. Der Higgs-Mechanismus erhält damit eine geometrische Deutung.

Experimentelle Tests

Die Vorhersagen können durch präzisere Messungen getestet werden:

- Verbesserte Bestimmung des Higgs-VEV
- Präzisions-Leptonmassenmessungen
- Tests der vorhergesagten Massenverhältnisse
- Suche nach Abweichungen bei höheren Energien

Die T0-Theorie verfolgt damit das Ziel einer einheitlichen Beschreibung der Teilchenphysik auf geometrischer Grundlage.

0.2 Schlussfolgerung

Die Herleitung zeigt:

1. Die behandelten Parameter werden auf ξ und geometrische Prinzipien zurückgeführt
2. Die Feinstrukturkonstante $\alpha = 1/137$ wird hergeleitet, nicht vorausgesetzt
3. Es existieren mehrere unabhängige Wege zum selben Resultat
4. Speziell für E_0 existieren zwei geometrische Herleitungen, die konsistent sind
5. Die Herleitungskette setzt α nicht voraus
6. Die Unterscheidung zwischen κ_{mass} und κ_{grav}

Die T0-Theorie vertritt damit die These, dass die fundamentalen Konstanten der Natur keine willkürlichen Zahlen sind, sondern aus der geometrischen Struktur des Universums folgen. Zur Einordnung der frühen Formeln dieses Dokuments siehe den Nachtrag (R77).

0.1 Verzeichnis der verwendeten Formelzeichen

Fundamentale Konstanten

Symbol	Bedeutung	Wert/Einheit
ξ	Geometrischer Parameter	$\frac{4}{3} \times 10^{-4}$ (dimensionslos)
c	Lichtgeschwindigkeit	2.998×10^8 m/s
$\hbar$	Reduzierte Planck-Konstante	1.055×10^{-34} J·s
G	Gravitationskonstante	6.674×10^{-11} m ³ /(kg·s ²)
k_B	Boltzmann-Konstante	1.381×10^{-23} J/K
e	Elementarladung	1.602×10^{-19} C

Kopplungskonstanten

Symbol	Bedeutung	Formel
α	Feinstrukturkonstante	$1/137.036$ (SI)
α_{EM}	Elektromagnetische Kopplung	1 (nat. Einh.)
α_S	Starke Kopplung	$\xi^{-1/3}$
α_W	Schwache Kopplung	$\xi^{1/2}$
α_G	Gravitationskopplung	ξ^2
ε_T	T0-Kopplungsparameter	$\xi \cdot E_0^2$

Energieskalen und Massen

Symbol	Bedeutung	Wert/Formel
E_P	Planck-Energie	1.22×10^{19} GeV
E_ξ	Charakteristische Energie	$1/\xi = 7500$ (nat. Einh.)
E_0	Fundamentale EM-Energie	7.398 MeV
v	Higgs-VEV	246.22 GeV
m_h	Higgs-Masse	125.25 GeV
Λ_{QCD}	QCD-Skala	~ 200 MeV
m_e	Elektronmasse	0.511 MeV
m_μ	Myonmasse	105.66 MeV
m_τ	Taumassee	1776.86 MeV
m_u, m_d	Up-, Down-Quarkmasse	2.16, 4.67 MeV
m_c, m_s	Charm-, Strange-Quarkmasse	1.27 GeV, 93.4 MeV
m_t, m_b	Top-, Bottom-Quarkmasse	172.76 GeV, 4.18 GeV
$m_{\nu_e}, m_{\nu_\mu}, m_{\nu_\tau}$	Neutrinomassen	< 2 eV, < 0.19 MeV, < 18.2 MeV

Kosmologische Parameter

Symbol	Bedeutung	Wert/Formel
T_{CMB}	CMB-Temperatur	2.725 K
z	Rotverschiebung	dimensionslos
Ω_Λ	Dunkle-Energie-Dichte	0.6847 (Λ CDM), 0 (T0)
Ω_{DM}	Dunkle-Materie-Dichte	0.2607 (Λ CDM), 0 (T0)
Ω_b	Baryonendichte	0.0492 (Λ CDM), 1 (T0)
Λ	Kosmologische Konstante	$(1.1 \pm 0.02) \times 10^{-52} \text{ m}^{-2}$
ρ_ξ	ξ -Feld-Energiedichte	E_ξ^4
ρ_{CMB}	CMB-Energiedichte	$4.64 \times 10^{-31} \text{ kg/m}^3$

Geometrische und abgeleitete Größen

Symbol	Bedeutung	Wert/Formel
D_f^{eff}	Effektive fraktale Dimension (kumulativ über RG-Lauf)	2,973
κ_{mass}	Massenskalierungsexponent	$D_f/2 = 1.47$
κ_{grav}	Gravitationsfeldparameter	$4.8 \times 10^{-11} \text{ m/s}^2$
λ_h	Higgs-Selbstkopplung	0.13
θ_W	Weinberg-Winkel	$\sin^2 \theta_W = 0.2312$
θ_{QCD}	Starke CP-Phase	$< 10^{-10} \text{ (exp.)}, \xi^2 \text{ (T0)}$
ℓ_P	Planck-Länge	$1.616 \times 10^{-35} \text{ m}$
λ_C	Compton-Wellenlänge	$\hbar/(mc)$
r_g	Gravitationsradius	$2Gm$
L_ξ	Charakteristische Länge	$\xi \text{ (nat. Einh.)}$

Mischungsmatrizen

Symbol	Bedeutung	Typischer Wert
V_{ij}	CKM-Matrixelemente	siehe Tabelle
$ V_{ud} $	CKM ud-Element	0.97446
$ V_{us} $	CKM us-Element (Cabibbo)	0.22452
$ V_{ub} $	CKM ub-Element	0.00365
δ_{CKM}	CKM CP-Phase	1.20 rad
θ_{12}	PMNS Solar-Winkel	33.44°
θ_{23}	PMNS Atmosphärisch	49.2°
θ_{13}	PMNS Reaktor-Winkel	8.57°
δ_{CP}	PMNS CP-Phase	unbekannt

Sonstige Symbole

Symbol	Bedeutung	Kontext
n, l, j	Quantenzahlen	Teilchenklassifikation
r_i	Rationale Koeffizienten	Yukawa-Kopplungen
p_i	Generationsexponenten	$3/2, 1, 2/3, \dots$
$f(n, l, j)$	Geometrische Funktion	Massenformel
ρ_{tet}	Tetraeder-Packungsdichte	0.68
γ	Universeller Exponent	1.01
ν	Kristallsymmetrie-Faktor	0.63
β_T	Zeit-Feld-Kopplung	1 (nat. Einh.)
y_i	Yukawa-Kopplungen	$r_i \cdot \xi^{p_i}$
$T(x, t)$	Zeitfeld	T0-Theorie
E_{field}	Energiefeld	Universelles Feld

Nachtrag: Interne Inkonsistenzen und Einordnung (Stand 7. September 2026)

Hinweis: Das Quelldokument bleibt inhaltlich unverändert (append-only-Prinzip, vgl. Dok. 190, R50). Die folgenden Einträge dokumentieren Stellen, an denen gedruckte Formeln und Tabellenwerte im Dokument mit dem dokumenteigenen $\xi = (4/3) \cdot 10^{-4}$ nicht übereinstimmen. Auflösung erfordert Autorenkontrolle am Quelldokument.

K-041-a: CKM-CP-Phase δ_{CKM} (deklariert 25. Aug. 2026). Die gedruckte Formel $\delta_{CKM} = \arcsin(2\sqrt{2} \cdot \sqrt{\xi}/3)$ ergibt 0,011 rad, nicht den Tabellenwert 1,20 rad. Kandidat: $\arcsin(2\sqrt{2}/3) = 1,231$ rad — der Faktor $\sqrt{\xi}$ ist vermutlich ein Satzfehler. Ob dieser Kandidat eine Korpusgröße ist, ist am Quelldokument zu klären.

K-041-b: PMNS-Reaktorwinkel θ_{13} (deklariert 25. Aug. 2026). Die gedruckte Formel $\theta_{13} = \arcsin(\xi^{1/3})$ ergibt 2,93°, nicht den Tabellenwert 8,57°. Kandidat: Argument $1/300 = 25\xi$ ergibt 8,59°. Ob $1/300$ eine eigenständige Korpusgröße ist, ist am Quelldokument zu klären.

K-041-c: CKM-Element $|V_{us}|$ (deklariert 25. Aug. 2026). Die Formel mit Dok. 006-Massen ergibt $|V_{us}| = 0,2124$; Tabellenwert 0,22452 (Abweichung 5,4 %). Mögliche Ursache: abweichende Massen oder f_{Cab} -Definition innerhalb dieses Dokuments.

R77: Einordnung früher Kopplungskonstanten-Formeln (deklariert im Register Dok. 190). Die früh entwickelten Kopplungskonstanten-Formeln in diesem Dokument sind als Vorstufen einzuordnen, nicht als kanonische FFGFT-Ableitungen. Maßgeblich sind die späteren Dokumente 160 (Lebensdauerstruktur), 318 (Geltungsbereich der Masseableitungen) und die Galois-Reihe (Dok. 336–348). Die Formeln in diesem Dokument bleiben archiviert; numerische Verwendung erfordert Rückgriff auf die Nachfolgedokumente.