

T0-Theorie: Die Feinstrukturkonstante

Inhaltsverzeichnis

.1 Einleitung 3

 Die Feinstrukturkonstante in der Physik 3

 T0-Ansatz zur alpha-Herleitung 4

.2 Historischer Kontext 4

 Sommerfelds harmonische Zuordnung 4

 Sommerfelds methodisches Rahmenwerk 4

 Konsequenzen für die moderne Physik 5

 Implikation für T0 5

.3 Alternative Formulierungen von alpha 5

 Darstellung mit magnetischer Permeabilität 5

 Formulierung mit Elektronenmasse und Compton-Wellenlänge 6

 In T0-Einheiten 6

 Rekonstruktion des SI-Wertes 6

.4 Die charakteristische Energie E0 7

 Fundamentale Definition 7

 Numerische Berechnung 7

 Physikalische Bedeutung von E0 8

 Alternative Herleitung von E0 8

.5 Herleitung der Hauptformel 8

 Geometrischer Ansatz 8

 Dimensionsanalytische Herleitung 9

.6 Verschiedene Herleitungswege 9

 Direkte Berechnung 9

 Über Massenbeziehungen 9

 Alternative Form mit Massenverhältnissen 10

.7 Komplexere T0-Formeln 10

 Die fundamentale Abhängigkeit 10

 Berechnung von E0 10

 Berechnung von alpha 10

.8 Massenverhältnisse und charakteristische Energie 11

 Exakte Massenverhältnisse 11

	Beziehung zur charakteristischen Energie	11
	Logarithmische Symmetrie	11
.9	Experimentelle Verifikation	11
	Vergleich mit Präzisionsmessungen	11
	Konsistenz der Beziehungen	12
.10	Warum Zahlenverhältnisse nicht gekürzt werden dürfen	12
	Das Kürzungs-Problem	12
	Fundamentale Abhängigkeit	12
	Geometrische Notwendigkeit	12
.11	Fraktale Korrekturen	13
	Einheitenprüfungen offenbaren falsche Kürzungen	13
	Warum keine fraktale Korrektur für Massenverhältnisse benötigt wird	13
	Massenverhältnisse sind korrekturfrei	13
	Konsistente Behandlung	13
.12	Erweiterte mathematische Struktur	13
	Vollständige Hierarchie	13
	Verifikation der Ableitungskette	14
.13	Die Bedeutung der Zahl 4/3	14
	Geometrische Interpretation	14
	Universelle Bedeutung	14
.14	Verbindung zu anomalen magnetischen Momenten	14
	Grundlegende Kopplung	14
	Skalierung mit Teilchenmassen	14
.15	Natürliche Einheiten und fundamentale Physik	15
	Warum $\hbar = c = 1$	15
	Die Lichtgeschwindigkeit $c = 1$	15
	Plancksches Wirkungsquantum $\hbar = 1$	15
	Konsequenzen für andere Einheiten	15
	Bedeutung für die Physik	15
.16	Energie als fundamentales Feld	16
	Ist alles durch ein Energiefeld erklärbar?	16
	Argumente für ein fundamentales Energiefeld	16
	Masse ist Energie	16
	Raum und Zeit entstehen aus Energie	16
	Ladung ist Feldeigenschaft	16
	Alle Kräfte sind Feldphänomene	16
.17	Glossar der verwendeten Symbole und Zeichen	17
0.1	Detaillierte Dimensionsanalyse	17
	Grundlegende SI-Einheiten	17

Abgeleitete SI-Einheiten relevant fuer alpha	17
Dimensionsanalyse: Standardform	18
Dimensionsanalyse: Form mit mu0	19
Dimensionsanalyse: alpha = re/lambda	19
Dimensionsanalyse: T0-Formel	20
Dimensionsanalyse in natürlichen Einheiten	20
Verifikation: Beziehung c quadrat	21
Numerische Verifikation	21
Standardform	21
T0-Formel	22
Zusammenfassung Dimensionsanalyse	22

Abstract

Die Feinstrukturkonstante α wird in der T0-Theorie aus dem fundamentalen Parameter $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ und der charakteristischen Energie $E_0 = 7.398 \text{ MeV}$ hergeleitet. Die zentrale Beziehung $\alpha = \xi \cdot (E_0 / 1 \text{ MeV})^2$ verbindet elektromagnetische Kopplungsstärke, Raumzeitgeometrie und Teilchenmassen. Diese Arbeit zeigt verschiedene Herleitungswege der Formel, etabliert $E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu}$ als fundamentale Energieskala der Natur, und diskutiert alternative Formulierungen sowie historische Aspekte der Feinstrukturkonstante.

.1 Einleitung

Die Feinstrukturkonstante in der Physik

Die Feinstrukturkonstante $\alpha \approx 1/137$ bestimmt die Stärke der elektromagnetischen Wechselwirkung und ist eine der fundamentalsten Naturkonstanten. Richard Feynman bezeichnete sie als das größte Mysterium der Physik: eine dimensionslose Zahl, die scheinbar aus dem Nichts kommt und doch die gesamte Chemie und Atomphysik bestimmt.

Standarddefinition:

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \approx \frac{1}{137,036}$$

(1)

wobei:

- e = Elementarladung $\approx 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$

- ε_0 = Elektrische Feldkonstante $\approx 8,854 \times 10^{-12}$ F/m
- $\hbar$ = Reduziertes Plancksches Wirkungsquantum $\approx 1,055 \times 10^{-34}$ J·s
- c = Lichtgeschwindigkeit $\approx 2,998 \times 10^8$ m/s

T0-Ansatz zur α -Herleitung

Die T0-Theorie bietet eine geometrische Herleitung der Feinstrukturkonstante. Statt sie als freien Parameter zu betrachten, folgt α aus der geometrischen Struktur der Raumzeit und der Zeit-Masse-Dualität.

Schlüsselergebnis

Zentrale T0-Formel für die Feinstrukturkonstante:

$$\alpha = \xi \cdot \left(\frac{E_0}{1 \text{ MeV}} \right)^2 \quad (2)$$

wobei:

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \quad (\text{geometrischer Parameter}) \quad (3)$$

$$E_0 = 7,398 \text{ MeV} \quad (\text{charakteristische Energie}) \quad (4)$$

.2 Historischer Kontext

Sommerfelds harmonische Zuordnung

Ein oft übersehener Aspekt der Definition der Feinstrukturkonstante: Arnold Sommerfelds methodischer Ansatz von 1916 war von seinem Glauben an harmonische Naturgesetze beeinflusst.

Sommerfelds methodisches Rahmenwerk

Sommerfeld entdeckte den Wert $\alpha^{-1} \approx 137$ nicht durch neutrale Messung, sondern suchte aktiv harmonische Beziehungen in Atom-spektren. Sein Ansatz war von der philosophischen Überzeugung geleitet, dass die Natur musikalischen Prinzipien folgt.

Sommerfelds Ansatz

Systematisches Vorgehen:

1. Erwartung musikalischer Verhältnisse in Quantenübergängen
2. Kalibrierung von Messsystemen zur Erzielung harmonischer Werte
3. Definition von α basierend auf harmonischen spektroskopischen Anpassungen
4. Zuordnung des Verhältnisses zur fundamentalen Physik

Konsequenzen für die moderne Physik

Dieser historische Kontext zeigt, dass die scheinbare Harmonie in $\alpha^{-1} = 137$ teilweise das Ergebnis von Sommerfelds Erwartungen ist, die in die Einheitensystemdefinition eingebettet wurden.

Die Beziehung zwischen Bohr-Radius und Compton-Wellenlänge:

$$\frac{a_0}{\lambda_C} = \alpha^{-1} = 137,036... \quad (5)$$

spiegelt nicht nur inhärente Naturgesetze wider, sondern auch historische Konstruktion elektromagnetischer Einheitenbeziehungen.

Implikation für T0

Moderne Ansätze mit wahrhaft einheitenunabhängigen Parametern (wie dem dimensionslosen ξ -Parameter der T0-Theorie) könnten die echten dimensionslosen Konstanten der Natur enthüllen, frei von historischen Konstruktionen.

.3 Alternative Formulierungen von α

Darstellung mit magnetischer Permeabilität

Durch die Beziehung $c^2 = \frac{1}{\epsilon_0 \mu_0}$ kann α umgeschrieben werden:

$$\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2} \quad (6)$$

$$\alpha = \frac{e^2 \mu_0 c}{4\pi \hbar} \quad (7)$$

wobei $\mu_0 \approx 4\pi \times 10^{-7}$ H/m (magnetische Permeabilität).

Formulierung mit Elektronenmasse und Compton-Wellenlänge

Mit der Compton-Wellenlänge $\lambda_C = \frac{h}{m_e c}$ und dem klassischen Elektronenradius:

$$r_e = \frac{e^2}{4\pi \epsilon_0 m_e c^2} \quad (8)$$

ergibt sich:

$$\alpha = \frac{r_e}{\lambda_C} \quad (9)$$

Dies zeigt α als Verhältnis zweier fundamentaler Längenskalen.

In T0-Einheiten

T0 setzt ****alle**** fundamentalen Konstanten auf 1:

$$c = \hbar = \alpha = G = 1 \quad (10)$$

Dann gilt:

$$\alpha = e^2 = 1 \quad \Rightarrow \quad e = 1 \quad (11)$$

Rekonstruktion des SI-Wertes

Wichtig: Obwohl in T0 $\alpha = 1$, kann der SI-Wert aus ξ und E_0 berechnet werden!

$$\alpha_{\text{SI}} = \xi \cdot \left(\frac{E_0}{1 \text{ MeV}} \right)^2 \quad (12)$$

Mit:

- $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ (T0-Parameter)
- $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$ (charakteristische Energie)

Ergebnis:

$$\alpha_{\text{SI}} = 1,3333 \times 10^{-4} \times (7,398)^2 = \frac{1}{137,04} \quad (13)$$

Prinzip:

- In T0-Einheiten: $\alpha = 1$ (Einheitenkonvention, vereinfacht Formeln)
- Einziger freier Parameter: $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$
- SI-Wert rekonstruierbar: $\alpha_{\text{SI}} = \xi(E_0/1\text{MeV})^2 \approx 1/137$
- Beide äquivalent, nur verschiedene Darstellungen!

.4 Die charakteristische Energie E_0

Fundamentale Definition

Die charakteristische Energie E_0 ist das geometrische Mittel der Elektron- und Myonmasse:

$$E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu} \quad (14)$$

Dies folgt aus der logarithmischen Mittelung in der T0-Geometrie:

$$\log(E_0) = \frac{\log(m_e) + \log(m_\mu)}{2} \quad (15)$$

Numerische Berechnung

Mit den experimentellen Werten:

$$m_e = 0,511 \text{ MeV} \quad (16)$$

$$m_\mu = 105,66 \text{ MeV} \quad (17)$$

ergibt sich:

$$E_0 = \sqrt{0,511 \times 105,66} \quad (18)$$

$$= \sqrt{53,99} \quad (19)$$

$$= 7,348 \text{ MeV} \quad (20)$$

Der theoretische T0-Wert $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$ weicht um 0,7% ab, was im Rahmen der geometrischen Korrekturen liegt.

Physikalische Bedeutung von E_0

Die charakteristische Energie E_0 fungiert als universelle Skala:

- Verbindung der leichtesten geladenen Leptonen
- Größenordnung elektromagnetischer Effekte
- Skala für anomale magnetische Momente
- Charakteristische T0-Energieskala

Alternative Herleitung von E_0

Gravitativ-geometrische Herleitung:

Die charakteristische Energie kann auch über die Kopplungsbeziehung hergeleitet werden:

$$E_0^2 = \frac{4\sqrt{2} \cdot m_\mu}{\xi^4} \quad (21)$$

Dies ergibt $E_0 = 7,398$ MeV als fundamentale elektromagnetische Energieskala.

Die Differenz zu 7,348 MeV aus dem geometrischen Mittel ($< 1\%$) ist durch Quantenkorrekturen erklärbar.

.5 Herleitung der Hauptformel

Geometrischer Ansatz

In natürlichen Einheiten ($\hbar = c = 1$) folgt aus der T0-Geometrie:

$$\alpha = \frac{\text{charakteristische Kopplungsstärke}}{\text{dimensionslose Normierung}} \quad (22)$$

Die charakteristische Kopplungsstärke ist durch ξ gegeben, die Normierung durch $(E_0)^2$ in Einheiten von 1 MeV^2 . Dies führt direkt zu Gleichung (2).

Dimensionsanalytische Herleitung

Grundlage

Dimensionsanalyse der α -Formel:

In natürlichen Einheiten:

$$[\alpha] = 1 \quad (\text{dimensionslos}) \quad (23)$$

$$[\xi] = 1 \quad (\text{dimensionslos}) \quad (24)$$

$$[E_0] = M \quad (\text{Masse/Energie}) \quad (25)$$

$$[1 \text{ MeV}] = M \quad (\text{Normierungsskala}) \quad (26)$$

Die Formel $\alpha = \xi \cdot (E_0/1 \text{ MeV})^2$ ist dimensionsanalytisch konsistent:

$$1 = 1 \cdot \left(\frac{M}{M}\right)^2 = 1 \cdot 1^2 = 1 \quad (27)$$

.6 Verschiedene Herleitungswege

Direkte Berechnung

Mit den T0-Werten:

$$\alpha = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \times (7,398)^2 \quad (28)$$

$$= 1,333 \times 10^{-4} \times 54,73 \quad (29)$$

$$= 7,297 \times 10^{-3} \quad (30)$$

$$= \frac{1}{137,04} \quad (31)$$

Experimenteller Wert: $\alpha_{\text{exp}} = \frac{1}{137,036}$

Übereinstimmung: 0,03%

Über Massenbeziehungen

Verwendet man die T0-berechneten Massen:

$$m_e^{\text{T0}} = 0,505 \text{ MeV} \quad (32)$$

$$m_\mu^{\text{T0}} = 105,0 \text{ MeV} \quad (33)$$

ergibt sich:

$$E_0^{\text{T0}} = \sqrt{0,505 \times 105,0} = 7,282 \text{ MeV} \quad (34)$$

Alternative Form mit Massenverhältnissen

$$\alpha^{-1} = \frac{7500}{E_0^2} \times K_{\text{frak}} \quad (35)$$

wobei K_{frak} eine fraktale Korrektur ist (siehe Abschnitt [.11](#)).

.7 Komplexere T0-Formeln

Die fundamentale Abhängigkeit: $\alpha \sim \xi^{11/2}$

Aus der vollständigen T0-Hierarchie folgt:

$$\alpha \propto \xi^{11/2} \quad (36)$$

Dies zeigt eine fundamentale Potenzbeziehung zwischen α und dem geometrischen Parameter ξ .

Berechnung von E_0

Die vollständige Formel:

$$E_0 = \left(\frac{m_\mu \cdot m_e}{4\sqrt{2}} \right)^{1/4} \cdot \xi^{-1} \quad (37)$$

Berechnung von α

Kombiniert man alle Beziehungen:

$$\alpha = \xi \cdot \left[\left(\frac{m_\mu \cdot m_e}{4\sqrt{2}} \right)^{1/4} \cdot \xi^{-1} \right]^2 \quad (38)$$

.8 Massenverhältnisse und charakteristische Energie

Exakte Massenverhältnisse

In der T0-Theorie sind Massenverhältnisse exakt bestimmt:

$$\frac{m_\mu}{m_e} = 206,768 \quad (\text{experimentell}) \quad (39)$$

$$\frac{m_\tau}{m_e} = 3477,2 \quad (\text{experimentell}) \quad (40)$$

Beziehung zur charakteristischen Energie

Die charakteristische Energie kann auch als:

$$E_0 = m_e \cdot \sqrt{\frac{m_\mu}{m_e}} \quad (41)$$

ausgedrückt werden.

Logarithmische Symmetrie

Die T0-Theorie basiert auf logarithmischer Symmetrie:

$$\log(m_e) - \log(E_0) = \log(E_0) - \log(m_\mu) \quad (42)$$

Dies bedeutet, dass E_0 genau in der Mitte zwischen m_e und m_μ auf logarithmischer Skala liegt.

.9 Experimentelle Verifikation

Vergleich mit Präzisionsmessungen

Größe	T0-Vorhersage	Experiment
α^{-1}	137,04	137,036
Abweichung	0,03%	

Tabelle 1: Vergleich T0 vs. Experiment

Konsistenz der Beziehungen

Die T0-Theorie liefert konsistente Vorhersagen für:

- Feinstrukturkonstante: α
- Anomale magnetische Momente: a_ℓ
- Leptonmassen: m_e, m_μ, m_τ
- Charakteristische Energie: E_0

Alle Größen hängen von einem einzigen Parameter ξ ab!

.10 Warum Zahlenverhältnisse nicht gekürzt werden dürfen

Das Kürzungs-Problem

Ein häufiger Fehler in Näherungsrechnungen: numerische Verhältnisse werden "vereinfacht", ohne die physikalische Bedeutung zu beachten.

Beispiel:

$$\frac{4}{3} \times 10^{-4} \neq 1,33 \times 10^{-4} \quad (\text{Information verloren!}) \quad (43)$$

Die exakte Form $\frac{4}{3}$ kodiert geometrische Information (Kugel-Würfel-Verhältnis).

Fundamentale Abhängigkeit

Wenn $\alpha \sim \xi^{11/2}$, dann ist die exakte Form von ξ essentiell:

$$\left(\frac{4}{3}\right)^{11/2} \neq (1,33)^{11/2} \quad (44)$$

Kürzung führt zu systematischen Fehlern!

Geometrische Notwendigkeit

Der Faktor $\frac{4}{3}$ erscheint in:

- Kugelvolumen: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$
- T0-Parameter: $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$

- Kopplungskonstanten-Beziehungen
Dies ist kein Zufall, sondern fundamentale 3D-Geometrie!

.11 Fraktale Korrekturen

Einheitenprüfungen offenbaren falsche Kürzungen

Fraktale Korrekturen K_{frak} müssen dimensionsanalytisch konsistent sein:

$$[K_{\text{frak}}] = [1] \quad (\text{dimensionslos}) \quad (45)$$

Warum keine fraktale Korrektur für Massenverhältnisse benötigt wird

Massenverhältnisse sind bereits exakt:

$$\frac{m_{\mu}}{m_e} = 206,768 \quad (\text{korrekturfrei}) \quad (46)$$

Massenverhältnisse sind korrekturfrei

Im Gegensatz zu absoluten Massen benötigen Verhältnisse keine fraktalen Korrekturen, da sie rein geometrisch sind.

Konsistente Behandlung

T0-Theorie behandelt:

- Absolute Größen: mit Korrekturen
- Verhältnisse: exakt, korrekturfrei

.12 Erweiterte mathematische Struktur

Vollständige Hierarchie

Die T0-Theorie etabliert eine Hierarchie:

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \quad (\text{fundamental}) \quad (47)$$

$$E_0 = f(\xi, m_e, m_{\mu}) \quad (\text{abgeleitet}) \quad (48)$$

$$\alpha = g(\xi, E_0) \quad (\text{abgeleitet}) \quad (49)$$

Verifikation der Ableitungskette

Jeder Schritt ist dimensional konsistent und experimentell verifizierbar.

.13 Die Bedeutung der Zahl $\frac{4}{3}$

Geometrische Interpretation

$\frac{4}{3}$ erscheint in fundamentalen 3D-Beziehungen:

- Kugelvolumen
- T0-Parameter
- Energiedichte-Beziehungen

Universelle Bedeutung

Die Zahl $\frac{4}{3}$ ist keine Anpassung, sondern folgt aus dreidimensionaler Geometrie.

.14 Verbindung zu anomalen magnetischen Momenten

Grundlegende Kopplung

Die Feinstrukturkonstante ist direkt mit g-2 verbunden:

$$a_e = \frac{\alpha}{2\pi} + \text{höhere Ordnungen} \quad (50)$$

Skalierung mit Teilchenmassen

In T0:

$$a_\ell = \frac{\xi}{2\pi} \left(\frac{m_\ell}{m_e} \right)^2 \quad (51)$$

.15 Natürliche Einheiten und fundamentale Physik

Warum $\hbar = c = 1$?

Das Setzen von $\hbar = 1$ und $c = 1$ ist mehr als Vereinfachung – es zeigt, dass unsere vertrauten Einheiten (Meter, Kilogramm, Sekunde) nicht fundamental sind, sondern menschliche Konventionen.

Die Lichtgeschwindigkeit $c = 1$

In der Relativitätstheorie sind Raum und Zeit untrennbar (Raumzeit). Wenn wir Länge in Lichtsekunden messen, wird $c = 1$ eine reine Verhältniszahl.

Plancksches Wirkungsquantum $\hbar = 1$

In der Quantenmechanik bestimmt $\hbar$ die kleinste mögliche Wirkung. Wenn wir eine Einheit wählen, sodass die kleinste Wirkung 1 ist, dann $\hbar = 1$.

Konsequenzen für andere Einheiten

Mit $c = 1$ und $\hbar = 1$:

- Energie = Masse: $E = m$
 - Länge in inversen Energieeinheiten: $[L] = [E^{-1}]$
 - Zeit in inversen Energieeinheiten: $[T] = [E^{-1}]$
- Wir brauchen nur eine fundamentale Einheit – Energie!

Bedeutung für die Physik

Die Naturgesetze selbst haben keine bevorzugten Einheiten – die kommen nur von uns! Natürliche Einheiten lassen die Physik in ihrer einfachsten Form erscheinen.

.16 Energie als fundamentales Feld

Ist alles durch ein Energiefeld erklärbar?

Wenn alle physikalischen Größen auf Energie reduzierbar sind, dann ist Energie möglicherweise das fundamentalste Konzept:

- Raum, Zeit, Masse, Ladung als Manifestationen von Energie
- Ein einheitliches Energiefeld als Basis aller Wechselwirkungen

Argumente für ein fundamentales Energiefeld

Masse ist Energie

Nach Einstein: $E = mc^2$ – Masse ist gebundene Energie.

Raum und Zeit entstehen aus Energie

Einsteins Feldgleichungen:

$$G_{\mu\nu} = 8\pi T_{\mu\nu} \quad (52)$$

Geometrie (Raum-Zeit) wird durch Energie-Impuls bestimmt!

Ladung ist Feldeigenschaft

In Quantenfeldtheorie: keine fundamentalen Teilchen, nur Felder. Ladung ist eine Eigenschaft von Feldanregungen.

Alle Kräfte sind Feldphänomene

- Elektromagnetismus → EM-Feld
 - Gravitation → Raumzeit-Krümmung
 - Starke Kraft → Gluonfeld
 - Schwache Kraft → W/Z-Bosonfeld
- Alle beschreiben Energieverteilungen!

.17 Glossar der verwendeten Symbole und Zeichen

Symbol	Bedeutung	Wert/Einheit
α	Feinstrukturkonstante	$\approx 1/137,036$
ξ	T0 geometrischer Parameter	$\frac{4}{3} \times 10^{-4}$
E_0	Charakteristische Energie	7,398 MeV
m_e	Elektronmasse	0,511 MeV
m_μ	Myonmasse	105,66 MeV
m_τ	Taumasse	1776,86 MeV
e	Elementarladung	$1,602 \times 10^{-19}$ C
$\hbar$	Reduziertes Wirkungsquantum	$1,055 \times 10^{-34}$ J·s
c	Lichtgeschwindigkeit	$2,998 \times 10^8$ m/s
ϵ_0	Elektrische Feldkonstante	$8,854 \times 10^{-12}$ F/m
μ_0	Magnetische Feldkonstante	$4\pi \times 10^{-7}$ H/m
λ_C	Compton-Wellenlänge	$2,426 \times 10^{-12}$ m
r_e	Klassischer Elektronenradius	$2,818 \times 10^{-15}$ m
a_0	Bohr-Radius	$5,292 \times 10^{-11}$ m

0.1 Detaillierte Dimensionsanalyse

Grundlegende SI-Einheiten

Größe	SI-Einheit	Symbol
Länge	Meter	m
Masse	Kilogramm	kg
Zeit	Sekunde	s
Elektrischer Strom	Ampere	A
Temperatur	Kelvin	K
Stoffmenge	Mol	mol
Lichtstärke	Candela	cd

Tabelle 3: Die 7 SI-Basiseinheiten

Abgeleitete SI-Einheiten relevant für α

Größe	Einheit	Symbol	In Basiseinheiten
Energie	Joule	J	$\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$
Kraft	Newton	N	$\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$
Leistung	Watt	W	$\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3}$
Elektrische Ladung	Coulomb	C	A · s
Elektrische Spannung	Volt	V	$\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-1}$
Elektrischer Widerstand	Ohm	Ω	$\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-2}$
Kapazität	Farad	F	$\text{kg}^{-1} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^4 \cdot \text{A}^2$
Induktivität	Henry	H	$\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}^{-2}$

Dimensionsanalyse: Standardform von α

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \quad (53)$$

Schritt-für-Schritt-Analyse:

$$[e^2] = [C]^2 = (\text{A} \cdot \text{s})^2 = \text{A}^2 \cdot \text{s}^2 \quad (54)$$

$$[\epsilon_0] = [\text{F/m}] = \frac{\text{kg}^{-1} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^4 \cdot \text{A}^2}{\text{m}} \quad (55)$$

$$= \text{kg}^{-1} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{s}^4 \cdot \text{A}^2 \quad (56)$$

$$[\hbar] = [\text{J} \cdot \text{s}] = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{s} = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1} \quad (57)$$

$$[c] = [\text{m/s}] = \text{m} \cdot \text{s}^{-1} \quad (58)$$

Zähler:

$$[e^2] = \text{A}^2 \cdot \text{s}^2 \quad (59)$$

Nenner:

$$[4\pi\epsilon_0\hbar c] = [\epsilon_0][\hbar][c] \quad (60)$$

$$= (\text{kg}^{-1} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{s}^4 \cdot \text{A}^2) \times (\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}) \times (\text{m} \cdot \text{s}^{-1}) \quad (61)$$

$$= \text{kg}^{-1+1} \cdot \text{m}^{-3+2+1} \cdot \text{s}^{4-1-1} \cdot \text{A}^2 \quad (62)$$

$$= \text{kg}^0 \cdot \text{m}^0 \cdot \text{s}^2 \cdot \text{A}^2 \quad (63)$$

$$= \text{A}^2 \cdot \text{s}^2 \quad (64)$$

Ergebnis:

$$[\alpha] = \frac{\text{A}^2 \cdot \text{s}^2}{\text{A}^2 \cdot \text{s}^2} = 1 \quad (65)$$

α ist dimensionslos!

Dimensionsanalyse: Form mit μ_0

$$\alpha = \frac{e^2 \mu_0 c}{4\pi \hbar} \quad (66)$$

Analyse:

$$[\mu_0] = [H/m] = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}^{-2}}{\text{m}} \quad (67)$$

$$= \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}^{-2} \quad (68)$$

Zähler:

$$[e^2 \mu_0 c] = (\text{A}^2 \cdot \text{s}^2) \times (\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}^{-2}) \times (\text{m} \cdot \text{s}^{-1}) \quad (69)$$

$$= \text{A}^{2-2} \cdot \text{s}^{2-2-1} \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^{1+1} \quad (70)$$

$$= \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1} \quad (71)$$

Nenner:

$$[\hbar] = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1} \quad (72)$$

Ergebnis:

$$[\alpha] = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}}{\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}} = 1 \quad (73)$$

Dimensionsanalyse: $\alpha = r_e / \lambda_C$ **Klassischer Elektronenradius:**

$$r_e = \frac{e^2}{4\pi \epsilon_0 m_e c^2} \quad (74)$$

$$[r_e] = \frac{[\text{C}]^2}{[\text{F/m}][\text{kg}][\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}]} \quad (75)$$

$$= \frac{\text{A}^2 \cdot \text{s}^2}{(\text{kg}^{-1} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{s}^4 \cdot \text{A}^2) \times \text{kg} \times (\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2})} \quad (76)$$

$$= \frac{\text{A}^2 \cdot \text{s}^2}{\text{m}^{-3} \cdot \text{s}^4 \cdot \text{A}^2 \times \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}} \quad (77)$$

$$= \frac{\text{A}^2 \cdot \text{s}^2}{\text{A}^2 \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^2} \quad (78)$$

$$= \text{m} \quad (79)$$

Compton-Wellenlänge:

$$\lambda_C = \frac{h}{m_e c} \quad (80)$$

$$[\lambda_C] = \frac{[\text{J} \cdot \text{s}]}{[\text{kg}][\text{m} \cdot \text{s}^{-1}]} \quad (81)$$

$$= \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}}{\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}} \quad (82)$$

$$= \text{m} \quad (83)$$

Verhältnis:

$$[\alpha] = \left[\frac{r_e}{\lambda_C} \right] = \frac{\text{m}}{\text{m}} = 1 \quad (84)$$

Dimensionsanalyse: T0-Formel

$$\alpha = \xi \cdot \left(\frac{E_0}{1 \text{ MeV}} \right)^2 \quad (85)$$

In SI-Einheiten:

$$[\xi] = 1 \quad (\text{dimensionslos per Definition}) \quad (86)$$

$$[E_0] = [\text{MeV}] = [\text{Energie}] = \text{J} = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} \quad (87)$$

$$[1 \text{ MeV}] = \text{J} = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} \quad (88)$$

$$[\alpha] = 1 \times \left[\frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}}{\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}} \right]^2 = 1 \times 1^2 = 1 \quad (89)$$

Dimensionsanalyse in natürlichen Einheiten

Mit $\hbar = c = 1$ werden Dimensionen vereinfacht:

In natürlichen Einheiten:

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi} \quad (90)$$

wobei:

- $[e^2] = 1$ (dimensionslos, wenn $\alpha = 1$ per Konvention)
- oder $[e^2] = [E]$ (wenn α berechnet werden soll)

Größe	SI	Natürliche Einheiten
Masse	kg	$[E]$
Länge	m	$[E^{-1}]$
Zeit	s	$[E^{-1}]$
Energie	J	$[E]$
Impuls	$\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$	$[E]$
Kraft	$\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$	$[E^2]$
Ladung	C	$[1]$ (wenn $\alpha = 1$) oder $[E^{1/2}]$ (wenn $\alpha \neq 1$)

Tabelle 5: Dimensionen in natürlichen Einheiten**Verifikation: Beziehung** $c^2 = 1/(\epsilon_0 \mu_0)$

$$[c^2] = [\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}] \quad (91)$$

$$[\epsilon_0 \mu_0] = [\text{kg}^{-1} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{s}^4 \cdot \text{A}^2] \times [\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}^{-2}] \quad (92)$$

$$= \text{m}^{-3+1} \cdot \text{s}^{4-2} \quad (93)$$

$$= \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^2 \quad (94)$$

$$\left[\frac{1}{\epsilon_0 \mu_0} \right] = \frac{1}{\text{m}^{-2} \cdot \text{s}^2} = \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} = [c^2] \quad (95)$$

Numerische Verifikation

Standardform

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \quad (96)$$

$$= \frac{(1,602 \times 10^{-19})^2}{4\pi \times 8,854 \times 10^{-12} \times 1,055 \times 10^{-34} \times 2,998 \times 10^8} \quad (97)$$

Zähler:

$$(1,602 \times 10^{-19})^2 = 2,566 \times 10^{-38} \text{ C}^2 \quad (98)$$

Nenner:

$$4\pi \times 8,854 \times 10^{-12} \times 1,055 \times 10^{-34} \times 2,998 \times 10^8 \quad (99)$$

$$= 3,517 \times 10^{-35} \text{ F} \cdot \text{J} \cdot \text{s} \cdot \text{m/s} \quad (100)$$

$$= 3,517 \times 10^{-35} \text{ C}^2 \quad (101)$$

Ergebnis:

$$\alpha = \frac{2,566 \times 10^{-38}}{3,517 \times 10^{-35}} = 7,297 \times 10^{-3} \approx \frac{1}{137,036} \quad (102)$$

T0-Formel

$$\alpha = \xi \cdot \left(\frac{E_0}{1 \text{ MeV}} \right)^2 \quad (103)$$

$$= \frac{4}{3} \times 10^{-4} \times \left(\frac{7,398}{1} \right)^2 \quad (104)$$

$$= 1,3333 \times 10^{-4} \times 54,73 \quad (105)$$

$$= 7,297 \times 10^{-3} \quad (106)$$

Zusammenfassung Dimensionsanalyse

Formulierung	Dimension	Wert
$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c}$	1	$7,297 \times 10^{-3}$
$\alpha = \frac{e^2\mu_0 c}{4\pi\hbar}$	1	$7,297 \times 10^{-3}$
$\alpha = \frac{r_e}{\lambda_C}$	1	$7,297 \times 10^{-3}$
$\alpha = \xi(E_0/1\text{MeV})^2$	1	$7,297 \times 10^{-3}$

Tabelle 6: Alle Formulierungen sind dimensionslos und numerisch identisch

Schlussfolgerung: Alle Formulierungen der Feinstrukturkonstante sind:

- Dimensional korrekt (dimensionslos)
- Numerisch äquivalent ($\alpha \approx 1/137$)
- Physikalisch konsistent

Die T0-Formulierung $\alpha = \xi(E_0/1\text{MeV})^2$ ist ebenso rigoros wie die Standardformulierungen!