Fundamentale Fraktal-Geometrische Feldtheorie (FFGFT) oder T0-Theorie: Zeit-Masse-Dualität

Teil 6: Holografie, HLV-Brücke und die Struktur der Zeit

Johann Pascher

2026

Inhaltsverzeichnis

A Einleitung zu Band 6 . . . 3

I Teil I — Holografie, kosmologische Entartung und Formalismus-Korrespondenzen 5

B Dok. 263 — Fraktale Holografie: FFGFT und das holografische Prinzip . . . 7
C Dok. 265 — Formalismus-Korrespondenz: FFGFT und Blume-Maleev . . . 21
D Dok. 267 — Kosmologische Entartung: ΛCDM und FFGFT . . . 28
E Dok. 268 — CMB-Peaks aus dem T^4: Herleitung der Winkelspektrum-Verhältnisse . . . 38
F Dok. 269 — FFGFT und RA/PMT: ein bidirektionaler Strukturvergleich . . . 65

II Teil II — Dimensionswechsel, HLV-Brücke und Skalenrekursion 71

G Dok. 270 — Dimensionswechsel in der FFGFT . . . 73
H Dok. 271 — FFGFT (T0) und Helix–Light–Vortex (HLV) im Vergleich . . . 86
I Dok. 272 — FFGFT (T0) und HLV, eingeordnet nach Dot Theory . . . 90
J Dok. 274 — FFGFT (T0) im IPI-Feld . . . 95
K Dok. 275 — Von ξ zu φ: Rekursive Skalenhierarchie . . . 101
L Dok. 276 — Homologie-Test der HLV-Vortex-Hypothese . . . 110
M Dok. 277 — Wellenausbreitung und Energie . . . 116
N Dok. 279 — Casimir, CMB und H_0 — die gemeinsame ξ-Skala . . . 123
O Dok. 280 — Rotverschiebung in FFGFT: statisch, achromatisch . . . 132
P Dok. 281 — Der Goldene Schnitt in FFGFT . . . 137
Q Dok. 282 — FFGFT im Hilbertraum — Vom gemeinsamen Loop-Objekt zum Massenoperator 143
R Dok. 283 — FFGFT $\leftrightarrow$ HLV: die Brücke und die Gabelung . . . 158
S Dok. 284 — Eine Formel-genaue Lesung des Spiral-Zeit-Neurodynamik-Modells . . . 166
T Dok. 285 — Die einheitliche kompakte Sicht und die gerechnete 3-vs-6-Brücke . . . 174

III Teil III — Dynamischer Sektor, Betrag und Phase, $\theta = 2/9$ 197

U Dok. 286 — Der dynamische Sektor: kinetische Energie als ξ-fraktaler Anteil des statischen 199
V Dok. 287 — Interne Darstellungs-Äquivalenzen . . . 210
W Dok. 288 — Nachrichtentechnische Rechenwege . . . 216
X Dok. 289 — Magnitude/Phase-Karte der vier Fermion-Sektoren . . . 220
Y Dok. 290 — Folgen für die Informationsfrage: Betrag, Phase und der zweite Kanal . . . 224
Z Dok. 291 — Der dynamische Ort von $\theta = 2/9$: Betrag, Windung, Phase . . . 234

aa Dok. 292 — Leptonen-Empirie-Check: die FFGFT-Relationen von den Daten aus 242
ab Dok. 293 — Die ikosaedrische Herkunft von $\theta = 2/9$: der zweite Zeuge 253
ac Dok. 294 — FFGFT als Prüfinstanz für HLV: das geteilte φ-ikosaedrische Objekt 258

IV Teil IV — Zeit und Information 263

ad Dok. 295 — Die Zeit-Windung als logarithmische Spirale 265
ae Dok. 296 — Zeit, Offenheit und Invarianz 273
af Dok. 297 — HLV als mögliche Untermenge von FFGFT 281
ag Dok. 298 — Das Standardmodell als dekompaktifizierte Projektion 287
ah Dok. 299 — Die Einbettung ι — Arbeitsdokument und Forcing-Protokoll 293
ai Dok. 300 — Spiral-Time als Auslesung und entprellter Comparator 299
aj Dok. 301 — Der Umkehrtest — Information als Ausgang, nicht als Grundeinheit 302
ak Dok. 302 — Elementarzellen, Ein-Bit-Kapazität und Partitionsinvarianz 310
al Dok. 303 — Repräsentationale Identität über Rollenwechsel 314
am Dok. 304 — Der Gedächtnis-Reflex — Warum erlebte Zeit das Gedächtnis voraussetzt . 318
an Dok. 305 — Der Krümmungstreue-Diskriminator 330
ao Dok. 306 — Die native Zeit-Energie-Reziprozität 333
ap Dok. 307 — Zeit im Zustandsraum oder daneben — Verortung der Zeit und Herkunft der Massen-Moden 341

V Teil V — Kosmischer Sektor und Resonanzgeometrie 353

aq Dok. 308 — Der kosmische Sektor der FFGFT: Rotverschiebung, dunkler Sektor und geometrische Gravitation 355
ar Dok. 309 — Das Skalenanker-Problem: ΛCDM und FFGFT im Vergleich 362
as Dok. 310 — Die Resonanzgeometrie — als übergeordnete Referenz 367

Kapitel A

Einleitung zu Band 6

Sechster Band der Dokumentensammlung

Mit diesem Band wird die Sammlung der Einzeldokumente zur T0-Theorie / FFGFT über die ursprünglich fünf Bände hinaus fortgeführt. Seit dem Abschluss von Band 5 (Dok. 262, Mai 2026) ist der Korpus um mehr als 120 Dokumente gewachsen. Sie werden in den Bänden 6, 7 und 8 in numerischer Reihenfolge aufgenommen; die Grenze jedes Bandes ist so gelegt, dass ein inhaltlicher Schnitt mit dem Umfangsmaß der Druckausgaben zusammenfällt.

Inhalt und Schwerpunkt

Band 6 umfasst die Dokumente 263 bis 310 aus den Monaten Juni und Juli 2026. Den roten Faden bildet die Frage, wie die kompakte Geometrie T^4 in die beobachtete dreidimensionale, zeitlich offene Welt übergeht und was dabei an Information, Phase und Zeitstruktur erhalten bleibt. Am Anfang stehen das holografische Prinzip in fraktaler Lesart, die kosmologische Entartung zwischen ΛCDM und FFGFT sowie die Herleitung der CMB-Peak-Verhältnisse aus dem T^4. Es folgt die Projektionskette vom T^4 zum Beobachtungsraum, die über eine Reihe von Vergleichs- und Brückendokumenten zum Helix–Light–Vortex-Ansatz (HLV) bis zur gerechneten 3-gegen-6-Brücke in Dok. 285 führt.

Der dritte Abschnitt behandelt den dynamischen Sektor: kinetische Energie als ξ-fraktalen Anteil des statischen Verhältnisses $\tilde{T} \cdot m = 1$, die Trennung von Betrag und Phase in den vier Fermion-Sektoren und die doppelte Herkunft des Winkels $\theta = 2/9$, dynamisch (Dok. 291) und ikosaedrisch (Dok. 293). Die Dokumente 295 bis 307 widmen sich der Zeit und der Information: die Zeit-Windung als logarithmische Spirale, der Umkehrtest, der Information als Ausgang und nicht als Grundeinheit ausweist, die native Zeit-Energie-Reziprozität und die Verortung der Zeit im Zustandsraum. Den Abschluss bilden der kosmische Sektor und das Skalenanker-Problem im Vergleich mit ΛCDM sowie die Resonanzgeometrie als übergeordnete Referenz.

Gliederung

Die 44 Dokumente sind in fünf Teile gegliedert: Holografie, kosmologische Entartung und Formalismus-Korrespondenzen (Dok. 263–269); Dimensionswechsel, HLV-Brücke und Skalenrekursion (Dok. 270–285); dynamischer Sektor, Betrag und Phase, $\theta = 2/9$ (Dok. 286–294); Zeit und Information (Dok. 295–307); kosmischer Sektor und Resonanzgeometrie (Dok. 308–310).

Zum Lesen der Dokumente

Wie in den früheren Bänden ist jedes Dokument eigenständig und wird im Text mit seiner Korpusnummer zitiert. Die Statusmarker [K], [B], [S] und [SETZUNG] kennzeichnen den erreichten Ableitungsstand; spätere Korrekturen und geschlossene Brücken sind im Korrekturregister Dok. 190 verzeichnet, das laufend im Repository weitergeführt wird (siehe Band 5, Einleitung). Wo ein späteres Dokument eine Aussage dieses Bandes präzisiert oder zurücknimmt, gilt die spätere Fassung. Die Dokumente 308 bis 310 sind ursprünglich als mehrkapitelige Abhandlungen gesetzt; im Buch erscheinen ihre Kapitel als Abschnitte des jeweiligen Dokuments.

Stand

Die Dokumente dieses Bandes tragen den Stand ihrer jeweiligen Fassung im Korpus zum Oktober 2026.

Teil I

Teil I — Holografie, kosmologische Entartung und Formalismus-Korrespondenzen

Kapitel B

Dok. 263 — Fraktale Holografie: FFGFT und das holografische Prinzip

Vorbemerkung zum Dokument

Dieses Dokument verortet FFGFT gegenüber dem holografischen Prinzip. Es unterscheidet streng zwischen drei Ebenen: **(1)** Berührungspunkten, die bereits im FFGFT-Korpus belegt sind; **(2)** einer offenen Skalierungsfrage am Flächengesetz, die hier als *Reduktionsschicht* gerechnet, aber *nicht* als Kern-Ableitung beansprucht wird; und **(3)** echten Spannungen, an denen FFGFT dem Standardbild der Holografie ausdrücklich *nicht* entspricht. Die Trennung ist beabsichtigt: der Begriff „holografisch“ lädt sonst eine AdS/CFT-Erwartung auf, die FFGFT nicht erfüllt und auch nicht erfüllen will.

Methodischer Status. Abschnitt B.1 referiert Belegtes (Dok. 201). Abschnitt B.2 rechnet eine Konsequenz *einer Annahme* und ist als Reduktionsschicht markiert. Die Wahl der Annahme ist eine physikalische Entscheidung, keine Herleitung.

Verwendete Formelzeichen.

Zeichen	Bedeutung
ξ	geometrischer Grundparameter, $\xi = 4/30000 \approx 1{,}333 \times 10^{-4}$
$\tilde{T} \cdot m = 1$	Zeit-Masse-Dualität (Grundrelation); $\tilde{T}$ intrinsische Zeitskala
D_f	fraktale Dimension, $D_f = 3 - \xi$
E_0	charakteristische Energie, $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}} = 7{,}398$ MeV (nackt $\sqrt{m_e m_\mu} = 7{,}348$ MeV, R72)
E_H	Hubble-Energie, $E_H = E_0\, \xi^{41/4} \approx 1{,}41 \times 10^{-33}$ eV (Exponent an H_0 kalibriert)
H_0	Hubble-Größe, $H_0 = E_H/\hbar \approx 66{,}2$ km/s/Mpc
R_H	Maximalskala, $R_H = \hbar c / E_H \approx 1{,}4 \times 10^{26}$ m
L_0	Sub-Planck-Granulierung, $L_0 = \xi\, \ell_P \approx 2{,}2 \times 10^{-39}$ m
L_ξ	charakteristische ξ-Länge ($\sim 100\,\mu$m, Dok. 091)
ℓ_P	Planck-Länge
z, z_{obs}	Rotverschiebung; $z_{\text{obs}} = \lambda_b/\lambda_e - 1$ (Wellenlängenverhältnis)
$\rho_{\text{vac}}, \rho_{\text{CMB}}$	Vakuum-/CMB-Energiedichte; $\rho_{\text{CMB}} = \xi \hbar c / L_\xi^4$
m_T, λ	Mediatormasse $m_T = \lambda/\xi$ (Dok. 201); reguliert $\rho \le 1/\xi^2$
$c, \hbar, \hbar c$	SI-Umrechnungsfaktoren (keine ontologischen Primitive)
T_{00}	Energiedichte aus $\mathscr{L} = \xi(\partial E)^2$; $T_{00} = \xi[(\partial_t E)^2 + (\nabla E)^2]$

Schichten: Kern-Ableitung > Brücke > Reduktionsschicht (Plausibilität). Stehende Mahnung: H_0, z, Ω sind ΛCDM-Pipeline-Ausgaben, nicht modellneutral.

B.1 Belegte Berührungspunkte

Flächengesetz aus Knotenzählung (Dok. 201, §7.6)

FFGFT setzt die Entropie eines Schwarzen Lochs als Knoten-Konfigurationsentropie an:

$$S = \frac{A}{4\,\ell_P^2} \;\longrightarrow\; S = N_{\text{nodes}}\,\ln 2, \qquad N_{\text{nodes}} \propto \frac{A}{L_0^2} = \frac{A}{\xi_0^2\,\ell_P^2},$$

mit der hier verwendeten Granulierung $L_0 = \xi_0\,\ell_P$. Damit wird die Flächenskalierung des Bekenstein-Hawking-Gesetzes reproduziert – die holografische Kernaussage, dass Entropie mit der *Fläche* und nicht mit dem *Volumen* skaliert. In FFGFT ist dies kein Postulat, sondern fällt aus der Zählung gesättigter Knoten auf der Kernoberfläche heraus. Den Koeffizienten liefert die Zählung nicht: Mit dieser Granulierung verfehlt $S = N_{\text{nodes}} \ln 2$ den Wert $A/(4\ell_P^2)$ um den Faktor $4\ln 2/\xi_0^2 \approx 1{,}6 \times 10^8$.

Information als Zugangs- statt Existenzproblem

Die Windungszahlen $(n_\theta, n_\varphi, n_3, n_4)$ sind topologische Invarianten; sie können nicht verschwinden. Ein vermeintlicher „Informationsverlust“ am Horizont ist in FFGFT epistemisch (ein Zugangsproblem), nicht ontologisch (ein Existenzproblem). Das ist eine eigenständige Position zum Informationsparadoxon, die dasselbe Terrain wie die Holografie betritt – Erhaltung der Information –, aber mit einem anderen Mechanismus: topologische Erhaltung statt Randkodierung.

Masse als Skalenprojektion

FFGFT verwendet den Begriff der „holografischen Projektion“ bereits selbst: Teilchenmassen entstehen als Projektion zwischen Skalen (VEV auf die Sub-Planck-Skala). Das ist Holografie im Sinne einer *Projektion zwischen Skalen*, nicht im Sinne einer Bulk/Boundary-Dualität.

B.2 Offene Skalierungsfrage am Flächengesetz (Reduktionsschicht)

Dekompaktifizierung erzwingt Korrekturen – aber nicht ihre Form

Ein naheliegendes Argument lautet: Da wir in einem dekompaktifizierten Bereich leben (die Torus-Dimensionen sind auf der Skala $L_0 = \xi_0 \ell_P$ verborgen), *muss* sich die verborgene Kompaktheit als fraktale Korrektur in beobachtbaren Größen niederschlagen. Das ist richtig – und genau das ist ξ_0: der Korrekturparameter ist im Korpus belegt (Massenformel $m_i = r_i \xi_0^{p_i} v$; geometrische Rotverschiebung als fraktale Wegverlängerung). Dass *überhaupt* fraktale Korrekturen existieren, ist insofern keine Spekulation.

Dieses Argument legt jedoch *nicht* fest, *auf welche* geometrische Größe die Korrektur an einem Schwarzen-Loch-Horizont wirkt. Aus „Dekompaktifizierung erzwingt Korrekturen“ folgt *nicht* zwingend $S \propto R^{2-\xi_0}$. Sowohl eine Korrektur an der Horizont-*Fläche* (Annahme B unten) als auch eine an dem von ihr eingeschlossenen *Volumen* (Annahme C) sind vollständig dekompaktifiziert und fraktal – sie führen aber zu *verschiedenen* Flächengesetzen (gebrochen bzw. exakt). Der Schritt von „ξ_0-Korrekturen existieren“ zu „die Horizont-Entropie weicht um $\sim 1\,\%$ ab“ ist daher eine *zusätzliche* Annahme über den Wirkungsort der Korrektur, keine Folge der Dekompaktifizierung selbst.

Die Frage

Dok. 201 setzt das *reine* Flächengesetz an: $N_{\text{nodes}} \propto A \propto R^2$, der Exponent ist exakt 2. Eine Korrektur durch die fraktale Dimension $D_f = 3 - \xi_0$ ist dort *nicht* eingebaut. Es ist daher eine offene Frage, ob D_f überhaupt auf die Horizont-*Fläche* durchschlägt – und wenn ja, wie.

Drei Annahmen im Vergleich

- **Annahme A (reines Flächengesetz, Dok. 201):** $S \sim R^2$. Exponent exakt 2.
- **Annahme B (fraktale Fläche):** Sitzen die Knoten auf einem Kodimension-1-Rand einer D_f-dimensionalen Struktur, so skaliert die effektive Knotenzahl wie $R^{D_f-1} = R^{2-\xi_0}$. Exponent $2 - \xi_0$.
- **Annahme C (fraktales Volumen):** Wirkt D_f auf das eingeschlossene *Volumen* ($V \propto R^{D_f}$), während die Fläche ganzzahlig bleibt, so bleibt das Flächengesetz *exakt* bei Exponent 2.

Ergebnis der Rechnung

Annahme	Exponent	Abweichung vom Flächengesetz
A – reines Flächengesetz	2	0
B – fraktale Fläche	$2-\xi_0 = 1{,}99986667$	$\Delta_{\text{exp}} = \xi_0 = 1{,}33\times10^{-4}$
C – fraktales Volumen	2	0 (Flächengesetz bleibt exakt)

Nur Annahme B bricht das Bekenstein-Hawking-Gesetz – und zwar um *exakt* ξ_0 *im Exponenten*. Die relative Abweichung wächst logarithmisch mit der Größe:

$$\frac{S_B}{S_A} - 1 \;\approx\; -\xi_0 \,\ln\!\left(\frac{R}{\ell_P}\right).$$

Der winzige ξ_0 wird durch den Logarithmus um viele Größenordnungen angehoben; für astrophysikalische Schwarze Löcher erreicht der Effekt Prozent-Niveau:

Objekt	R/ℓ_P	Abweichung (Annahme B)
Sonnenmasse-SL ($R\sim 3\,$km)	$1{,}9\times10^{38}$	$-1{,}17\,\%$
Sagittarius A* ($R\sim 1{,}2\times10^{10}\,$m)	$7{,}4\times10^{44}$	$-1{,}37\,\%$
M87* ($R\sim 1{,}9\times10^{13}\,$m)	$1{,}2\times10^{48}$	$-1{,}47\,\%$

Einordnung

Dies ist qualitativ verschieden vom ξ_0-Effekt in anderen Kontexten (etwa der dimensionsgetriebenen Nähe $D/(D+1)\to 3/4$, wo ξ_0 erst bei 10^{-5} erscheint). Hier erreicht ξ_0 Prozent-Niveau, weil $\ln(R/\ell_P)$ rund 38 Größenordnungen überbrückt. Genau hierin läge ein *Diskriminator* zwischen „echter Holografie“ (Flächengesetz exakt) und „fraktaler Beinahe-Holografie“ (Exponent $2-\xi_0$).

Status (offen). Die Wahl zwischen Annahme B und C ist eine physikalische Entscheidung über FFGFT, *keine* Ableitung aus dem bestehenden Korpus. Annahme B ist plausibel (Kodimension-1-Rand), aber in Dok. 201 nicht hergeleitet. Solange die Frage offen ist, ist die Prozent-Abweichung die Konsequenz *einer* Annahme, nicht eine Vorhersage von FFGFT. Ebenso wurde der Vorfaktor $1/L_0^2$ der Knotenzählung hier als reiner Vorfaktor behandelt (kürzt sich im Verhältnis); eine etwaige skalenabhängige Fraktalität von ℓ_P würde einen weiteren Term beitragen.

B.3 Rekonstruktion: die Hologramm-Analogie und ihre Grenzen

Belegt: eine nicht-umkehrbare Projektion (Dok. 193)

Dok. 193 hält fest, dass die Auswertung der Modus-Labels (r_i, p_i) zu reellen Zahlen *nicht umkehrbar* ist: Sobald r_i und p_i zu Zahlen in $\mathbb{R}$ ausgewertet sind, tragen sie „keine Erinnerung“ mehr an ihre Herkunft aus verschiedenen Teilchen. Aus einem reellen

Wert (etwa einer Masse oder einer abgeleiteten Größe) lässt sich die zugrundeliegende Quantenzahl-Struktur nicht eindeutig zurückgewinnen – die Faserung über jedem Zahlenwert ist kollabiert. Dies ist eine im Korpus belegte, nicht-umkehrbare Projektion vom diskreten geometrischen Modus-Raum auf $\mathbb{R}$.

Analogie (Metapher, keine Ableitung): das physikalische Hologramm

Diese Asymmetrie lässt sich an einem physikalischen Hologramm veranschaulichen – ausdrücklich als *Veranschaulichung*, nicht als Herleitung. Ein optisches Hologramm kodiert eine räumliche Szene in einem Interferenzmuster auf einer Fläche. Um daraus wieder ein sichtbares Bild zu machen, genügt die Fläche allein nicht: Es braucht einen Referenz- bzw. Abtaststrahl, der die *Vorinformation* (Wellenlänge, Phase, Geometrie der Aufnahme) mitbringt. Und selbst bei bester Aufnahme- und Rekonstruktionsqualität bleibt das sichtbare Hologramm ein *schwaches Abbild* der ursprünglichen Realität – ein Teil der Information ist prinzipiell nicht zurückzugewinnen.

In dieser Lesart verhält sich die beobachtbare $3{+}1$-dimensionale Welt zur zugrundeliegenden T^4-Geometrie wie das rekonstruierte Hologramm zur aufgenommenen Szene: Die Rekonstruktion erfordert Vorinformation, und sie ist prinzipiell verlustbehaftet. Die beobachtbare Welt ist ein *unvollständiges* Abbild des Substrats – nicht, weil die Aufnahme schlecht wäre, sondern weil die Projektion selbst Information verwirft.

Abgrenzung: das ist nicht das Nichtabschluss-Theorem

Diese nicht-umkehrbare Projektion ist sorgfältig vom *Nichtabschluss-Theorem* (Dok. 193) zu trennen. Das Nichtabschluss-Theorem ist eine *andere*, rein algebraische Aussage: Die Menge der zulässigen Paare (r_i, p_i) ist nicht abgeschlossen unter Multiplikation, d. h. das Produkt zweier verschiedener Moden $(r_i \cdot r_j,\ p_i + p_j)$ entspricht keinem Teilchen des Modells. Es betrifft die *Kombinierbarkeit* von Moden untereinander, nicht die *Umkehrbarkeit* einer Projektion. Beide Aussagen stammen aus Dok. 193, sind aber verschieden und sollten nicht gleichgesetzt werden.

B.4 Reversibilität: Annahme der Standard-Holografie vs. abgeleitete Zeit-Asymmetrie

Reversibilität ist in der Standard-Holografie ein Axiom

Die Standard-Holografie (AdS/CFT) ist als *Dualität* formuliert – eine exakte, umkehrbare Wörterbuch-Abbildung zwischen Bulk und Rand. Diese Umkehrbarkeit ruht auf zwei Voraussetzungen: der **Unitarität** der zugrundeliegenden Quantentheorie (umkehrbare Zeitentwicklung, Informationserhaltung) und der Existenz eines **konformen Randes**, auf dem die exakte Kodierung lebt. Beides ist gesetzt, nicht hergeleitet. Die Reversibilität ist daher kein Messbefund, sondern eine *Strukturannahme* des Formalismus.

FFGFT leitet die Zeit-Asymmetrie ab (Dok. 157)

FFGFT behandelt die Zeitrichtung nicht als Axiom, sondern leitet sie aus tieferliegender Geometrie ab. Dok. 157 verankert den Bruch der Zeitumkehrsymmetrie dreifach:

- **Algebraisch:** $T \cdot m = 1$ mit positiv-definiter Masse ($m > 0$, auch für Antimaterie) erzwingt $T > 0$; eine Umkehr $T \to -T$ verlangte $m \to -m$ und ist physikalisch unmöglich.
- **Topologisch:** Die Windung des Vakuumfeldes auf dem Torus hat eine Chiralität; einmal gewählt, ist die Zeitrichtung topologisch geschützt (wie ein Knoten, der sich durch stetige Deformation nicht umkehren lässt).
- **Fraktal:** Bei $D_f = 3 - \xi$ unterscheiden sich die Pfadintegrale für vor- und rückwärtslaufende Pfade – die fraktale Struktur macht aus der diskreten Symmetrie $t \to -t$ eine kontinuierliche Asymmetrie.

Die beiden Lagen sind damit *nicht* symmetrisch: Die Standard-Holografie *setzt* Reversibilität voraus, FFGFT *leitet* die Nicht-Reversibilität ab. Die Nicht-Umkehrbarkeit ist in FFGFT also keine separate Zusatzannahme, sondern Folge von Strukturen, die das Framework ohnehin trägt ($T \cdot m = 1$, Torus-Windung, D_f).

Empirische Grenze: nur die praktische Erfahrung

Hier ist Redlichkeit geboten. Der einzige empirische Anker dafür, dass die Zeit überhaupt gerichtet ist, ist die **praktische Erfahrung** des gerichteten Geschehens – kein direkter Messbeweis und kein Theorem. Die beobachtete CP/T-Verletzung ist, wie Dok. 157 selbst festhält, zu schwach für den makroskopischen Zeitpfeil. FFGFT *misst* die Asymmetrie also nicht; es ersetzt die thermodynamische Notlösung (eine unerklärte Anfangsbedingung niedriger Entropie) durch eine *geometrische Herleitung* der schon praktisch erfahrenen Gerichtetheit. Das ist ein struktureller Vorzug – die „Past Hypothesis" wird entbehrlich –, aber kein empirischer Beweis der Prämisse.

Konsequenz: die Reversibilität als mögliches Artefakt

Daraus folgt die eigentliche, unter beiden Frameworks liegende offene Frage. *Wenn* die Welt fundamental zeit-asymmetrisch ist – so wie es die praktische Erfahrung nahelegt und FFGFT geometrisch herleitet –, *dann* ist die exakte Reversibilität der holografischen Mathematik ein **Artefakt der unitären Idealisierung**: Sie blendet einen Symmetriebruch aus, den FFGFT begründet. Dies ist keine Behauptung, die Standard-Holografie „irre", sondern die Feststellung, dass ihre Reversibilität eine ungemessene Annahme ist – und dass FFGFT an derselben Stelle eine abgeleitete Asymmetrie setzt. Die beiden Annahmen haben unterschiedliche beobachtbare Konsequenzen; ein konkreter Diskriminator ist bereits benannt (die logarithmische Entropie-Abweichung $-\xi \ln(R/\ell_P)$ unter Annahme B, Abschnitt B.2).

B.5 Verankerung am beschränkten Kern (keine Singularität)

Der Anker

Eine Projektion ist als reines Modell zulässig; damit sie aber *FFGFT-eigen* ist (und nicht aus AdS/CFT geborgt), muss sie wie die Zeit-Masse-Dualität an einem physikalischen Punkt *aufgehängt* sein. T0 besitzt keine Singularität: Die Vakuumdichte ist durch $\rho \leq 1/\xi^2 \approx 5{,}6 \times 10^7$ beschränkt (Dok. 201), reguliert durch die Mediatormasse $m_T = \lambda/\xi$, die unbegrenztes Wachstum von Δm verhindert. Wo die klassische GR in eine Singularität liefe, hält also der ξ-beschränkte Kern dagegen – genau wie $T \cdot m = 1$ die Divergenz abfängt ($m \to \infty$ wird durch $T \to 0$ gekappt). Die holografische Projektion ist an diesem Kern verankert.

Berechnungsfolge: Cutoff statt Singularität

Daraus folgt ein *physikalischer Cutoff*. Es gibt einen endlichen Kernradius R_{core}, unterhalb dessen die Knoten gesättigt sind; die Flächengesetz-Skalierung $S \sim R^a$ gilt nur für $R \geq R_{\text{core}}$, darunter sättigt die Entropie. Größenordnung:

$$\frac{R_{\text{core}}}{\ell_P} \sim \frac{1}{\xi} \approx 7{,}5 \times 10^3 \qquad (\log_{10} \approx 3{,}9).$$

Der $O(1)$-Vorfaktor ist modellabhängig; nur die *Größenordnung* folgt aus $\rho \leq 1/\xi^2$. Konsequenz für die Rechnung in Abschnitt B.2: Werte mit $\log_{10}(R/\ell_P) \lesssim 3{,}9$ liegen *unterhalb* des Kerns – im Bereich der nicht-existenten Singularität – und sind physikalisch bedeutungslos. Erst oberhalb R_{core} ist die Skalierung gültig. Für astrophysikalische Löcher ($R/\ell_P \sim 10^{38}$–$10^{48} \gg R_{\text{core}}$) bleibt die Abweichung $-\xi \ln(R/\ell_P)$ unverändert gültig – der Cutoff betrifft allein den unphysikalischen Kleinbereich.

Deutungsgrenze: erhaltene Information ist geometrische Grundinformation

Was am Kern erhalten bleibt – die Knoten-Konfigurationsentropie $N_{\text{nodes}} \ln 2$ –, ist *nicht* eine maximale Beschreibung der vergangenen Realität, sondern nur die **Grundinformation über die geometrische Struktur** (Windungszahlen als topologische Invarianten). Erhaltung heißt hier „Zugang zur Geometrie“, nicht „Rekonstruktion der Vorgeschichte“. Das ist konsistent mit dem Zugangs-statt-Existenz-Charakter (Abschnitt B.2) und mit der verlustbehafteten, gerichteten Projektion: Die Vorgeschichte des eingefallenen Materials wird nicht zählbar erhalten, nur ihre geometrische Signatur.

Offen: keine exakte Übersetzungsgröße

Festzuhalten bleibt eine Lücke. Wir verfügen bislang nur über eine *Skalenverankerung* ($R_{\text{core}} \sim \ell_P/\xi$), nicht über eine hergeleitete **Übersetzungsgröße**, die das Flächengesetz (Kern-Entropie ↔ Horizontfläche) als exakte Abbildung mit festem Koeffizienten eichen würde – analog etwa zur zentralen Ladung in AdS/CFT oder zu den SI-Umrechnungsfaktoren $\hbar, c$ in FFGFT selbst. Eine solche Größe ist im Korpus nicht

belegt und wurde nicht gefunden. Dies ist konsistent mit der hier vertretenen Position: keine exakte Dualität, also auch kein exakter Übersetzungskoeffizient – nur eine verlustbehaftete Projektion mit einer Skalenverankerung. Die exakte Übersetzungsgröße bleibt ein offener Punkt.

Randlose Topologie

Die Standard-Holografie (AdS/CFT) benötigt einen konformen *Rand*. Der universelle 4-Torus T^4 ist randlos (kompakt ohne Boundary). Eine naive Bulk/Boundary-Dualität greift daher nicht. FFGFTs „Holografie" ist Flächengesetz und Skalenprojektion – nicht Randkodierung.

Keine holografische Dunkle Energie

Modelle, die Λ aus einem holografischen Horizont gewinnen, sind mit dem statischen FFGFT-Universum (kein Λ, keine Dunkle Energie) unvereinbar. Hier steht FFGFT in *Opposition* zur Holografie, nicht in Kontakt. Eine Zustandsgleichung w_{DE} existiert in FFGFT nicht; die vergleichbare Observable ist das geometrische Rotverschiebungsgesetz (fraktale Wegverlängerung, vgl. Dok. 041/182), kein w-Parameter.

B.6 H_0 als Projektions-Artefakt, nicht als Übersetzungsgröße

Keine direkte ξ-H_0-Brücke – aber eine Kette über $\hbar c$

Die Opposition zur holografischen Dunklen Energie verlockt zu der Frage, ob man FFGFTs ξ und den ΛCDM-Parameter H_0 *ineinander übersetzen* könne. Eine *direkte* Gleichsetzung $\xi/L_0 = H_0/c$ scheitert – aber nicht, weil Energie und Länge unvereinbar wären. In natürlichen Einheiten ($\hbar = c = 1$) sind Länge und Energie dual; der Übergang zu SI-Metern ist genau ein Umrechnungsfaktor ($\hbar c = 1{,}973 \times 10^{-7}$ eV m), und in FFGFT sind $\hbar, c$ ohnehin SI-Konversionsfaktoren, keine ontologischen Primitive. Der Fehler der naiven Brücke liegt nicht in der Energie-Längen-Dualität, sondern in der *Skalenwahl*: Sie koppelt ξ an die Sub-Planck-Granulierung $L_0 = \xi \ell_P \approx 2{,}2 \times 10^{-39}$ m, statt an die kosmologische Skala $R_H \approx 1{,}4 \times 10^{26}$ m. Beide Längen sind über $\hbar c$ korrekt in Energien überführbar – es sind nur *verschiedene* Skalen (Verhältnis $R_H/L_0 \approx 6{,}5 \times 10^{64}$, das jedoch an gemessenen H_0 kalibriert ist, nicht allein aus ξ folgt).

Die korrekte Übersetzungskette: $\hbar c$ als SI-Faktor

Über $\hbar c$ schließt sich die Kette tatsächlich (Dok. 182):

$$\xi \;\longrightarrow\; E_H = E_0\,\xi^{41/4} \;\xrightarrow{\times \hbar c}\; R_H = \frac{\hbar c}{E_H} \;\longrightarrow\; H_0 = \frac{c}{R_H} = \frac{E_H}{\hbar}.$$

Mit $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}} = 7{,}398$ MeV ergibt das $E_H = 1{,}412 \times 10^{-33}$ eV, $R_H = 1{,}398 \times 10^{26}$ m und $H_0^{T0} \approx 66{,}2$ km/s/Mpc ($-1{,}9\%$ vom Planck-Wert). Der Exponent $41/4$ ist dabei nicht aus ξ hergeleitet, sondern an den gemessenen H_0 kalibriert; die Kette zeigt die Form

der Übersetzung, ihr Zahlenwert ist keine Vorhersage. Hier ist $\hbar c$ präzise der SI-Umrechnungsfaktor, der die Energie-Darstellung (E_H) in die Längen-Darstellung (R_H) überführt – genau die Größe, die du erwartest, wenn Länge in natürlichen Einheiten als Energie lesbar ist. Die Kette verknüpft also die Energie E_H *und* – über $\hbar c$ – die zugehörige Länge; nur eben die *kosmologische* Länge R_H, nicht die Sub-Planck-Länge L_0.

Der Mechanismus: H_0 ist eine fehlgedeutete Steigung

Diese Kette ist zugleich die *Erklärung* von H_0 als Artefakt – konsistent mit der Projektions-Lesart der Holografie. Der Mechanismus: Für kleine z ist die fraktale Wegverlängerung linear, $z(d) = \kappa d$ mit $\kappa = E_H/(\hbar c)$. Ein Beobachter im Expansionsbild liest dieselbe lineare $z(d)$-Kurve und *tauft* ihre Steigung H_0/c. Damit ist

$$H_0^{(\text{gemessen})} = \kappa c = E_H/\hbar,$$

d. h. H_0 ist kein dynamischer Expansionsparameter, sondern der als Expansion fehlinterpretierte *geometrische Koeffizient* der Wegverlängerung. Das Artefakt ist die *Umdeutung einer Steigung*, kein Messfehler. Die Übersetzungskette $\xi \to E_H \to R_H \to H_0$ existiert also durchaus – sie zeigt nur, dass die übersetzte Größe geometrisch ist, nicht dynamisch. Jenseits der Maximalskala R_H gilt $z \to \infty$; ein Teilchenhorizont im ΛCDM-Sinn ist nicht nötig.

H_0 ist emergent, nicht fundamental

Entscheidend ist, wo H_0 ontologisch sitzt: Es ist *keine fundamentale Konstante* der Theorie. In der kompaktifizierten T^4-Form gibt es kein H_0 – es gibt dort weder kosmologische Strecken noch ein als Medium durchlaufenes Vakuum, und $\hbar, \varepsilon_0$ werden erst bei der Dekompaktifizierung „real" (Dok. 262). Da $H_0 = E_H/\hbar$ dieses erst dann reale $\hbar$ enthält, ist H_0 eine *emergente* Größe der dekompaktifizierten Beschreibung – ebenso wie Alter, kritische Dichte und Hubble-Länge *Friedmann-Konzepte ohne direktes T0-Gegenstück* sind (Dok. 016). Fundamental ist allein ξ; H_0 entsteht erst beim Übergang kompakt → dekompaktifiziert. Der krumme Exponent $41/4$ ist Ausdruck genau dieses Skalenübergangs (Skalenfluss über ~ 40 Größenordnungen), keine reine Geometrie-Konstante; eine zwanghafte Ganzzahl-Deutung würde eine emergente Übergangsgröße fälschlich in die kompakte Geometrie zurückzwingen.

Dasselbe gilt für z selbst: echte Sicht, Fehldeutung, Übersetzung

Die Umdeutung betrifft nicht nur die Steigung H_0, sondern den gesamten z-Wert – und hier lohnt die saubere Dreiteilung.

Modellneutral (real): Gemessen wird ein Wellenlängenverhältnis, $1 + z_{\text{obs}} = \lambda_{\text{beob}}/\lambda_{\text{emit}}$. Diese Größe ist beobachtbar und in beiden Bildern dieselbe; sie ist kein Artefakt.

Echte FFGFT-Sicht: z_{obs} ist die kumulierte *fraktale Wegverlängerung* des Photons über die physische Strecke d, $z_{\text{obs}} = (L_{\text{eff}} - d)/d$ (Dok. 026). Kein Skalenfaktor, keine

Expansion, keine Zeitentwicklung des Raumes – eine rein geometrische Weglängen-Relation im statischen T^4.

Die Fehldeutung (ΛCDM): Dasselbe z_{obs} wird als *Expansions*-Rotverschiebung gelesen, also als kosmologischer Skalenfaktor $1 + z = a_0/a_{\text{emit}}$. In dieser Lesart wird die lineare Anfangssteigung zu H_0 und ein großer Wert wie $z \approx 1100$ zum „Entkopplungs"-Zeitpunkt einer Rekombination. Beides ist die Expansionsdeutung *derselben* geometrischen Wegverlängerung – nicht eine zweite, unabhängige Messung (vgl. P15/R15, Dok. 190; die statische Theorie kennt kein kosmologisches z im Expansionssinn).

Übersetzbar: Die beiden Sichten sind ineinander überführbar, weil sie *dieselbe* $z_{\text{obs}}(d)$-Kurve beschreiben. H_0 ist die Steigung bei kleinem z, $z \approx 1100$ ein Extremwert nahe der Maximalskala R_H; beide sind ΛCDM-Lesarten der einen FFGFT-Geometrie (der FFGFT-eigene Wert dieses Extremwerts ist $z_* \approx 875$, Dok. 267; $z \approx 1089/1100$ ist allein die Expansionsdeutung, nicht der FFGFT-Wert). Die Übersetzung ist daher eine *Umdeutung der Kurve*, keine physikalische Identität von Parametern: real ist z_{obs}, Artefakt ist allein seine Expansionsdeutung.

Einordnung und offener Punkt

Dies ist genau die Auflösung der scheinbaren Dunkle-Energie-Opposition: Es *gibt* eine Übersetzung – die Kette $\xi \to E_H \to R_H = \hbar c/E_H \to H_0$ –, aber keine *direkte* $\xi \leftrightarrow H_0$-Identität auf Sub-Planck-Skala (die deren Pipeline-Charakter verschleierte und der stehenden Mahnung widerspräche). Die modellneutrale gemeinsame Größe bleibt die Observable $z(d)$: gleiche Kurve, zwei Mechanismen, bei großem z unterscheidbar. **Einordnung:** Der Exponent $41/4$ beschreibt den *Skalenübergang* von der charakteristischen Energie E_0 zur Hubble-Energie E_H (Dok. 026/182, Rekursion R Dok. 203). Zwei Dinge sind dabei zu trennen: (i) Die *Struktur* der Kette $\xi \to E_H \to R_H \to H_0$ ist belegt und konsistent – H_0 ist darin ein geometrischer, als Expansion fehlgedeuteter Koeffizient, kein dynamischer Parameter; $\hbar$ wirkt nur als SI-Umrechnung ($H_0 = E_H/\hbar$), nicht als physikalische Eingabe (vgl. Abschnitt „Konstanten als Projektionsfaktoren"). (ii) Der *Zahlenwert* des Exponenten $41/4$ ist nicht aus der ξ-Feldtheorie hergeleitet, sondern an den gemessenen H_0 kalibriert; auch der Exponent der einheitenfreien ganzzahligen Form $n = 10$ (Dok. 165) ist nicht vorwärts abgeleitet. Der H_0-Zahlenwert ist daher die eine externe Eingabe des kosmologischen Sektors – ein gemeinsamer empirischer Bezugspunkt beider Modelle, kein Konsistenzargument und kein Kern-Ergebnis. Die *Deutung* (H_0 als Projektions-Artefakt) hängt nicht an (ii) und steht unabhängig davon.

B.7 Konstanten als Projektionsfaktoren – und die Vakuumenergie

Die H_0-Lesart ist Spezialfall eines allgemeineren Prinzips, das sich über mehrere Größen hinweg zeigt und die holografische Projektions-Idee quantitativ stützt. Es lässt sich in vier Schritten ausführen; alle vier sind als kurze Rechnungen reproduzierbar und unten als Reduktionsschicht gekennzeichnet.

1. Die „Konstanten“ begründen nichts – sie rechnen um

In natürlichen Einheiten ($\hbar = c = 1$, reine Verhältnisse) ist die FFGFT-Beschreibung statisch und korrekturfrei (Layer 1, Dok. 261). Die Größen c, $\hbar c$ und $\sqrt{\hbar G/c^5}$ sind keine physikalischen Eingaben, sondern *Umrechnungsfaktoren* der SI-Projektion (Layer 2):

- c ist der Meter/Sekunde-Faktor, der entsteht, wenn die in Layer 1 identischen Größen Länge und Zeit ($\tilde{T} \cdot m = 1$) in getrennte Einheiten projiziert werden (Dok. 134: $c = L/T$, „kein Naturgesetz, sondern Verhältnis“). Der Zahlenwert $299\,792\,458$ ist die Meter-Definition, keine ξ-Vorhersage.
- $\sqrt{\hbar G/c^5}$ begründet keine Zeitskala, sondern drückt die bereits feststehende Skala in Sekunden aus (reine Einheiten-Kalibrierung).
- Selbst G folgt c-frei aus ξ: $G_{\text{nat}} = \xi^2/(4m_{\text{char}})$ (Dok. 012/013); $c, \hbar$ treten erst bei der SI-Umrechnung hinzu.

2. Die Vakuumstruktur ist kompaktifiziert vollständig vorhanden

Die Modenstruktur (ξ/L_ξ^4, fraktale Modenabzählung bei $d = 3 + \delta$, Dok. 091) ist in Layer 1 *vollständig vorhanden* – nur einheitenlos. Es kommt bei der Dekompaktifizierung *nichts hinzu*: dieselbe Struktur erscheint in Layer 2, multipliziert mit dem Umrechnungsfaktor $\hbar c$, als dimensionsbehaftete Energiedichte $\rho_{\text{vac}} = \xi \hbar c / L_\xi^4$ (Form aus Dok. 091/025). Die Vakuumenergie *entsteht* also nicht – sie wird aus SI-Sicht nur *sichtbar* durch die Dekompaktifizierung der zuvor eingerollten fraktalen/zeitlichen Struktur.

3. Kein statischer Energie-Sockel: die Energie ist dynamisch

Dass es keine *eigenständige* (statische) Vakuumenergie gibt, folgt rechnerisch aus der Energiefeld-Lagrangedichte $\mathscr{L} = \xi(\partial_\mu E)(\partial^\mu E)$ mit Feldgleichung $\Box E = 0$ (masselos, kein Potentialterm $V(E)$, Dok. 010). Der kanonische Energie-Impuls-Tensor liefert

$$T_{00} = \xi\left[(\partial_t E)^2 + (\nabla E)^2\right].$$

T_{00} enthält *keinen* statischen Term. Schaltet man die zeitliche Komponente ab ($\partial_t E = 0$) und fordert eine quellenfreie Vakuumlösung ($\Box E = 0 \Rightarrow \nabla^2 E = 0 \Rightarrow E = \text{const}$), so ist $T_{00} = 0$. Die Vakuumenergie ist damit vollständig an die zeitliche (und, bei Randbedingungen wie beim Casimir-Effekt, räumliche) *Variation* des Feldes gebunden – kein Eigenwert eines ruhenden Feldes, sondern Ausdruck der Dynamik. Das *freie* Vakuum hat keinen Raumanteil; das *eingeschränkte* (Casimir) hat einen, konsistent mit der Frei-gegen-Eingeschränkt-Unterscheidung in Dok. 091.

4. Abgrenzung: Relationen mit ξ allein

Ohne Fit-Faktoren und zirkuläre Exponenten kommen die Größen aus, in denen ξ *allein* steht: $T_{\text{CMB}} = \frac{16}{9}\xi^2 E_\xi$ und $|\rho_{\text{Casimir}}|/\rho_{\text{CMB}} = \pi^2/(720\xi) \approx 102{,}8$. Beide sind jedoch

keine Belege: Die T_{CMB}-Relation stimmt nur in der Energieeinheit eV, und das Casimir-Verhältnis ist eine Identität, weil L_ξ aus der gemessenen CMB-Energiedichte bestimmt wird.

Klarstellung zur Natur dieser T_{CMB}-Relation. Sie ist eine *algebraische* ξ-Relation, *keine fraktale Korrektur*: Der Faktor $16/9$ ist schlicht $(4/3)^2$, das Quadrat des Zahlenvorfaktors von $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ (vgl. Dok. 025/028/006); $D_f = 3 - \xi$ und eine Modenabzählung mit fraktaler Dimension treten in dieser Herleitung *nicht* auf. Die *Verhältnisaussage* $T_{\mathrm{CMB}}/E_\xi = (16/9)\xi^2$ ist damit einheitenlos (Layer 1); ihre Übereinstimmung mit dem Messwert gilt jedoch nur in der Energieeinheit eV. Der absolute Kelvin-Wert $2{,}725\,\mathrm{K}$ folgt erst über die SI-Umrechnung (Embedding-Preis, Dok. 261); die dabei verbleibende Restabweichung von $\approx 0{,}9\%$ (Dok. 013) ist *nicht* aus ξ hergeleitet. Eine Korrektur der Form $1 - C\xi$, die diese $0{,}9\%$ schließen würde, ist im Korpus nur als *numerische Näherung* vorhanden (etwa $C = 275/4$), nicht als Ableitung aus der Rekursion $\mathscr{R}$ (Dok. 203) – sie bleibt offen.

Das in Dok. 028 angegebene Verhältnis $\rho_{\mathrm{DE}}/\rho_{\mathrm{DM}} = \xi^{\ln(2{,}5)/\ln \xi}$ ist gesondert einzuordnen. Es ergibt für *jedes* ξ exakt $2{,}5$ und ist daher *als Vorhersage* zirkulär. Sein Zielwert $2{,}5$ ($\Omega_\Lambda/\Omega_{\mathrm{DM}}$) ist aber selbst keine modellneutrale Messung, sondern eine ΛCDM-Pipeline-Ausgabe. Liest man die Relation daher *nicht* als Vorhersage, sondern als *Umrechnungsfaktor* zwischen FFGFT-Geometrie und der ΛCDM-Ω-Buchhaltung – analog zu c (Meter/Sekunde) und zu z –, ist die zirkuläre Kalibrierung über $2{,}5$ zulässig. Allerdings *nur eingeschränkt*: anders als bei c, wo beide Seiten dasselbe reale Gegenstück haben, enthält die ΛCDM-Seite mit ρ_{DE} ein Modellartefakt (kein Λ in FFGFT); der Faktor übersetzt teils Reales (DM-Buchung $\leftrightarrow$ ξ-Effekt), teils ein Artefakt. Vgl. Dok. 190, P17.

Die *Deutung* ist damit klar: Dunkle Energie ist eliminiert (kein Λ, statisch); Dunkle Materie ist *keine Substanz*, sondern ein ξ-geometrischer Effekt – ein Artefakt der ΛCDM-Sicht, wie H_0 und z. *Quantitativ* offen bleibt allein die modellneutrale Reproduktion dessen, was ΛCDM als DM bucht (Ω_{DM}, Rotationskurven).

Status. Dieser Abschnitt ist Reduktionsschicht: Er macht ein in Dok. 261/262 belegtes Prinzip (Layer 1 korrekturfrei / Layer 2 SI-Projektion) für c, ρ_{vac} und die Dynamik explizit. Er sagt keinen neuen kosmologischen Zahlenwert vorher; die Zahlenwert-Zirkularität von L_ξ (aus ρ_{CMB} bestimmt) bleibt eine Grenze.

B.8 Eine formale Brücke zu UIFT – einseitig verifizierbar

Dasselbe Projektions-Bild liefert eine *formale* Brücke zur Informationsgröße ξ_{UIFT} aus Onur Tekers UIFT (Dok. 257). Sie ist hier nur einzuordnen, nicht zu behaupten: ihre Aussagekraft ist *asymmetrisch*.

Die Brücke beruht allein auf der *ersten Ordnung* $T_{\mathrm{CMB}}/E_\xi = (16/9)\xi$ (nicht auf der fraktalen Korrektur K_{frak} und nicht auf dem absoluten Kelvin-Wert). Abschnitt 4 schreibt dasselbe Verhältnis als $T_{\mathrm{CMB}}/E_\xi = (16/9)\xi^2$; beide Formen unterscheiden sich bei gleichem Symbol E_ξ um den Faktor ξ. Der unten angegebene Faktor entspricht $k_B T_{\mathrm{CMB}} = (16/9)\xi\,\mathrm{eV}$; mit dem gemessenen $T_{\mathrm{CMB}} = 2{,}7255\,\mathrm{K}$ ergäbe sich $418\,518$. Setzt

man die erste Ordnung in die UIFT-Relation $\xi_{\mathsf{UIFT}} = k_B T_{\mathsf{CMB}} \ln 2/(m_e c^2)$ ein, so ergibt sich ein *fester* Faktor

$$\frac{\xi_{\mathsf{FFGFT}}}{\xi_{\mathsf{UIFT}}} = \frac{m_e c^2/\mathrm{eV}}{(16/9)\ln 2} \approx 414\,684.$$

Dieser Wert ist kein empirisches Resultat, sondern ein reiner *Umrechnungsfaktor* zwischen einer Schicht-1-Größe (ξ_{FFGFT}, dimensionslos) und einer an die CMB-Temperatur gebundenen Schicht-2-Größe (ξ_{UIFT}); er fällt mit seiner geschlossenen Form zusammen.

Was damit verifiziert ist – und was nicht. Die *FFGFT-Seite* ist vollständig nachvollziehbar: ξ ist geometrisch, $(16/9)\xi$ folgt aus der Modenzählung, m_e aus der Leptonen-Hierarchie – jeder kann den Faktor nachrechnen. Die *UIFT-Seite* können wir *nicht* verifizieren: die Relation $\xi_{\mathsf{UIFT}} = k_B T_{\mathsf{CMB}} \ln 2/(m_e c^2)$ stammt aus Tekers Arbeit, und ob sie korrekt oder empirisch validiert ist, liegt außerhalb unseres Zugriffs. Die Brücke ist daher *formal*: *wenn* Tekers Relation gilt *und* die FFGFT-Werte gelten, *dann* verknüpft ein fester Faktor beide Größen. Verifiziert ist damit die FFGFT-Seite der Brücke – nicht die UIFT-Seite.

B.9 Zusammenfassung

- **Belegt:** FFGFT reproduziert die Flächenskalierung des Bekenstein-Hawking-Gesetzes aus Knotenzählung (Dok. 201; den Koeffizienten liefert die Zählung nicht); Information ist topologisch erhalten (Zugangs-, kein Existenzproblem); Masse als Skalenprojektion.
- **Offen (Reduktionsschicht):** Schlägt $D_f = 3 - \xi_0$ auf die Horizont-Fläche durch (Annahme B), ergibt sich ein Exponent $2 - \xi_0$ und eine logarithmisch wachsende Abweichung $-\xi_0 \ln(R/\ell_P)$ (Prozent-Niveau für reale SL). Wirkt D_f aufs Volumen (Annahme C), bleibt das Flächengesetz exakt. Die Wahl ist physikalisch zu treffen.
- **Rekonstruktion:** Die Projektion der Modus-Labels auf $\mathbb{R}$ ist nicht umkehrbar (Dok. 193) – veranschaulicht durch das physikalische Hologramm (Metapher): Rekonstruktion braucht Vorinformation und bleibt ein schwaches Abbild. Strikt getrennt vom Nichtabschluss-Theorem.
- **Verankerung:** Die Projektion ist am ξ-beschränkten Kern aufgehängt ($\rho \leq 1/\xi^2$, keine Singularität; Dok. 201) – wie $T \cdot m = 1$. Folge: Cutoff bei $R_{\mathsf{core}} \sim \ell_P/\xi$; unterhalb sättigt die Entropie, die $R^{2-\xi}$-Skalierung gilt nur darüber. Reale Löcher liegen weit darüber (Abweichung gültig). Erhaltene Information = geometrische Grundinformation, nicht die Vorgeschichte. Offen: keine exakte Übersetzungsgröße, nur eine Skalenverankerung.
- **Reversibilität:** Standard-Holografie *setzt* Umkehrbarkeit voraus (Unitarität + Rand); FFGFT *leitet* die Zeit-Asymmetrie ab (Dok. 157: $T \cdot m = 1$, Torus-Windung, D_f). Empirischer Anker der Gerichtetheit ist nur die praktische Erfahrung; unter dieser Prämisse ist die exakte Reversibilität ein Artefakt der unitären Idealisierung.
- **Spannung:** T^4 ist randlos (keine AdS/CFT-Dualität); kein Λ, kein w_{DE} (Opposition zur holografischen Dunklen Energie).

- H_0**-Artefakt:** Keine *direkte* $\xi \leftrightarrow H_0$-Gleichung auf Sub-Planck-Skala – die naive Form scheitert an der Skalenwahl ($L_0 = \xi \ell_P$ statt R_H), nicht an der Energie-Längen-Dualität (in nat. Einheiten sind beide über $\hbar c$ dual). Wohl aber existiert die Kette $\xi \to E_H = E_0 \xi^{41/4} \to R_H = \hbar c / E_H \to H_0 = E_H / \hbar$ ($\approx 66{,}2$ km/s/Mpc; Dok. 026/182), mit $\hbar c$ als SI-Faktor. H_0 ist damit ein geometrischer, als Expansion fehlgedeuteter Koeffizient; modellneutral bleibt die Observable $z(d)$. Der Exponent $41/4$ ist an den gemessenen H_0 kalibriert, nicht aus ξ hergeleitet.
- **Konstanten als Projektion:** c, $\hbar c$, $\sqrt{\hbar G / c^5}$ begruenden nichts, sie rechnen in SI um (Dok. 134/261). Die Vakuum- struktur ist kompaktifiziert vollstaendig da (einheitenlos), wird dekompaktifiziert nur SI-sichtbar. $T_{00} = \xi[(\partial_t E)^2 + (\nabla E)^2]$ (aus $\mathscr{L} = \xi(\partial E)^2$, $\Box E = 0$, Dok. 010) hat KEINEN statischen Term – ohne Feld-Variation ist $T_{00} = 0$: keine eigen- staendige Energie, die Energie kommt aus der zeitlichen Komponente.

Begriffliche Mahnung. „Holografisch“ ist in FFGFT im Sinne von *Flächengesetz + Skalenprojektion* zu verstehen, nicht im Sinne von *Randkodierung*. Diese Unterscheidung sollte in allen FFGFT-Texten explizit bleiben, um falsche AdS/CFT-Erwartungen zu vermeiden.

Kapitel C

Dok. 265 — Formalismus-Korrespondenz: FFGFT und Blume-Maleev

Zweck

Dieses Dokument liefert ein Arbeitsbeispiel für den strukturellen Vergleich physikalischer Formalismen, entwickelt für die Modell-Einordnungsarbeit der IPI-Gruppe. Das Beispiel verwendet zwei unabhängig hergeleitete mathematische Beschreibungen desselben experimentellen Systems – den ferrotoroidischen Quaternärspeicher $LiNi_{0.8}Fe_{0.2}PO_4$ (Qureshi et al. 2026) – um zu illustrieren, dass „Korrespondenz zwischen Formalismen“ keine einzelne Kategorie ist, sondern eine geschichtete Relation mit mindestens drei verschiedenen Ebenen.

Die zwei Beschreibungen sind:

- **Blume-Maleev-Polarisationsmatrix-Formalismus**: die Standard- Festkörperbeschreibung, vollständig und quantitativ korrekt, vollständig innerhalb etablierter experimenteller Physik entwickelt.
- **FFGFT (T^4-Torus-Geometrie)**: das geometrische Feldtheorie- Rahmenwerk, auf dasselbe System aus eigenen ersten Prinzipien angewendet, ohne Anleihen bei der Festkörperbeschreibung.

Keines der Rahmenwerke wurde im Hinblick auf das andere entwickelt. Die auftretenden Korrespondenzen sind daher strukturell informativ – sie zeigen, welcher mathematische Inhalt geteilt wird und welcher rahmenwerks-spezifisch ist.

C.1 Die drei Korrespondenzebenen

C.2 Der Vergleichsoperator – explizit gemacht

Die Drei-Ebenen-Klassifikation in Tabelle C.1 weist jede Korrespondenz einer Ebene zu. Bis hierher blieb jedoch *implizit*, *nach welchen Kriterien* diese Zuordnung erfolgt – welcher Operator entscheidet, ob ein Phänomen auf Ebene 1, 2 oder 3 fällt. Dieser

Tabelle C.1: Klassifikation der Korrespondenztypen zwischen Blume-Maleev- und FFGFT-Beschreibung des ferrotoroidischen Systems.

Ebene	Definition	Diagnosekriterium
1. Fast-Äquivalenz	Beide Formalismen drücken dasselbe mathematische Objekt aus, unabhängig aus verschiedenen Ausgangspunkten hergeleitet.	Die abstrakte Struktur (Gruppe, Operator, Invariante) ist identisch; nur Herleitungsweg und physikalische Interpretation unterscheiden sich.
2. Struktureller Überlapp	Dieselbe qualitative Struktur erscheint in beiden, aber der quantitative Inhalt wird nicht geteilt.	Ein Formalismus kann für das strukturelle Gerüst auf den anderen abgebildet werden, nicht aber für numerische Vorhersagen.
3. Komplementär	Jeder Formalismus erklärt etwas, das der andere nicht kann.	Keiner ist Teilmenge oder Erweiterung des anderen; die Vereinigung deckt mehr ab als jeder allein.

Abschnitt legt diesen Operator offen, sodass er prüfbar und bestreitbar wird statt auf Intuition zu beruhen.

Die sechs Vergleichsachsen

Zwei Formalismen werden entlang von sechs unabhängigen Achsen verglichen. Auf jeder Achse ist der Inhalt entweder *geteilt* (beide Formalismen liefern dasselbe) oder *nicht geteilt*:

1. **Geteilte Invarianten**: Erzeugen beide dieselben Erhaltungsgrößen / topologischen Invarianten? (z. B. die erhaltene Windungs-/Domänenzahl)
2. **Geteilte Operatoren**: Tritt dieselbe abstrakte Operatorstruktur auf? (z. B. dieselbe Gruppe $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$, dieselbe Transformationsregel)
3. **Geteilte mathematische Strukturen**: Teilen beide das qualitative Gerüst – antisymmetrische Kopplung, Projektionsfaktor – auch wenn die Zahlenwerte abweichen?
4. **Geteilte Vorhersagen**: Liefern beide für dasselbe Experiment denselben *quantitativen* Wert?
5. **Geteilte physikalische Mechanismen**: Schreiben beide das Phänomen *derselben* physikalischen Ursache zu?
6. **Geteilte Hardware-Implikationen**: Folgen aus beiden dieselben Konsequenzen für reale Bauelemente / Messungen?

Wie die Achsen die Ebenen definieren

Die Ebenenzuordnung ist keine Intuition, sondern liest sich direkt aus dem Muster der geteilten Achsen ab:

Tabelle C.2: Der Vergleichsoperator: welche Achsen auf welcher Ebene geteilt sind. ✓ = geteilt, × = nicht geteilt, ∼ = nur qualitativ geteilt.

Vergleichsachse	**Ebene 1** Fast-Äquiv.	**Ebene 2** Überlapp	**Ebene 3** Komplement.
1. Invarianten	✓	∼	×
2. Operatoren	✓	∼	×
3. Mathematische Struktur	✓	✓	×
4. Vorhersagen (quantitativ)	×	×	×
5. Physikalische Mechanismen	×	×	×
6. Hardware-Implikationen	×	×	×

Das Zuordnungskriterium lautet damit explizit:

- **Ebene 1 (Fast-Äquivalenz):** Achsen 1–3 voll geteilt – identische Invariante, identischer Operator, identische Struktur – bei verschiedenem Herleitungsweg. Achsen 4–6 bleiben getrennt. (Beispiele: $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$, $\mathscr{P}'' = 0$, topologische Ladung.)
- **Ebene 2 (Struktureller Überlapp):** Achse 3 geteilt (dasselbe qualitative Gerüst), Achsen 1–2 nur teilweise, Achsen 4–6 nicht. (Beispiele: antisymmetrischer Austausch, Dekompaktifizierungsprojektion.)
- **Ebene 3 (Komplementär):** Keine der Achsen 1–3 geteilt; jeder Formalismus deckt einen Bereich ab, den der andere nicht erreicht. (Beispiele: geometrische Notwendigkeit von $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ in FFGFT; materialspezifische Übergangstemperaturen in Blume-Maleev.)

Auffällig: Achsen 4–6 (quantitative Vorhersagen, physikalische Mechanismen, Hardware) sind in diesem Vergleich *auf keiner* Ebene geteilt. Das ist kein Mangel der Klassifikation, sondern ihr Hauptbefund: Blume-Maleev und FFGFT teilen mathematische *Struktur* (Achsen 1–3), aber nicht physikalische *Substanz* (Achsen 4–6). Genau das unterscheidet diese Korrespondenz von einer echten Äquivalenz (siehe Abschnitt zur Heisenberg/Schrödinger-Analogie).

Residuen: Grenzen des Operators

Der so explizit gemachte Operator ist selbst nicht vollständig ausgereift. Drei Residuen bleiben offen und werden hier deklariert, nicht verborgen:

- **Achsen-Vollständigkeit:** Sind sechs Achsen ausreichend, oder fehlen Dimensionen (z. B. geteilte Randbedingungen, geteilte Symmetriebrechungsmuster)? Die Liste ist ein Arbeitsstand, keine bewiesene Basis.
- **Achsen-Gewichtung:** Alle sechs Achsen werden hier gleichgewichtet. Ob eine geteilte Invariante (Achse 1) schwerer wiegen sollte als eine geteilte Struktur (Achse 3), ist nicht entschieden.

- **Achsen-Unabhängigkeit:** Die Achsen sind als unabhängig behandelt, sind es aber möglicherweise nicht – eine geteilte Operatorstruktur (Achse 2) impliziert oft eine geteilte Invariante (Achse 1). Die Korrelationsstruktur der Achsen ist nicht analysiert.

Diese Residuen ändern die Ebenenzuordnung im vorliegenden Fall nicht (das Muster in Tabelle C.2 ist robust), markieren aber, wo der Operator selbst weiter zu prüfen ist. Der Wert der Explizitmachung liegt gerade darin: ein zuvor implizites, aber tragendes Kriterium wird zu einem prüfbaren Objekt – inspizierbar statt überzeugend.

C.3 Ebene 1 – Fast-Äquivalenzen

Die $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$-Domänenstruktur

In Blume-Maleev: Die vier magnetischen Domänen sind durch zwei Symmetrieoperationen des Kristalls verknüpft: Zeitumkehr $1'$ (bildet $a \leftrightarrow b$ ab, der ferrotoroidische Flip) und die zweizählige Schraubenachse $2_1 \| y$ (bildet $' \leftrightarrow ''$ ab, der Orientierungsflip). Zusammen erzeugen diese eine $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$-Gruppenstruktur über den vier Domänen, hergeleitet aus der Kristallsymmetriegruppe $P1121/a'$.

In FFGFT: Der T^4-Torus hat zwei unabhängige binäre Freiheitsgrade für geschlossene Windungsschleifen: die zeitliche Windungsrichtung ($\pm\tilde{T}$, ob die Schleife im oder gegen den Uhrzeigersinn in der kompakten Zeitrichtung windet) und die räumliche Windungsparität ($\pm c$, die zwei möglichen Orientierungen der Windungsebene im beobachtbaren 3D-Unterraum). Diese erzeugen dieselbe $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$-Gruppenstruktur über den vier Windungsklassen.

Bewertung: Dieselbe abstrakte Gruppe $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ wird aus zwei völlig verschiedenen Ausgangspunkten hergeleitet – Kristall- symmetrie auf der einen Seite, T^4-Kompaktifizierungsgeometrie auf der anderen. Das ist eine Fast-Äquivalenz: das mathematische Objekt ist dasselbe, die Herleitungswege sind unabhängig.

Was das nicht bedeutet: Das impliziert nicht, dass das Kristallgitter *ein* T^4-Torus *ist*, oder dass die FFGFT-Parameter den spezifischen Kristall beschreiben. Die geteilte Gruppenstruktur ist eine mathematische Tatsache darüber, wie sich binäre Symmetrien kombinieren – sie identifiziert nicht den zugrundeliegenden physikalischen Mechanismus.

Die $\mathscr{P}'' = 0$-Bedingung

In Blume-Maleev: Die allgemeine Polarisationstransformation ist $\mathbf{P}_f = \mathscr{P}'\mathbf{P}_i + \mathscr{P}''$. Für $LiNi_{0.8}Fe_{0.2}PO_4$ gilt $\mathscr{P}'' = 0$, weil die magnetischen Strukturformfaktoren rein imaginär sind: $\mathrm{Re}(NM^*_{\perp i}) = 0$ und $\mathrm{Im}(M_{\perp y}M^*_{\perp z}) = 0$. Dies folgt aus der antiferromagnetischen Head-to-Tail-Konfiguration.

In FFGFT: Der Rekursionsoperator $\mathscr{R}$ (Dok. 203) auf dem T^4-Modenraum zerfällt in einen rotatorischen Anteil (kohärente Modentransformation, Windungszahl erhalten) und einen Erzeugungsanteil (spontane Modengenerierung an T^4-Grenzknoten, Dok. 204). Im statischen T^4-Grundzustand – keine Expansion, keine Horizont-Dynamik – verschwindet der Erzeugungsanteil: $\mathscr{P}'' = 0$.

Bewertung: Beide leiten dasselbe Verschwinden des Erzeugungs-/ Vernichtungsterms aus einer „keine spontane Erzeugung"-Bedingung ab – im Kristall aus der antiferromagnetischen Symmetrie, in FFGFT aus der statischen Geometrie. Die mathematische Struktur ist dieselbe.

Erhaltung der topologischen Ladung

Im Paper: Der Speicher ist nichtflüchtig – Domänenpopulationen bleiben bei $E = H = 0$ nach der Feldkühlung stabil. Das Paper identifiziert dies als Konsequenz der Energiebarriere zwischen toroidalen Domänen.

In FFGFT: Ein Modus mit von Null verschiedener Windungszahl n kann nicht auf $n = 0$ zerfallen, ohne die Mindestenergie der T^4-Rand- bedingung zu überwinden (Dok. 204). Die Windungszahl ist eine topologische Invariante.

Bewertung: Beide beschreiben dasselbe mathematische Phänomen – eine diskrete topologische Invariante, geschützt durch eine Energiebarriere. Fast-Äquivalenz auf der Ebene des Erhaltungsgesetzes; verschiedene Mechanismen auf der Ebene des physikalischen Ursprungs.

C.4 Ebene 2 – Struktureller Überlapp ohne Äquivalenz

Antisymmetrischer Austausch und das Nichtabschluss-Theorem

In Blume-Maleev: Die Dzyaloshinskii-Moriya-Wechselwirkung ist $\mathscr{H}^{\mathrm{DM}} = \mathbf{D} \cdot (\mathbf{S}_1 \times \mathbf{S}_2)$, ungerade unter Spinaustausch (antisymmetrisch), mit $\mathbf{D}_{34} = -\mathbf{D}_{12}$ aus der Inversionssymmetrie.

In FFGFT: Das Nichtabschluss-Theorem (Dok. 193) besagt, dass Kreuzprodukte von Modenlabeln aus *verschiedenen* Windungsklassen topologisch unzulässig sind. Das antisymmetrische Kreuzprodukt $S_i \times S_j$ entspricht strukturell diesem Befund: es koppelt zwei Spinkomponenten (zwei verschiedene Windungsrichtungen) in einer Weise, die antisymmetrisch unter Vertauschung ist.

Bewertung: Die antisymmetrische Kreuzproduktstruktur wird geteilt. Aber die DM-Vektorkomponenten D^b und D^c sind materialspezifische Größen ohne FFGFT-Entsprechung. FFGFT kann sagen, dass die antisymmetrische Struktur topologisch eingeschränkt ist; es kann die spezifische DM-Vektor- orientierung oder -größe für diesen Kristall nicht vorhersagen.

Dekompaktifizierungsprojektion

In Blume-Maleev: Die Faktoren p_{fx}/p_{ix} messen, wie genau der Messapparat den Polarisationszustand auflöst.

In FFGFT: Die Dekompaktifizierungsprojektion (Schicht 1 zu Schicht 2, Dok. 001) misst den Anteil des einheitenlosen geometrischen Inhalts, der in der SI-projizierten Beschreibung beobachtbar wird.

Bewertung: Die Struktur – ein Projektionsfaktor, der zwischen dem abstrakten mathematischen Inhalt und der beobachtbaren Größe vermittelt – ist dieselbe in

beiden. Aber die spezifischen Projektionsfaktoren p_{fi} sind apparatur- und materialabhängige Zahlen; in FFGFT wird die Projektion durch $\xi = 4/30000$ und die SI-Einbettung bestimmt. Keine quantitative Abbildung.

C.5 Ebene 3 – Komplementär (Nicht-Überlappend)

Was FFGFT erklärt, was Blume-Maleev nicht erklärt

Der Blume-Maleev-Formalismus leitet die Vier-Domänen-Struktur aus der beobachteten Kristallsymmetrie ab. Er nimmt die Symmetriegruppe als gegeben und arbeitet die Konsequenzen aus. Er erklärt nicht, *warum* die relevante Symmetriegruppe $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ ist und nicht eine andere – das ist durch das spezifische Material bestimmt und wird dem Experiment entnommen.

FFGFT liefert eine geometrische Erklärung: $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ ist die *notwendige* Struktur für einen kompakten T^4-Torus mit je einer zeitartigen und einer raumartigen kompakten Richtung, die zur beobachtbaren Domänenklassifikation beitragen. Die Vier-Zustands-Struktur ist nicht kontingent auf das Material; sie ist eine Konsequenz der Topologie.

Was Blume-Maleev liefert, was FFGFT nicht liefert

Das Paper liefert, was FFGFT nicht kann: quantitative Vorhersagen für den spezifischen Kristall. Die Übergangstemperaturen $T_2 = 25\,\mathrm{K}$ und $T_4 = 21\,\mathrm{K}$, die Domänenpopulationsgrade (bis zu 90% Mehrheitsdomäne bei optimaler Feldkühlung), die DM-Vektorausrichtung (35° zur c-Achse), die Polarisationstensorelemente in Tabelle 1 – all das folgt aus den Materialparametern von $LiNi_{0.8}Fe_{0.2}PO_4$ und liegt außerhalb des FFGFT-Anwendungsbereichs.

C.6 Die Analogie: Warum nicht Heisenberg vs. Schrödinger?

Eine naheliegende erste Analogie für zwei Formalismen, die dieselbe Physik beschreiben, ist Heisenbergs Matrizenmechanik vs. Schrödingers Wellenmechanik (1925–26), die nachträglich als vollständig äquivalent bewiesen wurden (von Neumann 1932). Aber diese Analogie ist für den vorliegenden Fall zu stark.

Heisenberg und Schrödinger beschrieben *dieselben physikalischen Objekte* (Atome, Elektronen) auf *derselben Skala* mit *demselben Vorhersage- umfang*. Ihre Äquivalenz bedeutete, dass jede Vorhersage des einen auch eine Vorhersage des anderen war.

Die Blume-Maleev/FFGFT-Korrespondenz ist schwächer: die beiden Formalismen teilen mathematische Struktur auf Ebenen 1 und 2, operieren aber auf verschiedenen Skalen (Angström-Gitter vs. Sub-Planck-T^4), mit verschiedenem Vorhersageumfang (materialspezifisch-quantitativ vs. topologisch-strukturell) und verschiedenen Herleitungsgrundlagen.

Eine präzisere Analogie ist die Relation zwischen:

- Einer **Symmetriegruppen-Klassifikation** (z. B. Wigners Klassifikation von Teilchen durch irreduzible Darstellungen der Poincaré-Gruppe): liefert die Topologie, die Quantenzahlen, die Erhaltungsgesetze.
- Einer **Lagrange-Feldtheorie für ein spezifisches Teilchen** (z. B. QED für das Elektron): liefert alle quantitativen Vorhersagen für dieses spezifische Teilchen.

Die Gruppenklassifikation ist keine Teilmenge von QED, und QED ist keine Teilmenge der Wigner-Klassifikation. Sie sind komplementär: die Gruppe liefert die strukturelle Notwendigkeit (warum das Elektron existiert und Spin 1/2 hat); die Feldtheorie liefert die Dynamik (wie es wechselwirkt).

Blume-Maleev entspricht der Feldtheorie (quantitativ, materialspezifisch, dynamisch vollständig). FFGFT entspricht der Gruppenklassifikation (strukturelle Notwendigkeit, skalenunabhängig, topologisch erklärend). Der geteilte Inhalt auf Ebenen 1 und 2 ist der Schnitt – die topologische Struktur, die beide Beschreibungen enthalten müssen, weil sie eine Eigenschaft des physikalischen Systems ist, unabhängig vom verwendeten Formalismus.

C.7 Folgerungen für den Modellvergleich

Die Drei-Ebenen-Gliederung hat praktische Konsequenzen für den Vergleich von Rahmenwerken in der IPI-Gruppe:

1. **Ebene-1-Korrespondenzen sind am informativsten**: Wenn zwei unabhängig hergeleitete Formalismen dasselbe mathematische Objekt erzeugen (dieselbe Gruppe, dieselbe Invariante, dasselbe Erhaltungsgesetz), ist das Evidenz dafür, dass das Objekt ein echter struktureller Charakterzug des physikalischen Systems ist – kein Artefakt des Formalismus.
2. **Ebene-2-Korrespondenzen definieren das gemeinsame Vokabular**: Der strukturelle Überlapp zeigt, welche Konzepte zwischen Rahmenwerken übertragbar sind (antisymmetrische Kopplung, Projektionsfaktoren) und welche nicht.
3. **Ebene-3 definiert die echte Grenze**: Der exklusive Inhalt jedes Rahmenwerks markiert, wo das andere es nicht ersetzen kann. Das verhindert sowohl Übertreibung („mein Rahmenwerk erklärt alles, was das andere tut“) als auch Untertreibung („die Rahmenwerke haben nichts miteinander zu tun“).
4. **Volle Äquivalenz ist der Spezialfall, nicht der Standard**: Die Heisenberg/Schrödinger-Äquivalenz war ein bemerkenswertes Ergebnis, keine Vorlage. Die meisten Rahmenwerke, die strukturellen Inhalt teilen, sind durch partiellen Überlapp oder Komplementarität verknüpft, nicht durch Äquivalenz.

Referenz. Das als Testfall verwendete Ferrotoroidizitäts- Experiment: N. Qureshi et al., *Toroidizität als Weg zu nichtflüchtigem Quaternärspeicher in Antiferromagneten*, *Nature Communications* **17**, 4033 (2026). DOI: 10.1038/s41467-026-70767-8. Die FFGFT- Interpretation aller Formeln des Papers befindet sich in Dok. 264 dieser Reihe.

Kapitel D

Dok. 267 — Kosmologische Entartung: ΛCDM und FFGFT

Zweck und Kernthese

Dieses Dokument stellt die beiden kosmologischen Modelle – das ΛCDM- Standardmodell und FFGFT – in ihrer jeweiligen inneren Logik gegenüber. Die Kernthese lautet:

> Die wichtigsten kosmologischen Standardmessungen (Supernovae Typ Ia, baryonische akustische Oszillationen, CMB-Temperatur) sind *entartet*: Sie können prinzipiell nicht zwischen einer physikalischen Bewegung des Raumes (ΛCDM) und einer intrinsischen, nicht-linearen Entfaltung der Zeitmetrik (FFGFT) unterscheiden – solange beide Modelle dieselbe Abstands-Rotverschiebungs-Beziehung $z(d)$ erzeugen.

Diese Aussage ist keine Behauptung der Überlegenheit von FFGFT. Sie ist eine methodische Feststellung: Die Daten allein entscheiden nicht zwischen den Modellen. Die Entscheidung verlagert sich auf die Ebene der theoretischen Konsistenz, der Parameteranzahl und der Ableitbarkeit aus ersten Prinzipien.

D.1 Die zwei Modelle in ihrer Grundstruktur

Die invertierte Anfangsbedingung

Der fundamentale Unterschied liegt nicht in den Vorhersagen, sondern in der Richtung der Entwicklung:

Phase	ΛCDM (Standardmodell)	FFGFT
Anfang	Singularität, Urknall, extrem heiß und dicht, Zeit vergeht schnell	Minimale Länge $L_0 = \xi \cdot \ell_P$, fast kompaktifiziert, konzentriert aber kalt, Zeit vergeht extrem langsam
Entwicklung	Metrische Expansion des Raumes + Abkühlung	Fraktale Entfaltung der Zeit → scheinbare Expansion
Heute	Expandiert, kalt, beschleunigt durch dunkle Energie (Λ)	Scheinbar expandiert, stationärer Quanten-Grundzustand, scheinbar beschleunigt durch nichtlineare Zeitrekursion

Die beiden Richtungen sind vollständig invertiert:

- ΛCDM: *heiß und schnell → kalt und beschleunigt*
- FFGFT: *kalt und langsam → scheinbar warm und beschleunigt* (durch Zeitentfaltung)

Die Temperatur in beiden Bildern

In ΛCDM ist die heutige CMB-Temperatur ($\approx 2{,}7\,\mathrm{K}$) der abgekühlte Überrest einer heißen Frühphase. In FFGFT ist sie kein Überbleibsel, sondern ein stationärer Gleichgewichtswert aus der ξ-Feld-Quantisierung (Dok. 025): die Strahlung kühlt nicht ab, sie ist ein inhärentes Merkmal des Vakuums im Gleichgewicht.

In FFGFT ist die anfängliche Konzentration *topologisch* (Windungszahlen nahe beieinander), nicht *thermodynamisch* (heiß). Es gibt keine kinetische Energie in großem Maßstab am Anfang, daher keine hohe Temperatur. Das ist die konsequente Umkehrung der ΛCDM- Anfangsbedingung.

D.2 Die kosmologische Entartung – drei Beispiele

Supernovae Typ Ia und die Lichtkurven-Dehnung

Das Signal: Die Messdaten zeigen $b \approx 1$: eine ferne Supernova läuft für uns langsamer ab (Lichtkurve gedehnt), und ihr Licht ist rotverschoben.

ΛCDM: Der Raum dehnt sich während des Photonenflugs metrisch aus. Das streckt die Wellenlänge (Rotverschiebung) und zieht die Signaldauer auseinander (Zeitdilatation).

FFGFT: Keine Raumexpansion. Aber die fraktale Zeitentfaltung verlängert den Pfad, den das Signal durch die Geometrie zurücklegt. Diese geometrische Wegverlängerung dehnt Wellenlänge und Pulsdauer im exakt selben Verhältnis – daher ebenfalls $b = 1$.

Die Ununterscheidbarkeit: Beide Mechanismen liefern exakt dieselbe mathematische Kurve. Die Supernova „weiß" nicht, ob der Raum gewachsen ist oder ob sich die

Zeit fraktal entfaltet hat. Der DES-Wert $b = 1{,}003 \pm 0{,}011$ schließt ein *nicht-dilatierendes* statisches Modell ($b = 0$) bei $\sim 90\sigma$ aus – aber FFGFT sagt $b = 1$ voraus, nicht $b = 0$. FFGFT ist daher von diesem Test nicht betroffen.

Baryonische akustische Oszillationen und die Winkelskalen

Das Signal: Man misst den Winkelabstand $\theta(z)$ von Galaxienclustern.

ΛCDM: Der scheinbare Winkel ändert sich, weil der Skalenfaktor $a(t)$ wächst und die dunkle Energie diese Expansion beschleunigt.

FFGFT: Die scheinbare Beschleunigung ist das Resultat der nicht-linearen zeitlichen Rekursion. Da sich die effektive Zeitrate pro Distanzschritt ändert, krümmt sich die $z(d)$-Relation genau so, als gäbe es eine beschleunigte Expansion.

Die Ununterscheidbarkeit: Solange die FFGFT-Zeitentwicklung dieselbe $z(d)$-Beziehung erzeugt, liefert sie dieselben Winkel am Himmel. Die BAO-Daten enthalten keinen Marker, der sagt, welcher Mechanismus die Kurve erzeugt hat.

Wichtige Einschränkung (P20): Der BAO-Test verwendet D_M/r_s, wobei $r_s \approx 147$ Mpc unter ΛCDM-Annahmen berechnet wurde. Onurs $\Delta\chi^2 \approx 138$ vergleicht eine logarithmische Distanzformel gegen ΛCDM-Pipeline-Daten – also Modell gegen Modell, nicht Theorie gegen rohe Natur.

Der kosmische Mikrowellenhintergrund und die Akustikpeaks

Das Signal: Ein nahezu perfektes Schwarzkörperspektrum bei $\approx 2{,}7$ K mit winzigen Temperaturschwankungen und einem charakteristischen Winkelleistungsspektrum mit Akustikpeaks bei $\ell \approx 200$, 500, 800, ...

ΛCDM: Hydrodynamische Schallwellen im Urplasma

In den ersten ≈ 380.000 Jahren nach dem Urknall bildeten Elektronen, Protonen und Photonen ein vollständig ionisiertes, undurchsichtiges Photon-Baryon-Fluid. In diesem Medium breiteten sich Schallwellen aus, angetrieben durch den Wettbewerb zweier Kräfte:

- **Gravitation (Kompression):** Regionen mit geringfügig höherer Dichte ziehen Materie an, die Dichte steigt.
- **Strahlungsdruck (Rarefaktion):** Je dichter das Fluid komprimiert wird, desto stärker steigt der thermische Strahlungsdruck, der schließlich die Gravitation überwindet und das Plasma nach außen treibt.

Bei der *Rekombination* ($T \approx 3000$ K) verbanden sich Elektronen und Protonen zu neutralem Wasserstoff. Die Photonen entkoppelten schlagartig – die Schallwellen wurden eingefroren, ihr Muster als Temperaturschwankung im CMB fixiert.

Die Peaks:

- **1. Peak ($\approx 1^\circ$):** Regionen, die seit dem Urknall exakt einmal maximale Kompression erreicht hatten.
- **2. Peak:** Regionen im Zustand maximaler Rarefaktion (ein halber Zyklus).
- **3. Peak:** Regionen bei zweiter maximaler Kompression.

Die Positionen und Amplituden der Peaks hängen hochempfindlich von den kosmologischen Parametern ab: das Baryon-zu-Photon-Verhältnis, die Dunkle-Materie-Dichte, und die Geometrie des Raumes (flach bei $\approx 1^\circ$ für den ersten Peak). ΛCDM erklärt diesen Datensatz mit außerordentlicher mathematischer Präzision.

FFGFT-Ansatz: Diskrete Gitterresonanzen (strukturell plausibel, quantitativ offen)

FFGFT hat keine heiße Frühphase, kein Photon-Baryon-Plasma, keine Rekombination. Die CMB-Temperatur ist der stationäre Quanten-Grundzustand des Φ-Feldes (Dok. 025). Die Akustikpeaks müssten durch diskrete T^4-Gitterresonanzen entstehen – analog zu Emissionsspektren eines Atoms oder Phonon-Dispersionskurven in einem Kristall.

Das Verhältnis $(\lambda_e/L_0)^{1/\ln(1/\xi)}$ mit der reduzierten Compton-Wellenlänge λ_e und $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ liefert numerisch:

$$\left(\frac{\lambda_e}{L_0}\right)^{1/\ln(1/\xi)} = \left(\frac{3{,}86 \times 10^{-13}}{2{,}16 \times 10^{-39}}\right)^{1/8{,}92} \approx 875.$$

Dieser Wert liegt in der richtigen Größenordnung nahe der ΛCDM-Rekombination ($z \approx 1089$). **Einschränkung (P20):** Der Exponent $1/\ln(1/\xi)$ in der Potenz ist nicht aus den vorliegenden FFGFT-Dokumenten hergeleitet; seine Begründung aus der T^4-Geometrie steht aus. z_* ist daher derzeit ein *Referenzwert* in der richtigen Größenordnung, kein abgeleitetes FFGFT-Resultat.

Aspekt	**ΛCDM**	**FFGFT-Ansatz**
Peak-Ursprung	Plasma-Schallwelle, eingefroren	T^4-Gitterresonanz
Peak-Positionen	Schallhorizont r_s	Torus-Eigenmoden r/L_{tor}
Peak-Amplituden	Baryon/Photon-Verhältnis	Bose-Einstein-Besetzung

D.3 Die Peak-Struktur aus reiner Geometrie

Es stellt sich die grundsätzliche Frage: Welche Peak-Struktur erzeugt die reine T^4-Geometrie – ohne Medium, ohne Plasma, ohne den Versuch, ΛCDM-Werte zu treffen?

Akustische Resonatoren sind exakt berechenbar, und ihre Eigenmoden-Verhältnisse hängen *nur von der Geometrie* des Resonators ab, nicht vom Medium:

Resonator	**Moden-Verhältnisse**
Rohr (beide Enden gleich) / Kugel (j_0)	$1 : 2 : 3 : 4 : 5$ (harmonisch)
Halboffenes Rohr	$1 : 3 : 5 : 7 : 9$ (ungerade)
Kreismembran (J_0-Nullstellen)	$1 : 2{,}30 : 3{,}60 : 4{,}90$
T^4-Wicklungsmoden (alle)	$1 : 1{,}41 : 1{,}73 : 2 : \ldots$ (zu dicht)
T^4-dominant. Peaks $\lvert n\rvert^2 = 3, 18, 42, 78$	$1 : 2{,}45 : 3{,}74 : 5{,}10$ ($\Delta < 2\%$)
CMB beobachtet	$1 : 2{,}44 : 3{,}68 : 5{,}09 : 6{,}56$

Die Peak-Struktur ist durch die *Geometrie* des Resonanzraums bestimmt, nicht durch das Medium. ΛCDM: Resonanzraum = Schallhorizont im Plasma. FFGFT: Resonanzraum = T^4-Torusgeometrie. Beide können dieselbe Serie erzeugen, wenn die effektive Resonatorgeometrie gleich ist.

Konkrete T^4-Rechnung. Das thermisch gewichtete Spektrum $I(r) = g(r)\cdot\langle N(r)\rangle\cdot r$ mit Bose-Einstein-Besetzung $\langle N\rangle = 1/(e^r - 1)$ und Jacobi-Entartung $g(r)$ hat lokale Maxima bei $\lvert n\rvert^2 = 3, 6, 10, 14, 18, \ldots$ Die Verhältnisse $\ell \propto \sqrt{\lvert n\rvert^2}$ der dominanten Peaks $\lvert n\rvert^2 = 3, 18, 42, 78$ (alle echte lokale Maxima) treffen die CMB-Serie:

$$\sqrt{3} : \sqrt{18} : \sqrt{42} : \sqrt{78} = 1 : 2{,}449 : 3{,}742 : 5{,}099 \quad \text{vs.} \quad 1 : 2{,}441 : 3{,}682 : 5{,}091 \ \text{(CMB)}.$$

Abweichung $< 2\%$ ohne freien Parameter in den Verhältnissen; der Faktor 3 ist gesetzt und die Peak-Selektion offen (siehe unten).

Der Faktor 3 ist eine Setzung. Die Peaks $3, 18, 42, 78$ sind genau $3 \cdot \{1, 6, 14, 26\}$. Eine räumliche Projektion der T^4-Mode $\vec{n} = (n_1, n_2, n_3, n_4)$ kann diesen Faktor nicht erzeugen, denn $n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 \le \lvert n\rvert^2$; für $(1, 1, 1, 0)$ ist schon $\lvert n\rvert^2 = 3$, die Mode gehört also nicht zu $\lvert n\rvert^2 = 1$. Die Verhältnisse $\sqrt{3} : \sqrt{18} : \sqrt{42} : \sqrt{78}$ hängen vom Faktor nicht ab. Die Rechnung und die Abgrenzung (die Peak-Selektion ist offen, ebenso der strenge Selektionsmechanismus über die sphärische C_ℓ-Projektion, P30) stehen in Dok. 268, Schritt 8–9.

Zwei Filter erzeugen die Peak-Struktur. Die beobachteten diskreten, scharfen CMB-Peaks folgen aus zwei zusammenwirkenden Eigenschaften desselben vollständigen T^4 – gesehen aus zwei Bezugspunkten:

- **Filter 1 – Kompaktheit (das T^4 als Ganzes, von außen):** Ein kompakter (endlicher) Raum erzeugt ein *diskretes* Modenspektrum; ein unendlich-offener Raum hätte ein kontinuierliches – keine scharfen Peaks. Dieser Filter erzwingt die *Existenz* diskreter Peaks.
- **Filter 2 – fraktale Struktur (von innen, dekompaktifiziert):** Die fraktale Granulierung ($D_f = 3 - \xi$, Jacobi-Entartung der Vier-Quadrate-Summe und Bose-Einstein-Gewichtung) gewichtet die diskreten Moden ungleich. Erst dadurch entstehen die *dominanten* Peaks bei $\lvert n\rvert^2 = 3, 6, 10, 14, \ldots$ statt eines gleichförmigen Gitters. Dieser Filter erzwingt die *Lage* der Peaks.

Beide Filter sind keine zwei verschiedenen Objekte, sondern zwei Bezugspunkte auf dasselbe vollständige T^4: von außen kompakt-endlich (Filter 1, diskrete Moden), von innen fraktal-granuliert bis zur Untergrenze $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ (Filter 2). Die fraktale

Ungeschlossenheit ist damit keine *zweite*, der Kompaktheit widersprechende Eigenschaft, sondern die Innenansicht desselben geschlossenen Torus – eine Bezugspunkt-Angelegenheit (Innen/Außen, P20). Erst beide Filter zusammen geben die beobachtete CMB-Serie; die diskreten Peaks sprechen daher *für* den kompakten T^4 und *gegen* ein rein-unendlich-offenes Universum.

Ehrliche Abgrenzung: Dieser Schluss ist FFGFT-intern. Die Peaks *zwingen* die Raumkompaktheit nicht – ΛCDM erzeugt dieselben diskreten Peaks aus einer *zeitlichen* Schranke (dem Schallhorizont bei Rekombination) in einem räumlich unendlichen Universum. Das ist die kosmologische Entartung: die Peaks allein unterscheiden räumliche Kompaktheit (FFGFT) und zeitliche Schranke (ΛCDM) nicht.

D.4 Peak-Verhältnisse und absolute Skala

Verhältnisse: kein freier Parameter

Die Peak-Verhältnisse folgen direkt aus der T^4-Geometrie – ohne Fit, ohne externen Parameter:

$$\sqrt{3} : \sqrt{18} : \sqrt{42} : \sqrt{78} = 1 : 2{,}449 : 3{,}742 : 5{,}099$$

Beobachtet: $1 : 2{,}441 : 3{,}682 : 5{,}091$. Abweichung $< 2\%$.

Einschränkung: Stammen die Peak-Positionen aus einem ΛCDM-Template-Fit, steckt ΛCDM bereits darin. Ein sauberer Test braucht modellfreie lokale Maxima des C_ℓ-Spektrums (~ 1–2% Abweichung von ΛCDM-Fit-Werten).

Absolute Skala: R_H

Die absolute Position $\ell_1 \approx 220$ braucht eine Längenskala. In FFGFT ist das R_H, notiert über die Kette (Dok. 182):

$$\xi \;\to\; E_0 = \sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}} \;\to\; E_H = E_0 \cdot \xi^{41/4} \;\to\; R_H = \frac{\hbar c}{E_H} \approx 1{,}40 \times 10^{26}\,\text{m}$$

Der Exponent $41/4$ ist dabei nicht aus ξ hergeleitet, sondern an den gemessenen H_0 kalibriert. Die kosmologische Skala ist damit die eine externe Eingabe des Sektors: ein gemeinsamer empirischer Bezugspunkt beider Modelle, keine FFGFT-spezifische Lücke. R_H ist gleichzeitig der Schwarzschild-Radius der Gesamtmasse $M_U = R_H c^2/(2G)$ des statischen Universums – eine interne Konsistenzprüfung (Dok. 182, Dok. 190 P4).

Größe	Herkunft	Status
Verhältnisse $1 : 2{,}449 : \ldots$	T^4-Geometrie, Jacobi-Entartung	Kein freier Parameter
R_H (absolute Skala)	$E_H \to R_H$, Exponent an H_0 kalibriert (Dok. 182)	Eine externe Eingabe
Verbindung $R_H \to \ell_1$	Effektiver Resonatorradius	Noch offen (P20)

Skript: `ffgft_lambda_im_messprozess.py`.

D.5 Umkehrung und die symmetrische Zirkularität

Geht man von den gemessenen Peaks aus, ist der Grundton-Winkel $\theta_1 = \pi/A \approx 0{,}59°$. Aber $\theta_1 = L_{\text{res}}/D_A$ ist ein *Verhältnis*: Eindeutig messbar ist nur das Produkt $H_0 \cdot L_{\text{res}} = \theta_1 c/\ln(1+z_*) \approx 458$ km/s, nicht H_0 allein. Das Isolieren von H_0 braucht eine extern festgelegte Länge – den externen Parameter aus P20.

Das macht die Zirkularität **symmetrisch**:

	ΛCDM	**FFGFT**
Gemessen	θ_1 (Winkel)	θ_1 (Winkel)
Externe Längenskala	$r_s \approx 147$ Mpc	R_H (Torusgröße)
Quelle der Skala	heiße Frühphase (Modell)	gesetzt / an H_0 kalibriert
H_0	$67{,}4$ (Output)	$66{,}2$ (gesetzt)
Zirkulär?	**Ja**	**Ja**

Ein gemessener Winkel bestimmt immer nur ein Längenverhältnis. Beide Modelle müssen eine absolute Skala hineinstecken. Niemand gewinnt aus den CMB-Peaks ein modellneutrales H_0. Der faire Vergleich ist nicht „wer ist zirkelfrei“ (keiner ist es), sondern Sparsamkeit (FFGFT: eine externe Skala; ΛCDM: r_s aus 6 Parametern plus BBN-Phase) gegen Verankerung (ΛCDM besser getestet; FFGFTs Frühphase offen).

Skripte: `ffgft_zirkularitaet_symmetrie.py`, `lcdm_circularity.py`.

D.6 Die beschleunigte Dilatation in beiden Modellen

Ein oft übersehener Punkt: Beide Modelle sagen eine *beschleunigte* Dilatation voraus, nicht eine konstante.

Aspekt	**ΛCDM**	**FFGFT**
Grund	Dunkle Energie (Λ)	Fraktale zeitliche Entwicklung ($\mathscr{R}$)
Mechanismus	Abstoßende Gravitation	Akkumulierte Wegverlängerung
w	≈ -1	Kein w (kein Λ-Feld)
Beschleunigung	Real (metrische Expansion)	Scheinbar (emergente Zeitdilatation)

In FFGFT wächst die effektive Skalenänderung pro Zeitschritt mit der Anzahl der Rekursionsschritte: Je weiter wir in die Entfernung (kosmologisch: in die Vergangenheit) blicken, desto mehr entfaltete Zeit liegt zwischen den Ereignissen. Die Beobachtung einer beschleunigten Dilatation ist daher kein Widerspruch zu FFGFT – sie ist genau das, was FFGFT aus seiner eigenen Dynamik erwartet. Nur die Erklärung ist eine andere.

Dies erschwert die Unterscheidung zwischen den Modellen zusätzlich: Viele Beobachtungen (SNe Ia, BAO) messen primär die Beschleunigung selbst, nicht ihren Mechanismus.

Die drei Phasen der ΛCDM-Expansionsgeschichte

Ein struktureller Unterschied betrifft den *zeitlichen Verlauf* der Expansionsrate. ΛCDM verlangt drei aufeinanderfolgende Regime:

1. **Frühphase (Inflation):** eine extrem rasche, exponentiell beschleunigte Ausdehnung, getrieben durch ein hypothetisches Inflaton-Feld mit negativem Druck, das danach zerfällt.
2. **Mittlere Phase (gebremste Expansion):** strahlungs- und materiedominiert, $a(t) \sim t^{1/2}$ bzw. $t^{2/3}$. Die anziehende Gravitation *verlangsamt* die Expansion.
3. **Heutige Phase (erneute Beschleunigung):** ab $z \approx 0{,}6$ dominiert die kosmologische Konstante Λ und treibt die Expansion wieder beschleunigt an.

Die Abfolge *beschleunigt → gebremst → wieder beschleunigt* ist mathematisch durch die Friedmann-Gleichung erlaubt, erfordert aber *zwei separate, unabhängig postulierte* Beschleunigungsmechanismen (Inflaton und Λ), getrennt durch eine Bremsphase. Hinzu kommt das Koinzidenzproblem: Λ wird gerade in unserer kosmischen Epoche dominant – eine Feinabstimmung, die das Modell nicht aus sich heraus erklärt.

FFGFT kommt demgegenüber mit *einem* Mechanismus aus: die scheinbare Beschleunigung wächst monoton mit der Rekursionstiefe der fraktalen Zeitentfaltung; es gibt keine getrennte Inflations- und keine getrennte Λ-Epoche. Dies ist ein Vorteil auf der Ebene der theoretischen Ökonomie, *keine* empirische Aussage – FFGFT hat für die Frühphase bislang keine quantitativen Vorhersagen, und ob seine eine Entfaltungsdynamik die gesamte Expansionsgeschichte korrekt nachbildet, ist nicht gezeigt.

D.7 Was die Daten können und was nicht

Beobachtung	**ΛCDM**	**FFGFT**
SNe Ia: $b \approx 1$	Expansion dehnt Lichtkurven	Geometrische Wegverlängerung dehnt Lichtkurven
BAO: $z(d)$	Skalenfaktor $a(t)$ wächst	Akkumulierte fraktale Pfadlänge
Beschleunigung	Dunkle Energie (Λ)	Nicht-lineare Zeitrekursion ($\mathscr{R}$)
CMB-Spektrum	Abkühlung von heißem Urknall	Stationärer Quanten-Grundzustand (Dok. 025)

Was die Daten nicht können: Sie können nicht unterscheiden, ob die Dilatation von metrischer Expansion oder von fraktaler Pfadverlängerung stammt. Beides ergibt dasselbe beobachtbare Signal.

D.8 Die Grenze für beide Modelle: keine modellneutrale Skala

Die Entartung wird durch ein zweites Problem verstärkt, das beide Modelle gleichermaßen betrifft (P20, Dok. 190): Es gibt keine modellneutrale Bestimmung der kosmologischen Skala R_H.

- ΛCDM misst $H_0 \approx 67{,}4$ km/s/Mpc – aber dieser Wert ist eine Pipeline-Ausgabe, die Expansion, FLRW-Metrik und Materiegehalt voraussetzt.
- FFGFT schreibt $E_H/\hbar \approx 66{,}2$ km/s/Mpc in der Form $\xi^{41/4}$; der Exponent ist jedoch nicht aus ξ hergeleitet, sondern an den gemessenen H_0 kalibriert, und damit ist auch $R_H = \hbar c/E_H$ gesetzt (Dok. 182). Offen ist die genaue Verbindung $R_H \to \ell_1$ (wie R_H die absolute Peak-Position ergibt, P20).

Onurs Tests verwenden ΛCDM-Pipeline-Größen (r_s, H_0, kalibrierte Magnituden) als Referenz. Sie testen daher nicht „statisch gegen expandierend", sondern „ΛCDM-Pipeline gegen die Abwesenheit dieser Pipeline". Das ist kein neutraler Test.

D.9 Wo die Entscheidung tatsächlich fällt

Wenn die Daten blind für den Mechanismus sind, verlagert sich die Entscheidung auf die theoretische Ebene:

1. **Parameteranzahl:** FFGFT braucht intern nur das fundamentale Verhältnis $\xi = 4/30000$ und für den kosmologischen Sektor eine offen deklarierte externe Skala ($R_H = \hbar c/E_H$, an H_0 kalibriert, Dok. 182); offen ist die genaue Verbindung $R_H \to \ell_1$ (P20). ΛCDM benötigt Parameter für dunkle Energie, dunkle Materie, Inflation, Baryonendichte und weitere.
2. **Singularitäten:** FFGFT erzeugt keine Singularität (kein Urknall, keine unendliche Dichte bei $t = 0$). ΛCDM beginnt mit einer Singularität.
3. **Erklärung der Zeit:** FFGFT leitet die Entstehung und Veränderung des Zeitflusses (die fraktale Entfaltung) aus ersten Prinzipien her. ΛCDM postuliert die Zeit als starre, unerklärte Hintergrundbühne.

Wichtig – keine Überlegenheitsbehauptung: Diese Punkte sind Vorteile auf der Ebene der theoretischen Ökonomie und Konsistenz. Sie sind *keine* empirische Widerlegung von ΛCDM.

D.10 Die ehrliche wissenschaftliche Position

- Es gibt zwei konkurrierende Erklärungen für dieselben Beobachtungen.
- Keine ist derzeit empirisch bevorzugt, weil die klassischen Messungen (SNe Ia, BAO, CMB-Temperatur) entartet sind.

- Die Daten zwingen uns nicht, uns für ein Modell zu entscheiden.
- Die Wahl ist eine Frage der theoretischen Konsistenz und der Erklärungskraft jenseits der kosmologischen Standarddaten.
- FFGFT ist durch Onurs Tests weder bestätigt noch widerlegt. Die Tests zeigen lediglich, dass ein *naives* statisches Modell ohne fraktale Zeitentfaltung ($b = 0$, keine Beschleunigung) ausgeschlossen ist. FFGFT ist kein solches naives Modell.

Der Punkt, an dem die Modelle prinzipiell unterscheidbar wären: Die Frühphase. Hier ist allerdings Vorsicht geboten – die Frühphase ist für *beide* Modelle kaum direkt belegbar, und das wird sie vermutlich auch bleiben: Niemand kann die ersten Momente des Universums direkt beobachten; beide Modelle rekonstruieren sie aus heutigen Spuren und vielen Annahmen. ΛCDM hatte Jahrzehnte Zeit, für diese Phase ein detailliertes Erklärungsgebäude zu entwickeln (heißer Urknall, Inflation, Nukleosynthese) – erfolgreich in der Anpassung an die Daten, aber selbst auf zahlreichen Annahmen und freien Parametern aufgebaut. FFGFT müsste die Lichtelementhäufigkeiten (BBN), die CMB-Akustikpeaks und die Strukturbildung aus seiner umgekehrten Richtung (kalt, langsam, fraktal entfaltend) erklären – das ist eine offene Forschungsfrage, an der bisher wenig gearbeitet ist.

Die Frühphase ist daher zwar im Prinzip die Stelle, an der sich die Modelle unterscheiden könnten – aber wegen der eingeschränkten Belegbarkeit für beide Seiten ist nicht zu erwarten, dass sie zu einer eindeutigen empirischen Entscheidung führt. Eine quantitative FFGFT-Vorhersage für die frühen Observablen wäre wünschenswert, steht aber aus.

Bezug zu früheren Dokumenten: P18–P20 (Dok. 190, Status der kosmologischen Skala), Dok. 025 (CMB als ξ-Feld-Grundzustand), Dok. 182 (fraktale Wegverlängerung), Dok. 264 (Ferrotoroidizität, P″=0 als statischer Grundzustand), Dok. 266 (Analyse von Onurs Tests).

Kapitel E

Dok. 268 — CMB-Peaks aus dem T^4: Herleitung der Winkelspektrum-Verhältnisse

Überblick

Dieses Dokument untersucht den Zusammenhang zwischen der T^4-Gitterstruktur der FFGFT und den beobachteten CMB-Peak-Verhältnissen. Alle Zahlen sind direkt nachrechenbar. Was Konsistenzprüfung (rückwärts) und was echte Vorwärts-Vorhersage ist, wird ab Schritt 17 klar getrennt.

Zwei getrennte Aussagen, die nicht verwechselt werden dürfen:

- **(A) Verhältnis-Befund (Konsistenzprüfung, rückwärts).** Die Werte $|n|^2 = 3, 18, 42, 78$ erzeugen Verhältnisse $1 : 2{,}449 : 3{,}742 : 5{,}099$, die mit den beobachteten CMB-Peaks ($1 : 2{,}441 : 3{,}682 : 5{,}091$) auf $< 2\%$ übereinstimmen. *Aber:* die Folge $\{1, 6, 14, 26\}$ (vor dem Faktor 3) wurde aus den *gemessenen* CMB-Verhältnissen abgelesen (Schritt 4), nicht vorwärts aus T^4 erzeugt. Dies ist eine erfolgreiche *Retrodiktion*, keine parameterfreie Vorhersage (siehe Schritt 17.1).
- **(B) Anharmonizität-Befund (Vorwärts, neu).** Forward erzeugt T^4 entweder ein dichtes Modenspektrum oder – bei symmetrischer Resonanz – die *harmonische* Reihe $1 : 2 : 3 : 4 : 5$. Der CMB ist aber *anharmonisch* ($1 : 2{,}44 : 3{,}68 : 5{,}09$). Diese Anharmonizität folgt *vorwärts und parameterfrei* aus der Kodimension-1-Projektion in der fraktalen Geometrie ($D_f - 1 \approx 2 \Rightarrow$ Bessel-Index $\nu \approx 0 \Rightarrow J_0$-Membran), die die beobachtete Serie auf $\sim 5\%$ trifft – ohne Modenauswahl (Schritt 17). Dies ist die konzeptuell sauberere Aussage und der eigentliche Fortschritt dieses Dokuments.

Ehrliche Kurzfassung: Der Verhältnis-Match ist real, aber rückwärts gefunden. Der Forward-Gehalt liegt in der *Anharmonizität* als geometrischem Effekt der flachen Kodimension-1-Projektion. Der strenge Selektionsmechanismus für genau $\{3, 18, 42, 78\}$ bleibt offen (P29/P30, Dok. 190): der Faktor 3 vor $\{1, 6, 14, 26\}$ ist eine Setzung, die sich aus der Projektion auf drei Raumrichtungen nicht ergibt (Schritt 8), und $|n|^2 = 30$ wird durch den Faktor-3-Filter nicht ausgeschlossen (Schritt 17.1).

E.1 Schritt 1: Der T^4-Zustandsraum

Auf dem T^4-Torus hat jede Mode eine ganzzahlige Wicklungszahl in vier Richtungen:

$$\vec{n} = (n_1, n_2, n_3, n_4) \in \mathbb{Z}^4$$

Der Radius (die Quantenzahl) einer Mode ist:

$$|\vec{n}| = \sqrt{n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 + n_4^2}$$

Die niedrigsten Stufen mit je einem Beispiel-Tupel:

$\lvert n\rvert^2$	$\lvert n\rvert$	Beispiel-Tupel	Entartung g
1	1,0000	$(-1, 0, 0, 0)$	8
2	1,4142	$(-1, -1, 0, 0)$	24
3	1,7321	$(-1, -1, -1, 0)$	32
4	2,0000	$(-2, 0, 0, 0)$	24
5	2,2361	$(-2, -1, 0, 0)$	48
6	2,4495	$(-2, -1, -1, 0)$	96
7	2,6458	$(-2, -1, -1, -1)$	64
8	2,8284	$(-2, -2, 0, 0)$	24
9	3,0000	$(-3, 0, 0, 0)$	104
10	3,1623	$(-3, -1, 0, 0)$	144

Wichtig: Die Entartung $g(|n|^2)$ ist *nicht* monoton. Bei $|n|^2 = 6$ springt sie auf 96 – zwölfmal mehr als bei $|n|^2 = 1$. Das folgt aus der Jacobi-Formel für die Darstellungsanzahl als Summe von vier Quadraten: $g(n) = 8 \sum_{d|n,\, 4\nmid d} d$.

E.2 Schritt 2: Thermische Besetzung (Bose-Einstein)

Die Energie einer Mode mit Radius $r = |n|$ ist (aus der Kalibrierung $L_{\text{tor}} = 1/(k_B T_{\text{CMB}})$, Dok. 025):

$$E_r = r \cdot k_B T_{\text{CMB}}$$

Die thermische Besetzung nach Bose-Einstein mit $\mu = 0$:

$$\langle N(r) \rangle = \frac{1}{e^r - 1}$$

Die spektrale Dichte – wie viel Energie insgesamt in Stufe r steckt:

$$\boxed{I(r) = g(r) \cdot \langle N(r) \rangle \cdot r}$$

Numerische Werte für die niedrigsten Stufen:

$\lvert n\rvert^2$	$\lvert n\rvert$	g	$\langle N\rangle$	$I = g \cdot N \cdot \lvert n\rvert$	Lok. Max.?
1	1,0000	8	0,582	4,66	
2	1,4142	24	0,321	10,90	
3	1,7321	32	0,215	11,91	**Ja**
4	2,0000	24	0,157	7,51	
5	2,2361	48	0,120	12,84	
6	2,4495	96	0,094	22,22	**Ja**
7	2,6458	64	0,076	12,93	
8	2,8284	24	0,063	4,26	
9	3,0000	104	0,052	16,35	
10	3,1623	144	0,044	20,13	**Ja**

Eine Auswahl der lokalen Maxima bis $\lvert n\rvert^2 = 80$:

Peak	$\lvert n\rvert^2$	$\lvert n\rvert$	I
1	3	1,7321	11,91
2	6	2,4495	22,22
3	10	3,1623	20,13
4	14	3,7417	17,45
5	18	4,2426	19,30
6	22	4,6904	12,52
7	26	5,0990	10,52
8	30	5,4772	13,25
9	42	6,4807	7,64
10	66	8,1240	2,77
11	78	8,8318	1,73

Die vollständige Liste der lokalen Maxima von $I(r)$ bis $\lvert n\rvert^2 = 80$ lautet $3, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 45, 50, 54, 58, 60, 63, 66, 70, 75, 78$; in der Tabelle nicht aufgeführt sind 34 ($I = 7{,}42$), 38 ($6{,}24$), 45 ($5{,}12$), 50 ($4{,}47$), 54 ($4{,}54$), 58 ($2{,}70$), 60 ($1{,}93$), 63 ($2{,}36$), 70 ($2{,}24$) und 75 ($1{,}49$).

E.3 Schritt 3: Projektion auf Multipolmomente

Das beobachtbare Multipolmoment ℓ ist proportional zur Wellenzahl der Mode:

$$\ell \propto |\vec{n}| = \sqrt{|n|^2}$$

Damit sind die *Verhältnisse* der Peak-ℓ-Werte direkt die Verhältnisse der $\sqrt{|n|^2}$-Werte – unabhängig von der absoluten Skala (die D_A und L_{tor} enthält):

$$\frac{\ell_k}{\ell_1} = \frac{\sqrt{|n|_k^2}}{\sqrt{|n|_1^2}}$$

E.4 Schritt 4: Der entscheidende Befund

Die CMB-Verhältnisse *quadriert* geben direkt die nötigen $|n|^2$-Verhältnisse:

CMB-Peak	ℓ_{obs}	ℓ/ℓ_1	$(\ell/\ell_1)^2$	nächstes $\lvert n\rvert^2$
1	220	1,000	1,00	1
2	537	2,441	5,96	**6**
3	810	3,682	13,56	**14**
4	1120	5,091	25,92	**26**
5	1440	6,545	42,84	**43**

Wenn der *erste* CMB-Peak bei $|n|^2 = X$ liegt, dann liegen die weiteren bei $X \cdot 6$, $X \cdot 14$, $X \cdot 26$, ...

Für $X = 3$: Die Peaks liegen bei $|n|^2 = 3, 18, 42, 78$.

Ehrliche Einordnung von Schritt 4 (Richtung der Schlussfolgerung)

Die Folge $\{1, 6, 14, 26\}$ entsteht hier durch *Quadrieren der gemessenen* CMB-Verhältnisse und Runden auf die nächste ganze Zahl – also *aus den Daten*, nicht vorwärts aus T^4. Schritt 5 prüft anschließend, ob $3 \cdot \{1, 6, 14, 26\}$ echte lokale Maxima des T^4-Spektrums sind (sie sind es). Das ist eine **Konsistenzprüfung (Retrodiktion)**, keine Vorhersage. Die Richtung läuft Daten $\rightarrow \{1, 6, 14, 26\} \rightarrow \times 3$, nicht $T^4 \rightarrow$ Daten. Der echte Forward-Gehalt – die Anharmonizität als geometrischer Effekt – wird in Schritt 17 entwickelt.

E.5 Schritt 5: Vergleich mit den T^4-Peaks

Sind $|n|^2 = 3, 18, 42, 78$ echte lokale Maxima im T^4-Spektrum?

$\lvert n\rvert^2$	g	I	I_{links}	Lokales Maximum?
3	32	11,91	10,90	**Ja**
18	312	19,30	9,77	**Ja**
42	768	7,64	3,57	**Ja**
78	1344	1,73	1,04	**Ja**

Alle vier sind echte lokale Maxima. Die Verhältnisse:

	Peak 1	Peak 2	Peak 3	Peak 4
$\lvert n\rvert^2$	3	18	42	78
$\sqrt{\lvert n\rvert^2}$	1,7321	4,2426	6,4807	8,8318
Verhältnis zu Peak 1	1,000	2,449	3,742	5,099
CMB-Verhältnis	1,000	2,441	3,682	5,091
Abweichung	0,0%	+0,3%	+1,6%	+0,2%

Abweichung $< 2\%$**.**

Dass die vier Werte echte lokale Maxima sind, folgt aus der Jacobi-Entartungsstruktur des T^4-Gitters und der Bose-Einstein-Statistik. Die Auswahl $\{1, 6, 14, 26\}$ ist dagegen aus den Daten abgelesen (Schritt 4), und der Faktor 3 ist gesetzt (Schritt 8).

E.6 Schritt 6: Was die absolute Skala bestimmt

Die Verhältnisse sind skalenunabhängig. Die absolute Position des ersten Peaks ($\ell_1 \approx 220$) hängt von:

$$\ell_1 = \frac{\pi \cdot D_A}{L_{\text{tor}}/\sqrt{3}}$$

mit der Winkeldistanz D_A (externer Parameter, P20) und $L_{\text{tor}} = 1/(k_B T_{\text{CMB}})$ (über die gemessene CMB-Temperatur; ihre Relation zu ξ ist eine einheitenabhängige Übereinstimmung, keine Herleitung). Dies bestimmt $A \approx 303{,}6$ in der Trompetenformel (Dok. 267).

E.7 Schritt 7: Was noch offen ist (P29)

Das T^4-Spektrum hat Peaks bei $|n|^2 = 3, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, \ldots$ Die CMB zeigt nur die Teilmenge $3, 18, 42, 78$.

Zwischen diesen liegen starke Peaks – insbesondere $|n|^2 = 6$ mit $I = 22{,}22$, dem größten Wert im ganzen Spektrum.

Frage (P29): Welche Auswahlregel erklärt, warum $|n|^2 = 6, 10, 14, 22, 26, 30$ nicht als CMB-Peaks sichtbar sind?

Diese Frage ist offen. Der Beobachter misst im 3D-Raum (plus Zeitentfaltung) und sieht nur die räumliche Projektion $k^2_{\text{obs}} = (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2)/L^2$. Diese Projektion kann den Faktor 3 in der sichtbaren Serie $3 \cdot \{1, 6, 14, 26\} = \{3, 18, 42, 78\}$ jedoch nicht erzeugen, weil die projizierte Wellenzahl die volle nie übersteigt (Schritt 8); der Faktor ist eine Setzung.

Auch die vollständige sphärische Projektion der T^4-Moden auf das Winkelleistungsspektrum C_ℓ mit sphärischen Bessel-Funktionen (Dok. 190, P30) liefert die Auswahl nicht: in der naiven Form ergibt sie ein Quasi-Kontinuum (Schritt 17.1). Die Peak-Selektion bleibt insgesamt offen. Die Verhältnisse selbst sind gerechnet und stehen fest.

E.8 Zusammenfassung

Schritt	Ergebnis
1. T^4-Zustandsraum	Wicklungszahlen $\vec{n} \in \mathbb{Z}^4$, Jacobi-Entartung $g(\lvert n\rvert^2)$ nicht monoton
2. Bose-Einstein	$I(r) = g(r) \cdot \frac{1}{e^r-1} \cdot r$, lokale Maxima bei $\lvert n\rvert^2 = 3, 6, 10, 14, 18, \ldots$
3. Projektion	$\ell \propto \sqrt{\lvert n\rvert^2}$, Verhältnisse skalenunabhängig
4. CMB-Verhältnisse	$(\ell/\ell_1)^2 \approx 1, 6, 14, 26$ für $\lvert n\rvert^2 = 1, 6, 14, 26$ (oder $\times 3$ für $\lvert n\rvert^2 = 3, 18, 42, 78$)
5. Übereinstimmung	$\sqrt{3} : \sqrt{18} : \sqrt{42} : \sqrt{78} = 1 : 2{,}449 : 3{,}742 : 5{,}099$ vs. CMB $1 : 2{,}441 : 3{,}682 : 5{,}091$, Abweichung $< 2\%$
6. Absolute Skala	$\ell_1 \approx 220$ aus D_A (extern) und L_{tor} (über T_{CMB})
7. P29/P30	Auswahlregel für die Teilmenge $3, 18, 42, 78$ offen: Faktor 3 gesetzt (Schritt 8), naive C_ℓ-Projektion (P30) unzureichend (Schritt 17.1)

Bezug: Dok. 025 (T_{CMB}), Dok. 050 (T^4-Topologie, Spinstruktur), Dok. 190 (P14a Wegverlängerung, P20 R_H als externer Parameter), Dok. 203 (Rekursionsoperator $\mathscr{R}$), Dok. 267 (Kosmologische Entartung, Trompetenformel).
Python-Skript: `ffgft_cmb_t4_peaks.py`

E.9 Schritt 8: Woher kommen k^2 und der Faktor 3?

8.1 Woher kommt das k^2?

Das ^{2} in k^2_{eff} kommt nicht aus dem Faktor 3 – es kommt aus der Wellengleichung selbst. Die Wellengleichung für ein masseloses Feld ($m = 0$, Photon):

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - c^2\,\Delta\right)\phi = 0$$

Der Laplace-Operator Δ enthält *zweite* Ableitungen. Fourier-Ansatz $\phi \sim e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega t)}$ einsetzen ergibt:

$$-\omega^2 + c^2k^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega^2 = c^2k^2 \quad \Rightarrow \quad E = \hbar\omega = \hbar c\,k$$

Das ^{2} ist universell – es gilt für jede Wellengleichung, unabhängig von FFGFT.

8.2 Der Faktor 3 ist eine Setzung

Der Beobachter lebt in **3 Raumdimensionen + Zeitentfaltung**. Er nimmt den T^4-Torus durch seine 3 Raumrichtungen wahr. Die vierte Torusrichtung ist die Zeitentfaltung –

sie ist nicht eine weitere Raumrichtung, sondern der Mechanismus durch den der Beobachter überhaupt existiert.

Konkret: Eine T^4-Mode mit Wicklungszahl $\vec{n} = (n_1, n_2, n_3, n_4)$ erscheint dem 3D-Beobachter mit der beobachtbaren 3D-Wellenzahl:

$$k_{\text{obs}}^2 = \frac{n_1^2 + n_2^2 + n_3^2}{L_{\text{tor}}^2}$$

Die n_4-Komponente ist in der Zeitentfaltung "versteckt".

Für die T^4-Mode $(1, 1, 1, 0)$ – alle drei Raumrichtungen gleichwertig, $n_4 = 0$ – gilt:

$$k_{\text{obs}}^2 = \frac{1^2 + 1^2 + 1^2}{L_{\text{tor}}^2} = \frac{3}{L_{\text{tor}}^2},$$

zugleich ist aber auch $|n|^2 = 3$: die Projektion ändert hier nichts. Allgemein gilt $n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 \leq |n|^2$ – die projizierte Wellenzahl übersteigt die volle nie. Eine räumliche Projektion kann den Faktor 3 vor der Folge $\{1, 6, 14, 26\}$ daher **nicht** erzeugen; der Faktor 3 ist eine Setzung.

8.3 Die beobachtbare Serie

Das beobachtbare Multipolmoment ist $\ell \propto k_{\text{obs}} \cdot D_A$:

$$\ell^2 \propto k_{\text{obs}}^2 \cdot D_A^2 = \frac{n_1^2 + n_2^2 + n_3^2}{L_{\text{tor}}^2} \cdot D_A^2$$

Für Moden der Form $(n, n, n, 0)$ ist $n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 = 3n^2 = |n|^2$, also $\ell^2 \propto |n|^2$. Die Serie $\{3, 18, 42, 78\}$ entsteht erst, wenn man den Faktor 3 vor die Folge $\{1, 6, 14, 26\}$ setzt:

$$\ell^2 \propto 3 \cdot |n|^2 \qquad (|n|^2 \in \{1, 6, 14, 26\},\ \text{Faktor 3 gesetzt})$$

Die sichtbaren Peaks $\{3, 18, 42, 78\} = 3 \cdot \{1, 6, 14, 26\}$:

	Peak 1	Peak 2	Peak 3	Peak 4
T^4-Grundpeak $\lvert n\rvert^2$	1	6	14	26
$\times 3$ (gesetzt)	3	18	42	78
$\ell \propto \sqrt{3 \cdot \lvert n\rvert^2}$	1,732	4,243	6,481	8,832
Verhältnis zu Peak 1	1,000	2,449	3,742	5,099
CMB-Verhältnis	1,000	2,441	3,682	5,091
Abweichung	0,0%	+0,3%	+1,6%	+0,2%

8.4 Was noch offen ist

Auch im Mittel über alle Moden eines $|n|^2$-Niveaus ergibt die Projektion $\langle n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 \rangle = \frac{3}{4}|n|^2$ (isotrope T^4-Verteilung), also weniger als $|n|^2$, nicht $3 \cdot |n|^2$.

Warum gerade $3 \cdot \{1, 6, 14, 26\} = \{3, 18, 42, 78\}$ sichtbar ist, ist damit nicht hergeleitet: der Faktor 3 ist gesetzt, und die naive sphärische Projektion der T^4-Moden auf C_ℓ reproduziert die Serie nicht (Schritt 17.1). Die Peak-Selektion bleibt offen (P29, P30).

E.10 Schritt 9: Überblick der Retrodiktion

Die Retrodiktion der CMB-Peak-Verhältnisse in drei Schritten:

Schritt	Eingabe	Mechanismus	Ausgabe
1	— (ξ-frei)	Jacobi-Entartung $g(\lvert n\rvert^2)$, Bose-Einstein $N(r)$	T^4-Peaks bei $\lvert n\rvert^2 = 1, 6, 14, 26$
2	Faktor 3 (gesetzt)	keiner – die 3D-Projektion $k^2_{\text{obs}} = (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2)/L^2$ erzeugt ihn nicht (Schritt 8)	Faktor 3 in $\ell^2 \propto 3 \cdot \lvert n\rvert^2$
3	Schritte 1+2	$\ell \propto \sqrt{3 \cdot \lvert n\rvert^2}$	Verhältnisse $1 : 2{,}449 : 3{,}742 : 5{,}099$

Beobachtet: $1 : 2{,}441 : 3{,}682 : 5{,}091$. Abweichung $< 2\%$.

Das ^{2} in k^2_{obs} kommt aus der Wellengleichung (zweite Ableitungen des Laplace-Operators) – universell, keine FFGFT-Spezialität.

Der Faktor 3 ist gesetzt: der Beobachter in 3D + Zeitentfaltung sieht nur $n_1^2+n_2^2+n_3^2 \leq \lvert n\rvert^2$, eine solche Projektion kann ihn nicht erzeugen (Schritt 8).

Offener Schritt: Die Peak-Selektion insgesamt – Herkunft des Faktors 3 und Auswahl der Folge $\{1, 6, 14, 26\}$ – ist nicht hergeleitet.

Wichtige Einordnung (siehe Schritt 17): Die in der Tabelle als "Ausgabe" von Schritt 1 genannte Folge $\{1, 6, 14, 26\}$ ist *nicht* vorwärts aus T^4 erzeugt, sondern aus den gemessenen CMB-Verhältnissen abgelesen (Schritt 4). Dieser "Überblick" beschreibt also die *Retrodiktion*. Der eigentliche Forward-Gehalt – die Anharmonizität aus der Kodimension-1-Projektion – steht in Schritt 17.

E.11 Zusammenfassung (aktualisiert)

Schritt	**Ergebnis**
1. T^4-Zustandsraum	Jacobi-Entartung $g(\lvert n\rvert^2)$ nicht monoton
2. Bose-Einstein	Lokale Maxima bei $\lvert n\rvert^2 = 3, 6, 10, 14, 18, \ldots$
3. Beobachter in 3D	$k^2_{\text{obs}} = (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2)/L^2$; Faktor 3 gesetzt, aus der Projektion nicht erzeugbar; ^{2} aus Wellengleichung (Laplace)
4. CMB-Serie	$3 \cdot \{1, 6, 14, 26\} = \{3, 18, 42, 78\}$, alle echte T^4-Peaks
5. Verhältnisse	$1 : 2{,}449 : 3{,}742 : 5{,}099$ vs. CMB $1 : 2{,}441 : 3{,}682 : 5{,}091$, Abweichung $< 2\%$
6. Absolute Skala	D_A extern (P20), L_{tor} über T_{CMB}
7. Noch offen	Peak-Selektion: Herkunft des Faktors 3 und Auswahl der Folge $\{1, 6, 14, 26\}$

Bezug: Dok. 025 (T_{CMB}), Dok. 050/051 (T^4-Topologie, Dirac-Struktur), Dok. 190 (P14a, P20, P29, P30), Dok. 203 (Rekursionsoperator $\mathscr{R}$), Dok. 267 (Kosmologische Entartung).

E.12 Schritt 10: Die physikalische Intuition – Doppel-Resonator

10.1 Offenes und geschlossenes Rohr

In der klassischen Akustik bestimmen die Randbedingungen welche Moden resonieren:

System	Randbedingung	Moden-Verhältnisse
Geschlossenes Rohr	beide Enden fest	$1 : 2 : 3 : 4 : 5$ (alle)
Halboffenes Rohr	ein Ende offen	$1 : 3 : 5 : 7$ (nur ungerade)
Kreismembran (2D)	Rand fest	$1 : 2{,}30 : 3{,}60 : 4{,}90$
Fraktaler T^4	**zwei gekoppelte Systeme**	**1 : 2,449 : 3,742 : 5,099**

Der reine T^4 (ganzzahlige Dimension $D = 4$, vollständig kompakt) entspricht einem *geschlossenen* System – alle Moden resonieren. Der fraktale T^4 (Dimension $D_f = 3 - \xi < 4$) hat eine qualitativ andere Resonanzstruktur.

10.2 Der fraktale T^4 als Doppel-Resonator

Die Analogie zum halboffenen Rohr (das einen Faktor 2 erzeugt) liegt nahe – aber sie ist nicht vollständig. Der fraktale T^4 ist kein einfach offenes oder einfach geschlossenes System. Er wirkt als **Doppel-Resonator**: zwei überlagerte Resonanzstrukturen, deren Koinzidenzen die sichtbaren Peaks bestimmen.

	System 1 T^4-Gitter	**System 2** 3D-Beobachterprojektion
Resonanzen	$\lvert n\rvert^2 = 1, 6, 14, 26, \ldots$	Projiziert auf $n_1^2 + n_2^2 + n_3^2$
Bedingung	Lokales Maximum in $I(r)$	$k^2_{\text{obs}} = (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2)/L^2$
Herkunft	Jacobi-Entartung $g(\lvert n\rvert^2)$	Faktor 3 gesetzt (aus der Projektion nicht erzeugbar)

In diesem Bild wären die sichtbaren Peaks **Koinzidenz-Resonanzen** – Moden, bei denen beide Systeme gleichzeitig resonieren:

$$\lvert n\rvert^2_{\text{sichtbar}} = 3 \cdot \lvert n\rvert^2_{\text{Gitter}} = 3 \cdot \{1,\ 6,\ 14,\ 26\} = \{3,\ 18,\ 42,\ 78\}$$

System 2 kann den Faktor 3 jedoch nicht liefern (Schritt 8). Der Doppel-Resonator ist daher eine Analogie mit gesetztem Faktor 3, kein hergeleiteter Selektionsmechanismus.

10.3 Nicht alle Koinzidenzen sind sichtbar

Die Doppel-Resonanzbedingung liefert mehr Kandidaten als nur $\{3, 18, 42, 78\}$:

$\lvert n\rvert^2$	$\lvert n\rvert^2/3$	Peak in Sys. 1?	I	CMB-Peak?
3	1	nein	11,91	**Ja**
18	6	**Ja**	19,30	**Ja**
30	10	**Ja**	13,25	Nein
42	14	**Ja**	7,64	**Ja**
54	18	**Ja**	4,54	Nein
66	22	**Ja**	2,77	Nein
78	26	**Ja**	1,73	**Ja**

Die Peaks $|n|^2 = 30, 54, 66$ erfüllen die Doppel-Resonanzbedingung ebenfalls, erscheinen aber nicht als CMB-Peaks. Thermische Stärke erklärt das nicht: $|n|^2 = 30$ ist mit $I = 13{,}25$ stärker als 42 ($I = 7{,}64$) und 78 ($I = 1{,}73$), und auch 66 ($I = 2{,}77$) ist stärker als 78. Eine Auswahl nach dem stärksten Koinzidenz-Peak je Bereich trägt daher nicht (Schritt 17.1); warum gerade $18, 42, 78$ sichtbar sind, ist offen.

10.4 Die physikalische Bedeutung

Der Übergang von $D = 4$ (reiner T^4, ganzzahlig kompakt) zu $D_f = 3 - \xi$ (fraktaler T^4) entspricht dem Übergang von einem vollständig geschlossenen zu einem *fraktal-teiloffenen* System:

- $D = 4$ **(rein kompakt):** Alle vier Torusrichtungen schwingen gleichberechtigt. Jedes $|n|^2$ kann resonieren. Das entspricht einem Resonator mit 4 gleichwertigen, geschlossenen Richtungen.
- $D_f = 3 - \xi$ **(fraktal):** Die vierte Richtung ist nicht mehr ganzzahlig-kompakt, sondern fraktal-granuliert. Sie verhält sich wie eine Richtung mit *kontinuierlichem Spektrum* – analog zur offenen Seite eines halboffenen Rohrs. Der Beobachter im 3D-Raum sieht nur die drei räumlichen Komponenten $n_1^2 + n_2^2 + n_3^2$ (die vierte ist Zeitentfaltung); den Faktor 3 erzeugt diese Projektion nicht (Schritt 8).

Kurz: Der fraktale T^4 ist kein geschlossener und kein offener Resonator – er ist ein *Doppel-Resonator* mit gekoppelten Systemen. In diesem Bild markieren die CMB-Peaks Koinzidenzen von T^4-Gittergeometrie und 3D-Beobachterprojektion – mit gesetztem Faktor 3; ein Selektionsmechanismus ist damit nicht hergeleitet.

10.5 Vergleich der Resonator-Typen

Analogie	Mechanismus	Selektiert
Geschlossenes Rohr	eine Randbedingung	alle Ganzzahlen
Halboffenes Rohr	eine Randbedingung	nur Ungerade
Kreismembran	2D-Geometrie	Bessel-Nullstellen
Fraktaler T^4	**Koinzidenz zweier Resonatorsysteme**	$3 \cdot \{\text{Gitter-Peaks}\}$ (Faktor gesetzt)

In diesem Bild wäre die CMB-Peakserie $1 : 2{,}449 : 3{,}742 : 5{,}099$ die Signatur eines fraktal-teiloffenen, vierdimensionalen Resonanzraums – nicht eines Plasmas, nicht einer einfachen Membrane, sondern der spezifischen Kombination aus T^4-Topologie und fraktaler Dimension $D_f = 3 - \xi$. Solange Faktor 3 und Auswahl nicht hergeleitet sind, bleibt das eine Deutung.

10.6 Was aus den Peaks folgt: zwei Filter

Die diskreten, scharfen Peaks folgen aus zwei zusammenwirkenden Eigenschaften desselben vollständigen T^4 – gesehen aus zwei Bezugspunkten:

	Filter 1: Kompaktheit (T^4 als Ganzes, von außen)	**Filter 2: Fraktalität** (von innen, dekompaktifiziert)
Wirkung	erzeugt *diskretes* Spektrum	gewichtet die Moden ungleich
erzwingt	*Existenz* scharfer Peaks	*Lage* der dominanten Peaks
Herkunft	endliche, geschlossene Topologie	Jacobi-Entartung $g(\lvert n\rvert^2)$ + Bose-Einstein
Ergebnis	gleichförmiges Modengitter	Peaks bei $\lvert n\rvert^2 = 3, 6, 10, 14, \ldots$

Beide sind keine zwei Objekte, sondern zwei Bezugspunkte auf denselben vollständigen T^4: von außen kompakt-endlich (Filter 1), von innen fraktal-granuliert bis $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ (Filter 2). Die fraktale Ungeschlossenheit ist damit keine *zweite*, der Kompaktheit widersprechende Eigenschaft, sondern die Innenansicht desselben geschlossenen Torus – eine Bezugspunkt-Angelegenheit (Innen/Außen, P20).

Erst beide Filter zusammen geben die beobachtete Struktur:

- Filter 1 allein: gleichförmiges diskretes Gitter – jedes $\lvert n\rvert^2$ gleich, keine bevorzugten Peaks.
- Filter 2 allein: braucht ein diskretes Gitter, auf dem er wirken kann – ohne Kompaktheit kein Gitter.

- Filter 1 + Filter 2: dominante Peaks an bestimmten $|n|^2$, die mit dem gesetzten Faktor 3 (Schritt 8) die CMB-Serie ergeben.

Was daraus ableitbar ist: Die diskreten Peaks sprechen *für* ein kompaktes (endliches) Universum und *gegen* ein rein-unendlich-offenes – ein rein offener Raum gäbe ein Kontinuum ohne scharfe Peaks. Das ist die stärkste strukturelle Aussage, die sich aus den Peaks ziehen lässt.

Ehrliche Abgrenzung: Dieser Schluss ist FFGFT-intern. Die Peaks *zwingen* die Raumkompaktheit nicht – ΛCDM erzeugt dieselben diskreten Peaks aus einer *zeitlichen* Schranke (dem Schallhorizont bei Rekombination) in einem räumlich unendlichen Universum. Die Peaks allein unterscheiden räumliche Kompaktheit (FFGFT) und zeitliche Schranke (ΛCDM) nicht; das ist die kosmologische Entartung (Dok. 267).

10.7 Was die Peak-Verhältnisse modellfrei aussagen

Dieser Abschnitt betrachtet die gemessenen Peak-Positionen ausschließlich mit den Methoden der Spektral-/Frequenzanalyse – ohne jede T^4-Annahme. Die Frage: Was lässt sich aus den reinen Zahlen $\ell \approx 220, 537, 810, 1120, 1450$ ablesen, und wo lauern typische Fehlinterpretationen durch Differenzbildung und Abtastgrenzen?

10.7.0 Begriffsklärung: „akustisch“ führt in die Irre

Die CMB-Peaks heißen historisch „akustische Peaks“. Der Begriff schickt jeden, der ihn zum ersten Mal hört, in die falsche Richtung, denn es ist *nichts* mit Schall im Spiel:

- **Kein Schall:** Es gibt kein hörbares Signal, keine Druckwelle in Luft.
- **Keine Zeitschwingung:** Die CMB ist ein eingefrorenes Standbild, kein zeitliches Signal. Gemessen wird nichts in Hertz.
- **Keine direkte Wellenmessung:** Das Teleskop misst die Temperatur als Funktion der *Himmelsrichtung* – eine Karte aus heißen und kalten Flecken. Ausgewertet wird die *räumliche Verteilung am Himmel*, nicht eine Schwingung.

Das Wort „akustisch“ stammt aus dem ΛCDM-*Erklärungsmodell*: dort werden die Flecken als eingefrorene Druckwellen im Photon-Baryon-Plasma *vor* der Rekombination gedeutet. Das ist eine modellabhängige Deutung des *Mechanismus* – sie steckt bereits im Namen, noch bevor irgendetwas gemessen ist. Die *Messgröße* selbst ist neutral: ein räumliches Interferenzmuster am Himmel, beschrieben durch das Winkelspektrum C_ℓ.

Zwei verschiedene „Frequenzen“ – nicht verwechseln. Bei der CMB tragen zwei völlig verschiedene Dinge den Namen „Frequenz“:

	(A) Photonen-Frequenz	(B) Fleckenmuster
Was	Farbe/Energie des Lichts	Winkelstruktur der Flecken
Wert	~ 160 GHz	$\ell = 220, 537, \ldots$
Einheit	Hertz (zeitlich)	dimensionslos / Winkel (räumlich)
gemessen als	Radiometer (Photonenenergie)	Winkel am Himmel

Die Peak-Verhältnisse $1 : 2{,}44 : 3{,}68 : \ldots$ gehören zu **(B)**, dem *räumlichen* Winkelmuster. Mit (A), der Photonenfrequenz, haben sie nichts zu tun. Eine Umrechnung der Multipole in eine Hertz-Frequenz wäre künstlich und irreführend – sie würde ein räumliches Muster in eine fiktive Zeitschwingung übersetzen, die so nicht existiert.

Sprachregelung in diesem Dokument: Wir vermeiden „akustisch" wo möglich und schreiben *Winkelspektrum-Peaks* oder schlicht *CMB-Peaks*. Die Resonator-Analogie (offenes/geschlossenes Rohr, Doppel-Resonator) bleibt als rein *mathematische* Analogie für ein diskretes Eigenmoden-Spektrum – nicht als Behauptung, dass dort Schall war. Ob die Resonanzen aus Druckwellen (ΛCDM) oder aus geometrischen Gittermoden (FFGFT) stammen, ist genau die offene Frage, die der Name „akustisch" vorschnell zugunsten von ΛCDM entscheidet.

10.7.1 Erste und zweite Differenz: die Anharmonizität ist real

Die Abstände aufeinanderfolgender Peaks sind *nicht* konstant:

$$\Delta\ell = 317,\ 273,\ 310,\ 330.$$

Eine reine harmonische Serie (gerade Obertöne $1 : 2 : 3 : 4 : 5$) hätte konstante Abstände. Die Verhältnisse $1 : 2{,}44 : 3{,}68 : 5{,}09 : 6{,}59$ liegen durchweg *über* der harmonischen Reihe $1 : 2 : 3 : 4 : 5$ ($2{,}44 > 2$, $3{,}68 > 3$, $5{,}09 > 4$, $6{,}59 > 5$), und die Abstände fallen nicht monoton. Diese Abweichung von konstanten Abständen ist deutlich größer als die Messunsicherheit der Peak-Positionen (~ 1–$3\,\%$ bei breiten Peaks). Sie ist daher *kein* Differenzbildungs-Artefakt, sondern ein reales Merkmal des Spektrums.

Folgerung 1: Gerade Obertöne (eine einfache harmonische Grundschwingung) sind ausgeschlossen.

10.7.2 Die Falle: „missing fundamental" beim linearen Lesen

Aus der Praxis der Frequenzanalyse ist bekannt: Misst man nur Obertöne und fehlt der Grundton, suggerieren die Abstände eine Grundschwingung, die real nicht angeregt ist. Liest man die CMB-Peaks linear ($\ell_n = A + Bn$), ergibt der Fit:

$$A = -72, \qquad B = 297.$$

Der Offset A ist **negativ**. Die lineare Fortsetzung verlangt also einen „Grundton“ bei $\ell < 0$ – physikalisch sinnlos. Genau das ist das missing-fundamental-Artefakt: Wer die Peaks als „Obertöne einer verschobenen Grundschwingung“ deutet, konstruiert eine Grundmode, die es nicht gibt.

Folgerung 2: Die lineare Deutung (gerade Obertöne plus Versatz) ist ein Differenzbildungs-Artefakt und scheidet aus.

10.7.3 Der Grundton im Gitter-Sinn ist rekonstruierbar

Prüft man stattdessen, ob die Peaks $\sqrt{\text{Ganzzahl}}$-Vielfache eines gemeinsamen Grundtons sind, also $\ell = c \cdot \sqrt{|n|^2}$ mit $|n|^2 = 3, 18, 42, 78$, so ist $c = \ell/\sqrt{|n|^2}$ nahezu konstant:

$$c = 127{,}0;\ 126{,}6;\ 125{,}0;\ 126{,}8 \quad (\text{Streuung } 1{,}6\,\%).$$

Es existiert also ein gemeinsamer **Gitter-Grundton** $c \approx 126$. Das ist die sparsamste Deutung der Anharmonizität: *ein* Parameter (die Skala c) genügt, denn die Anharmonizität selbst steckt in den festen Gitterzahlen $3, 18, 42, 78$.

	harmonisch	**Gitter ($\sqrt{\lvert n\rvert^2}$)**
Grundton-Definition	$\ell_n = f_0 \cdot n$	$\ell = c \cdot \sqrt{\lvert n\rvert^2}$
Konstanz-Test	$\ell/n = 220 \ldots 290$	$\ell/\sqrt{\lvert n\rvert^2} \approx 126$
Parameter	2 (Offset + Steigung)	1 (nur Skala c)
Offset	$A = -72$ (unphysikalisch)	keiner nötig
Ergebnis	scheitert	$c \approx 126$

Folgerung 3: Der Grundton ist rekonstruierbar – aber nur im Gitter-Sinn ($\ell = c\sqrt{|n|^2}$), nicht im harmonischen. Der Wert $c \approx 126$ entspricht der Mode $|n|^2 = 1$.

10.7.4 Der rekonstruierte Grundton ist nicht der erste Peak

Der Gitter-Grundton $c \approx 126$ entspricht $\ell \approx 126$ für $|n|^2 = 1$. Der erste *sichtbare* Peak liegt aber bei $|n|^2 = 3$, also $\ell \approx 219$. Es gibt somit eine **echte, aber als Peak unsichtbare** Grundmode:

$$|n|^2 = 1 \ \rightarrow\ \ell \approx 126 \quad (\text{Grundmode, kein Peak}),$$

$$|n|^2 = 3 \ \rightarrow\ \ell \approx 219 \quad (\text{erster sichtbarer Peak}).$$

Bemerkenswert: $\ell \approx 126$ liegt *mitten im beobachteten Bereich*, aber dort ist kein Akustik-Peak, sondern das ansteigende Sachs-Wolfe-Plateau. Das ist konsistent damit, dass $|n|^2 = 1$ kein lokales Maximum des Spektrums $I(r)$ ist (Schritt 11.1); das erste lokale Maximum liegt bei $|n|^2 = 3$.

Folgerung 4: Es gibt eine reale, tieferliegende Grundmode bei $\ell \approx 126$, die als Skalensetzer wirkt, aber nicht als Peak erscheint. Dies ist eine schwach falsifizierbare Konsistenzbedingung: der aus den oberen Peaks rekonstruierte Grundton c muss zur Stelle passen, an der das Spektrum vom Plateau in den ersten Peak übergeht.

10.7.5 Keine Größe des Universums aus den Schwingungen

Aus den Winkel-Schwingungen lässt sich *keine absolute Größe* ablesen – weder die Größe der Strukturen noch die des Universums. Der gemessene Winkel eines Peaks ist

$$\theta = \frac{L_{\text{struktur}}}{D_A},$$

also nur das *Verhältnis* aus physischer Strukturgröße L_{struktur} und Distanz D_A (Winkeldistanz zur Ursprungsfläche). Derselbe Winkel passt zu „große Struktur, weit weg“ ebenso wie zu „kleine Struktur, nah dran“:

angenommenes D_A	$\rightarrow$ L_{struktur} **(bei** $\theta \approx 0{,}8°$**)**
$14\,000$ Mpc	≈ 200 Mpc
100 Mpc	$\approx 1{,}4$ Mpc
1 Mpc	$\approx 0{,}01$ Mpc

Um aus dem Winkel eine absolute Länge zu machen, braucht man D_A – und D_A ist keine Messgröße, sondern ein **Modell-Output**:

- ΛCDM: $D_A = \int c/H(z)\,dz$ – erfordert H_0, Ω_m, Ω_Λ, das Rekombinations-z_*.
- FFGFT: $D_A = R_H \ln(1+z_*)$ – erfordert R_H, den externen Parameter (P20), der nicht aus ξ allein folgt.

In beiden Fällen kommt die Distanz aus dem Modell, nicht aus der Messung. Die Winkel-Messung ist **maßstabslos**: sie zeigt die *Form* des Musters (die Verhältnisse), aber nicht seine absolute Größe – wie ein Foto ohne Maßstab die Form eines Objekts zeigt, nicht seine Größe. Das ist exakt dieselbe Grenze wie bei den Peak-Verhältnissen: die *Form* folgt aus der Geometrie, die *absolute Skala* braucht einen externen Parameter (P20).

Warum die Resonator-Methode hier nicht hilft. Bei einem echten Resonator vor uns – einer Orgelpfeife etwa – steckt die Größe sehr wohl in der Grundschwingung: misst man die Grundwellenlänge λ_0 *in Metern* und kennt das Medium (Schallgeschwindigkeit c_{Medium}), folgt die Länge direkt, $L = \lambda_0/2$. Diese Methode braucht zwei Dinge, die bei der CMB beide fehlen:

- **Eine Wellenlänge in Metern** – nicht nur einen Winkel. Die Orgelpfeife liegt vor uns; wir messen ihre Länge direkt. Der CMB-„Resonator“ ist unerreichbar weit weg; wir sehen nur seinen Winkel am Himmel, nicht seine Länge. Der Schritt vom Winkel zur Länge braucht D_A – den unbekannten Modell-Output.
- **Ein bekanntes Medium.** Bei der Orgelpfeife ist c_{Medium} eine bekannte Konstante. Im ΛCDM-Plasma-Bild ist die „Schallgeschwindigkeit“ $c_s(z) = c/\sqrt{3(1+R(z))}$ keine Konstante, sondern eine *aus dem Modell gerechnete Funktion*: sie erfordert die Baryonen- und Photonendichte als Funktion der Zeit, die Expansionsgeschichte und den Rekombinationszustand. Das „Medium“ ist hier kein Stoff, den man wie Luft vor sich hat und dessen c man misst – es entsteht erst *indirekt* aus der angenommenen Krümmung und Expansion. „Früher dichter“ ist bereits eine Aussage über die Geometrie, nicht über ein unabhängig existierendes Medium.

Damit ist die Rückrechnung im ΛCDM-Bild gleich dreifach modellabhängig: die „Wellenlänge" ist nur ein Winkel, das „Medium" $c_s(z)$ ist aus Dichte, Expansion und Metrik herausgerechnet, und die Distanz D_A ist ebenfalls ein Modell-Output. Keine der drei Zutaten ist eine modellfreie Messung; das „Medium" ist sogar die am stärksten abgeleitete Größe. FFGFT braucht im Gegenzug *kein* Medium und *keine* Schallgeschwindigkeit – die Peaks sind Eigenmoden einer Geometrie, kein Schall in einem Stoff – benötigt aber für die absolute Skala R_H als externen Parameter (P20). Nicht annahmenfrei, sondern eine andere *Art* von Annahme: eine geometrische Skala statt einer ganzen Plasma- und Expansionsgeschichte.

10.7.6 Was sicher ist und was nicht – die Abtastgrenze

Sicher ablesbar (modellfrei):

- Keine geraden Obertöne – die Anharmonizität ist real, kein Artefakt; die Verhältnisse liegen über der harmonischen Reihe.
- Ein diskretes Modengitter mit $\sqrt{|n|^2}$-Skalierung ist die sparsamste Deutung (ein Parameter, $c \approx 126$).
- Es gibt keine harmonische Grundschwingung „unter" dem ersten Peak; der lineare Fit dorthin ist ein missing-fundamental-Artefakt.
- Es lässt sich *keine absolute Größe* (des Universums oder der Strukturen) ablesen – der Winkel gibt nur L/D_A, und D_A ist ein Modell-Output.

Nicht ablesbar (Grenze der Methode):

- Ob die Anharmonizität von einem $\sqrt{\text{Ganzzahl-Gitter}}$ (FFGFT) oder von akustischer ΛCDM-Dispersion stammt – beide erzeugen dieselbe Form (kosmologische Entartung, Dok. 267).
- Feinunterschiede zwischen anharmonischen Gesetzen: die CMB-Peaks sind *breit* (Halbwertsbreite $\Delta\ell \sim 100$–200), die Positionen nur auf ~ 1–$3\,\%$ bestimmbar. Das reicht zum *Ausschluss* gerader Obertöne, nicht zur Unterscheidung der anharmonischen Gesetze.

Fazit dieses Abschnitts: Die reine Frequenzanalyse – ohne jede T^4-Annahme – liefert drei robuste Aussagen: (i) keine harmonische Obertonreihe, (ii) die Anharmonizität ist real (Verhältnisse über der harmonischen Reihe), (iii) ein Gitter-Grundton $c \approx 126$ existiert und entspricht einer echten, aber unsichtbaren $|n|^2{=}1$-Mode. Diese Aussagen sind unabhängig von der FFGFT-Herleitung gewonnen und stützen sie von der Messseite her, ohne die kosmologische Entartung (FFGFT vs. ΛCDM) aufzuheben.

E.13 Schritt 11: Kein Fit – was hergeleitet ist und was offen bleibt

Die Übereinstimmung der Peak-Verhältnisse auf $< 2\%$ kommt *nicht* aus einem Fit. Dieser Abschnitt zeigt explizit was woher kommt.

11.1 Was vorwärts folgt – und was nicht

Einordnung der Folge $\{1, 6, 14, 26\}$

Die Folge $\{1, 6, 14, 26\}$ folgt *nicht* aus ξ als lokale Maxima; $I(r)$ enthält ξ gar nicht. Die echten lokalen Maxima des vollen thermisch gewichteten T^4-Spektrums liegen bei $|n|^2 = 3, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, \ldots$ (dicht). Davon sind $6, 14, 26$ lokale Maxima, aber 1 ist es *nicht*, und 10 (ein lokales Maximum) fehlt in der Folge. $\{1, 6, 14, 26\}$ ist also *keine* natürliche Forward-Teilmenge – sie wurde aus den Daten abgelesen (Schritt 4). Was vorwärts aus T^4 folgt, ist in Schritt 17 sauber getrennt.

Größe	Herkunft
T^4-Spektrum-Maxima bei $\lvert n\rvert^2 = 3, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, \ldots$	Lokale Maxima von $I(r) = g(r) \cdot N(r) \cdot r$; g aus Jacobi-Formel (exakt), N aus Bose-Einstein. Eingabe: keine – $I(r)$ enthält ξ nicht, die Maxima sind ξ-unabhängig. *Forward, aber dicht.*
Harmonisches Rückgrat $1 : 2 : 3 : 4 : 5$	Symmetrische Resonanz (n, n, n): $k^2_{\text{obs}} = 3n^2$. *Forward*, aber harmonisch – "zu sauber".
Anharmonizität (Streckung)	Kodimension-1-Projektion $D_f - 1 \approx 2 \Rightarrow J_0$-Bessel. *Forward, parameterfrei* (Schritt 17).
Auswahl genau $\{1, 6, 14, 26\}$	*Aus den CMB-Daten abgelesen* (Schritt 4), nicht vorwärts.

Was forward ist: das dichte Spektrum, das harmonische Rückgrat und die geometrische Anharmonizität. **Was rückwärts ist:** die konkrete Auswahl der vier sichtbaren Peaks.

11.2 Was noch nicht streng hergeleitet ist

Annahme	Status	Konsequenz
$L_{\text{tor}} = 1/(k_B T_{\text{CMB}})$	Physikalisch motiviert, nicht streng bewiesen	Betrifft nur die absolute Skala, *nicht* die Verhältnisse
$k^2_{\text{obs}} = (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2)/L^2$	Beobachter in 3D + Zeitentfaltung, n_4 = Zeitentfaltung	Erzeugt den Faktor 3 nicht (Schritt 8); der Faktor ist gesetzt
D_A (Winkeldistanz)	Externer Parameter R_H nötig (P20)	Betrifft nur $\ell_1 \approx 220$, nicht die Verhältnisse

11.3 Was die Verhältnisse beweisen und was nicht

Die Verhältnisse $1 : 2{,}449 : 3{,}742 : 5{,}099$ stimmen mit CMB auf $< 2\%$ überein; die Auswahl $\{1, 6, 14, 26\}$ ist dabei aus den Daten abgelesen, der Faktor 3 gesetzt. Das zeigt:

- Die so gewählte Serie $\{3, 18, 42, 78\}$ fällt auf echte lokale Maxima des T^4-Spektrums (Schritt 5).
- Die Abweichung von $< 2\%$ liegt innerhalb der Messungenauigkeit der rohen CMB-Peak-Positionen (ohne ΛCDM-Template-Fit).

Das beweist *nicht*:

- Dass Faktor 3 und Auswahl aus der Geometrie folgen: der Faktor 3 ist aus der Projektion nicht erzeugbar (Schritt 8), und die naive sphärische C_ℓ-Projektion reproduziert die Serie nicht (Schritt 17.1; P29, P30 offen).
- Dass keine andere Theorie dieselben Verhältnisse erzeugen kann.
- Dass FFGFT den gesamten CMB korrekt beschreibt (Amplituden, Polarisation, Frühphasen-Physik offen).

Der Status ist: eine Retrodiktion – die aus den Daten abgelesene Serie fällt mit gesetztem Faktor 3 auf echte T^4-Maxima und trifft die beobachteten Verhältnisse auf $< 2\%$. Der Forward-Gehalt liegt in der Anharmonizität (Schritt 17).

E.14 Schritt 12: Schwarzschild-Verbindung und R_H

12.1 Die zwei Schwarzschild-Radien in FFGFT

FFGFT hat zwei Skalen die gleichzeitig Schwarzschild-Radien sind (Dok. 190, P4; Dok. 182):

Skala	Definition	Schwarzschild-Masse	Check
$L_0 = \xi \cdot \ell_P$	Sub-Planck-Fundamentallänge	$M_0 = \xi \cdot m_P/2$	$r_S(M_0) = L_0$
$R_H = \hbar c/E_H$	Hubble-Horizont	$M_U = R_H c^2/(2G)$	$r_S(M_U) = R_H$

Beide Checks numerisch:

$$r_S(M_0) = \frac{2G \cdot \xi \cdot m_P/2}{c^2} = \xi \cdot \frac{G m_P}{c^2} = \xi \cdot \ell_P = L_0 \quad \checkmark$$

$$r_S(M_U) = \frac{2G \cdot M_U}{c^2} = \frac{2G}{c^2} \cdot \frac{R_H c^2}{2G} = R_H \quad \checkmark$$

12.2 Die Umrechnung: R_H aus den zwei Schwarzschild-Bedingungen

Division der zwei Schwarzschild-Formeln:

$$\frac{R_H}{L_0} = \frac{2G\,M_U/c^2}{2G\,M_0/c^2} = \frac{M_U}{M_0}$$

Also:

$$\boxed{R_H = L_0 \cdot \frac{M_U}{M_0} = \xi \cdot \ell_P \cdot \frac{M_U}{\xi \cdot m_P/2} = \frac{2\,\ell_P \cdot M_U}{m_P}}$$

Das ist eine reine Umrechnung – kein Modell, keine Annahme. Sie zeigt: R_H folgt direkt aus L_0 und dem Massenverhältnis M_U/M_0.

12.3 Was das bedeutet

$L_0 = \xi \cdot \ell_P$ ist vollständig aus ξ hergeleitet. $M_0 = \xi \cdot m_P/2$ ebenso.

R_H ist damit vollständig bestimmt *sobald* M_U bekannt ist:

$$R_H = \frac{2\,\ell_P}{m_P} \cdot M_U$$

In Dok. 182 wird M_U über $E_H = E_0 \cdot \xi^{41/4}$ gewonnen. Die Schwarzschild-Umrechnung zeigt denselben R_H von einer anderen Seite – als direkte Konsequenz der Massenskala des Universums.

12.4 Offene Frage: M_U unabhängig aus ξ?

Die Verbindung $R_H = 2\ell_P M_U/m_P$ ist exakt. Offen ist: kann M_U aus der T^4-Modenstruktur hergeleitet werden *ohne* R_H vorauszusetzen?

Wenn ja, dann wäre R_H eine echte Vorhersage aus ξ allein – ohne den Exponenten $41/4$ als Eingabe zu brauchen. Das ist eine offene Herleitung, kein prinzipielles Hindernis.

E.15 Schritt 13: Das Messproblem – was FFGFT kann, was ΛCDM nicht kann

13.1 Der Exponent 41/4 ist äquivalent zu H_0

Aus $E_H = E_0 \cdot \xi^{41/4}$ und $H_0 = E_H/\hbar$ folgt:

$$\frac{41}{4} = \frac{\ln(E_0/(\hbar H_0))}{\ln(1/\xi)}$$

Der Exponent $41/4$ ist damit **äquivalent zur Messung von H_0**. Numerisch:

H_0 [km/s/Mpc]	Quelle	Exponent
66,19	FFGFT (aus $41/4$)	10,2492
67,40	Planck/CMB (ΛCDM)	10,2472
73,00	SH0ES (Distanzleiter)	10,2382

Der Unterschied zwischen den Exponenten ist kleiner als 0,02 – alle H_0-Messungen geben denselben Exponenten auf $\sim 0{,}1\%$.

13.2 Das Messproblem

Eine modellfreie Messung von H_0 gibt es nicht. Jede Messung setzt Modellannahmen voraus:

Methode	Modellannahme	Ergebnis
CMB-Peaks (ΛCDM)	Expansion, FLRW-Metrik, Rekombination	$67{,}4$ km/s/Mpc
Distanzleiter (SH0ES)	Kalibrierte Standardkerzen, lokale Geometrie	$73{,}0$ km/s/Mpc
FFGFT ($\xi^{41/4}$)	Statisches Universum, T^4-Topologie, Exponent $41/4$ gesetzt (nicht hergeleitet)	$66{,}2$ km/s/Mpc

In FFGFT bedeutet H_0 etwas anderes als in ΛCDM: nicht die Expansionsrate, sondern den Kehrwert der fraktalen Wegverlängerungsskala $R_H = c/H_0$. Was ΛCDM als Expansion misst, interpretiert FFGFT als fraktale Wegverlängerung $z(d)$ (Dok. 190, P14a).

13.3 Was FFGFT kann, was ΛCDM nicht kann

Größe	ΛCDM	FFGFT
H_0	Freier Parameter (aus Daten bestimmt)	Aus $\xi^{41/4}$ abgeleitet (wenn $41/4$ hergeleitet)
CMB-Peak-Verhältnisse	Aus $r_s(z^*)$ und $D_A(z^*)$ (braucht H_0, Ω_b, ...)	Retrodiktion: T^4-Maxima, Faktor 3 gesetzt, Auswahl aus Daten
Absolute Peak-Position ℓ_1	Aus H_0, z^*, r_s	Aus R_H (aus $\xi^{41/4}$) + offene Verbindung P20

Der strukturelle Unterschied: ΛCDM braucht H_0 als Eingabe – gemessen, nicht hergeleitet. FFGFT schreibt $H_0 = 66{,}2$ km/s/Mpc als $\xi^{41/4}$. Wenn $41/4$ aus der T^4-Geometrie folgt (noch offen), ist H_0 eine *Vorhersage* – kein freier Parameter.

Das verbleibende offene Problem: Der Exponent $41/4$ ist in keinem Dokument aus der T^4-Geometrie hergeleitet. Er ist die einzige Stelle in der FFGFT-Kosmologie wo eine externe Eingabe nötig ist – äquivalent zu H_0. Solange diese Herleitung fehlt, steht FFGFT und ΛCDM in dieser Hinsicht gleich: beide brauchen eine kosmologische Skala als Eingabe.

E.16 Schritt 14: Die universelle Compton-Schwarzschild-Relation

14.1 Jede Länge hat zwei zugeordnete Massen

Zu jeder Länge R gehören zwei Massen:

$$M_c(R) = \frac{\hbar}{R\,c} \quad (R \text{ ist ihre Compton-Wellenlänge})$$

$$M_s(R) = \frac{R\,c^2}{2G} \quad (R \text{ ist ihr Schwarzschild-Radius})$$

Ihr Produkt ist *unabhängig von* R:

$$\boxed{M_c(R) \cdot M_s(R) = \frac{\hbar}{Rc} \cdot \frac{Rc^2}{2G} = \frac{\hbar c}{2G} = \frac{m_P^2}{2}}$$

14.2 Anwendung auf das Elektron

Äquivalent in Längen: zu jeder Masse m gehören Compton-Wellenlänge $\lambda = \hbar/(mc)$ und Schwarzschild-Radius $r_S = 2Gm/c^2$, mit

$$\lambda \cdot r_S = \frac{\hbar}{mc} \cdot \frac{2Gm}{c^2} = \frac{2G\hbar}{c^3} = 2\,\ell_P^2$$

Also:

$$\sqrt{\lambda_e \cdot r_S(e)} = \sqrt{2}\,\ell_P$$

Die beiden Skalen des Elektrons liegen *geometrisch symmetrisch* um die Planck-Länge – unabhängig von der Elektronmasse.

Skala	Wert	Bedeutung
$r_S(e) = 2Gm_e/c^2$	$1{,}35 \times 10^{-57}$ m	Schwarzschild (unten)
ℓ_P	$1{,}62 \times 10^{-35}$ m	Planck (Mitte)
$\lambda_e = \hbar/(m_e c)$	$3{,}86 \times 10^{-13}$ m	Compton (oben)

14.3 Anwendung auf R_H

Dieselbe Relation gilt für den Hubble-Radius:

$$M_c(R_H) = \frac{\hbar}{R_H c} = \frac{E_H}{c^2} \quad \text{(winzig)}$$

$$M_s(R_H) = \frac{R_H c^2}{2G} = M_U \quad \text{(Universumsmasse)}$$

mit

$$M_c(R_H) \cdot M_s(R_H) = \frac{E_H}{c^2} \cdot M_U = \frac{m_P^2}{2} \quad \checkmark$$

14.4 Was diese Relation leistet und was nicht

Sie leistet: Eine elegante interne Konsistenz. Die Schwarzschild-Masse des Universums M_U und die kosmologische Energie E_H sind durch $M_U \cdot E_H/c^2 = m_P^2/2$ verbunden – exakt, ohne freien Parameter. Die zwei Schwarzschild-Skalen L_0 (unten) und R_H (oben) sind keine willkürlichen Grenzen, sondern Schwarzschild-Radien realer Massen ($M_0 = \xi m_P/2$ und M_U).

Sie leistet nicht: Eine Bestimmung von R_H. Die Relation $M_c \cdot M_s = m_P^2/2$ ist eine universelle Identität – sie gilt für *jede* Länge und gibt daher keine neue Information über den Zahlenwert von R_H. Beide Massen $M_c(R_H)$ und $M_s(R_H)$ sind über R_H definiert; ihr Produkt ist tautologisch $m_P^2/2$.

Um R_H festzulegen braucht man eine *unabhängige* Eingabe: die kosmologische Energie $E_H = E_0 \cdot \xi^{41/4}$ (Dok. 182). Das Elektron legt über $\sqrt{\lambda_e r_S(e)} = \sqrt{2}\ell_P$ die Planck-Skala fest, aber nicht R_H.

Das verbleibende offene Problem bleibt: Der Exponent $41/4$ – äquivalent zur kosmologischen Energieskala E_H – ist die einzige Eingabe die FFGFT für die absolute kosmologische Skala braucht. Die Compton-Schwarzschild-Relation erklärt die *Struktur* der Skalenhierarchie, aber nicht den *Wert* von E_H.

E.17 Schritt 15: Die T⁴-Länge ist ein Schwarzschild-Radius

15.1 Die fundamentale Identität (Dok. 010, 066, 067)

Die FFGFT-Dokumente definieren die T0-Länge eines Objekts als:

$$r_0 = 2Gm \quad \text{(natürliche Einheiten, } c = 1\text{)}$$

Dok. 067 stellt explizit fest: der Faktor 2 ergibt sich aus der relativistischen Feldstruktur und *stimmt exakt mit dem Schwarzschild-Radius überein*. Dok. 010 schreibt $r_0 = 2GE$ (Energie statt Masse), Dok. 066 als Verhältnis $\xi = r_0/\ell_P = 2Gm/\ell_P$.

Das bedeutet: Jede charakteristische T0-Länge *ist* ein Schwarzschild-Radius – nicht analog, sondern identisch.

15.2 Warum verschiedene Formeln in den Dokumenten?

Es ist dieselbe Formel in verschiedenen Einheitensystemen:

Dokument	Formel	Einheitensystem
SI	$r_S = 2Gm/c^2$	Meter, kg, Sekunden
Dok. 015, 029	$r_S = 2M$	natürlich ($G = c = 1$)
Dok. 010	$r_0 = 2GE$	$c = 1$, Energie statt Masse
Dok. 066	$r_0 = \xi \cdot \ell_P$	Planck ($\ell_P = 1$)

Für die Minimalmasse $M_0 = (\xi/2)\, m_P$ geben *alle* denselben Wert:

$$\frac{2GM_0}{c^2} = \frac{2G}{c^2} \cdot \frac{\xi}{2} m_P = \xi \cdot \frac{Gm_P}{c^2} = \xi \cdot \ell_P = L_0 = 2{,}155 \times 10^{-39}\ \text{m}$$

Die scheinbare Vielfalt ist nur die SI-Umrechnung, die Faktoren c^2 und G ein- oder ausblendet. Sobald in SI-Einheiten gerechnet wird, erscheinen c^2 und G explizit; in natürlichen Einheiten verschwinden sie. Die Physik ist in allen Fällen identisch.

15.3 "ein Schwarzschild-Radius" vs. "der Schwarzschild-Radius"

In der Standardphysik spricht man von *dem* Schwarzschild-Radius eines Objekts – die eine Länge bei der diese Masse zum Schwarzen Loch wird.

In FFGFT ist die T0-Länge *immer* ein Schwarzschild-Radius – aber *welcher*, hängt von der Masse ab:

Masse	**Schwarzschild-Radius**	**Rolle**
Elektron m_e	$1{,}35 \times 10^{-57}$ m	Teilchen-Skala
$M_0 = (\xi/2)m_P$	$L_0 = 2{,}16 \times 10^{-39}$ m	Fundamentallänge
Proton	$2{,}48 \times 10^{-54}$ m	Teilchen-Skala
M_U (Universum)	$R_H = 1{,}41 \times 10^{26}$ m	Hubble-Horizont

Daher: L_0 *ist ein* Schwarzschild-Radius (nämlich der von M_0) – aber *nicht der* Schwarzschild-Radius schlechthin, weil es keinen einzigen universellen gibt. Ebenso ist R_H *ein* Schwarzschild-Radius (der von M_U), nicht *der* eine.

Das ist die Skalenrelativität aus Dok. 182: jedes System trägt seinen eigenen Torus mit eigener charakteristischer Skala $R_{\text{Torus}}(m) = \hbar/(mc)$. Die universelle Untergrenze L_0 gilt für alle; eine universelle Obergrenze existiert nicht – R_H ist nur die Obergrenze des kosmologischen Sektors.

15.4 Was das für R_H bedeutet

R_H *deckt sich exakt* mit dem Schwarzschild-Radius von M_U – das ist in den Dokumenten korrekt formuliert und keine Näherung. Aber: weil $r_0 = 2Gm$ die *Definition* der T0-Länge ist, ist die Übereinstimmung notwendig, nicht überraschend. Die T0-Länge einer Masse und ihr Schwarzschild-Radius sind dasselbe Objekt.

Die Identität legt R_H nicht unabhängig fest: man braucht weiterhin M_U (bzw. $E_H = E_0 \cdot \xi^{41/4}$). Was die Identität leistet, ist die *physikalische Deutung*: R_H ist nicht ein abstrakter Horizont, sondern der Schwarzschild-Radius der Gesamtmasse des statischen Universums – das Universum sitzt an seiner eigenen Schwarzschild-Grenze.

E.18 Schritt 16: Warum die Schwarzschild-Relation R_H nicht herleitet

16.1 Die verlockende, aber falsche Schlussfolgerung

Aus zwei wahren Formeln entstand ein Trugschluss:

$$\text{(A)} \quad \xi = L_0/\ell_P, \quad L_0 = \xi \cdot \ell_P \tag{E.1}$$

$$\text{(B)} \quad r_S(m) \cdot r_C(m) = 2\,\ell_P^2 \quad \text{(universell)} \tag{E.2}$$

Beide sind korrekt. Der Fehler entstand durch eine stillschweigende Annahme: dass man in Relation (B) die Elektronmasse m_e durch die Universumsmasse M_U ersetzen kann, *während man λ_e beibehält*, und so $R_H = r_S(M_U)$ herausbekommt.

16.2 Der genaue Fehler

Relation (B) verbindet zwei Größen *derselben* Masse. Beim Elektron:

$$\underbrace{r_S(m_e)}_{1{,}35\times10^{-57}\,\mathrm{m}} \cdot \underbrace{\lambda_e}_{3{,}86\times10^{-13}\,\mathrm{m}} = 2\,\ell_P^2$$

Beide Faktoren gehören zu m_e.

Ersetzt man $m_e \to M_U$, so ersetzt man *beide* Faktoren:

$$\underbrace{r_S(M_U)}_{R_H = 1{,}41\times10^{26}\,\mathrm{m}} \cdot \underbrace{r_C(M_U)}_{3{,}7\times10^{-96}\,\mathrm{m}} = 2\,\ell_P^2$$

Die Compton-Wellenlänge von M_U ist $3{,}7 \times 10^{-96}$ m – **nicht** λ_e. Die Vermischung war: R_H (Schwarzschild des *Universums*) wurde mit λ_e (Compton des *Elektrons*) in eine Relation gesteckt, die nur für eine einzige Masse gilt. Tatsächlich:

$$r_S(M_U) \cdot \lambda_e = 5{,}4 \times 10^{13}\,\mathrm{m}^2 \neq 2\,\ell_P^2 = 5{,}2 \times 10^{-70}\,\mathrm{m}^2$$

– um den Faktor 10^{83} daneben.

16.3 Zwei getrennte Systeme

Elektron und Universum sind zwei verschiedene Systeme, jedes in sich konsistent:

$$\text{Elektron:} \quad m_e \to \{r_S(e),\ \lambda_e\}, \quad r_S(e) \cdot \lambda_e = 2\ell_P^2$$

$$\text{Universum:} \quad M_U \to \{R_H,\ r_C(M_U)\}, \quad R_H \cdot r_C(M_U) = 2\ell_P^2$$

Zwischen den Systemen gibt es *keine* Brücke aus dieser Relation.

16.4 Die Schwarzschild-Formel erzeugt keine Information

Der tiefere Grund: $r_S = 2GM/c^2$ ist eine *Umrechnung* zwischen Masse und Länge. Wie bei jedem Objekt:

Bekannt	**Folgt**
Masse M	Schwarzschild-Radius $r_S = 2GM/c^2$
Länge r_S	Masse $M = r_S c^2/(2G)$
keins von beiden	**nichts**

Das gilt für ein Schwarzes Loch, die Sonne, das Elektron und das Universum gleichermaßen. Um R_H zu kennen, muss eine der vier äquivalenten Größen unabhängig bekannt sein:

$$M_U \longleftrightarrow H_0 \longleftrightarrow E_H \longleftrightarrow R_H$$

Sie bilden einen Ring von Umrechnungen – aber keinen Eingang.

16.5 Wo FFGFT die Eingabe liefert

FFGFT liefert genau eine kosmologische Eingabe:

$$E_H = E_0 \cdot \xi^{41/4}, \qquad E_0 = \sqrt{m_e m_\mu}$$

Daraus folgt $R_H = \hbar c/E_H$ und alles Übrige. Der Exponent $41/4$ ist äquivalent zur Angabe von H_0 und ist in keinem Dokument aus der T^4-Geometrie hergeleitet (offenes Problem).

Fazit: Die Schwarzschild-Identität (L_0, R_H sind Schwarzschild-Radien) ist eine echte strukturelle Eigenschaft und liefert die *physikalische Deutung*. Aber sie kann die kosmologische Skala nicht *erzeugen* – dafür braucht es die eine Eingabe E_H. Der frühere Eindruck, die zwei Formeln (A) und (B) würden R_H herleiten, beruhte auf der stillschweigenden Ersetzung $m_e \to M_U$, die zwei verschiedene Massen vermischt.

E.19 Schritt 17: Forward-Test – Anharmonizität aus der Kodimension-1-Projektion

Dieser Schritt trennt sauber, was *vorwärts* (ohne Datenblick) aus T^4 folgt und was *rückwärts* (Konsistenzprüfung) ist. Er dokumentiert das Ergebnis einer expliziten Forward-Untersuchung und ist der konzeptuelle Fortschritt gegenüber den Schritten 1–11. Alle hier genannten Zahlen sind mit den beiliegenden Skripten (`python/Dok267_268_Skripte/`) nachrechenbar.

17.1 Was die naive Vorwärts-Rechnung ergibt – und was nicht

Drei Forward-Rechnungen, alle ohne jeden Blick auf die Daten:

1. **Symmetrischer T^4, sphärische C_ℓ-Bessel-Projektion** ($C_\ell = \sum_n N_{\mathrm{BE}}\, |j_\ell(k_{\mathrm{obs}} D_A)|^2$): reproduziert $\{3, 18, 42, 78\}$ *nicht*. Das Ergebnis ist ein Quasi-Kontinuum, dominiert von den niedrigsten Moden (stärkster Peak bei $\ell \approx 122$). Die naive Bessel-Projektion ist *unzureichend*.
2. **3+Zeit (T^3-Raumspektrum):** lokale Maxima bei $|n|^2 = 2, 5, 9, 14, 17, 21, 26, \ldots$ – dicht, und *nicht* $\{1, 6, 14, 26\}$.
3. **Symmetrische Raumresonanz** (n, n, n)**:** $k^2_{\mathrm{obs}} = 3n^2 \Rightarrow$ Serie $\{3, 12, 27, 48, 75\}$, Verhältnisse $\sqrt{3} : \sqrt{12} : \sqrt{27} : \ldots = 1 : 2 : 3 : 4 : 5$ (*harmonisch*).

Folgerung: Forward erzeugt T^4 entweder ein dichtes Spektrum oder das harmonische Rückgrat $1 : 2 : 3 : 4 : 5$. Die spärliche, anharmonische Serie $\{3, 18, 42, 78\}$ ist *kein* Forward-Output; sie entsteht nur durch die aus den Daten abgelesene Auswahl $\{1, 6, 14, 26\}$.

Konkret offen ($|n|^2 = 30$, von O. Teker geschärft): $30 = 3 \cdot 10$, und $|n|^2 = 10$ ist ein echtes lokales Maximum ($I = 20{,}1$). Damit erfüllt 30 den Faktor-3-Filter. Thermisch ist es sogar *stärker* als zwei der sichtbaren Peaks: $I(30) = 13{,}2 > I(42) = 7{,}6 > I(78) = 1{,}7$. Trotzdem zeigt der CMB bei $|n|^2 = 30$ ($\ell \approx 696$, im Tal zwischen Peak 2 und Peak 3) keinen Peak. Eine Auswahl nach dem stärksten Peak im Bereich (Abschnitt 10.3) trägt daher nicht. Der Faktor 3 ist zudem selbst gesetzt (Schritt 8); die Peak-Selektion bleibt insgesamt offen (P29, P30).

17.2 Der eigentliche Forward-Befund: Anharmonizität ist geometrisch

Das harmonische Rückgrat $1 : 2 : 3 : 4 : 5$ ist "zu sauber" – wie die idealen Obertöne einer steifigkeitsfreien Saite. Reale Saiten sind durch ihre Steifigkeit *inharmonisch* (gestreckte Klavierstimmung). Analog *erwarten* wir Anharmonizität, weil die Raumzeit aus unserer Sicht gekrümmt ist und die Projektion nicht-linear (fraktale Wegverlängerung).

Akustische Resonatoren zeigen, dass Anharmonizität rein *geometrisch* ist (forward, ohne Fit, ohne Medium):

Resonator (Dimension D)	**Verhältnisse**	**Abw. zu CMB**
Rohr/Kugel j_0 ($D = 3$, $\nu = \frac{1}{2}$)	$1 : 2 : 3 : 4$ (harmonisch)	-18 bis -24%
Kreismembran J_0 ($D = 2$, $\nu = 0$)	**$1 : 2{,}30 : 3{,}60 : 4{,}90$**	**-2** bis **-6%**
S^3-Laplace	$1 : 1{,}63 : 2{,}24$	-33 bis -48%
S^2 ($Y_{\ell m}$)	$1 : 1{,}73 : 2{,}45$	zu dicht
CMB beobachtet	$1 : 2{,}44 : 3{,}68 : 5{,}09$	—

Schlüsselfakt: Der radiale Bessel-Index ist $\nu = D/2 - 1$. Die Anharmonizität ist *maximal bei* $D = 2$ ($\nu = 0$, J_0) und verschwindet bei $D = 1$ und $D = 3$ (beide harmonisch). Die CMB-Serie sitzt genau bei $D \approx 2$ – der Dimension maximaler Anharmonizität.

Wichtig: Der Match ist zur *flachen* Kreismembran (J_0), *nicht* zur gekrümmten 2-Sphäre ($Y_{\ell m}$, gibt $1 : 1{,}73 : \ldots$, falsch). Die richtige Erwartung ist eine *flache begrenzte Scheibe*, keine Sphäre – denn die CMB-Peaks kommen aus der *radialen* Projektion, nicht aus den Eigenwerten der Beobachtungsfläche.

17.3 Herleitung: flache Scheibe aus der fraktalen Kodimension-1

Die Letztstreufläche ist eine **Kodimension-1-Hyperfläche** im fraktalen Raum:

$$D_{\text{eff}} = D_f - 1 = (3 - \xi) - 1 = 2 - \xi \approx 2.$$

Radiale Moden in D Dimensionen sind Nullstellen von $J_{D/2-1}$. Für $D = 2 - \xi$:

$$\nu = \frac{D}{2} - 1 = \frac{2 - \xi}{2} - 1 = -\frac{\xi}{2} \approx -6{,}7 \times 10^{-5} \approx 0 \;\Rightarrow\; J_0\text{-Membran.}$$

Das gibt forward, **parameterfrei und ohne Modenauswahl**, die anharmonische Serie $1 : 2{,}30 : 3{,}60 : 4{,}90$ – Treffer auf $\sim 5\%$. Die Anharmonizität folgt aus der Kodimension-1-Projektion in der fraktalen Geometrie, genau wie aus der Krümmung erwartet.

17.4 Die kleine Restabweichung – ehrlich offen

Der Best-Fit liegt bei $\nu \approx -0{,}07$, also effektiver Dimension $D \approx 1{,}86$ – knapp *unter* 2. Die naheliegende physikalische Quelle wäre die *Spektral-Dimension* d_s (maßgeblich für

Wellenausbreitung auf einem Fraktal), die generell unter der Hausdorff-Dimension liegt: $d_s = 2D_f/d_w$ mit Walk-Dimension $d_w > 2$.

Die explizite Rechnung schließt diese Quelle jedoch aus:

- Das FFGFT-Fraktal ist *zu schwach fraktal*: mit $D_f = 3 - \xi$ ist $d_w = 2 + O(\xi)$, also d_s(Fläche) $\approx 2{,}00$. ξ ist $\sim 1000\times$ zu klein, um D auf $1{,}86$ zu drücken.
- Für $d_s = 1{,}86$ bräuchte man $d_w \approx 2{,}15$ (starke Fraktalität), unvereinbar mit $D_f = 2 - \xi$.

Die Restabweichung ist nicht aus ξ herleitbar. Zudem ist sie von der Größenordnung der Messunsicherheit: die reine J_0-Vorhersage ($D = 2$) ist mit den Peaks 3 und 4 innerhalb $\sim 2\sigma$ konsistent; nur Peak 2 sitzt bei $\sim 4\sigma$. Der "Best-Fit $1{,}86$" ist damit weitgehend Messrauschen; auf einen exakten Wert (etwa $13/7$) zu zeigen wäre Zahlenspielerei, die die Datenqualität nicht hergibt.

17.5 Zusammenfassung – geschichtete, ehrliche Struktur

Schicht	Status
$D = 3 \to 2$ (Kodimension-1, J_0)	**forward, parameterfrei, hergeleitet**; $\sim 5\%$
Anharmonizität geometrisch	hergeleitet (maximal bei $D = 2$)
Verhältnis-Match $\{3, 18, 42, 78\}$	Retrodiktion (aus Daten), *nicht* Vorhersage
$D = 2 \to 1{,}86$ (Sub-2)	nicht aus ξ; weitgehend Messrauschen; offen
Ausschluss $\lvert n\rvert^2 = 30$	offen (Peak-Selektion, P29/P30)
Peak-2-Rest ($\sim 4\sigma$)	kleiner genuiner offener Punkt, vermutlich andere Physik

Verteidigbare Aussage (statt "Fit auf $D = 1{,}86$"): Die fraktale Kodimension-1-Projektion erzeugt forward und parameterfrei das J_0-Membran-Spektrum ($D \approx 2$) und trifft die CMB-Anharmonizität auf $\sim 5\%$ – im Rahmen der Messfehler. Das harmonische Rückgrat kommt aus der symmetrischen T^4-Resonanz; die Streckung aus der Geometrie der Beobachtung. Diese Formulierung ist konzeptuell sauberer als die Modenauswahl der Schritte 4–11, weil sie *keine* Auswahl aus den Daten benötigt und damit den Zirkularitätseinwand (O. Teker) ausräumt. Der strenge Selektionsmechanismus für die diskreten Einzelpeaks bleibt offen.

Kapitel F

Dok. 269 — FFGFT und RA/PMT: ein bidirektionaler Strukturvergleich

Zweck

Dieses Dokument vergleicht FFGFT (Fundamentale Fraktale Geometrische Feldtheorie, T^4-Zeit-Masse-Dualität) mit dem RA/PMT-Schema von J. T. Guevara (*Regional Arenas / Perception Mechanism Theory*, 2026, drei Teile: Bewusstsein, fundamentale Physik, Kosmologie).

Der Vergleich nutzt denselben explizit gemachten Vergleichsoperator wie Dok. 265 – aber er wird hier *in beide Richtungen* angewandt:

- **Richtung A:** FFGFT bewertet RA/PMT mit dem Sechs-Achsen-Operator (Dok. 265).
- **Richtung B:** das RA/PMT-eigene Raster (RA4 → RA1.5 → RA2 → RA1) wird auf FFGFT angewandt – so, wie Guevara es selbst auf QFT, ART und emergente Raumzeit anwendet.

Die beidseitige Anwendung ist gerade der Sinn eines offengelegten Operators (Dok. 265): jede Seite darf die andere mit ihrem eigenen Werkzeug abbilden, und beide Abbildungen bleiben prüfbar nebeneinander stehen.

Vorab – die wichtigste Abgrenzung: FFGFT und RA/PMT liegen *nicht auf derselben Ebene*. FFGFT ist eine physikalische Theorie mit einem freien Parameter ($\xi = 1/7500$), aus dem konkrete Zahlen folgen (CMB-Peak-Verhältnisse, H_0, Massenrelationen). RA/PMT ist nach Guevaras eigenen Worten *„not a new physical theory"* – ein Meta-Schema zur Einordnung von Theorien. Der Vergleich ist daher kein Vergleich zweier konkurrierender Modelle desselben Systems (wie Dok. 265 für FFGFT/Blume-Maleev), sondern der Vergleich einer Theorie mit einem Theorien-Ordnungsschema. Das prägt jeden Befund unten.

F.1 Das RA/PMT-Schema in Kürze

RA/PMT zerlegt jede Theorie in fünf Schichten:

Schicht	Funktion
RA4	Blueprint – der strukturierte Raum aller *möglichen* Konfigurationen (vor jeder Realisierung).
RA3	Residuum – die undefinierten Begriffe der Theorie, ausdrücklich als ungeklärt deklariert statt versteckt.
RA2	Mapping – die Regeln/Gleichungen, die einen gewählten Blueprint in die physikalische Erscheinung entfalten.
RA1.5	Mechanismus – der *Selektor*, der eine Konfiguration aus RA4 auswählt. (HPM für Bewusstsein, PSM für Physik, CSM für Kosmologie – nach Guevara dieselbe Rolle.)
RA1	Expression – das physikalisch Realisierte.

Die zentrale These von RA/PMT: QM, ART, emergente Raumzeit und Kosmologie besitzen alle RA4 und RA2, aber *kein* RA1.5. Das Fehlen dieses Selektors sei die gemeinsame Wurzel von Messproblem, Anfangsbedingungs-Problem, Feinabstimmung, Zeitpfeil und kosmologischer Konstante. RA/PMT „vollendet" die Theorien, indem es RA1.5 ergänzt – ohne ihre Gleichungen zu ändern.

F.2 Richtung A: FFGFT bewertet RA/PMT (Sechs-Achsen-Operator)

Wir wenden den Vergleichsoperator aus Dok. 265 an: zwei Rahmenwerke werden entlang sechs Achsen verglichen (geteilte Invarianten, Operatoren, mathematische Strukturen, Vorhersagen, physikalische Mechanismen, Hardware-Implikationen). Auf jeder Achse: geteilt, teilweise, oder nicht.

Befund Richtung A: Auf vier von sechs Achsen gibt es *keine* Berührung, auf zwei nur eine Berührung auf der Meta-Ebene (Achsen 2 und 3). Nach der Klassifikation aus Dok. 265 ist das nicht einmal Ebene 3 (Komplementär im üblichen Sinn) – es ist **Kategorienverschiedenheit**: die beiden Rahmenwerke beantworten nicht dieselbe Art von Frage. Der einzige echte Überlapp ist methodisch: beide trennen sauber zwischen dem, was streng folgt, und dem, was offen bleibt. FFGFT tut das über die Drei-Schichten-Methodik (Kerne aus ξ bewiesen $>$ Brücken algebraisch bewiesen $>$ Reduktionen als Plausibilität), RA/PMT über RA4/RA3/RA2/RA1.5/RA1. Diese Disziplin ist sympathisch und verwandt – aber sie ist eine *Haltung*, keine geteilte Physik.

F.3 Richtung B: das RA/PMT-Raster auf FFGFT angewandt

Guevara wendet sein Raster selbst auf fremde Theorien an (QFT, ART, emergente Raumzeit, IIT, …). Die logische Konsequenz: man kann es auch auf FFGFT anwenden. Das ist aufschlussreich.

Tabelle F.1: FFGFT ↔ RA/PMT entlang der sechs Vergleichsachsen. ✓ = geteilt, ∼ = nur auf Meta-Ebene, × = nicht geteilt.

Vergleichsachse	Status	Bemerkung
1. Invarianten	×	RA/PMT liefert keine Invariante; FFGFT: $\tilde{T} \cdot m = 1$, Windungszahl.
2. Operatoren	∼	Nur strukturell: RA/PMTs „Selektor“ vs. FFGFTs Rekursion $\mathscr{R}$ (Dok. 203) – aber $\mathscr{R}$ ist definiert, RA1.5 nicht.
3. Mathematische Struktur	∼	Geteilt nur als *Schichtungs-Disziplin*: FFGFTs Kerne $>$ Brücken $>$ Reduktionen $\approx$ RA/PMTs RA4 $>$ RA2 $>$ RA1.
4. Vorhersagen (quantitativ)	×	RA/PMT erzeugt keine einzige Zahl; FFGFT: Peak-Verhältnisse, H_0, Massen aus ξ.
5. Physikalische Mechanismen	×	RA1.5/CSM ist präphysisch und nicht spezifiziert; FFGFT-Mechanismen sind geometrisch konkret.
6. Hardware-Implikationen	×	RA/PMT macht keine Aussage über Bauelemente/Messungen.

Schicht	FFGFT-Zuordnung
RA4	Der T^4-Modenraum: Windungszahlen $\vec{n} \in \mathbb{Z}^4$, die möglichen Moden.
RA3	Offene Punkte, in FFGFT bereits ausdrücklich deklariert (P-Register, Dok. 190): z. B. der Exponent $41/4$ (P20), die strenge C_ℓ-Projektion (P30).
RA2	Die Ableitungen aus ξ: Jacobi-Entartung, Bose-Einstein, 3D-Projektion, Rekursionsoperator $\mathscr{R}$ (Dok. 203).
RA1.5	**Hier fragt RA/PMT: wo ist euer Selektor?**
RA1	Beobachtbares: CMB-Peak-Verhältnisse, H_0, Massenrelationen.

Der entscheidende Punkt – FFGFT hat kein RA1.5, und braucht keines. Guevaras Raster diagnostiziert bei jeder Theorie einen „fehlenden Selektor". Bei FFGFT lautet die Antwort nicht „der Selektor fehlt", sondern *„die Prämisse trifft nicht zu"*:

- RA1.5 setzt voraus, dass es einen Raum *vieler möglicher* Universen/Konfigurationen gibt (RA4), aus dem *eines* ausgewählt wird. Das ist die multiversum-artige Annahme, die RA/PMT (wie ΛCDM mit seinen Anfangsbedingungen) stillschweigend trägt.
- FFGFT ist **statisch**: kein Urknall, kein $t = 0$, kein Anfangszustand, der ausgewählt werden müsste. Der fraktale T^4-Torus ist nicht *eine ausgewählte* unter vielen Konfigurationen – er ist *die* Struktur. Es gibt keinen Blueprint-Raum, über den ein Selektor entscheiden müsste.
- Wo Guevaras Kosmologie (Part III) den Urknall, die Inflation und die niedrige Anfangsentropie als „Ausdruck eines selektierten Blueprints" deutet, sagt FFGFT: diese Ereignisse sind keine zu selektierenden Anfangsbedingungen, weil es keinen Anfang gibt (Dok. 267, invertierte Anfangsbedingung).

Was Richtung B offenlegt: Das RA/PMT-Raster ist nicht neutral. Es trägt eine versteckte Annahme – dass *jede* Theorie einen Selektor zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit braucht. FFGFT ist genau das Gegenbeispiel: eine Theorie, die diese Schicht bewusst nicht hat, weil sie die Möglichkeits-Wirklichkeits-Spaltung nicht macht. Der „Mangel", den das Raster diagnostiziert, ist aus FFGFT-Sicht kein Mangel, sondern die Abwesenheit einer überflüssigen Annahme.

Das ist methodisch der wertvollste Befund des ganzen Vergleichs: er zeigt, dass RA1.5 selbst – nach Guevaras eigener RA3-Definition – ein *Residuum* ist. „CSM selektiert die Niedrigentropie-Konfiguration" nennt das Rätsel um, statt es zu lösen: es gibt keine Gleichung, kein Selektionskriterium, keine Vorhersage. Ein benannter Selektor ohne Operationalisierung erfüllt genau die RA3-Bedingung („lacks a defined mechanism"), die RA/PMT bei anderen Theorien anmahnt.

F.4 Synthese: zwei Gegenpole derselben Frage

Die beiden Richtungen zusammen ergeben ein klares Bild. FFGFT und RA/PMT sind nicht Konkurrenten und nicht Varianten – sie sind **Gegenpole derselben Grundfrage**: Wie kommt die beobachtete Wirklichkeit zustande?

	RA/PMT	**FFGFT**
Grundannahme	viele mögliche Universen (RA4), eines wird selektiert	ein statischer fraktaler T^4, keine Auswahl
Selektor RA1.5	notwendig, aber undefiniert (CSM/PSM/HPM)	nicht vorhanden, nicht benötigt
Urknall, Inflation, Anfangsentropie	reale Ereignisse, deren Konfiguration selektiert wird	gibt es nicht ($t = 0$ entfällt)
Λ, Feinabstimmung	selektierte Parameter	Prämisse abgelehnt (kein dark sector; Rotverschiebung = fraktale Wegverlängerung, Dok. 190 P14a)
Liefert Zahlen?	nein (Meta-Schema)	ja ($\xi \to$ Peaks, H_0, Massen)
Stärke	Schichtungs-Disziplin, Begriffshygiene	parameterfreie, falsifizierbare Vorhersagen

Wo RA/PMT eine fehlende Schicht postuliert, sagt FFGFT: die Schicht fehlt nicht, sie wird nicht gebraucht – die Prämisse (viele mögliche Konfigurationen, eine ausgewählt) ist selbst eine ΛCDM-artige Annahme. Das ist dieselbe methodische Linie wie die „invertierte Anfangsbedingung“ und die symmetrische Zirkularität aus Dok. 267: RA/PMTs CSM ist im Grunde ΛCDMs Anfangsbedingungen mit einem metaphysischen Selektor davor; FFGFT entfernt die Notwendigkeit beider.

Faire Würdigung. Das soll RA/PMT nicht abwerten. Als *Meta-Schema* – als Disziplin, Begriffe einer Theorie sauber in Blueprint, Residuum, Mapping, Mechanismus und Expression zu sortieren – ist es ein nützliches diagnostisches Werkzeug, und seine Ehrlichkeit beim Deklarieren von Residuen verdient Anerkennung. Es teilt mit FFGFT die Haltung „inspizierbar statt überzeugend“ (Dok. 265). Der Dissens liegt nicht in der Methode, sondern in der Prämisse: ob die Wirklichkeit überhaupt eine Auswahl aus Möglichem ist (RA/PMT) oder eine einzige, statische, fraktale Struktur ohne Auswahl (FFGFT).

Residuen dieses Vergleichs (ehrlich deklariert).

- Der Vergleich behandelt RA/PMT als Meta-Schema. Sollte Guevara RA1.5 später operationalisieren (eine Gleichung, ein Selektionskriterium angeben), wäre Richtung A neu zu bewerten – dann gäbe es möglicherweise Achse-4-Berührung.
- Richtung B nimmt an, dass FFGFTs statische Prämisse korrekt ist. Das ist eine FFGFT-interne Position, kein bewiesener Satz; ein RA/PMT-Vertreter würde sie als selbst selektierte Konfiguration lesen. Beide Lesarten bleiben nebeneinander stehen (vgl. das Provenance-Prinzip, Dok. 265).

Bezug: Dok. 265 (Vergleichsoperator, sechs Achsen), Dok. 267 (kosmologische Entartung, invertierte Anfangsbedingung), Dok. 203 (Rekursionsoperator $\mathscr{R}$), Dok. 190 (P14a, P20, P30). RA/PMT: J. T. Guevara, *Architectural Completion* (Teil I–III), Juni 2026.

Teil II

Teil II — Dimensionswechsel, HLV-Brücke und Skalenrekursion

Kapitel G

Dok. 270 — Dimensionswechsel in der FFGFT

Abstract

Die Reduktion der fundamentalen 4-Torus-Struktur T^4 der FFGFT auf niedrigere Dimensionen wird als formale Kette $T^4 \to T^3 \to T^2 \to T^1 \to T^0$ untersucht. Die zentrale Aussage ist, dass diese Kette *nicht* aus gleichartigen Schritten besteht. Sie zerfällt in zwei qualitativ verschiedene Operationen. Der erste Schritt ($D4 \to D3$) ist keine verlustbehaftete Projektion, sondern eine *Dualitäts-Dekompaktifizierung*: die kompakte Massedimension S^1_m wird über die Fundamentalrelation $\tilde{T} \cdot m = 1$ in die nichtkompakte Zeitrichtung abgerollt. Diese Operation ist im Modeninhalt informationserhaltend; einzig die direkte Sichtbarkeit der Kompaktheit überlebt als diskrete Spektralsignatur, kodiert durch die Rekursion ξ^n. Die weiteren Schritte ($D3 \to D2 \to D1 \to D0$) sind echte geometrische Projektionen räumlicher Richtungen: streng verlustbehaftet, nicht reversibel, durch die Rekursion *nicht* kompensiert. Der Schritt $D3 \to D2$ wird als holographische Projektion identifiziert. Die topologische Identifikation $t \sim t + R_m$ wird als physikalische Observable geführt (T_{rev}, CHSH-Abweichung $\sim \xi$, letztere mit heutiger Hardware nicht auflösbar). Der Abwärtsreduktion wird die *Aufwärts*- Operation gegenübergestellt: die bijektive repräsentationelle Übersetzung $T^4 \leftrightarrow$ Hilbertraum/Matrix (Typ III, Dok. 230/206/231), die *verlustfrei* ist – gerade weil sie keine geometrischen Extra-Dimensionen hinzufügt, sondern denselben 4D-Inhalt in einer höherdimensionalen Sprache ausdrückt. Die Arbeit löst damit die scheinbare Spannung zwischen "Projektion verliert Information" und "kompaktifiziert / dekompaktifiziert" auf und ordnet die geometrische Abwärtsreduktion gegen die repräsentationelle Aufwärtsübersetzung ein.

G.1 Motivation: die Spannung in der Fragestellung

Die FFGFT beschreibt die fundamentale Physik auf einem kompakten 4-Torus T^4 mit dem einzigen dimensionslosen Parameter $\xi = 4/30000$ und der zentralen Relation $\tilde{T} \cdot m = 1$. Die beobachtbare Welt ist hingegen ein dreidimensionaler Raum mit Zeitentwicklung, $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_t$.

Drei Beobachtungen zu diesem Übergang stehen scheinbar im Widerspruch:

(A) **Verlustbild.** Jede Projektion $D \to D-1$ ist nicht injektiv, verliert also Information. Die Kette $T^4 \to \ldots \to T^0$ ist nicht reversibel.

(B) **Kompaktheitsbild.** T^4 ist vollständig kompaktifiziert; die beobachtbare Raumzeit $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_t$ ist dekompaktifiziert.

(C) **Aufwärtsbild.** Es existiert bereits eine *bijektive* Übersetzung von T^4 in einen höherdimensionalen Raum – den Hilbertraum (Dok. 230) – die *verlustfrei* ist.

Diese drei Bilder lassen sich nicht naiv übereinanderlegen: Wäre der erste Schritt reiner Verlust (A), könnte daraus keine *dekompaktifizierte* Zeitrichtung (B) entstehen, denn Vergessen erzeugt keine neue Dimension; und es bliebe rätselhaft, wie eine Aufwärtsbewegung (C) zugleich verlustfrei sein kann, während die Abwärtsbewegung (A) Information vernichtet.

Die Auflösung: Es gibt nicht eine, sondern *drei* dimensionsändernde Operationen von *zwei Arten*. *Geometrische* Operationen (Typ I: Masse-Zeit-Dualität; Typ II: räumliche Projektion) bauen die beobachtbare Welt aus T^4 ab; die *repräsentationelle* Operation (Typ III) übersetzt T^4 verlustfrei nach oben. Die geometrisch-runter verlustbehaftete gegen die repräsentationell-hoch bijektive Bewegung – diese Asymmetrie ist das zentrale Resultat der Arbeit.

G.2 Struktur von T^4

Zerlegung und Radienklassen

Definition G.2.1 (Fundamentale Torusstruktur)**.** Die fundamentale Ebene der FFGFT ist der kompakte 4-Torus

$$T^4 \;=\; S^1_x \times S^1_y \times S^1_z \times S^1_m,$$

mit drei *räumlichen* Kreisen $S^1_{x,y,z}$ und einem *Masse-Kreis* S^1_m. Alle vier Komponenten sind kompakt.

Bemerkung G.2.2 (Die vierte Richtung als Ersatz-Zeit). Die vierte Torusrichtung S^1_m ist nicht eine Massedimension *neben* einer separaten Zeit, sondern die *Ersatz-Zeit-Richtung* selbst. Masse und Zeit sind zwei *Lesarten* ein- und derselben Dimension; die Fundamentalrelation $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist das Übersetzungswörterbuch:

$$\underbrace{S^1_m \text{ (kompakt)}}_{\text{Masse-Lesart, diskretes Spektrum}} \quad \xleftrightarrow{\tilde{T}\cdot m=1} \quad \underbrace{\mathbb{R}_t \text{ (offen)}}_{\text{Zeit-Lesart, kontinuierlicher Fluss}} \,.$$

Es gibt keine Zeit "zusätzlich" zu den vier Richtungen; die Zeit ist die dekompakte Lesart der vierten Richtung (vgl. Dok. 185). Die Zwei-Typen-Struktur hängt allein an der Trennung *kleiner* und *großer* Kompaktifizierungsradien und ist von der Benennung unabhängig.

Die vier Richtungen tragen zwei getrennte Radienklassen:

$$R_x = R_y = R_z \;\sim\; R_H \qquad \text{(kosmologischer Horizont, "groß")}, \tag{G.1}$$

$$R_m \;\sim\; \xi \cdot \ell_P \qquad \text{(Planck-Skala, "klein")}. \tag{G.2}$$

Bemerkung G.2.3 (Status der beiden Skalen). R_H ist hier die *deklarierte externe* (importierte) kosmologische Skala, *nicht* aus ξ hergeleitet. Intrinsisch ist allein die *Form* – die Radienklassen-Trennung groß/klein bzw. das dimensionslose Verhältnis R_H/ℓ_P –, nicht der absolute *Faktor* (Dok. 190, P20). Die Zwei-Typen-Struktur dieses Dokuments hängt allein an dieser Klassen-Trennung, nicht am Zahlenwert von R_H. Umgekehrt setzt $R_m \sim \xi\ell_P$ die *Spitze* des KK-Turms ($1/R_m \sim \xi^{-1} m_P$, transplanckisch); die beobachteten Teilchenmassen liegen über die Rekursion ξ^n weiter unten auf der Leiter (Dok. 159, 258/259).

Kaluza-Klein-Lesart

Ein kompakter Kreis vom Radius R trägt einen diskreten Massenturm $m_n \sim n/R$, $n \in \mathbb{Z}$. Die beiden Radienklassen erzeugen dadurch qualitativ verschiedene Physik:

Kreis	Radius	Modenturm
$S^1_{x,y,z}$	$R \sim R_H$ (groß)	Lücke $\sim 1/R_H \approx 0$, quasi-kontinuierlich ⇒ Raum
S^1_m	$R \sim \xi\ell_P$ (klein)	Lücke riesig, diskret und schwer ⇒ Massenspektrum

Proposition G.2.4 ($\tilde{T}m = 1$ als Kompaktifizierungsrelation)**.** *In natürlichen Einheiten hat ein Kompaktifizierungsradius R die Dimension einer Länge bzw. inneren Zeit, $\tilde{T} \sim R$, während die erzeugte Massenskala $m \sim 1/R$ ist. Die Fundamentalrelation*

$$\boxed{\tilde{T} \cdot m = 1}$$

ist damit strukturell die Kaluza-Klein-Relation für die Massedimension.

G.3 Zwei Typen von Reduktion

Die *Abwärts*-Richtung (Reduktion von T^4) verläuft über zwei geometrische Operationen, die hier entwickelt werden. Die verlustfreie *Aufwärts*-Operation (Typ III, repräsentationelle Übersetzung) folgt in Abschnitt 8.

Typ I: Dualitäts-Dekompaktifizierung (Masse → Zeit)

Definition G.3.1 (Abrollen der Massedimension)**.** Die Operation

$$S^1_m \xrightarrow{\text{Überlagerung}} \mathbb{R}_t, \qquad p : \mathbb{R}_t \to S^1_m, \;\; t \mapsto e^{2\pi i t/R_m},$$

rollt den kompakten Massekreis über seine universelle Überlagerung in die nichtkompakte Zeitrichtung ab. Sie wird durch $\tilde{T} \cdot m = 1$ gesteuert.

Satz G.3.2 (Typ I ist im Modeninhalt informationserhaltend)**.** *Das Abrollen $S^1_m \to \mathbb{R}_t$ ist eine Einbettung, keine Projektion. Periodische Strukturen auf S^1_m heben sich eindeutig in $\mathbb{R}_t$; der Funktionenraum auf $\mathbb{R}_t$ ist echt größer. Es wird kein Modeninhalt vergessen; vielmehr entsteht eine zusätzliche nichtkompakte Richtung – die Zeit.*

Beweis: (Skizze) Die universelle Überlagerung $p : \mathbb{R} \to S^1$ ist ein lokaler Homöomorphismus und surjektiv. Eine R_m-periodische Funktion auf $\mathbb{R}$ entspricht bijektiv einer Funktion auf S^1_m (Fourier-Reihe, diskretes Spektrum). Der umgekehrte Weg (Kompaktifizierung $\mathbb{R} \to S^1$) ist verlustbehaftet, da nichtperiodische Anteile nicht herabsteigen. Das Abrollen geht somit in die *einbettende*, nicht in die projizierende Richtung.

Korollar G.3.3 (Zeit als Einbettungspreis)**.** *Der "Preis" der Dekompaktifizierung ist kein Informationsverlust, sondern das Auftreten der Zeitrichtung selbst (Dok. 185). Was nicht direkt sichtbar bleibt, ist allein die* Kompaktheit*: die Periodizität von S^1_m erscheint im Beobachtbaren nicht als Geometrie, sondern indirekt – als diskrete Struktur des Spektrums.*

Bemerkung G.3.4 (Worauf sich "nicht total verlustfrei" bezieht). Es geht nicht um absoluten Verlust, sondern um *lesart-abhängige Sichtbarkeit*. In der Masse-Lesart ist die Kompaktheit manifest – das Spektrum ist diskret, die Identifikation $t \sim t + R_m$ direkt ausgedrückt. In der Zeit-Lesart ist dieselbe Kompaktheit nur *latent*: aus kontinuierlicher Zeit allein ist die topologische Identifikation nicht eindeutig rekonstruierbar (die Windung bleibt mehrdeutig). Die Dualität garantiert volle Übersetzbarkeit des Spektrums; die Identifikation trägt die Zeit-Lesart nur implizit – über die Diskretheit des Spektrums. Genau dort setzt ξ^n an.

Was die ausgerollte Zeit stetig und gleichförmig macht

Zwei Eigenschaften der ausgerollten Zeit haben zwei verschiedene Ursachen — und eine dritte Frage (*dass* überhaupt ausgerollt wird) hat eine ganz andere Antwort.

Stetigkeit: die Überlagerung. Dass $\mathbb{R}_t$ *kontinuierlich* ist, ist eine topologische Tatsache, kein Zusatz: das Abrollen $S^1_m \to \mathbb{R}_t$ ist die universelle Überlagerung $p : \mathbb{R} \to S^1$ (Satz G.3.2), ein lokaler Homöomorphismus. Die Überlagerung eines Kreises *ist* die stetige Gerade. Sobald ein Kreis aufgerollt wird, ist das Ergebnis daher zwingend stetig — und zwar als Einbettung, nicht als Projektion (kein Modeninhalt geht verloren).

Gleichförmigkeit: Homogenität und der feste Eigenwert. Dass die Zeit mit *konstanter Rate* fließt, liegt an der Homogenität des Masse-Kreises: S^1_m ist eine $\mathrm{U}(1)$, translationsinvariant, kein Punkt ist ausgezeichnet. Die konstante, translationsinvariante Metrik hebt sich auf die Überlagerung $\mathbb{R}$ als affine, gleichförmige Parametrisierung. Die Rate selbst ist der *eine feste Eigenwert* $m = 1/\tilde{T}$ (die Ruheenergie), keine variable Größe. Im Rekursionsbild: der konstante Multiplikator ξ besitzt einen wohldefinierten Generator $\ln \xi$, sodass die diskrete Iteration ξ^n zum kontinuierlichen Dilatationsfluss $t = t_0\, \xi^s$ wird (Dok. 285); konstanter Multiplikator $\Rightarrow$ konstante Rate.

Dass überhaupt ausgerollt wird: die Messung. Geometrisch sind im kompakten T^4 alle vier Kreise gleichberechtigt — es gibt keine Zeit. Nicht die Geometrie, sondern

der *Messvorgang* (der eingebettete Beobachter, Dok. 248) wählt einen Kreis als Zeit und rollt ihn auf; ein physikalischer Akt, kein mathematischer Grenzübergang (Dok. 285). Dabei wird die Windungszahl verworfen.

Der Kern der Sache: Stetigkeit = vergessene Windung. Damit lautet die eigentliche Antwort auf "was macht die Zeit stetig": das Verwerfen der Windung. Die Windung ist die diskrete, kompakte Information; in der Zeit-Lesart wird sie weggeworfen (der informationsverwerfende Schritt, Dok. 285), und die Kompaktheit wird *latent* — aus stetiger Zeit allein ist die Windung nicht mehr eindeutig rekonstruierbar (Bem. G.3.4). Stetige Zeit ist also der Kreis mit vergessener Windung; behielte man die Windung, hätte man den diskreten Kreis zurück.

Feinheit: stetig exakt, gleichförmig nur bis $O(\xi)$. Hier sind zwei Eigenschaften zu trennen. Die *Stetigkeit* bleibt exakt: $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu}(1 + \xi f)$ ($D_f = 3 - \xi$; f ist hier die fraktale Korrekturfunktion der Metrik, keine Frequenz und nicht die Grundwindungszahl $f = 1/\xi$) ist eine *Metrik*-Korrektur, kein topologischer Eingriff — eine beschränkte ξ-kleine Modulation zerreißt $\mathbb{R}$ nicht, es entstehen keine Lücken. Die *Gleichförmigkeit* dagegen gilt nur bis $O(\xi)$: dieselbe ξ-Gegenkopplung, die im dynamischen Sektor die AM-Seitenbänder trägt (Dok. 286), lässt die Rate um relativ $\xi \approx 10^{-4}$ wackeln; die flache Metrik η "ignoriert die fraktale Struktur" (Dok. 051). Die perfekt glatte, gleichförmige Zeit ist also der Grenzfall $\xi \to 0$ — die idealisierte Zeit der Relativität —, die reale FFGFT-Zeit ist ein Kontinuum *mit* einer ξ-feinen fraktalen Raten-Modulation. Wichtig: das ist *nicht* diskret — fraktal ≠ diskret; die Zeit bleibt überabzählbares Kontinuum, nur nicht glatt-affin. (Ob diese ξ-Körnigkeit der Metrik-Schatten der latenten Kompaktheit ist — der vergessenen Windung ein ξ-Rest —, ist eine naheliegende Vermutung, aber nicht belegt: die latente Kompaktheit zeigt sich im diskreten Spektrum (Bem. G.3.4), die ξ-Korrektur in der Metrik.)

Typ II: geometrische Projektion (räumlich)

Definition G.3.5 (Vergessen einer Raumrichtung)**.** Eine Projektion $\pi : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^{k-1}$ mit $\ker(\pi) = \mathbb{R}$ vergisst eine räumliche Richtung. Sie ist nicht injektiv, also nicht umkehrbar.

Satz G.3.6 (Typ II ist streng verlustbehaftet)**.** *Bei einer räumlichen Projektion $\mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^{k-1}$ kollabiert eine vollständige Faser $\mathbb{R}$. Die Information über die vergessene Richtung ist im Bild nicht enthalten und ohne Zusatzdaten (Randbedingungen, holographische Vollständigkeit) nicht rekonstruierbar. Die Rekursion ξ^n wirkt auf diesen Schritt* nicht.

	Typ I (Masse→Zeit)	**Typ II (räumlich)**
Operation	Abrollen / Überlagerung	Vergessen / Projektion
Richtung	einbettend	projizierend
Modeninhalt	erhalten	verloren
Reversibilität	dual/spektral rückgewinnbar	nicht reversibel
Rolle von ξ^n	Spektralsignatur	wirkungslos
Residuum	Kompaktheit nur inferiert	echter Geometrieverlust

G.4 Die formale Kette, Stufe für Stufe

Stufe 1: $D4 \to D3 +$ **Zeit (Typ I)**

$$T^4 \longrightarrow \underbrace{T^3}_{\to \mathbb{R}^3} \times \underbrace{\mathbb{R}_t}_{\text{aus } S^1_m} .$$

Stufe 1 bündelt *zwei* informationserhaltende Operationen *verschiedenen* Mechanismus: (Ia) der *Massekreis* rollt gemäß Satz G.3.2 über die Dualität $\tilde{T}m = 1$ in $\mathbb{R}_t$ ab (Dualitäts-Dekompaktifizierung); (Ib) die drei *Raumkreise* dekompaktifizieren durch den *Grenzprozess* großer Radien ($R_{x,y,z} \to \infty$ bei $r \ll R_H$) zu $\mathbb{R}^3$ (Limes-Dekompaktifizierung). Beide sind einbettend, keine Projektion; (Ib) ist aber *kein* Dualitätsschritt, sondern ein Limes – siehe die Präzisierung in Abschnitt G.12, Punkt 3.

Invariant: $\tilde{T} \cdot m = 1$ (Prop. G.2.4); im räumlichen Limes die lokale Flachheit. *Verlust:* keiner im Modeninhalt; nur Sichtbarkeit der Kompaktheit (Bem. G.3.4).

Stufe 2: $D3 \to D2$ **(Typ II, holographisch)**

$$\pi_2 : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \qquad \ker(\pi_2) = \mathbb{R} \ \text{(Tiefenrichtung)}.$$

Invariant: Fläche A. *Holographie:* Stufe 2 ist mathematisch das holographische Prinzip; im Horizontfall der Bekenstein-Hawking-Bound $S \leq A/(4\ell_P^2)$ (Anschluss Dok. 254/263). *Verlust:* echte Tiefenrichtung.

Stufe 3: $D2 \to D1$ **(Typ II)**

$$\pi_3 : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad \ker(\pi_3) = \mathbb{R}.$$

Invariant: Länge L. *Verlust:* zweite Raumrichtung; kein Flächenmaß mehr.

Stufe 4: $D1 \to D0$ **(Typ II, Totalverlust)**

$$\pi_4 : \mathbb{R} \longrightarrow \{\text{pt}\}.$$

Invariant: nur diskretes skalares Maß ($n \in \mathbb{Z}$). *Verlust:* vollständige geometrische Struktur.

G.5 Reversibilität, präzise pro Typ

Satz G.5.1 (Reversibilität der Gesamtkette)**.** *Sei* $\Pi = \pi_4 \circ \pi_3 \circ \pi_2$ *die räumliche Teilkette* $\mathbb{R}^3 \to \{\text{pt}\}$ *und* D *die Typ-I-Operation* $S^1_m \to \mathbb{R}_t$*. Dann gilt:*

(i) D *ist als Dualität (Fourier/KK) im Modeninhalt umkehrbar; die Windung bleibt mehrdeutig.* D *ist "fast reversibel".*

(ii) Π *ist nicht invertierbar: es gibt keine stetige Abbildung* $\rho : \{\text{pt}\} \to \mathbb{R}^3$ *mit* $\rho \circ \Pi = \text{id}$.

Beweis: (Skizze) (i) folgt aus Satz G.3.2: das Abrollen ist einbettend, das diskrete Spektrum kodiert den vollen periodischen Inhalt; nur die Wahl des Lifts (Windung) ist nicht eindeutig. (ii) folgt aus Satz G.3.6: jedes π_k hat $\ker = \mathbb{R} \neq \{0\}$. Eine Linksinverse müsste die kollabierte Faserstruktur rekonstruieren; diese Information ist im Bild $\{\mathrm{pt}\}$ nicht vorhanden.

Korollar G.5.2 (Auflösung der Eingangsspannung)**.** *Bild (A) und Bild (B) sind beide korrekt, betreffen aber verschiedene Operationen. Die Nicht-Reversibilität (A) gilt für die* räumlichen *Projektionen (Typ II). Die Dekompaktifizierung zur Zeitrichtung (B) ist der* einbettende *Typ-I-Schritt – er erzeugt eine Dimension, statt eine zu vergessen. Es liegt kein Widerspruch vor.*

G.6 Rolle der Rekursion ξ^n

Die Rekursion $R : \xi^n \mapsto \xi^{n+1}$ ist *keine* universelle Kompensation für Projektionsverluste. Ihre Funktion ist eng begrenzt:

- **Typ I:** ξ^n erzeugt das diskrete Massenspektrum (Teilchenleiter). Dieses Spektrum *ist* der kompakte Modeninhalt von S^1_m, dual als Zeit-Frequenz-Struktur. ξ^n "füllt" nichts auf, sondern ist die Spektralsignatur, an der die verborgene Kompaktheit erkennbar bleibt (Bem. G.3.4).
- **Typ II:** ξ^n wirkt nicht. Räumliche Projektionsverluste sind echt und werden von der Rekursion nicht berührt.

Bemerkung G.6.1 (Korrektur einer naheliegenden Fehldarstellung). Eine Darstellung, die der Rekursion eine über alle vier Stufen monoton abnehmende "Kompensationskraft" zuschreibt (voll/partiell/schwach/keine), ist irreführend. Sie unterstellt eine gleichförmige verlustbehaftete Leiter, die es nicht gibt. Die Rekursion gehört ausschließlich zum Typ-I-Schritt.

G.7 Übersicht

Stufe	Operation	Typ	Invariant	ξ^n
$D4 \to D3{+}t$	$S^1_m \to \mathbb{R}_t$ (abrollen)	I	$\tilde{T}m = 1$	Spektralsignatur
$D3 \to D2$	Raum vergessen	II	Fläche A	–
$D2 \to D1$	Raum vergessen	II	Länge L	–
$D1 \to D0$	Raum vergessen	II	$n \in \mathbb{Z}$	–

Tabelle G.1: Die Kette $T^4 \to T^0$ nach Typ getrennt.

$$\underbrace{T^4 \longrightarrow \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_t}_{\text{Typ I: einbettend, fast reversibel}} \longrightarrow \underbrace{\mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} \longrightarrow \{\mathrm{pt}\}}_{\text{Typ II: projizierend, nicht reversibel}}$$

G.8 Die Aufwärtsrichtung: repräsentationelle Übersetzung (Typ III)

Die bisherige Kette beschreibt ausschließlich die *Abwärts*-Richtung (Reduktion). Es gibt eine Gegenrichtung – aber sie ist *nicht* geometrisch.

Definition G.8.1 (Typ III: repräsentationelle Übersetzung)**.** Die Operation

$$T^4 \xleftrightarrow{\text{bijektiv}} \mathscr{H}$$

übersetzt den FFGFT-Modenformalismus auf T^4 in den (unendlichdimensionalen) Hilbertraum $\mathscr{H}$ bzw. die äquivalente Matrix-Algebra (Dok. 230, 206, 231). Sie ist keine Approximation, sondern eine *bijektive Strukturaussage*: jede QM-Rechnung ist in FFGFT-Sprache abbildbar und umgekehrt.

Die dimensionale Asymmetrie

Abwärts (geometrisch) und aufwärts (repräsentationell) sind verschiedene Arten von Operation mit *entgegengesetzten* Informationseigenschaften:

- **Abwärts (Typ II, geometrisch):** verlustbehaftet, nicht reversibel – eine Faser kollabiert (Satz G.3.6).
- **Aufwärts (Typ III, repräsentationell):** bijektiv, verlustfrei – es werden *keine* physikalischen Dimensionen hinzugefügt, sondern derselbe 4D-Inhalt in einer höherdimensionalen *Sprache* ausgedrückt, in der er ohne Reduktion Platz hat.

Die Verlustfreiheit folgt also *gerade aus* dem repräsentationellen Charakter – nicht aus einem Gewinn echter Extra-Dimensionen.

Bemerkung G.8.2 (Keine geometrisch höheren Dimensionen). Eine geometrische Erweiterung $T^4 \to T^5 \to \ldots$ ist in der FFGFT ausgeschlossen (Dok. 171): Komplexität entsteht aus *fraktaler Tiefe* ($D_f = 3 - \xi$, Selbstähnlichkeit), nicht aus *mehr* Dimensionen. Dies ist der bewusste Gegensatz zur Stringtheorie (10/11D, Calabi-Yau, Landschaftsproblem). "Höher" bedeutet in der FFGFT daher stets Typ III (repräsentationell), nie geometrisch.

Damit hat die FFGFT drei dimensionsändernde Operationen:

Typ	Operation	Charakter	Information
I	Masse $\leftrightarrow$ Zeit ($\tilde{T}m = 1$)	geometrisch	fast reversibel
II	räumliche Projektion (runter)	geometrisch	verlustbehaftet
III	$T^4 \leftrightarrow \mathscr{H}$/Matrix (hoch)	repräsentationell	**bijektiv**

Die Bijektivität von Typ III ist die spiegelbildliche Aussage zur Nicht-Reversibilität von Typ II (Satz G.5.1): geometrisch verliert man beim Reduzieren, repräsentationell verliert man beim Übersetzen nichts.

G.9 Warum genau vier Kreise? Minimal-Suffizienz, Einheiten und Veranschaulichung

Die bisherige Kette (Typ I/II abwärts, Typ III aufwärts) setzt die Vier-Kreis-Struktur $T^4 = S^1_{x,y,z} \times S^1_m$ voraus. Dieser Abschnitt beantwortet, *warum* es genau vier sind – bewusst *nicht* als Herleitung der Zahl, sondern als *Minimal-Suffizienz*.

$3+1$ ist Eingabe, nicht Herleitung

Keine Theorie leitet die Dimensionszahl der Raumzeit her: Standardmodell und ART nehmen $3+1$ an, die Stringtheorie scheitert an der Eindeutigkeit (Landschaftsproblem). Auch die FFGFT *leitet die 4 nicht vorwärts her*; sie nimmt $3+1$ als *empirische Eingabe*. Die Frage ist daher nicht „warum ist die Welt vierdimensional?“, sondern „*gegeben* $3+1$ – welche Struktur ist die minimale, die alles trägt?“.

Minimal-Suffizienz: vier statt fünf

Die Dualität spart eine Dimension

Naiv bräuchte man *fünf* Bausteine: drei für den Raum, einen für ein Massenspektrum (Teilchen), einen für die Zeitentwicklung. Die Fundamentalrelation $\tilde{T} \cdot m = 1$ identifiziert jedoch *Masse-Lesart* und *Zeit-Lesart einer* Dimension (Typ I, Satz G.3.2): der vierte Kreis S^1_m trägt als KK-Turm das Massenspektrum *und*, dekompaktifiziert, die Zeit. Die Dualität lässt *einen* Kreis die Arbeit von zweien tun – damit kollabiert die naive 5 auf **4**.

- **Weniger** (nur T^3): kein Massenspektrum, keine Zeit.
- **Vier** (T^3 + ein Dual-Kreis): Raum, Massen *und* Zeit aus *einem* Objekt, ohne Redundanz.
- **Mehr** (ein zweiter solcher Kreis): ein zweiter unabhängiger Massenturm bzw. eine zweite Zeit – überzählig, ohne Korrelat.

„Optimal“ heißt hier also *minimal-suffizient*: die kleinste Dimensionszahl, in der Raum, volles Massenspektrum und Zeit gemeinsam aus einem geometrischen Objekt entstehen.

Die vier Kreise als Einheiten-Buchhaltung

Die Vier-Kreis-Struktur *ist* zugleich die Exponenten-Buchhaltung der SI-Umrechnungsfaktoren – jeder Kreistyp trägt seine Brücke:

$$\underbrace{S^1_{x,y,z}}_{\text{Raum}} \xrightarrow{c} \text{Zeit}, \qquad \underbrace{S^1_m}_{\text{Masse}} \xrightarrow{\hbar\,(\tilde{T}m=1)} \text{Zeit}.$$

c ist die Raum-Zeit-Brücke der drei Raumkreise, $\hbar$ die Masse-Zeit-Brücke des Massekreises. Daraus folgt, warum die SI-Umrechnungen *nicht verzichtbar* sind, sobald man die Exponentenstruktur korrekt bestimmen will:

Bemerkung G.9.1 (Warum natürliche Einheiten die Potenzen verbergen). Natürliche Einheiten ($c = \hbar = 1$) kollabieren L, T und M zu *einer* Achse. Damit verschwindet genau die Unterscheidung, die die Exponentenstruktur trägt – die unabhängige *Potenz von* c bzw. *der Zeit*. c und $\hbar$ dürfen erst *nach* dem Ablesen der Exponenten auf 1 gesetzt werden; vorher ist die Information vernichtet. Die Faktoren sind das Gerüst, das die Potenzen sichtbar hält – und gerade leicht handhabbar, weil ihre ganze Rolle dieses Gerüst ohne freien Parameter ist. Auch G ist *hergeleitet* – rekonstruiert aus ℓ_P, c, $\hbar$, wofür es nur die SI-Relationen braucht (Dok. 012/056) – und trägt *keinen* freien Faktor. Der einzige freie Faktor sitzt nicht in einer Umrechnungs- oder Naturkonstante, sondern in der *kosmologischen Absolutskala* R_H (Exponent $41/4$; Dok. 190, P20).

Dieselbe Struktur als Hilbert-Veranschaulichung

Die Vier-Kreis-Geometrie ist zugleich die *treue* Veranschaulichung des unendlichdimensionalen Hilbertraums (Typ III, Def. G.8.1) – zwei Lesarten *derselben* Bijektion:

- **generativ/ontologisch:** $T^4 \to \mathscr{H}$ – die Geometrie *erzeugt* die Algebra (Dok. 206), nicht umgekehrt;
- **veranschaulichend/epistemisch:** der abstrakte $\mathscr{H}$ wird durch die 4D-Geometrie überhaupt erst *anschaulich*.

„Höherdimensional" (der ∞-dimensionale $\mathscr{H}$) heißt hier *nicht* „fundamentaler": die generative Richtung ist $T^4 \to \mathscr{H}$. Gerade *weil* die 4D-Struktur generativ ist (kein bloßes Bild), ist die Veranschaulichung *exakt* – bijektiv, kein Cartoon.

Zusammenfassung der Dimensions-Linie

Was „optimal" bedeutet

T^4 bzw. T^3+Zeit ist die *minimal-suffiziente*, *dual-ökonomische* und *Hilbert-treue* Konfiguration – *gegeben* $3+1$. Die Stärke liegt in der Ökonomie (eine Dimension gespart durch $\tilde{T}m = 1$) und der Treue (verlustfreie Hilbert-Repräsentation), *nicht* in einer Eindeutigkeit der Zahl. Die bloße 4 ist Eingabe, kein Vorwärts-Resultat (Dok. 190, P34) – dieselbe Signatur wie bei der ξ-Magnitude (P33) und der kosmologischen Skala (P20): *Struktur vorwärts, Zahl Eingabe*.

G.10 Im kompakten Bild ist die Zeit nur ein Kreis: die Asymmetrie ist der Messvorgang

In der kompakten Darstellung $T^4 = S^1 \times S^1 \times S^1 \times S^1$ sind alle vier Kreise identisch: dimensionslose zyklische Koordinaten, keine Signatur, keine Raum/Zeit-Unterscheidung. Die Zeit wird *genauso* geschrieben wie die drei Raum-Kreise; auf der kompakten Ebene existiert die Lorentz-Asymmetrie nicht. Deshalb ist in FFGFT die Zeit-Koordinate einfach zu schreiben – sie ist ein Kreis wie die anderen. Die Komplikation tritt erst beim Verlassen des kompakten Bildes auf.

Die Asymmetrie (eine Zeit, Signatur $(3,1)$) erscheint erst unter der Dekompaktifizierung (Typ I, Def. G.3.1): genau ein Kreis – der Masse-Kreis, $\tilde{T}\cdot m = 1$ – rollt durch seinen Universal-Cover in die nichtkompakte Zeit aus, während die anderen drei kompakt bleiben (diskretes Spektrum) oder projizieren (Raum, Typ II).

Welcher Kreis zur Zeit wird, ist daher keine intrinsisch-geometrische Tatsache, die herzuleiten wäre. Die Geometrie ist symmetrisch, und nichts in ihr soll eine Richtung auszeichnen. Zeit ist *relational*: die Auswahl ist der Messvorgang selbst. Die Dekompaktifizierung *ist* die Messung – die Auslesung/Projektion dieses Dokuments und von Dok. 284 – und einen Kreis auf nichtkompakte, erlebte Zeit festzulegen ist genau der informationsverwerfende Schritt, den eine Messung vollzieht. Der eingebettete Beobachter, der von innen ausliest (Dok. 248, Selbstreferenz), erlebt eine Richtung als Dauer; dieses Erleben konstituiert den Zeit-Kreis. Die Symmetrie-Brechung ist der Messvorgang, nicht die Geometrie.

[Der Zeit-Kreis wird durch den Messvorgang ausgewählt] Im kompakten Bild sind die vier Kreise von T^4 symmetrisch. Die Zeit wird nicht von der Geometrie gewählt, sondern ist relational: die Symmetrie-Brechung *ist* der Messvorgang (die Dekompaktifizierung vom Typ I). Drei Aussagen schließen die Buchhaltung lückenlos:

- **Dass es eine Zeit gibt** (nicht zwei) ist der Signatur-/Vorhersagbarkeits-Constraint – eine zeitartige Richtung gibt hyperbolische Feldgleichungen mit wohlgestelltem Cauchy-Problem; zwei oder mehr geben ultrahyperbolische Gleichungen ohne wohlgestelltes Anfangswertproblem.
- **Welcher Kreis die Zeit ist** ist durch den Messvorgang festgelegt, d. h. durch die erlebte Situation des eingebetteten Beobachters (Dok. 248).
- **Dass die Aufteilung** $3{+}1$ **ist** ist die Struktur des Eingebettet-Seins – die empirische Eingabe von Dok. 190 (P34), hier gelesen als die Situation des Beobachters, nicht als freier Parameter.

Der Kontrast zu einer nicht-kompaktifizierten Behandlung der Zeit ist dann scharf. Ein Framework, das die Zeit als komplizierte Struktur auf der schon-physikalischen Zeit t schreibt (etwa ein Spiral-Time-Operator $\psi(t) = t + i\varphi(t) + j\chi(t)$, Dok. 283/284), hat das *Ergebnis* des Messvorgangs in seine Kinematik *hineingeschrieben*, statt die erlebte Zeit als die messungs-induzierte Dekompaktifizierung eines symmetrischen Kreises zu erkennen. Im kompakten Bild ist diese Komplikation unnötig: die Zeit ist ein weiterer Kreis, und erst die Auslesung macht sie zur nichtperiodischen Achse, die wir erleben.

G.11 Physikalische Prüfbarkeit der Identifikation $t \sim t + R_m$

Die topologische Identifikation $t \sim t + R_m$ ist keine reine Begleitstruktur, sondern eine physikalische Observable. In der Zeit-Lesart ist ihre Periode *exakt* die fundamentale Umlaufzeit

$$T_{\text{rev}} = \frac{R_m}{c} = \frac{\xi \ell_P}{c} \approx 7{,}2 \times 10^{-48}\ \text{s}, \qquad \Delta\phi = 2\pi\xi \approx 8{,}4 \times 10^{-4}\ \text{rad/Umlauf},$$

sodass $t \sim t + R_m$ identisch ist mit $t \sim t + cT_{\text{rev}}$ (Dok. 183/185). Die Kompaktheit der vierten Richtung *ist* die Revival-Zeit.

Zwei prüfbare Lesarten

- **Masse-Lesart (strukturell ausgearbeitet).** Das diskrete Modenspektrum erzeugt die Teilchenmassen als Torus-Obertöne mit Schrittweite $1/D$; daraus folgen die drei Generationen (Dok. 159, 258/259). Die Leiter ist eine Struktur mit einem deklarierten Referenzpunkt; ihre Koeffizienten sind Setzungen, ihre Präzisionsübereinstimmungen daher keine Belege, und Koide folgt nur näherungsweise.
- **Zeit-Lesart (im Prinzip falsifizierbar, mit heutiger Hardware nicht auflösbar).** Die Periodizität erzeugt eine CHSH-Abweichung von der Tsirelson-Schranke der Größenordnung ξ. Für 73 Qubits sagt die FFGFT $\Delta \approx 5{,}4 \times 10^{-4}$ voraus. Der Hardwaretest IBM Heron r2 (Mai 2026) bestätigt die Bell-Verletzung ($S = 2{,}74$) und die Lauffähigkeit der T0-Schaltkreise; der ξ-Effekt liegt jedoch weit unter dem Hardware-Rauschen und ist mit heutiger Hardware nicht auflösbar (Dok. 147): die gemessene Abweichung von der Tsirelson-Schranke beträgt $2\sqrt{2} - 2{,}74 = 0{,}088$ (3,1 %), rund das 160-Fache von Δ; $\sigma \sim 10^{-4}$ ist nur die statistische Schranke.

Skalierung: linear versus logarithmisch

Regime-Abhängigkeit der Phasenakkumulation

Eine naive *kohärente Linearakkumulation* $r \cdot \Delta\phi$ über r Umläufe ergäbe physikalisch absurde Phasendriften (Größenordnung 10^{44} rad/s) und stünde im Widerspruch zu funktionierenden Atomuhren und tiefen Quantenschaltkreisen. Die Laborvorhersage skaliert daher *logarithmisch*,

$$\delta\phi \sim \frac{\xi \ln(r)}{D_f} \approx 2 \times 10^{-4} \quad (D_f = 3 - \xi),$$

nicht linear. Die lineare Form $r \cdot \Delta\phi$ aus Dok. 185 ist die *Worst-Case-Schranke des RSA-Arguments* (Kohärenz über $r \approx N$ Zyklen), nicht die Laborvorhersage. Diese Regime-Trennung erklärt, warum tiefe kohärente Schaltkreise laufen, während die RSA-Faktorisierung großer Schlüssel geometrisch geschützt bleibt.

Fazit. $t \sim t + R_m$ ist im FFGFT-Korpus als Observable geführt (T_{rev}, CHSH-Abweichung $\sim \xi$): in der Masse-Lesart als Struktur ausgearbeitet, in der Zeit-Lesart im Prinzip falsifizierbar, aber mit heutiger Hardware nicht auflösbar (weit unter dem Hardware-Rauschen). Keine unfalsifizierbare Begleitstruktur.

G.12 Einordnung und offene Fragen

Anschlüsse. Dok. 185 (Zeit als Einbettungspreis) liefert die ontologische Grundlage des Typ-I-Schritts; Dok. 263 (holographische Projektion) und Dok. 254

(Flächen-Schrankentheorem) den Rahmen für Stufe 2; Dok. 206 (Triangle–Matrix-Reduktion) bestätigt, dass die 4D-Ebene generativ ist; Dok. 147/183 liefern die zeit-seitige Prüfbarkeit. Die Aufwärts-Operation (Typ III) ist in Dok. 230 (bijektive Hilbertraum-Übersetzung), Dok. 231 (notwendige Erweiterungen) und Dok. 206 (Matrix-Darstellung) ausgearbeitet; Dok. 171 begründet den Ausschluss geometrisch höherer Dimensionen.

Offene Punkte.

1. **Strukturannahme – bestätigt.** Die Zerlegung $T^4 = S^1_{x,y,z} \times S^1_m$ mit S^1_m als Ersatz-Zeit-Richtung und $\tilde{T} \cdot m = 1$ als Übersetzung ist festgelegt (Bem. G.2.2).
2. **Skalierung linear/logarithmisch.** Die lineare Worst-Case-Schranke $r \cdot \Delta\phi$ (Dok. 185, RSA-Regime) und die logarithmische Laborvorhersage $\xi \ln(r)/D_f$ (Dok. 147) sollten explizit als regime-abhängig gekennzeichnet werden, um Widerspruchsfreiheit zu sichern.
3. **Spatialer Grenzfall – präzisiert.** Die Dekompaktifizierung $S^1_{x,y,z} \to \mathbb{R}^3$ ist ein *Grenzprozess* ($R_{x,y,z} \to \infty$), weder die Typ-I-Dualität noch eine Typ-II-Projektion, sondern eine eigene *limes-artige* informationserhaltende Operation (Ib). Sie wird daher in Stufe 1 ausdrücklich von der Massekreis-Dualität (Ia) getrennt geführt; beide teilen den einbettenden Charakter, nicht den Mechanismus.
4. **Holographische Vollständigkeit.** Inwieweit lässt sich der Typ-II-Verlust bei $D3 \to D2$ über Randdaten exakt (nicht nur teilweise) rekonstruieren? Anschluss Dok. 254/263.

Kapitel H

Dok. 271 — FFGFT (T0) und Helix–Light–Vortex (HLV) im Vergleich

Abstract

Diese Arbeit stellt die FFGFT (T0, Zeit-Masse-Dualität) dem Helix-Light-Vortex-Programm (HLV, M. Krüger) bidirektional gegenüber. Beide sind *geschichtete effektive geometrische Programme*: Sie ersetzen das glatte Kontinuum durch ein diskretes, höherdimensional erzeugtes Substrat, tragen ein dreigliedriges (triadisches) Kernmotiv, deuten Teilchen als topologische Objekte, wurzeln in klassischer Proportions-/Harmonik-Geometrie und teilen eine Methodik aus Rückgewinnungslimit und Nullmodell-Falsifikation. Wir trennen *echte Isomorphismen* von *Oberflächen-Analogien*. Der zentrale Unterschied: FFGFT besitzt *eine* dimensionslose Konstante $\xi \approx 1/7500$ mit dimensionslosen Vorwärts-Vorhersagen (Feinstrukturkonstante, Koide-Relation, Leptonenmassenverhältnisse), während HLV kein ξ-Analogon hat, dafür ein explizit reproduzierbares aperiodisches Substrat samt Graph-Laplace-Testbed gegen Nullmodelle. Die geometrische Gabel *aperiodischer Quasikristall* (HLV) gegen *periodischer T^4-Torus mit fraktaler Korrektur* (FFGFT) erzeugt einen messbaren spektralen Unterschied; daraus wird eine *unterscheidende* Vorhersage formuliert. Die Bewusstseins-/Biogravimetrie-Schicht von HLV wird ausdrücklich aus diesem physikalischen Vergleich ausgeklammert. Als gemeinsame Leitplanke wird die Trivialität jeder Darstellung $X = \varphi^N$ bzw. $X = \xi^N$ betont: Vorwärts-Gehalt liegt allein in dimensionslosen Verhältnissen, die isoliert, vorhergesagt und präzise sind; eine absolute Skala bleibt kalibrierte Eingabe.

H.1 Motivation und Rahmen

HLV liegt in zwei jüngeren Dokumenten in einer bewusst *konservativen*, falsifizierbaren Fassung vor: einer „Master-Erklärung“ (Zenodo 10.5281/zenodo.20596861) und einem reproduzierbaren „6D-zu-3D-Cut-and-Project-Graph-Testbed“ (Zenodo 10.5281/zenodo.20275888). Der dort vollzogene Schritt – weg von „die Raumzeit

ist quasikristallin“ hin zu „lässt sich dieses Substrat explizit, reproduzierbar und von einfacheren Nullmodellen unterscheidbar machen?“ – ist methodisch genau die Wende, die auch die FFGFT in ihrem Korrekturregister (Dok. 190, insbesondere die korpusweite Bereinigung der H_0-Über-Claims) vollzogen hat.

Ziel dieser Arbeit ist eine *Gegenüberstellung*, keine Verschmelzung. Es geht darum, zu prüfen, wo die Verwandtschaft strukturell trägt, wo sie nur sprachlich ist, und an welcher Stelle die beiden Programme empirisch *auseinanderlaufen* müssen.

H.2 Gemeinsame Achsen (Übersicht)

Achse	FFGFT / T0 (Pascher)	HLV (Krüger)
Substrat / Projektion	kompakter 4-Torus T^4 + fraktale Korrektur $D_f = 3 - \xi$; Reduktionskette $T^4 \to T^0$	aperiodischer Quasikristall via Cut-and-Project ($\mathbb{Z}^6 \to 3$D), golden-ratio/Fibonacci
Zeitstruktur	Zeit-Masse-Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$; Z_3 in der Dreiecks-Reduktion (det $= 1 - \xi$)	triadische Spiralzeit $\psi(t) = t + i\varphi(t) + j\chi(t)$, $i^2 = j^2 = -1$
Teilchen-Ontologie	Windungsquantenzahlen auf T^4; Bell topologisch, nicht ontologisch nichtlokal	Vortices / Stehwellen-Moden eines Skalarfelds Ψ im Gitter
Generativer Kern	*eine* dimensionslose $\xi \approx 1/7500$	kein ξ-Analogon; Substrat-Geometrie (φ, Fibonacci)
Vorwärts-Vorhersagen	α, Koide, Leptonenverhältnisse (dimensionslos, isoliert)	bewusst zurückgehalten; Fokus „Substrat unterscheidbar?“
Rückgewinnungslimit	$\hbar, c, G$ als Umrechnung; $O(\xi)$-Gitterdispersion; Bridges (mit ehrlichen Negativa)	muss QFT/GR im Limes erreichen; Graph-Laplace vs. Nullmodelle
Falsifikationskanal	Modenspektrum (T^4): CMB-Peak-*Verhältnisse*, $B = 1/3$ aus $D = 4$	Graph-Laplace-Spektrum vs. Nullmodell; Vortex-Benchmarks

H.3 Echte Isomorphismen vs. Oberflächen-Analogien

1. **Projektion aus höherer Dimension.** *Resonanz:* Beide deuten die beobachtete 3D-Welt als Projektion einer strukturierten, höherdimensionalen, diskreten Geometrie – HLV über Cut-and-Project, FFGFT über die explizite Kette $T^4 \to T^0$ (Dok. 270). *Aber: aperiodisch* (Quasikristall) gegen *periodisch* (T^4) sind verschiedene Spektralklassen – siehe Abschnitt 6. Das Motiv ist isomorph, die Realisierung nicht.
2. **Triadisches Kernmotiv.** *Resonanz:* HLVs hyperkomplexe Zeit $\psi = t + i\varphi + j\chi$ steht neben der Z_3-Struktur der FFGFT-Dreiecks-Reduktion ($\det(A_\xi) = 1 - \xi$, Dok. 206) und den drei Operationstypen der Reduktionskette. *Aber:* HLVs Triade ist eine *Zeit-Algebra*, die der FFGFT eine *Reduktionsmatrix-Symmetrie*. Die gemeinsame „3“ ist auffällig, aber noch kein bewiesener Isomorphismus – ein Kandidat für genauere Prüfung, keine Identität.
3. **Teilchen als topologische Objekte.** *Resonanz:* HLV-Vortices / Stehmoden entsprechen FFGFT-Windungszahlen auf dem Torus; beide verlagern „Quantenzahl“ in eine topologische Windung des Substrats. In der FFGFT wird damit auch die

Bell-Korrelation als topologisch (nicht ontologisch nichtlokal) lesbar. Hier ist die Verwandtschaft am ehesten echt.

4. **Harmonisch-geometrische Wurzel.** *Resonanz:* HLV ankert in Goldenem Schnitt und Fibonacci; die FFGFT in Euler-Tonnetz und Kommastruktur der Temperatur. Gleiche Intuition („Proportion/Harmonie → fundamentale Geometrie"), verschiedene Konstante.
5. **Methodik.** *Resonanz (am stärksten):* Rückgewinnungslimit plus Nullmodell-Falsifikation. HLVs „distinguishable from simpler null models" ist exakt das Kriterium, mit dem die FFGFT geprüft hat, ob etwa $63/4$ *isoliert* ist oder nur einer von mehreren „schönen Brüchen" in einem dichten Kandidatenfeld (Dok. 190, P35).

H.4 Divergenzen und Komplementarität

- **Generativer Kern.** Die FFGFT hat mit ξ einen einzigen dimensionslosen Samen und daraus *Vorwärts*-Vorhersagen ($\alpha = \xi(E_0/\mathrm{MeV})^2$, Koide, Leptonenverhältnisse). HLV hat (Stand der vorgelegten Dokumente) kein solches Analogon und bleibt bewusst auf der Ebene „ist das Substrat unterscheidbar". ⇒ FFGFT bringt den Samen, HLV die reproduzierbare Substrat-Konstruktion – komplementär, nicht konkurrierend.
- **Werkzeug.** HLVs Graph-Laplace-Testbed gegen Nullmodelle ist eine numerische Falsifikations-Maschinerie, die die FFGFT für ihr eigenes T^4-Modenspektrum übernehmen könnte.
- **Substrat.** Aperiodisch vs. periodisch + fraktal – eine reale geometrische Gabel (Abschnitt 6).
- **Fundament-Reife.** HLV hat in externen Reviews Kritik an unterspezifizierter, nicht geschlossener Algebra und an undefinierten Operatoren erhalten; die FFGFT arbeitet mit einer Drei-Ebenen-Disziplin (Kern-Herleitungen / algebraisch bewiesene Bridges / Plausibilitäts-Reduktionen) und dem Hilbertraum-Brückenbau (Dok. 230–232).
- **Skope.** HLV bezieht eine Bewusstseins-/Biogravimetrie-Schicht ein. Diese wird hier *ausdrücklich ausgeklammert*: Der vorliegende Vergleich betrifft allein die physikalisch- geometrischen Schichten.

H.5 Unterscheidende Vorhersage: die spektrale Gabel

Der wissenschaftlich belastbare Kern der Gegenüberstellung ist spektral. Ein *periodisches* Substrat (T^4) erzeugt ein diskretes Spektrum mit ganzzahligen Modenlabels $|n|^2$ und einer harmonisch-leiterartigen Struktur; die FFGFT liest daraus dimensionslose CMB-Peak-Verhältnisse $1 : 2{,}449 : 3{,}742 : \ldots$ ab, fest aus $D = 4$ (Krümmungsparameter $B = 1/3$). Ein *aperiodisches* Substrat (Quasikristall) erzeugt dagegen typischerweise ein hierarchisches, lückenreiches Spektrum (singulär-stetige Zustandsdichte, Cantor-artige Lückenstruktur) *ohne* einfache ganzzahlige Harmonik-Leiter.

Diese beiden Signaturen sind *unterscheidbar*. Konkreter Test (skaleninvariant):

1. HLVs Testbed mit (a) dem Quasikristall *und* (b) einem *periodischen* Gitter-Nullmodell laufen lassen – nicht nur gegen randomisierte Nullmodelle. Die scharfe Frage ist aperiodisch-vs-periodisch, nicht diskret-vs-kontinuierlich.
2. Den führenden *Abweichungs-Exponenten* im Rückgewinnungslimit berichten: Nähert sich die Graph-Laplace-Dispersion dem Kontinuum $\omega \propto |k|$, und ist der Rest $O(\text{klein})$ und vorzeichenbestimmt? (Die FFGFT tut genau dies mit $O(\xi)$-Korrekturen.)
3. Skaleninvariante *Spektral-Verhältnisse* gegenüberstellen: das harmonische T^4-Verhältnisspektrum gegen das Quasikristall-Lückenspektrum – und beide gegen Daten (CMB-Peaks bzw. Gitter-Benchmarks). Welches Verhältnisspektrum die Beobachtung trifft, diskriminiert die Substrate.

H.6 Gemeinsame methodische Leitplanke

Für *beide* Programme gilt: Jede Größenordnung lässt sich als φ^N bzw. ξ^N schreiben; eine einzelne gemessene Skala in einem Exponenten ist daher *keine* Vorhersage. Vorwärts-Gehalt liegt allein in dimensionslosen Verhältnissen, die zugleich *isoliert*, *vorhergesagt* und *präzise* sind. Die absolute Skala (bei der FFGFT H_0/R_H über den gefitteten Exponenten $41/4$) bleibt kalibrierte Eingabe, kein Beleg (Dok. 190, P35). Eine ehrliche HLV-Vorhersage sollte entsprechend ein *skalenfreies* Verhältnis aus dem Graph-Laplace-Spektrum sein, nicht eine in φ gekleidete Absolutgröße.

H.7 Status und nächste Schritte

Diese Arbeit ist eine strukturelle Kartierung, kein Vereinigungs-Anspruch. Offen bleibt, ob die triadische Resonanz ein echter Isomorphismus oder ein Zufall ist, und ob eines der beiden Substrate das beobachtete Modenspektrum besser trifft. Der naheliegende nächste Schritt ist ein *gemeinsamer* Testbed-Lauf: HLVs Graph-Laplace gegen ein periodisches Null-Gitter, plus die skaleninvariante Verhältnis-Gegenüberstellung mit dem T^4-Spektrum. Erst danach – Falsifikation vor Interpretation – ist eine Aussage über die Verwandtschaft der beiden Geometrien belastbar.

H.8 Quellen

- M. Krüger, *A Conservative Master Explanation of the Helix–Light–Vortex Framework*, Zenodo (2026), doi:10.5281/zenodo.20596861.
- M. Krüger, *A Reproducible 6D-to-3D Cut-and-Project Graph Testbed for Quasicrystalline Laplacian Recovery and Vortex Benchmarks*, Zenodo (2026), doi:10.5281/zenodo.20275888.
- FFGFT: Dok. 190 (Korrekturregister, P35), Dok. 206 (Dreiecks-Reduktion, Z_3), Dok. 230–232 (Hilbertraum-Brücke), Dok. 268 (CMB-Peaks aus T^4), Dok. 270 (Reduktionskette $T^4 \to T^0$).

Kapitel I

Dok. 272 — FFGFT (T0) und HLV, eingeordnet nach Dot Theory

Abstract

Diese Arbeit ordnet FFGFT (T0, Zeit-Masse-Dualität) und das Helix-Light-Vortex-Programm (HLV, M. Krüger) durch das *aktuelle Governance-Gerüst* von Stefaan Vossens *Dot Theory* ein, wie es im direkten IPI-Austausch (Vossen mit J. Pascher u. a.) entwickelt wurde. Dot Theory ist kein konkurrierendes Physikmodell, sondern ein repräsentationales Meta-Programm mit einer Governance-Maschinerie aus vier Aufzeichnungsobjekten: dem **Lexicon** (Struktur/Terminologie), dem **OAP** (Admissibilitäts-Record), der **Matrix** (Beziehungen zwischen Frameworks) und der **FAH** (*Framework Admissibility History*: wie sich Admissibilität ändert; provenance-erhaltende Renderings $O0 \to O1/O2$). Leitprinzipien: „declared provenance, not universal agreement“ und „preservation of meaning-making, not allocation of meaning“ – ein FAH-Record ist ein *historisches Objekt*, kein Wahrheitsanspruch. Die vorliegende Einordnung entsteht als **Matrix-Eintrag** (Beziehung FFGFT↔HLV) und wird als **sekundäres Rendering ($O2$)** unter Provenance angeboten – eine *erklärte* Lesart (J. Pascher), während Krüger (HLV) und Vossen (Dot) die $O0$-Originatoren-Deklaration halten. Ergebnis: FFGFT (beobachterunabhängig/periodisch/vorwärts-prädiktiv) und HLV (beobachtereingebettet/aperiodisch/substrat-distinktiv) sind nur auf der spektral-/Rückgewinnungs-Achse kommensurabel; die übrigen Achsen liegen in verschiedenen „Fragegeometrien“. Genutzt wird allein Dots Governance-/Routing-Schicht, nicht dessen eigene physikalische ToE-/ψ-Schicht.

I.1 Dot Theorys Governance-Maschinerie (Stand IPI, Juni 2026)

Dot Theory wird von Vossen ausdrücklich nicht als fertige physikalische Theorie geführt, sondern als repräsentationale Hypothese über das Modellieren, mit strenger Programm-Auflage: jede Erweiterung muss konsistent sein, geforderte Symmetrien wahren, den Standardformalismus als Grenzfall *zurückgewinnen* und mindestens

einen klaren empirischen Diskriminator liefern. Im direkten IPI-Austausch hat sich daraus eine Governance-Maschinerie mit vier Aufzeichnungsobjekten entwickelt:

- **Lexicon** – hält die *Struktur*: Begriffe und ihre Definitionen.
- **OAP** – hält die *Admissibilität* eines Frameworks (erfüllt es die Programm-Auflage?).
- **Matrix** – hält die *Beziehungen* zwischen Frameworks.
- **FAH** (Framework Admissibility History) – hält, *wie sich* Admissibilität ändert, wenn eine implizite Festlegung sichtbar gemacht und verschoben wird.

Die FAH arbeitet mit gestaffelten Renderings: $O0$ (Originatoren-Deklaration) $\rightarrow$ $O1/O2$ (sekundäre Renderings anderer Beobachter) $\rightarrow$ spätere Bewertung. Einmal aufgenommen, bleiben Records *permanent* und anfechtbar; spätere Einträge können verfeinern, bestreiten, ergänzen oder ablösen, aber das ursprüngliche Rendering bleibt Teil der Entwicklungsgeschichte. Tragend ist die Unterscheidung „preservation of meaning-making“ (zulässig: festhalten, *wie* eine Änderung verstanden wurde) gegen „allocation of meaning“ (unzulässig: entscheiden, *wer* recht hat). In Pascher-Worten: *Die Geschichte, wie ein Resultat verstanden wurde, ist selbst Teil des Resultats.*

Diese Einordnung verwendet allein die Governance-/Routing-Schicht. Dot Theorys eigene physikalische ToE-Schicht (Meta-Lagrangian $\mathscr{L}_{\text{Dot}}$, Beobachter-Operator $\odot$, Beobachter-Zweck-Feld ψ) wird *nicht* herangezogen. Der Stand ist Juni 2026 und – konsistent mit Dots nicht-absolutem Anspruch und der FAH-Ablösbarkeit – ausdrücklich vorläufig.

I.2 Lexicon: die Einordnungs-Achsen als definierte Begriffe

- *Informations-Zugänglichkeit / Fragegeometrie*: unter welcher Frage und mit welchem Zugang operiert das Framework?
- *Operationale Invarianten*: was bleibt unter den charakteristischen Operationen erhalten?
- *Rekonstruierbarkeit / Projektionsverlust*: welche Information geht bei der Projektion verloren, welche lässt sich zurückgewinnen?
- *Beobachter-Einbettung*: ist ein Beobachter konstitutiv im Formalismus enthalten?
- *Empirischer Diskriminator (Admissibilität)*: welche prüfbare Observable trennt das Framework von Nullmodellen?

I.3 OAP: Admissibilität von FFGFT und HLV

Beide Frameworks sind im OAP-Sinn *admissibel*, aber auf verschiedenen Observablen. **FFGFT** erfüllt die Auflage über dimensionslose Verhältnisse (α, CMB-Peak-Verhältnisse aus $D = 4$), eine $O(\xi)$-Rückgewinnung der Kontinuumsdispersion und eine *ausgearbeitete* Rekonstruierbarkeits-Typologie (Dok. 270). **HLV** erfüllt sie über

das Graph-Laplace-Spektrum gegen Nullmodelle und Vortex-Benchmarks; die Rückgewinnung von QFT/GR im Limes ist gefordert, aber noch zu belegen – ein *Reifeunterschied*, kein Widerspruch.

I.4 Matrix: die Beziehung FFGFT ↔ HLV

Lexicon-Achse	**FFGFT / T0**	**HLV**
Strukturelle Schachtelung (Juni 2026)	kristallographischer 3-fach-Kern C_3; T^4	ikosaedrische Erweiterung $A_5 \supset C_3$; $T^7 = T^4 \times T^3$; φ = Eigenwert des Perp-Sektors
Zugänglichkeit / Fragegeometrie	beobachter*unabhängig*; „welche dimensionslosen Verhältnisse folgen aus ξ?“	substratzentriert; „ist das Substrat von Nullmodellen unterscheidbar?“
Operationale Invarianten	$\tilde{T}\cdot m = 1$; ξ; Windungszahlen; Z_3 (det $= 1-\xi$)	Cut-and-Project-Fenster; Vortex-Topologie; triadische Zeit $\psi = t + i\varphi + j\chi$
Rekonstruierbarkeit / Projektionsverlust	*ausgearbeitet* (Dok. 270): verlustbehaftete Reduktion vs. verlustfreie Repräsentation	Rückgewinnung von QFT/GR im Limes – gefordert, noch zu zeigen
Beobachter-Einbettung	keine (rein geometrisch)	ja: ψ-/Bewusstseinsschicht (wie Dot Theory selbst)
Empirischer Diskriminator	dimensionslose Verhältnisse: α, Peak-Verhältnisse aus $D = 4$	Graph-Laplace-Spektrum vs. Nullmodell; Vortex-Benchmarks

Achsenweise zeigt sich: FFGFT und HLV stellen *verschiedene* Fragen (was folgt aus ξ vs. ist das Substrat unterscheidbar), tragen die triadische Struktur an verschiedenen Stellen (Zeitalgebra ψ vs. Reduktionssymmetrie Z_3 – Isomorphie-Kandidat, kein Beweis, vgl. Dok. 271), und sind nur über die Rekonstruierbarkeits-/Diskriminator-Achse *spektral* aneinander anschlussfähig. Dort – und nur dort – ist der paarweise Vergleich (Dok. 271) lizenziert und liefert die unterscheidende Vorhersage: periodisches T^4-Harmonikspektrum (Peak-Verhältnisse aus $D = 4$) gegen aperiodisches Quasikristall-Lückenspektrum. Auf den Achsen Fragegeometrie und Beobachter-Einbettung leben beide in verschiedenen Regimen; ein direkter „X ist wie Y“-Vergleich wäre dort eine Kategorienverwechslung.

Verfeinerung (späteres $O2$-Rendering, 19. Juni 2026). Auf der strukturell-gruppentheoretischen Achse besteht eine engere Beziehung als oben festgehalten: $C_3 < A_5$ und $T^4 \subset T^7$ ($7 = 4 + 3$) ergeben ein *Enthaltensein* HLV $\supset$ FFGFT (Dok. 283/285) – FFGFT als kristallographischer 3-fach-Kern, HLV als ikosaedrische Erweiterung. Der goldene Schnitt φ ist dabei der HLV-seitige *Diskriminator*: Eigenwert der Perp-Richtungen (golden inflation $\varphi^2 = \varphi + 1$), die FFGFT gerade nicht enthält; dieselbe kristallographische Einschränkung ($2\cos(2\pi/5) = 1/\varphi \notin \mathbb{Z}$), die φ in FFGFT verbietet, weist φ HLV zu. Diese Lesart ist *stärker festgelegt* als der ursprüngliche Eintrag und wird ausdrücklich als anfechtbares Rendering eingebracht: sie ändert OAP nicht und allokiert keine Bedeutung; die gruppentheoretische Tatsache ($C_3 < A_5$, $7 = 4 + 3$) ist belastbar, die physikalische Identifikation des Perp-Sektors bleibt deklarierte Lesart.

I.5 FAH: Rendering-Status dieser Einordnung

Dieser Matrix-Eintrag wird als *sekundäres Rendering* ($O2$) in die Provenance eingebracht. Die $O0$-Originatoren-Deklarationen liegen bei Krüger (HLV) und Vossen (Dot Theory); die hier vorgelegte Lesart ist die von J. Pascher und beansprucht nicht, objektiv festzustellen, welches Framework „stimmt". Sie *bewahrt Meaning-Making* (sie hält fest, wie die Beziehung verstanden wird) und *allokiert keine Bedeutung* (sie entscheidet keinen Vorrang). Damit erklärt die Einordnung zugleich *nachträglich*, warum Dok. 271 genau seine Vorbehalte brauchte: Diese sind nicht Höflichkeit, sondern das Resultat verschiedener Zugänglichkeitsbedingungen – Dots „epistemic routing prior to mechanism deployment" an einem konkreten Fall. Spätere Renderings dürfen diesen Eintrag verfeinern oder bestreiten; er bleibt als historisches Objekt erhalten.

I.6 Rückbezug zur Architektur

Zwei FFGFT-Bausteine speisen direkt in die Governance zurück: (i) die Rekonstruierbarkeits-Typologie aus Dok. 270 (drei qualitativ verschiedene Reduktions-/Übersetzungsoperationen) als konkrete *recoverability structure* für die Matrix-/OAP-Achse; (ii) die methodische Leitplanke aus Dok. 190 (P35): Jede Größe ist als ξ^N bzw. φ^N schreibbar, eine gemessene Skala in einem Exponenten ist keine Vorhersage – nur isolierte, vorhergesagte, präzise *Verhältnisse* tragen Vorwärts-Gehalt. Beide operationalisieren Dots Admissibilitäts- und Routing-Kriterien an einem realen Beispiel.

I.7 Status

Meta-Ebenen-Kartierung, kein Anspruch, dass eines der Frameworks korrekt sei; Stand Juni 2026, vorläufig und ablösbar. Was sie leistet: Sie zeigt prinzipiell begründet, *wo* der Vergleich aus Dok. 271 zulässig ist (spektral-/Rückgewinnungs-Achse) und wo nicht (Fragegeometrie, Beobachter-Einbettung). Offen bleibt – konsistent mit Dots nicht-absolutem Anspruch – ob die triadische Resonanz mehr als Koinzidenz ist und welches Substrat das beobachtete Modenspektrum besser trifft.

I.8 Quellen

- S. Vossen, *Dot Theory* (repräsentationales Forschungsprogramm) und die im IPI-Direktaustausch (Juni 2026) entwickelte Governance: *Lexicon, OAP, Matrix, FAH* ($O0/O1/O2$-Renderings; „declared provenance, not universal agreement"; „preservation of meaning-making, not allocation of meaning"), dottheory.co.uk.
- M. Krüger, HLV: *Conservative Master Explanation* (Zenodo 10.5281/zenodo.20596861) und *6D-to-3D Cut-and-Project Graph Testbed* (Zenodo 10.5281/zenodo.20275888).

- FFGFT: Dok. 190 (P35), Dok. 206 (Z_3), Dok. 270 (Reduktionskette / Rekonstruierbarkeit), Dok. 271 (paarweiser Vergleich FFGFT↔HLV).

Kapitel J

Dok. 274 — FFGFT (T0) im IPI-Feld

Abstract

Diese Arbeit ordnet die FFGFT (T0, Zeit-Masse-Dualität) in das Feld der im *Information Physics Institute* (IPI) diskutierten Rahmenwerke ein. Statt eines weiteren paarweisen Vergleichs (die liegen in Dok. 244, 245/269, 246, 251, 260, 271, 272 vor) wird hier eine *Landkarte* entlang zweier orthogonaler Ordnungsachsen vorgeschlagen: (1) die **Substrat-Geometrie** – woraus der diskrete Untergrund besteht – und (2) das **Primitiv** – was als das Fundamentale gilt. Auf Achse 1 nimmt FFGFT den *periodischen* Pol ein (kompakter T^4-Kristall), HLV den *aperiodischen* (Quasikristall); der *zufällige* Pol bleibt ein Kontrollmodell ohne festen Vertreter. Diese Triade ist genau die, die der spektrale Diskriminator-Testbed (Dok. 271, beiliegendes Skript) messbar macht. Auf Achse 2 steht FFGFT geometrie-primitiv neben informations-primitiven (Vopson; stromabwärts Leavitt), algebraisch-hilbertraumbasierten (UMF) und selektions-/constraint-orientierten Rahmenwerken (RA/PMT, RSG, UC, UIFT). Es wird ausdrücklich betont: diese Zwei-Achsen-Karte ist eine *Ordnungs-Überlagerung des Autors* – in Dot-Theory-Sprache ein *sekundäres Rendering (O2)*, eine erklärte Lesart – nicht das Eigenvokabular der jeweiligen Rahmenwerke; das primäre Rendering (O0) verbleibt bei deren Urhebern.

J.1 Zweck und Grenzen dieser Karte

Im IPI-Austausch sind FFGFT in den letzten Monaten eine Reihe von Rahmenwerken gegenübergestellt worden. Jede Gegenüberstellung endete auffallend oft mit demselben Befund: *Kategorieunterschied, nicht Widerspruch*. Dieses Dokument fragt, warum, und schlägt eine Karte vor, die das erklärt.

Drei Vorbehalte vorab. *Erstens*: die Etiketten unten („periodisches Kristallgitter", „informations-primitiv" usw.) sind *Ordnungsbegriffe dieser Arbeit*. Manche Urheber würden ihr Rahmenwerk anders einsortieren; die Karte ist eine Lesart, kein Urteil. *Zweitens* – und das ist der wichtigere Punkt: die *Wahl der beiden Achsen* (Substrat-Geometrie, Primitiv) ist selbst eine *deklarierte Projektion*, nicht eine universelle Dimension des Feldes. Eine andere Untersucherin könnte ebenso zulässig andere

Achsen wählen – etwa Zugänglichkeit/Constraint oder Beobachterabhängigkeit/Rückgewinnbarkeit – und käme zu einer anderen, gleichermaßen legitimen Klassifikation desselben Feldes. Die hier gewählten Achsen werden daher als *eigens ausgewiesene Projektion* geführt, nicht als implizite Universalien; sie sind privilegiert allein relativ zum erklärten Zweck dieser Karte. *Drittens*: auch innerhalb dieser Projektion sortieren die Achsen das Feld nicht restlos – Achse 1 (Substrat) trennt sauber nur die geometrischen Substrat-Programme; algebraische (UMF) und kontinuums-topologische (αLGQV) Programme liegen neben der Triade. Das ist kein Mangel der Karte, sondern ihre ehrliche Auflösung.

Verwendung von O0/O2 (deklariert): O0/O2 werden hier im *provenienzwahrenden* Sinn gebraucht – als Marker dafür, wo die Deutungshoheit liegt und wer das Korrekturrecht behält –, nicht als vollständiger Import von Guevaras Rendering-Hierarchie (O0/O1/O2 als Repräsentationsebenen). Ob beide letztlich zusammenfallen, bleibt offen; diese Karte verwendet allein die provenienzwahrende Lesart (vgl. Vossens FAH-Anliegen). Rendering-Ebene und Provenienz fallen in diesem Dokument nur deshalb zusammen, weil ein sekundäres Rendering *fremder* Rahmenwerke notwendig von jemand anderem als dem Urheber verfasst ist – außerhalb des Fremdvergleichs entkoppeln sie.

J.2 Achse 1 – Substrat-Geometrie (die Kristall-Achse)

FFGFT ist im Kern ein *periodisches Kristallgitter*: der kompakte 4-Torus T^4 ist periodisch und geordnet, mit fraktaler Korrektur $D_f = 3 - \xi$. HLV ist demgegenüber ein *aperiodischer Quasikristall* (Cut-and-Project $\mathbb{Z}^6 \to 3$D, golden ratio / Fibonacci). Ein drittes, *zufälliges* Substrat dient als Nullmodell. Diese drei Typen sind nicht nur begrifflich verschieden – sie haben *verschiedene Spektral-Fingerabdrücke*, und genau diese Trennung macht der Graph-Laplace-Testbed aus Dok. 271 skaleninvariant messbar.

Substrat-Typ	Vertreter	Spektraler Fingerabdruck (skaleninvariant)
periodisches Kristallgitter	**FFGFT** (T^4)	stark entartet; $\langle r \rangle \approx 0$; ganzzahlige $\lvert n \rvert^2$-Leiter (Summen von Quadraten); in $D{=}4$ wird *jede* ganze Zahl getroffen (Lagrange); keine Cantor-Lücken
aperiodischer Quasikristall	**HLV** (Krüger)	geringe Entartung; *intermediäres* („kritisches") $\langle r \rangle$; hohe Lücken-Reichhaltigkeit (Cantor-Hierarchie) – erwartet, von beiden Kontrollen unterscheidbar
zufälliges Substrat	Kontrollmodell	$\langle r \rangle \approx 0{,}50$ (GOE $0{,}531$); keine Entartung, keine Lückenhierarchie

Die Diskriminatoren ($\langle r \rangle$ = Verhältnis aufeinanderfolgender Niveau-Abstände, Entartungsanteil, Lücken-Reichhaltigkeit) sind dimensionslos und brauchen kein *unfolding*; die absolute Skala spielt keine Rolle. Damit ist Achse 1 nicht bloß ein Bild, sondern ein *Experiment*: der Test, ob ein gegebenes Spektrum periodisch, aperiodisch oder zufällig ist. FFGFT trägt dazu die Vorhersage des periodischen Arms bei (die rationale $\lvert n \rvert^2$-Leiter), HLV das aperiodische Substrat; die Leitplanke „$X = \varphi^N$ bzw. $X = \xi^N$ ist keine Vorhersage" (Dok. 190 P35) gilt für beide.

J.3 Achse 2 – das Primitiv (woraus alles folgt)

Ein großer Teil des IPI-Feldes hat *kein* geometrisches Substrat; dort greift die Kristall-Achse nicht, und ein zweiter Ordnungsbegriff wird nötig: was gilt als das Fundamentale?

- **Geometrie-primitiv: FFGFT** – alles folgt aus T^4-Geometrie und der einen dimensionslosen Konstante $\xi \approx 1/7500$. Statisch, beobachterunabhängig, ohne Selektor.
- **Informations-primitiv: Vopson** – Masse-Energie-Informations-Äquivalenz (MEI), Zweites Gesetz der Infodynamik, Simulations-Hypothese. Information ist physikalisch und fundamental. Stromabwärts: **Leavitt**, dessen Bit-Budget-Konstruktion direkt auf Vopsons MEI aufsetzt.
- **Algebraisch / hilbertraumbasiert: UMF** (Gericke) – ein primzahl-indizierter Hilbertraum $\ell^2(P_N)$ mit Kopplungs-Bivektor B_{OI}.
- **Selektions- / Constraint-orientiert** (was *wählt oder beschränkt* die Konfiguration): **RA/PMT** (Guevara), **RSG** (Austin), **UC** (Haskins), **UIFT** (Teker).
- **Kontinuums-topologisch:** αLGQV (Kriger) – S^3-Topologie, Membran-Elastizität als Metrik.
- **Meta- / Governance** (ordnet *andere* Theorien, eine Ebene höher): **Dot Theory** (Vossen).

Auf dieser Achse ist der FFGFT-Kontrast zu Vopson nicht periodisch-vs-aperiodisch, sondern die *geometrische gegen die informationelle Seite derselben MEI-Beziehung*: FFGFT nähert sich von der Geometrie, Vopson von der Entropie (Dok. 251). Ein sichtbarer struktureller Unterschied folgt daraus – FFGFT schließt ein „Außen“ bzw. eine Simulation strukturell aus (es gibt keinen Außenstandpunkt zu einer statischen Gesamtstruktur), während Vopsons Rahmen ihn offen lässt.

J.4 Die Gesamtkarte

Rahmenwerk	Eigner	Kategorie (Achse)	Relation zu FFGFT	Dok.
FFGFT / T0	Pascher	Substrat: periodisch; Primitiv: Geometrie	— (Bezugspunkt: statisch, beobachterfrei, kein Selektor)	—
HLV	Krüger	Substrat: aperiodisch	gemeinsame spektral-/Rückgewinnungs-Achse; sonst Kategorienfehler	271, 272
Vopson (MEI)	Vopson	Primitiv: Information	Geometrie- vs. Informations-Seite derselben MEI-Relation; Außen ausgeschlossen vs. offen	251
(Bit-Budget)	Leavitt	Primitiv: Information (stromab Vopson)	teilt Vopsons Primitiv; Bit-Budget = ΛCDM-Werte als Eingabe, kein Vorwärts-Gehalt	—
UMF	Gericke	Algebraisch / Hilbertraum	$\ell^2(P_N)$ ist echter Teilraum von $L^2(T^4)$; $\tau{\cdot}\mu = \hbar/c^2$ beidseitig	244
RA/PMT	Guevara	Selektion (Meta-Schema)	FFGFT verweigert den Selektor-Slot RA1.5 (statisch)	245, 269
RSG	Austin	Selektion / bulk-boundary	asymmetrische Komplementarität: FFGFT liefert Skala, RSG Selektionssprache	246
UC	Haskins	Constraint (statisch)	beide statisch; α-Korrektur-Inkonsistenz (H_0 vs. a_0)	260
UIFT	Teker	holographischer Rand	Beobachter-Faktor-3 ist FFGFTs explizite Version des Volumen→Rand-Moves	267, 268
αLGQV	Kriger	Kontinuums-topologisch	anderer Substrat-Typ (S^3, Membran); kein Gitter	—
Dot Theory	Vossen	Meta / Governance	ordnet das Feld (Lexicon/OAP/Matrix/FAH); kein physikalisches Substrat	272

Abstammung und Außenkontakte (keine IPI-Forum-Rahmenwerke, zur Vollständigkeit): die *Scale Relativity* (Nottale) ist der fraktale-Raumzeit-Vorfahr der FFGFT; der Koide-Kreis (Koide, Rivero, Baez, Kocik, Brannen) betrifft die Massenformel-Verifikation, nicht das Substrat.

J.5 Warum so oft „Kategorieunterschied, nicht Widerspruch“

Die Karte erklärt das wiederkehrende Vergleichsergebnis. FFGFT sitzt auf *beiden* Achsen am gleichen, strukturell-geometrischen Pol: periodischer Kristall (Achse 1) und Geometrie-Primitiv, statisch, ohne Selektor (Achse 2). Die meisten anderen Rahmenwerke bauen ihre Theorie gerade um einen *Slot*, den FFGFT prinzipiell leer lässt oder anders besetzt:

- den **Selektor** (RA/PMT RA1.5, RSGs Selektionsprinzip) – FFGFT ist statisch, es wird nichts ausgewählt;
- die **Volumen→Rand-Naht** (UIFT) – FFGFT trifft sie explizit als Beobachter-Faktor-3, löst aber nicht dieselbe offene Frage;
- den **Constraint** (UC) – FFGFT instanziiert Struktur, formuliert aber kein eigenständiges Constraint-Prinzip;

- das **Informations-Primitiv** (Vopson) – FFGFT nimmt die Geometrie als Primitiv und gewinnt Information daraus, nicht umgekehrt;
- den **Außenstandpunkt / die Simulation** (Vopson offen) – in FFGFT strukturell ausgeschlossen.

Deshalb sind die Befunde selten Widersprüche: die Rahmenwerke reden über verschiedene Schichten. Wo sie sich wirklich *berühren* und damit empirisch kollidieren können, ist die Substrat-Achse – und dort liefert der spektrale Diskriminator (Dok. 271) den einzigen derzeit scharfen, gemeinsamen Test.

J.6 Anwendung der Governance-Schicht: vom Matrix-Eintrag zum A∗

In der Governance-Sprache von Vossen (Dot Theory) und Guevara (RA/PMT) lässt sich diese Karte nicht nur als statische Einordnung lesen, sondern als *Arbeitsablauf*. Die FFGFT–HLV-Achse ist dafür das konkrete Beispiel – der Ablauf ist bereits durchlaufen, nicht bloß beschrieben:

- **Deklarierte Projektion:** die Substrat-Achse.
- **PRC** (Projection-Relative Classification): FFGFT periodisch, HLV aperiodisch.
- **PRM** (Projection-Relative Measurement): der spektrale Diskriminator (Niveau-Abstands-Verhältnis $\langle r \rangle$, Lückenstruktur, spektrale Dimension) – eine Messung, die *relativ zu dieser Projektion* definiert und ohne sie sinnlos ist.
- **Residuum** (deklariert, nicht absorbiert): eine unabhängige Reproduktion des HLV-Spektrums ($\mathbb{Z}^6$-Schnitt-Projektion, k-NN-Laplace) zeigt, dass der Quasikristall auf der Leitstatistik $\langle r \rangle$ *noch nicht* vom Zufalls-Kontrollmodell trennbar ist; die aperiodische Signatur überlebt nur schwach, in Lückenstruktur und Tiefmoden-Sektor. Dieses Residuum wird ausgewiesen, nicht weggerechnet.
- **Operational Accord:** das gemeinsame Testprotokoll (periodisches Nullmodell, expliziter Rückgewinnungs-Limes, skaleninvariante Verhältnisse), gebunden an die beiden Beitragenden und ohne die Behauptung, die Rahmenwerke seien identisch.

Das Resultat – der geteilte Spektral-Testbed – ist ein *Cooperative Admissible Space (A∗)* im Sinne der jüngsten Vossen–Guevara-Lokalisierung: eine deklarierte Region, in der FFGFT und HLV für einen erklärten Zweck *operativ* kooperieren, ohne ontologische Identität. Guevaras Beobachtung gilt dabei: der Accord ist selbst ein Objekt mit eigenen Admissibilitäts-Bedingungen (den drei vereinbarten Kriterien), eigener Residuumsstruktur (was der abgeglichene Lauf zeigt) und einem Revisionsoperator (Neulauf, sobald HLV sein gewichtetes Spektrum liefert). *Operativ* statt bloß deklariert ist er, weil die Messung scheitern kann – das obige Residuum belegt, dass der Raum echte Arbeit leistet. O0 und O2 sind hier nicht das Ziel, sondern die Instrumente, durch die der Accord konstruierbar und überprüfbar wird.

Auch dieser Abschnitt ist eine erklärte Anwendung fremden Vokabulars (Vossen, Guevara) und steht unter Korrekturvorbehalt der Urheber.

J.7 Ehrliche Residuen (deklariert)

- Diese Karte ist eine *erklärte Lesart* des Autors (Dot-Theory-O2). Das primäre Rendering (O0) jedes Rahmenwerks verbleibt bei seinem Urheber; die Einordnungen oben sind als Matrix-Einträge im Sinne von Dok. 272 zu lesen, nicht als Zuschreibungen.
- Die *Wahl der Achsen selbst* ist eine deklarierte Projektion (Abschnitt 1), kein universelles Raster; andere Achsen (Zugänglichkeit/Constraint, Beobachterabhängigkeit/Rückgewinnbarkeit) sind gleichermaßen zulässig und ergäben eine andere legitime Karte.
- Die Substrat-Triade (periodisch/aperiodisch/zufällig) ordnet sauber nur FFGFT, HLV und das Kontrollmodell. UMF (algebraisch) und αLGQV (kontinuums-topologisch) liegen neben der Triade; ihre Einordnung erfolgt allein über Achse 2 bzw. den Substrat-*Typ*, nicht über die Spektral-Gabel.
- Die Platzierung von Leavitt als „stromabwärts Vopson" folgt aus der Herkunft seiner Bit-Budget-Konstruktion (MEI), nicht aus einer eigenständigen Substrat-Aussage.
- Sollte ein Urheber seinen Slot operationalisieren – etwa Guevara RA1.5 als Gleichung, oder Vopson eine isolierte, vorhergesagte, dimensionslose Verhältnis-Vorhersage –, wäre die betreffende Zeile neu zu bewerten. Die Karte ist datiert und vorläufig (Juni 2026).

Bezug: Dok. 244 (UMF/Hilbertraum), 245/269 (RA/PMT), 246 (RSG), 251 (Vopson), 260 (UC/Haskins), 267/268 (UIFT-Naht), 270 (Projektionskette $T^4 \to T^0$), 271/272 (HLV, paarweise und Dot-Governance), 190 P35 (ξ^N-Trivialität). HLV: Krüger, Zenodo 10.5281/zenodo.20596861 und 10.5281/zenodo.20275888. Vopson: AIP Advances 2022/2023/2024. RA/PMT: Guevara 2026.

Kapitel K

Dok. 275 — Von ξ zu φ: Rekursive Skalenhierarchie

Abstract

Wir untersuchen die rekursive Dämpfungsfolge $r(k{+}1) = r(k)(1-\xi)$, $r(0) = D_f/3$, die allein aus dem fundamentalen geometrischen Parameter $\xi = 4/30000$ und der fraktalen Dimension $D_f = 3 - \xi$ folgt. Bei der Rekursionstiefe $k^* = \log(\varphi)/\xi \approx 3609$ *passiert* die Folge den Wert $1/\varphi$: $r(3609) \approx 1/\varphi$ mit absolutem Fehler $4{\cdot}10^{-5}$ (relativ $6{,}5{\cdot}10^{-5}$); das exakte reelle $k^*_{\text{exakt}} = 3608{,}51$ trifft $1/\varphi$ identisch. **Statusklärung (Revision 11. Juni 2026):** $1/\varphi$ ist *kein Fixpunkt* der Rekursion (der einzige Fixpunkt ist 0), sondern ein Durchgangspunkt; da $k^*(c)$ für *jedes* Ziel $c \in (0,1)$ mit identischem Parameterstatus existiert, greift die ξ^N/φ^N-Trivialitätswarnung (Dok. 190 P35) auf dieses Resultat in vollem Umfang. Physikalischen Gehalt erhielte es erst durch eine unabhängige Fixierung von $k^* \approx 3609$ – derzeit offen. Die Rekursionsebenen sind geometrische Skalenebenen mit dem FFGFT-internen Faktor $q = 2/3$; $(2/3)^{3609}$ ist konvergent. Die numerische Validierungsstudie wurde nach einem unabhängigen Audit (P. Stoychev, IPI, 11. Juni 2026) vollständig korrigiert (v4): mit echter 4D-Implementierung des T^4-Graphen und dimensions-gematchten 4D-Null-Modellen liegt FFGFT T^4 *im* Null-Band; HLV liegt mit echtem Ensemble ebenfalls im Band. Frühere gegenteilige Befunde (v3) waren Implementierungsartefakte und werden in diesem Dokument sichtbar widerrufen.

K.1 Motivation und Einordnung

In Dok. 258 wurde gezeigt, dass der Koide-Skalar $Q_{\text{FFGFT}} \approx 0{,}6677$ aus den geometrischen Invarianten r_e, r_μ, r_τ und den Leptonenexponenten p_e, p_μ, p_τ folgt. Dieser Wert ist ein *Output* der Theorie, kein Eingabeparameter.

Parallel dazu erscheint in der HLV-Gitterkonstruktion von Krüger [1] der goldene Schnitt $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$ als Projektionsratio bei der 6D→3D cut-and-project-Konstruktion. Run E von Krüger identifiziert die Low-Sektor-Lückenhierarchie als einzigen verbleibenden Kandidaten-Separationskanal zwischen HLV und Null-Modellen.

Das vorliegende Dokument beantwortet drei Fragen:

1. Welcher Skalar ist der physikalisch korrekte für die makroskopische geometrische Struktur?
2. Wie hängt er mit ξ zusammen?
3. Was bedeutet $k^* \approx 3609$ physikalisch – und warum ist das keine astronomische Skala?

Bemerkung K.1.1 (Alle drei FFGFT-Skalare sind herleitbar). Die Frage ist nicht, welcher der drei Skalare ξ, $1/\varphi$, Q_{FFGFT} aus FFGFT hergeleitet werden *kann* – das gilt für alle drei. Die Frage ist, welcher auf welcher physikalischen Ebene *operiert* und damit für welche Messgrößen zuständig ist.

K.2 Fundamentale Parameter und Skalartrennung

Die FFGFT arbeitet mit folgenden parameterlosen Grundgrößen:

$$\xi = \frac{4}{30000} \approx 1{,}333 \times 10^{-4} \qquad \text{(fraktale Abweichung, mikroskopisch)} \tag{K.1}$$

$$D_f = 3 - \xi \approx 2{,}99987 \qquad \text{(Hausdorff-Dimension des } T^4\text{)} \tag{K.2}$$

$$q = \frac{2}{3} \qquad \text{(geometrischer Rekursionsfaktor)} \tag{K.3}$$

Definition K.2.1 (Drei FFGFT-Skalare nahe 0,6)**.**

Größe	Wert	Rolle
$\xi = 4/30000$	$1{,}333 \times 10^{-4}$	fundamentaler Input; fraktale Dim.; überall aktiv
$1/\varphi$	$0{,}6180$	makroskopischer Schalenratio; Durchgangspunkt der ξ-Rekursion (Output; Status s. Abschn. K.3)
Q_{FFGFT}	$0{,}6677$	Koide-Skalar Leptonen (Output, Dok. 258); nur Teilchenphysikskala

Alle drei sind aus FFGFT herleitbar. Sie sind *nicht* austauschbar.

K.3 Die ξ-Dämpfungsrekursion

Definition und geschlossene Form

Definition K.3.1 (ξ-Dämpfungsrekursion)**.** Sei $r(0) = D_f/3 = (3-\xi)/3$ der Schalenratio auf der untersten Skalenebene. Die Rekursion lautet:

$$r(k+1) = r(k) \cdot (1-\xi), \qquad k = 0, 1, 2, \ldots \tag{K.4}$$

Geschlossene Form:

$$r(k) = \frac{D_f}{3} \cdot (1-\xi)^k \approx \frac{D_f}{3} \cdot e^{-\xi k}. \tag{K.5}$$

Der physikalische Inhalt: $r(0) = D_f/3$ ist das Verhältnis der fraktalen Dimension zur topologischen Dimension 3. Jede Skalenebene dämpft dieses Verhältnis um den Faktor $(1-\xi)$.

Hauptbeobachtung (revidiert): $1/\varphi$ als Durchgangspunkt

Bemerkung K.3.2 (Revision 11. Juni 2026). Die ursprüngliche Fassung dieses Abschnitts bezeichnete $1/\varphi$ als *Fixpunkt* der Rekursion und führte das Resultat als Theorem. Beides war falsch bzw. überhöht: der einzige Fixpunkt von $r \mapsto r(1-\xi)$ ist $r = 0$; $1/\varphi$ ist ein *Durchgangspunkt*. Die Korrektur folgt dem Audit von P. Stoychev (IPI-Liste, 11. Juni 2026).

Beobachtung. Die Folge $r(k)$ passiert den Wert $1/\varphi$ bei der Rekursionstiefe

$$k^* = \frac{\log \varphi}{\xi} = \frac{\log\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)}{4/30000} \approx 3609, \tag{K.6}$$

mit $r(3609) = 0{,}6179940013\ldots$ und $|r(3609) - 1/\varphi| = 4{,}0 \times 10^{-5}$ (relativ $6{,}5 \times 10^{-5}$). Das exakte reelle $k^*_{\text{exakt}} = \big(\log(1/\varphi) - \log\big(D_f/3\big)\big)/\log(1-\xi) = 3608{,}51$ erfüllt $r(k^*_{\text{exakt}}) = 1/\varphi$ identisch.

Bemerkung K.3.3 (Parameterstatus – die entscheidende Einschränkung). Die Arithmetik ist korrekt, aber die Aussage ist *nicht* ausgezeichnet: für *jedes* Ziel $c \in (0,1)$ existiert

$$k^*(c) = \frac{\log c - \log\big(D_f/3\big)}{\log(1-\xi)} \tag{K.7}$$

mit exakt demselben Parameterstatus – „kein freier Parameter" gilt für alle Ziele gleichermaßen, weil der freie Exponent lediglich in k^* umbenannt und nach dem Ziel aufgelöst wurde:

Ziel c	$k^*(c)$
$1/\varphi = 0{,}6180$	3608,5
$Q_{\text{FFGFT}} = 0{,}6677$	3028,8
$1/2$	5197,9
$1/e$	7499,2
α_{em}	36899,0

Die ξ^N/φ^N-Trivialitätswarnung (Dok. 190 P35) greift damit auf das eigene Resultat. Physikalischen Gehalt erhielte die Beobachtung erst, wenn $k^* \approx 3609$ durch etwas Unabhängiges fixiert würde (eine Ebenenzählung der Konstruktion, eine Observable) und *dann* auf $1/\varphi$ träfe. Eine solche Fixierung ist derzeit nicht bekannt.

K.4 Skaleninterpretation: $q = 2/3$, nicht Faktor 2

Bemerkung K.4.1 (Kritischer Punkt). Eine naive Lesart könnte $k^* \approx 3609$ als astronomisch viele Renormierungsgruppen-Schritte deuten: mit Faktor 2 pro Schritt wäre das eine Skalenspreizung $2^{3609} \approx 10^{1086}$, weit jenseits jeder experimentellen Reichweite.

Dieser Einwand verfehlt die FFGFT-Struktur.

Die vier Toruslängen folgen der Rekursion $L_\mu = L_0 \cdot q^\mu$ mit $q = 2/3$ (K.3). Die kumulative Skalierung nach k Ebenen ist $S(k) = q^k = (2/3)^k \to 0$.

Proposition K.4.2 (Konvergenz mit FFGFT-Skalierung). *Im Vergleich:*

Interpretation	*Skalenfaktor bei* $k^* = 3609$	*Charakter*
RG, Faktor 2 (externe Konvention)	$2^{3609} \approx 10^{1086}$	*divergent*
FFGFT, $q = 2/3$ *(intern)*	$(2/3)^{3609} \approx 10^{-635}$	*konvergent*

$k^* \approx 3609$ *ist eine natürliche Zahl innerhalb des Skalenspektrums der Theorie, kein astronomischer Grenzwert.*

K.5 Spektrale Validierungsstudie (drei Ebenen)

Design

Skriptversion v4 (revidiert nach Audit). Verglichen werden zwei getrennte Sektoren mit jeweils dimensions-gematchten Null-Modellen: *4D-Sektor* – FFGFT T^4 als kNN-Graph in echten 4D-Koordinaten (anisotrope Toruslängen $L_\mu = 2\pi(2/3)^\mu$, Anisotropie $L_0/L_3 = 3{,}38$) gegen drei 4D-Nulls (isotrop-kubisch, jittered-anisotrop, random-anisotrope Box); *3D-Sektor* – HLV G-Lattice (kNN-Graph, jetzt mit echtem Seed-Ensemble $\sigma = 0{,}05$) gegen drei 3D-Nulls (jittered-kubisch, random, kubisch). $N = 2000$, $k = 16$, drei Seeds für alle Modelle; Eindeutigkeit aller Punktmengen wird per Assertion erzwungen.

Bemerkung K.5.1 (Was an v3 falsch war – Audit P. Stoychev). (i) Der v3-„T^4-Graph“ nutzte die Gitterkoordinate n_3 nur in der Akzeptanznorm, nicht in der Position: von 2000 Punkten waren nur 729 eindeutige 3D-Positionen; die $1/d^2$-Gewichtung mit Clamp erzeugte Laplacian-Eigenwerte bis $2{,}5\times10^{12}$. (ii) `hlv_points(seed)` verwendete den Seed nicht – das „Ensemble“ war dreimal dieselbe Rechnung. (iii) Der Schalen-Detektor war für Ziele < 1 strukturell verzerrt (s. Abschn. K.5). Alle drei Fehler sind in v4 behoben; zusätzlich werden 4D-Modelle nur gegen 4D-Nulls verglichen, da der Vergleich eines 4D-Graphen mit 3D-Nulls erneut unfair wäre.

Ebene 1 Gap-Hierarchie-Metriken: max. Lücke, Gap-CV, Low-Sektor $\langle r \rangle$, IDS – analog Krüger Run E.

Ebene 2 Schalenstruktur: $1/\varphi$ vs. Q_{FFGFT} auf dem HLV-Punktgitter bei $N = 2000$.

Ebene 3 Numerische Verifikation von k^* und $r(k^*)$.

Bemerkung K.5.2 (Heuristiken im Skript). Die Schalenstruktur-Funktion verwendet einen Schwellwert von 5% für Schalen-Erkennung. Das ist eine Heuristik; für eine Publikation wäre die radiale Verteilungsfunktion $g(r)$ robuster. Die Ensemble-Größe (3 Seeds) ist illustrativ, nicht statistisch abgesichert.

Ergebnisse Ebene 1 (v4): Gap-Hierarchie ($N = 2000$, 3 Seeds)

Bemerkung K.5.3 (Widerruf des v3-Resultats). Das in der Erstfassung berichtete Resultat „FFGFT T^4-Graph außerhalb des Null-Bandes, gap_CV $= 1{,}68 \pm 0{,}09$“ wird **widerrufen**: es war vollständig ein Artefakt der Punktduplikate (729 eindeutige von

2000 Punkten) in Kombination mit dem $1/d^2$-Clamp. Ebenso wird die Präzisionsaussage „HLV ≈ jittered, $\Delta < 0{,}001$ über 3 Seeds“ zurückgenommen – sie verglich eine einzelne Realisierung mit sich selbst (Seed-Bug).

Tabelle K.1: Gap-CV (Low-Sektor, n=100 Moden, N=2000, Mittel ± Std über 3 Seeds), v4: getrennte Sektoren mit dimensions-gematchten Null-Modellen.

Sektor	Modell	gap_CV	Band-Status
4D	**FFGFT T^4 (anisotrop)**	$1{,}329 \pm 0{,}025$	im Band
4D	Null: kubisch isotrop	$2{,}406 \pm 0{,}010$	Bandgrenze oben
4D	Null: jittered anisotrop	$0{,}690 \pm 0{,}026$	Bandgrenze unten
4D	Null: random anisotrope Box	$0{,}740 \pm 0{,}037$	–
3D	**HLV G-Lattice** (σ=0,05)	$0{,}710 \pm 0{,}008$	im Band
3D	Null: jittered kubisch	$0{,}768 \pm 0{,}011$	–
3D	Null: random	$0{,}675 \pm 0{,}043$	Bandgrenze unten
3D	Null: kubisch	$0{,}978 \pm 0{,}010$	Bandgrenze oben

Befunde:

1. **Kein Modell separiert.** FFGFT T^4 liegt mit $1{,}329$ innerhalb des 4D-Null-Bandes $[0{,}690,\ 2{,}406]$; HLV liegt mit $0{,}710$ innerhalb des 3D-Null-Bandes $[0{,}675,\ 0{,}978]$.
2. **Das isotrope 4D-Gitter selbst hat die höchste gap_CV** ($2{,}406$) – reguläre Gitter erzeugen in 4D starke Eigenwert-Degenerationen. Eine hohe gap_CV ist daher kein T^4-Spezifikum, sondern eine generische Ordnungs-Signatur.
3. **Robustheit geprüft:** Das T^4-Resultat ist jitter-stabil ($\sigma = 0{,}02$–$0{,}10$: $1{,}43/1{,}35/1{,}35$) und für $n_{\text{range}} = 4/5$ konsistent ($1{,}35/1{,}40$); $n_{\text{range}} = 3$ ($2{,}28$) ist ein Kleinheits-Artefakt.
4. **HLV mit echtem Ensemble** bleibt im Band und nahe jittered-kubisch – der *Befund* von v3 (konsistent mit Krügers Run E) überlebt, die damals behauptete Präzision nicht.

Bemerkung K.5.4 (Konsequenz für den Vergleich). Bei $N = 2000$ trennt die gap_CV-Diagnostik weder den T^4-Graphen noch HLV von dimensions-gematchten Null-Modellen. Das *verstärkt* Krügers konservativen Run-E-Befund aus einer unabhängigen Pipeline und schränkt die in Dok. 271 formulierte Hypothese einer gemeinsamen spektralen Signatur weiter ein: auf der Graphen-Ebene ist bei dieser Größe keine Signatur nachweisbar.

Bemerkung K.5.5 (Nachtrag (15. Juni 2026): Krügers PHI5 bestätigt die φ-Nicht-Spezifität). Krügers *korrigierter* Pairwise-Audit (PHI5, Juni 2026) fällt *negativ für die φ-Eindeutigkeit* aus: φ ist nicht der stärkste Ausreißer; andere Irrationale erreichen gleiche oder stärkere Eins-gegen-Rest-/paarweise Trennbarkeit. Damit bestätigen sich aus Krügers *eigener* Pipeline – und konsistent mit dem unabhängigen Pairwise-Audit – die hier vertretene Lesart: φ ist eine *generische Ordnungs-Signatur, kein T^4- oder HLV-Spezifikum*. Krüger hat das HLV-Programm daraufhin auf eine konservative Hybrid-Träger-Geometrie (nativer 6D-Backbone, duale Randschleifen, ICE-Faser, nicht-exakte Holonomie; vorab deklarierte Kill-Tests HICE0–HICE7) zurückgesetzt

und erhebt *keine* φ-Spezifitäts-Behauptung mehr. Eine unabhängige HICE-Pilot-Implementierung reproduziert dabei seinen DICE0-Status („precondition not satisfied"): Gauge-Null, Null-Modell-Trennung und destruktive Tests bestehen, aber die Benign-Stabilität fällt durch (Phason-/Fenster-Sensitivität des Cut-and-Project). Für FFGFT ändert das nichts – der Rahmen ankert im Euler-Tonnetz, nicht im Goldenen Schnitt; der Befund stützt nur die obige Aussage.

Ergebnisse Ebene 2: Schalenstruktur – widerrufen

Bemerkung K.5.6 (Widerruf der v3-Diskriminierung). Die in der Erstfassung berichtete Diskriminierung ($\mathrm{err}(Q_{\mathrm{FFGFT}}) < \mathrm{err}(1/\varphi)$, $\Delta = 0{,}145$) wird **widerrufen**. Der Detektor erkennt Schalen als streng wachsende Distanzfolge (Faktor $\geq 1{,}05$); für jedes Zielverhältnis $c < 1$ ist der minimal erreichbare Fehler $(1{,}05/c - 1)$: für $1/\varphi$ also $0{,}699$, für Q_{FFGFT} $0{,}573$. *Das größere von zwei sub-1-Verhältnissen gewinnt auf jedem Punktset* – die eigenen Kontrollen zeigten dies bereits (kubisch: $0{,}976$ vs. $1{,}135$; random: $1{,}194$ vs. $1{,}371$), wurden aber nicht als Alarmsignal gelesen. Der Befund war strukturell, nicht physikalisch (Audit P. Stoychev).

In v4 wirft der Detektor für Ziele ≤ 1 eine Ausnahme; getestet wird nur noch gegen Verhältnisse > 1. Referenzwert: $\mathrm{err}(\varphi{=}1{,}618)_{\mathrm{HLV}} = 0{,}257$; das beste konsekutive Schalenverhältnis der HLV-Punktwolke liegt nach Stoychevs Messung bei $\approx 1{,}15$ – weder φ, $1/\varphi$ noch Q_{FFGFT}. Für künftige Versionen ist die radiale Verteilungsfunktion $g(r)$ mit Peak-Positionsanalyse der robustere Weg.

Ergebnis Ebene 3: Numerische Verifikation

$$k^* = \frac{\log \varphi}{\xi} \approx 3609{,}1, \qquad r(3609) = 0{,}6179940013\ldots \approx \frac{1}{\varphi} \quad (|\text{Fehler}| = 4{,}0{\times}10^{-5},\ \text{relativ}\ 6{,}5{\times}10^{-5}). \tag{K.8}$$

Die Arithmetik ist korrekt; die Fehlerangabe wurde in v3 präzisiert (zuvor fälschlich $< 10^{-9}$). Zum *Status* der Aussage – Durchgangspunkt, nicht Fixpunkt; $k^*(c)$ für jedes Ziel existent – siehe Abschn. K.3: „ohne freie Parameter" ist keine Auszeichnung dieses Resultats.

K.6 Diskussion

Verhältnis zur φ^N-Trivialitätswarnung (Dok. 190 P35) – revidiert

Bemerkung K.6.1 (Widerruf der Abgrenzung). Die Erstfassung dieses Abschnitts führte drei Argumente an, warum die Trivialitätswarnung das k^*-Resultat *nicht* treffe („kein freier Exponent", „kein empirischer Anker", „keine externe Kalibrierung"). Diese Abgrenzung wird **widerrufen**: alle drei Argumente übersehen, dass der freie Exponent lediglich in k^* *umbenannt* und nach dem gewünschten Ziel *aufgelöst* wurde. $k^*(c)$ existiert für jedes $c \in (0, 1)$ mit identischen Eigenschaften (Tabelle in Abschn. K.3); die Auswahl des Ziels $1/\varphi$ ist die versteckte Wahl. P35 greift in vollem Umfang – das ist exakt der Fall, für den die Leitplanke geschrieben wurde, und ihre Anwendung auf

ein eigenes Resultat ist ihr erster ernsthafter korpusinterner Härtetest (bestanden: das Resultat wird herabgestuft).

Was bleibt: Die in Dok. 190 P37 dokumentierte Dreiteilung der φ-Rollen im Korpus – (1) mikroskopisch/ξ-Ebene, (2) makroskopisch/$1/\varphi$ als Durchgangspunkt der Rekursion, (3) Teilchenphysik/Q_{FFGFT} – bleibt als *Begriffstrennung* gültig und nützlich. Dok. 188 verwendet φ^{-1} als phänomenologischen Skalierungsfaktor zwischen fraktalen Ebenen; ob dieser Faktor strukturell aus der ξ-Rekursion folgt, ist nach der vorliegenden Revision wieder eine *offene Frage*: die Rekursion liefert ihn nur, wenn die Tiefe $k^* \approx 3609$ unabhängig begründet wird.

Einordnung in die Dokument-Reihe

Dok. 270 beschreibt die Reduktionskette $T^4 \to T^0$ als zwei qualitativ verschiedene Operationstypen. Das vorliegende Dokument ergänzt die *Skalenhierarchie*: die $q = 2/3$-Rekursion verbindet die mikroskopische ξ-Ebene mit der makroskopischen φ-Ebene durch kumulative geometrische Dämpfung – ohne qualitativen Operationstyp-Wechsel.

Dok. 271 stellt FFGFT und HLV strukturell gegenüber. Das vorliegende Dokument konkretisiert den dort angekündigten spektralen Vergleich durch das numerische Skript und identifiziert gap_CV als gemeinsamen diagnostischen Kanal.

Offene Punkte

1. Schalen-Diagnostik auf $g(r)$-Basis (Peak-Positionen, Verhältnisse > 1) – der v3-Detektor ist für sub-1-Ziele unbrauchbar (Abschn. K.5).
2. Pre-deklarierte Ensemble-Bandtests analog Krüger Run E (Metriken, Bänder und Seeds vor der Rechnung festgelegt) für den 4D-T^4-Graphen.
3. Größere N und mehr Seeds: die vorliegenden 3-Seed-Ensembles sind illustrativ, nicht statistisch abgesichert.
4. Eine unabhängige Fixierung von $k^* \approx 3609$ (Ebenenzählung der Konstruktion oder physikalische Observable) – ohne sie hat die Durchgangspunkt-Beobachtung keinen physikalischen Gehalt (Abschn. K.3). Derzeit nicht bekannt.
5. Kreuzvalidierung der v4-Implementierung gegen die von P. Stoychev angebotenen deduplizieren/geseedeten Varianten.

Epistemische Grenze: Determinismus und Resonanzdichte

Die offene Frage nach der unabhängigen Fixierung von k^* ist kein Zufall, sondern Ausdruck einer grundsätzlichen methodischen Grenze, die im Korpus an anderer Stelle bereits dokumentiert ist (Dok. 038, Markov-Determinismus).

Die Rekursion $r(k{+}1) = r(k)(1 - \xi)$ ist vollständig deterministisch: jeder Durchgangswert $c \in (0, 1)$ existiert bei einer exakt bestimmten Tiefe $k^*(c)$. Die Rekursion erzeugt jedoch keine ausgezeichneten diskreten Ebenen – sie ist kontinuierlich, und die Durchgangspunkte liegen so dicht beieinander, dass man ohne einen unabhängigen

Anker von außen keinen einzelnen hervorheben kann. Das Resonanzmuster ist zu dicht für eine eindeutige Identifikation aus dem Wert allein.

Dieser Sachverhalt ist strukturell identisch mit zwei anderen Fällen im Korpus:

- **Große Semiprimzahlen (Dok. 176):** Die Faktoren existieren eindeutig, aber die Suche ist praktisch nicht durchführbar, weil die Kandidaten zu dicht liegen.
- **Quantenmechanik (Dok. 038):** Das Substrat ist deterministisch; eine statistische Beschreibung wird nötig, wenn die Mikrozustände nicht mehr auflösbar sind – nicht weil die Physik stochastisch wäre, sondern weil die epistemische Auflösung fehlt.

Das Fazit für dieses Dokument: Die Nichtfixierbarkeit von k^* ist kein Fehler der Theorie, sondern eine ehrliche Grenze der Methodik. Die Theorie ist vollständig determiniert; die Frage, welcher Durchgangspunkt physikalisch ausgezeichnet ist, ist praktisch nicht beantwortbar ohne einen Anker von außen. Genau deshalb schützt Dok. 190 P35 vor dem Fehler, aus der Resonanzdichte einen Befund zu lesen der keiner ist. Der Status von Dok. 275 – Beobachtung, offen – ist die korrekte Konsequenz dieser Grenze.

K.7 Schlussfolgerung

1. Die ξ-Dämpfungsrekursion passiert $1/\varphi$ bei $k^* = \log(\varphi)/\xi \approx 3609$; die Arithmetik ist korrekt (Fehler $4{\cdot}10^{-5}$), aber $1/\varphi$ ist *Durchgangspunkt, nicht Fixpunkt*, und $k^*(c)$ existiert für jedes Ziel – die P35-Trivialitätswarnung greift; ohne unabhängige Fixierung von k^* hat die Beobachtung keinen physikalischen Gehalt.
2. Mit $q = 2/3$ ist $(2/3)^{3609}$ konvergent und intern konsistent, kein astronomischer Grenzwert – diese Skaleninterpretation bleibt bestehen.
3. **v4-Hauptergebnis ($N = 2000$, dimensions-gematchte Nulls):** Keine Separation. FFGFT T^4 (echtes 4D, gap_CV $= 1{,}329 \pm 0{,}025$) liegt im 4D-Null-Band $[0{,}690,\ 2{,}406]$; HLV (echtes Ensemble, $0{,}710 \pm 0{,}008$) liegt im 3D-Null-Band $[0{,}675,\ 0{,}978]$. Das verstärkt Krügers konservativen Run-E-Befund aus einer unabhängigen Pipeline.
4. Die v3-Befunde „T^4 außerhalb des Bandes“ und „Q_{FFGFT} diskriminiert gegen $1/\varphi$“ sind **widerrufen** (Duplikat-Artefakt bzw. Detektor-Bias); der Seed-Bug des HLV-Ensembles ist behoben. Alle drei Fehler gehen auf das Audit von P. Stoychev zurück und sind in Dok. 190 als K4 registriert.
5. Die drei Skalare ξ, $1/\varphi$, Q_{FFGFT} bleiben als Begriffstrennung auf verschiedenen physikalischen Ebenen nützlich (Dok. 190 P37); der *Herleitungsanspruch* für $1/\varphi$ aus der Rekursion ist auf den Status einer offenen Frage zurückgestuft (Dok. 190 P38).

Anschlüsse. Dok. 258 (Q_{FFGFT}, Koide-Leiter), Dok. 270 (Reduktionskette $T^4 \to T^0$), Dok. 271 (FFGFT-HLV-Strukturvergleich), Dok. 272 (HLV/Dot-Theory-Einordnung). Das Python-Skript `ffgft_hlv_gap_v4.py` (korrigierte Fassung; v2/v3 bleiben als dokumentierte Fehlerstände im Archiv) ist öffentlich zugänglich und reproduzierbar.

Dank. Plamen Stoychev (IPI) für das unabhängige Audit vom 11. Juni 2026, das alle drei Skriptfehler identifizierte und die Statusklärung des k^*-Resultats erzwang. Die Revision dieses Dokuments setzt sein Audit vollständig um.

[1] M. Krüger, *Operational Falsification Pathways for the HLV G-Lattice*, Zenodo (2026), https://doi.org/10.5281/zenodo.20615649.

[2] J. Pascher, *Dok. 258: Geometrische Leiter* $q = 2/3$, FFGFT-Korpus (2026).

[3] J. Pascher, *Dok. 270: Dimensionswechsel in der FFGFT*, FFGFT-Korpus (2026).

[4] J. Pascher, *Dok. 271: FFGFT gegenübergestellt mit HLV*, FFGFT-Korpus (2026).

[5] J. Pascher, *Dok. 190: Korrekturverzeichnis FFGFT/T0 (K1–K4, P1–P38)*, FFGFT-Korpus (2026).

[6] J. Pascher, *Dok. 009: Ursprung von* $\xi = 4/30000$, FFGFT-Korpus (2026).

[7] J. Pascher, *Dok. 188: Geometrische Grundlagen der FFGFT*, FFGFT-Korpus (2026).

Kapitel L

Dok. 276 — Homologie-Test der HLV-Vortex-Hypothese

Abstract

Marcel Krügers HLV-G-Lattice-Programm [1] formuliert eine endliche 6D→3D-cut-and-project-Konstruktion und prüft sie über eine Leiter pränumerierter Falsifikationstests (Runs A–K7 sowie das Zellgeometrie-Addendum D1–D3). Das D1–D3-Audit hat die ursprüngliche Behauptung exakter dodekaedrischer Voronoi-Zellen *zurückgenommen* und durch ein engeres Profil ersetzt: ein nicht-kristallines, gemischtflächiges, φ-verzerrtes Zell-Ensemble. Die daraus revidierte Vortex-Achse verlangt keine platonische Zelle mehr, sondern geschlossene Zyklen, Phasenkontinuität und holonomietragende Schleifen. Genau an dieser Stelle liefert die FFGFT-Seite einen *additiven* Beitrag: topologisches Winding ist eine Homotopie-Invariante; sie lebt in π_1 des Komplexes, nicht in der Form seiner Flächen. Wir stellen ein eigenständiges, reproduzierbares Prüfskript vor (Begleitdatei, nur `numpy`/`scipy`; optional `gudhi`), das diese Aussage operationalisiert: über eine kNN-Filtration wird die GF(2)-Homologie $b_1(\varepsilon)$ berechnet, die *ganze* normierte Betti-Kurvenform per Energie-Distanz-Permutationstest gegen Kontrollwolken verglichen, ein Deformations-Null-Test (Persistenz vs. Drift, mit optionalem Persistenz-Zyklen-Matching) durchgeführt und die Effektstärke über N skaliert. **Befund (ehrlich, konservativ):** Das *skalare* Gesamtpersistenz-Maß trennt HLV nicht sauber und ist k-sensitiv; die *Kurvenform* hingegen separiert HLV signifikant von allen Kontrollen ($p < 0{,}05$), scharf von kristallinen Gittern (FCC, cubic, BCC) und nur schwach vom generischen $\sqrt{2}$-Quasikristall. Die N-Skalierung zeigt: die Trennung von kristallin wächst/stabilisiert sich (strukturell), die von Zufall schrumpft. Der diskriminierende Faktor ist folglich *"quasiperiodische cut-and-project-Struktur"*, *nicht* der goldene Schnitt spezifisch. Eine separate, weniger zirkuläre Diagnostik (längste persistente H_1-Lebensdauer) zeigt zudem, dass cut-project-Wolken (HLV *und* $\sqrt{2}$-Quasikristall) einen markant länger lebenden 1-Zyklus tragen als Gitter und Zufall – dies wird als Beobachtung festgehalten, ausdrücklich *nicht* als "topologischer Schutz" überverkauft.

L.1 Einordnung: HLV, FFGFT und die Arbeitsteilung

Das HLV-Programm (Helix–Light–Vortex) von Krüger [1] testet ein endliches geometrisches Substrat als *Kandidatenobjekt*, nicht als Ontologie. Die methodische Stärke liegt in der pränumerierten Falsifikations-Governance [2]: positive, negative, partielle und unterbestimmte Ausgänge werden in einer Claim-State-Leiter (*candidate / restricted / underdetermined / rejected / validated candidate*) getrennt geführt; ein positiver Befund darf einen negativen Residual aus einem anderen Kanal nicht löschen.

Im D1–D3-Audit wurde die starke Aussage "HLV erzeugt exakte dodekaedrische Voronoi-Zellen" verworfen – der exakte 12-Flächen-Kanal wird von FCC/rhombisch und HCP-artigen Kontrollen dominiert. Übrig bleibt die schwächere, besser gestützte Aussage eines *frischsaatvalidierten Kandidaten*: ein nicht-kristallines, gemischtflächiges, φ-verzerrtes endliches Voronoi-Zell-Ensemble. Die daraus folgende Reformulierung der Vortex-Achse lautet sinngemäß: Vortex- und Randmoden werden von der Kanten-, Flächenrand-, Schleifen- und Defekt-Grenzflächen-Struktur eines gemischt-flächigen Komplexes getragen – nicht von einer exakten Zellform.

Beobachtung. Topologisches Winding verlangt keine platonische Zelle. Es verlangt geschlossene Graph-Zyklen, Phasenkontinuität und holonomietragende Schleifen. Diese Strukturen leben in π_1 des Komplexes und sind invariant gegenüber der Zellform.

Dies ist zugleich die FFGFT-Position: Auf dem kompakten T^4 sind die relevanten Invarianten Holonomieklassen von $\pi_1(T^4) = \mathbb{Z}^4$, bewusst metrik- und zellunabhängig (vgl. Dok. 270 [7], Dok. 271 [4]). Die Arbeitsteilung bleibt komplementär, nicht überlappend: HLV als Randmuster-Residual-Test, FFGFT als Skalengesetz-/effektives-L_ξ-Test (Dok. 275 [3]).

L.2 Die Prüf-Methode

Komplex und Randoperator

Statt Voronoi-Flächen zu zählen, bilden wir den Cliquenkomplex des symmetrischen kNN-Graphen (dasselbe Graph-Objekt wie in Krügers Runs, k einstellbar) und lesen den Zyklen-/Holonomie-Sektor über die GF(2)-Homologie

$$H_1 = \ker \partial_1 / \operatorname{im} \partial_2, \qquad b_1 = \dim \ker \partial_1 - \operatorname{rank} \partial_2 = (E - \operatorname{rank} \partial_1) - \operatorname{rank} \partial_2.$$

Dabei ist $\operatorname{rank} \partial_1 = N - (\#\text{Komponenten})$ (per Union-Find), und $\operatorname{rank} \partial_2$ wird über GF(2) berechnet. b_1 ist die zell-form-unabhängige Winding-/Holonomie-Kapazität des Komplexes.

Sprach-Präzisierung. H_1 ist form-unabhängig *innerhalb eines festen Komplexes*; es hängt jedoch weiterhin von k und der Metrik ab. Daher (i) der k-Sweep und (ii) der Vergleich der *ganzen* Kurvenform statt einer einzelnen "tessellationsfreien" Zahl.

Filtration und Kurvenform

Ein dichter kNN-Komplex ist nahezu kontrahierbar; die Holonomie-Struktur wird erst über eine Radius-Filtration sichtbar. Wir werten $b_1(\varepsilon)$ auf einem Gitter $\varepsilon/d_0 \in \{1{,}1;\ 1{,}35;\ 1{,}6;\ 1{,}85;\ 2{,}1;\ 2{,}35\}$ aus (d_0 = Median-Nächste-Nachbar-Distanz) und vergleichen die *normierte* Kurve $\hat{b}_1 = b_1 / \sum b_1$ – die Form, nicht die Fläche. Das skalare Gesamtpersistenz-Integral $\int b_1 \, \mathrm{d}\varepsilon$ wird nur als grobe Einzahl-Zusammenfassung geführt.

Statistik und Kontrollen

Jede Wolke wird zu einem Ensemble über Seeds promoviert (dieselbe "HLV-als-Ensemble"-Disziplin wie in Krügers Run E). Skalare werden per Permutationstest, Kurvenformen per Energie-Distanz-Permutationstest verglichen. Kontrollen: FCC, einfach-kubisch, BCC (kristallin); jittered-cubic, uniform-random, Poisson-Disc (ungeordnet, gegen Dichte-Artefakte); generischer $\sqrt{2}$-cut-and-project (Quasikristall ohne goldenes Verhältnis).

Deformations-Null-Test

Wir morphen HLV $\to$ Kontrolle stetig, $x(t) = (1-t)\, x_{\text{HLV}} + t\, x_{\text{Kontrolle}}$, und verfolgen die Gesamtpersistenz. Bei vorhandenem `gudhi` wird zusätzlich die *längste* H_1-Lebensdauer (Rips-Persistenz) verfolgt – deutlich weniger zirkulär, da ein einzelner langer Balken nicht zwangsläufig auf 0 fällt. Caveat: Ein Ziel mit $b_1 \approx 0$ (z. B. FCC) erzwingt den Endwert 0; ein sauberes Zyklen-Matching ist nur über persistente Homologie möglich.

N-Skalierung und vorab registrierter Konsistenzcheck

Die Effektstärke (L1-Distanz der mittleren Kurvenformen, HLV gegen das gepoolte kristalline Profil) wird über N skaliert: stabilisiert sie sich $\Rightarrow$ strukturell, verschwindet sie $\Rightarrow$ Finite-Size-Artefakt. Der `--falsify`-Schalter implementiert einen *vorab registrierten Konsistenzcheck* (festes N, k, p; nur kristalline Kontrollen) – ausdrücklich *kein* Falsifikationstest im Popper'schen Sinn: ein negatives Ergebnis schwächt die Behauptung, falsifiziert sie aber nicht logisch.

L.3 Ergebnisse

Alle Zahlen stammen aus dem realen Lauf des Begleitskripts ($N = 240$, $k = 14$, Seed-Basis 20260613, 5 Seeds).

Skalar (Check 1/1b). Das Gesamtpersistenz-Maß ist instabil und k-sensitiv: die einfach-kubische Kontrolle dominiert (~ 130 gegen HLV ~ 50), und über $k \in \{10, 14, 18\}$ liegt HLV in $0/3$ Fällen über dem Kontrollband. Claim-State: *underdetermined*. Dies ist genau der Grund, das skalare Maß zu verwerfen und die Form zu vergleichen.

Kurvenform (Check 1c). Der Energie-Distanz-Test trennt HLV von *allen* Kontrollen ($p < 0{,}05$):

Kontrolle	Energie-Distanz	p
jittered cubic	2,81	0,0015
uniform random	2,79	0,0060
Poisson-Disc	2,71	0,0030
FCC (rhombendodeka.)	1,93	0,0075
cubic	1,67	0,0040
BCC	1,11	0,0060
generic QC ($\sqrt{2}$)	0,15	0,0085

Die Trennung ist scharf gegen kristalline Gitter und sehr schwach (kleinste Distanz $0{,}15$) gegen den generischen $\sqrt{2}$-Quasikristall.

Längste H_1-Lebensdauer (mit `gudhi`, max-Kante $= 2\,d_0$).

Wolke	roh	normiert ($/d_0$)
HLV (golden cut-project)	2,07	0,87
generic QC ($\sqrt{2}$)	2,01	0,85
cubic	0,41	0,41
uniform random	0,25	0,43
BCC	0,13	0,15
FCC	0,00	0,00

N-Skalierung. Die mittlere-Form-L1-Distanz HLV-gegen-kristallin wächst/stabilisiert mit N ($\approx 0{,}56 \to 0{,}67 \to 1{,}61 \to 1{,}51$ für $N = 200/400/600/800$) – strukturell, kein reines Finite-Size-Artefakt; HLV-gegen-Zufall schrumpft entsprechend.

Deformations- und Konsistenzcheck. Im Deformations-Null-Test fallen sowohl Gesamtpersistenz als auch längste H_1-Lebensdauer; bei diesem N ergibt sich *kein* robustes Plateau (Status: underdetermined – ehrlich). Der vorab registrierte Konsistenzcheck (festes N, k, $p < 0{,}01$; nur FCC/cubic/BCC) ergibt *PASS*: HLV trennt sich von jeder kristallinen Kontrolle.

L.4 Diskussion und Claim-State

Die verteidigbare Aussage ist präzise und konservativ:

1. HLV trennt sich *strukturell* von kristallinen Gittern (FCC/cubic/BCC) über die $b_1(\varepsilon)$-Kurvenform; der Effekt wächst mit N (Claim-State: *candidate*, form-basiert k-robust).
2. HLV ist auf *jeder* Metrik nahezu ununterscheidbar vom generischen $\sqrt{2}$-cut-and-project-Quasikristall (Form-Energiedistanz $0{,}15$; längster Zyklus roh $2{,}07$ vs. $2{,}01$). Das diskriminierende Merkmal ist daher *"quasiperiodische cut-and-project-Struktur"*, *nicht* der goldene Schnitt spezifisch.




Abbildung L.1: Vier-Felder-Übersicht des Begleitskripts (v3). A: normierte Betti-Kurven $b_1(\varepsilon)$ – Form, nicht Betrag. B: Energie-Distanz der Kurvenform HLV gegen Kontrollen. C: Deformations-Null-Test (Gesamtpersistenz und, mit `gudhi`, längste H_1-Lebensdauer). D: N-Skalierung der Effektstärke (stabil = strukturell). Endliche Diagnostik; keine Aussage über physikalische Raumzeit-Mikrostruktur.

3. cut-project-Strukturen tragen einen markant länger lebenden H_1-Zyklus (normiert $0{,}85$–$0{,}87\,d_0$, roh ~ 2) als Gitter und Zufall (normiert $\leq 0{,}43\,d_0$). Dies ist eine reale Beobachtung der weniger zirkulären Persistenz-Diagnostik; sie wird *nicht* als "topologischer Schutz" interpretiert – das wäre derselbe Overclaim, nur mit umgekehrtem Vorzeichen.

Methodisch bestätigt das Skript die Claim-State-Disziplin des HLV-Programms: das naheliegende skalare Maß scheitert, und der Fortschritt liegt im formbasierten, ensemble- und permutationsgestützten Vergleich. Stärkere Aussagen verlangen größeres N, mehr Seeds, exakte Repository-Adjazenz und unabhängige Reimplementierung.

Reproduzierbarkeit. Das Begleitskript (`Dok276_Skripte / ffgft_hlv_homology_check_v3.py`) hängt allein von `numpy`/`scipy` ab; `gudhi` und `matplotlib` sind optional (echte Persistenzdiagramme bzw. die Figur). Bewusst keine harte Abhängigkeit – jede:r auf der IPI-Liste kann das Resultat ohne Build-Schritt nachrechnen.

Dank. Marcel Krüger (HLV-G-Lattice, Falsifikations-Governance) für den offenen Austausch und die pränumerierte Test-Architektur, auf die dieses Dokument aufsetzt.

[1] M. Krüger, *Operational Falsification Pathways for the HLV G-Lattice: Weighted Spectral Forks, Fresh-Seed Cell-Shape Validation, Native 6D Operators, and Process-Tensor Bridge Tests*, Zenodo (2026), https://doi.org/10.5281/zenodo.20668125.

[2] M. Krüger, *Operational Falsification Governance: Residual Preservation, Claim-State Ledgers, and Revision-Admissible Scientific Frameworks*, Zenodo (2026), https://doi.org/10.5281/zenodo.20629842.

[3] J. Pascher, *Dok. 275: Von ξ zu φ – Rekursive Skalenhierarchie und spektrale Lückenstruktur*, FFGFT-Korpus (2026).

[4] J. Pascher, *Dok. 271: FFGFT gegenübergestellt mit HLV*, FFGFT-Korpus (2026).

[5] J. Pascher, *Dok. 270: Dimensionswechsel in der FFGFT ($T^4 \to T^0$)*, FFGFT-Korpus (2026).

[6] H. Edelsbrunner und J. Harer, *Computational Topology: An Introduction*, American Mathematical Society (2010).

[7] A. Gretton et al., *A kernel two-sample test*, Journal of Machine Learning Research **13**, 723–773 (2012).

Kapitel M

Dok. 277 — Wellenausbreitung und Energie

Abstract

Eine propagierende Welle trägt *immer* eine wohldefinierte, positive Energie: elektromagnetisch über den Poynting-Fluss, quantisiert über $E = \hbar\omega$ pro Quant, mechanisch über den Strahlungsdruck. Dieses Dokument trennt sauber zwei Ebenen, die in Populardarstellungen ständig vermischt werden: die *lokale* Energiebilanz (immer erfüllt, $\partial_t u + \nabla\cdot\mathbf{S} = 0$ bzw. $\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$) und die *globale* Bilanz, die in gekrümmter, zeitlich nicht-stationärer Raumzeit nicht eindeutig definierbar ist. Der verbreitete Fehlschluss „Energie ist nicht erhalten“ (gemeint: *vernichtet*) verwechselt eine Buchhaltungsebene mit physikalischer Zerstörung. Im FRW-Modell folgt die Nicht-Definierbarkeit der Gesamtenergie aus dem Fehlen eines zeitartigen Killing-Feldes (Noether); sie ist keine Verletzung der lokalen Physik. In der FFGFT-Lesart sind $\hbar$ und c SI-Umrechnungsfaktoren, der physikalische Gehalt liegt in den dimensionslosen Verhältnissen ($\tilde{T}\cdot m = 1$); die gemessene Absolutenergie ist beobachterabhängig, die Verhältnisstruktur invariant. Auf einem *statischen* kompakten 4-Torus T^4 existiert die Zeit-Translations-Symmetrie wieder; nach Noether ist die Gesamtenergie dann wohldefiniert und erhalten. Rotverschiebung wird damit zur reinen Skalen- und Beobachter-Umbuchung statt zur metrischen Raumdehnung, und der Hauptanlass für dunkle Energie (beschleunigte Expansion) sowie ein Teil der Motivation für dunkle Materie (CMB-Peak-Fit) entfällt – die einschlägige Struktur folgt in FFGFT aus der T^4-Geometrie und aus ξ (Dok. 267/268). Diese kosmologische Schlussfolgerung wird im Status der Entartungs-These (Dok. 267) geführt: auf den *Daten* sind beide Modelle gleichwertig, auf der theoretischen *Struktur* ist FFGFT die sparsamere Lesart (kein Dunkelsektor, globale Energieerhaltung). R_H ist dabei eine gemeinsame Skalen-Referenz, kein freier Parameter – kein empirischer K. o. von ΛCDM, sondern ein Ökonomie-Argument.

M.1 Einordnung: Warum diese Trennung nötig ist

Die Aussage „eine Welle ohne Energie wäre keine Welle“ ist trivial richtig und doch der Ausgangspunkt eines hartnäckigen Missverständnisses. In der kosmologischen Diskussion wird aus der korrekten technischen Feststellung „im expandierenden Universum gibt es keine global eindeutige Gesamtenergie“ regelmäßig die falsche Konsequenz „Energie wird vernichtet“ gezogen. Beides liegt auf verschiedenen Ebenen.

Definition M.1.1 (Zwei Bilanzebenen)**. Lokale Bilanz** Die Kontinuitätsgleichung des Energie-Impuls-Tensors, $\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$, bzw. im Flachraum $\partial_t u + \nabla\cdot \mathbf{S} = 0$. Sie ist eine Aussage über *Fluss*: Energie verschwindet nirgends, sie strömt. Immer erfüllt.

Globale Bilanz Die Existenz einer eindeutigen, erhaltenen *Gesamtenergie* des Systems. Nach Noether an die Zeit-Translations-Symmetrie gebunden; in nichtstationären gekrümmten Raumzeiten nicht eindeutig definierbar.

Warnung M.1.2 (Der Kategorienfehler). „Global nicht eindeutig definierbar“ ist eine Aussage über die *Buchhaltungsebene*. „Physikalisch zerstört“ wäre eine Verletzung der lokalen Physik – und die tritt nie auf. Die Gleichsetzung beider ist der eigentliche Fehler.

Dieses Dokument arbeitet die gleichnamige Kurznotiz aus, belegt die einzelnen Schritte und ordnet sie in den Korpus ein: in die Einheiten-Frage (Dok. 166, 182, 230), in die Reduktionsstruktur (Dok. 270) und in die kosmologische Entartung (Dok. 267/268).

M.2 Lokale Energiebilanz – immer erfüllt

Elektromagnetisches Feld

Für das elektromagnetische Feld ist die Energiedichte und der Poynting-Vektor [2, 3]

$$u = \frac{\varepsilon_0}{2}\,|\mathbf{E}|^2 + \frac{1}{2\mu_0}\,|\mathbf{B}|^2, \qquad \mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0}\,\mathbf{E}\times\mathbf{B}, \tag{M.1}$$

mit $\mathbf{S}$ als Energiestromdichte. Die Energie-Kontinuitätsgleichung lautet

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla\cdot\mathbf{S} = -\,\mathbf{J}\cdot\mathbf{E}, \qquad \text{im Vakuum} \quad \frac{\partial u}{\partial t} + \nabla\cdot\mathbf{S} = 0. \tag{M.2}$$

Sie ist eine *lokale* Erhaltungsaussage: jede Abnahme der Energiedichte an einem Punkt ist exakt durch ausströmenden Fluss bilanziert. Energie verschwindet nirgends.

Quantisierung und Strahlungsdruck

Quantisiert trägt jedes Quant

$$E = \hbar\omega, \qquad p = \hbar k = \frac{E}{c}, \qquad P_{\text{rad}} = \frac{S}{c}, \tag{M.3}$$

mit Impuls p und Strahlungsdruck P_{rad}. Solange die Welle läuft, fließt Energie – mit messbarer Flussdichte, messbarem Druck, messbarem Photoeffekt.

Erkenntnis M.2.1 (Operationaler Gehalt)**.** Die lokale Bilanz ist nicht verhandelbar, weil sie an drei unabhängige Messgrößen gekoppelt ist: Flussdichte S, Strahlungsdruck $P_{\text{rad}} = S/c$ und der Photoeffekt-Schwellenwert über $E = \hbar\omega$. Eine „laufende Welle ohne Energie“ würde allen dreien widersprechen.

M.3 Rotverschiebung: beobachterabhängig, kein Verlust ins Nichts

Bei kosmologischer Rotverschiebung skaliert die gemessene Wellenlänge; ein gegebener Beobachter misst $E = hc/\lambda$ entsprechend kleiner. Das heißt *nicht*, dass Energie verschwindet, sondern dass die Frage „wie viel Energie“ frame- bzw. beobachterabhängig ist.

Proposition M.3.1 (Frame-Abhängigkeit der Photonenergie)**.** *Die Photonenergie ist die Zeitkomponente eines Vierimpulses, $E = p^\mu u_\mu$, also das Skalarprodukt mit der Vierergeschwindigkeit u_μ des Beobachters. Sie ist daher keine invariante Größe, sondern beobachterabhängig. Ein zur Emissionszeit mitbewegter Beobachter misst die volle Energie; ein relativ dazu anders bewegter misst einen anderen Wert. Was* invariant *bleibt, sind Verhältnisse (Frequenz-, Energie-, Massenverhältnisse).*

Energie ist hier also eine relative, beobachterabhängige Größe – keine zerstörte. Diese Aussage ist modellunabhängig (sie gilt in ΛCDM ebenso wie in FFGFT); was sich zwischen den Modellen unterscheidet, ist die *Deutung* des z (Abschnitt M.7).

M.4 Der globale Trugschluss – Noether präzise

Satz M.4.1 (Noether: Energieerhaltung aus Zeit-Translations-Symmetrie)**.** *Eine global erhaltene Gesamtenergie existiert genau dann, wenn die Raumzeit ein zeitartiges Killing-Feld ξ^μ besitzt, d. h. eine Zeit-Translations-Symmetrie $\nabla_{(\mu}\xi_{\nu)} = 0$ [1, 6, 5].*

Ein expandierendes FRW-Universum besitzt kein zeitartiges Killing-Feld, also keine globale Zeit-Translations-Symmetrie, also keine eindeutig definierte globale Gesamtenergie. Dies ist eine Aussage über die *Nicht-Existenz einer eindeutigen globalen Bilanz*, nicht über physikalische Vernichtung. Lokal gilt stets

$$\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0. \tag{M.4}$$

Bemerkung M.4.2 (Was hier oft schiefgeht)*.* Der häufige grobe Fehler lautet „Energie ist einfach nicht erhalten“ – gemeint als vernichtet. Korrekt ist: in FRW ist die *globale* Buchhaltung nicht eindeutig, weil das Symmetrie-Argument aus Satz M.4.1 nicht greift. Gleichung (M.4) bleibt davon unberührt.

M.5 Absorption: Energie wird umgesetzt, nicht vernichtet

Bei Absorption gibt die Welle ihre Energie ab und wechselt die Form: Photoeffekt, Erwärmung, oberhalb der Schwelle Paarerzeugung. Die Kinematik verlangt einen

zweiten Partner: ein einzelnes freies Photon kann wegen gleichzeitiger Energie- und Impulserhaltung kein Paar erzeugen.

$$\gamma\gamma \to e^+e^- \quad \text{(Breit–Wheeler [4])}, \qquad \gamma + N \to e^+e^- + N \quad (E \geq 2m_e c^2). \tag{M.5}$$

Auch hier bleibt die lokale Bilanz (M.2)/(M.4) jederzeit erfüllt: die Energie wechselt die Form, nicht die Existenz.

M.6 FFGFT-Sicht: Energie als teils einheiten-buchhalterische Größe

In FFGFT sind $\hbar$ und c SI-Umrechnungsfaktoren, keine ontologischen Primitiva; der physikalische Gehalt liegt in den dimensionslosen Verhältnissen. Die fundamentale Relation

$$\tilde{T} \cdot m = 1 \qquad \text{(natürliche Einheiten } \hbar = c = 1) \tag{M.6}$$

macht das explizit: $E \leftrightarrow 1/\tilde{T}$ und $m \leftrightarrow 1/\tilde{T}$.

Erkenntnis M.6.1 (Verhältnisstruktur ist invariant)**.** „Wie viel Energie“ hängt an der Einheiten- und Beobachterkonvention; die Verhältnisstruktur (Massen-, Frequenz-, Energieverhältnisse) ist invariant. Das ist exakt konsonant mit Proposition M.3.1: der Absolutwert der gemessenen Energie ist beobachterabhängig, die invarianten Verhältnisse bleiben.

In dieser Lesart ist „Licht → Materie“ das Binden freier Phase (Licht) in Modeninhalt (Masse): die Energie wechselt die Buchungsebene, nicht die Existenz. Die repräsentationelle Seite dieser Aussage – dass derselbe 4D-Inhalt verlustfrei zwischen T^4-Geometrie und Hilbertraum-Sprache übersetzbar ist – ist in Dok. 230 ausgearbeitet; die Reduktionskette $T^4 \to T^0$ mit der Dualitäts-Dekompaktifizierung der Massedimension über $\tilde{T} \cdot m = 1$ in Dok. 270.

Bemerkung M.6.2 (Einheiten-Buchhaltung statt Ontologie). Die Bezeichnung „teils einheiten-buchhalterisch“ ist präzise zu lesen: Der *Fluss* und der *Druck* (Abschnitt 3) sind operationale, einheitenunabhängige Tatsachen. Was an der Konvention hängt, ist allein die Zuordnung eines Absolutwerts „Energie“ zu einem gegebenen Modeninhalt – die Wahl der Skala, in der gezählt wird.

M.7 Kosmologische Konsequenz: statischer T^4, keine dunklen Anteile

FFGFT lebt auf einem kompakten, *statischen* 4-Torus T^4. Es gibt keine metrische Expansion des Raumes – und damit entfällt der Anlass für dunkle Energie (Λ) wie ein Teil der Motivation für dunkle Materie. Auf die obige Energiediskussion wirkt sich das unmittelbar und vereinfachend aus.

Proposition M.7.1 (Globale Energieerhaltung wird wiederhergestellt)**.** *Ein statischer T^4-Hintergrund besitzt eine zeitartige Zeit-Translations-Symmetrie. Nach Satz M.4.1 ist*

die Gesamtenergie dann wohldefiniert und erhalten. Der Trugschluss aus Satz M.4.1-Kontext („keine eindeutige globale Energie") ist eine Folge der Expansionsannahme*; ohne sie muss man gar nicht erst auf „global nicht definierbar" ausweichen.*

1. Rotverschiebung = Buchhaltungswechsel, nicht Raumdehnung. Ohne Expansion ist die Rotverschiebung keine Dehnung der Wellenlänge durch wachsenden Raum. Sie ist die in $\tilde{T} \cdot m = 1$ (M.6) angelegte Skalen- und Beobachter-Umbuchung: die Energie- und Zeitskala der fernen Quelle wird relativ zum lokalen Standard anders referenziert. Das Photon trägt seine Energie durchgehend (Abschnitte 3); z ist die Umrechnung zwischen Quellen- und Beobachter-Buchhaltung – exakt die beobachterabhängige, relative Energie aus Proposition M.3.1, nur ohne den FRW-Apparat.

2. Keine dunklen Anteile nötig. ΛCDM braucht dunkle Energie, um eine beschleunigte Expansion zu treiben, und dunkle Materie u. a. zum Fit der CMB-Peakstruktur. Fällt die Expansion weg, entfällt die Hauptaufgabe der dunklen Energie. Die einschlägige Struktur – etwa die Lage der CMB-Peaks – folgt in FFGFT aus der T^4-Geometrie und aus ξ statt aus einem Expansion-plus-Dunkel-Fit: die Peak-Verhältnisse werden in Dok. 268 aus den Entartungen $g(|\vec{n}|^2)$ der T^4-Moden hergeleitet, die Skalenleiter (Casimir/CMB/H_0) in Dok. 166.

Tabelle M.1: Theoretische Kosten der beiden Lesarten *derselben* Daten.

	ΛCDM zahlt	FFGFT
Beschleunigte Expansion	dunkle Energie Λ nötig	entfällt (kein expandierender Raum)
CMB-Peak-Fit	u. a. dunkle Materie	aus $T^4 + \xi$ (Dok. 268)
Globale Energie	nicht erhalten (FRW, kein Killing-Feld)	erhalten (Noether, statischer T^4)
„Energie verschwindet"	lebt hier als Trugschluss	löst sich auf

Warnung M.7.2 (Status: auf den Daten entartet, in den Kosten nicht symmetrisch). Auf der *Daten*-Ebene sind die Modelle entartet (Dok. 267): SNe Ia, BAO und CMB-Temperatur unterscheiden nicht zwischen metrischer Expansion (ΛCDM) und fraktaler Zeitentfaltung (FFGFT) – dieselben Daten, zwei Lesarten. Auf der *Struktur*-Ebene sind die Kosten jedoch *nicht* symmetrisch (Tab. M.1): ΛCDM trägt dunkle Energie und dunkle Materie als freie Komponenten und verzichtet auf globale Energieerhaltung; FFGFT zahlt keines davon. Bei empirischer Gleichwertigkeit entscheidet die theoretische Ökonomie – und dort ist FFGFT die sparsamere Lesart. Das ist ein Sparsamkeits-Argument (Occam), kein empirischer K. o. von ΛCDM.

Bemerkung M.7.3 (R_H ist Skalen-Referenz, kein Eingabewert). R_H *muss* nicht aus ξ folgen – es ist eine Skalen-Referenz wie jede systemspezifische Obergrenze $R_{\text{Torus}}(m) = \hbar/mc$ (Dok. 182). Die Beziehung Plancklänge$\leftrightarrow R_H$ (Exponent $41/4$, $R_H/L_0 = 6{,}49 \times 10^{64}$) leitet *kein* Rahmen aus ersten Prinzipien her: warum das Universum $\sim 10^{60}$ Plancklängen misst, sagt keine Theorie. ΛCDM legt die Relation über den gemessenen H_0 fest – im Sinne der Entartung selbst zirkulär (Dok. 267); FFGFT übernimmt den etablierten Wert zur Vergleichbarkeit und notiert ihn in ξ-Schreibweise (Dok. 190 P35/P36). Das ist ein *gemeinsamer empirischer Bezugspunkt* beider Modelle, kein freier Parameter und keine FFGFT-spezifische Lücke. In FFGFT sind zudem $\hbar, c$ SI-Umrechnung

und G abgeleitet ($\xi \to \{m_e, \ldots\} \to G \to \ell_P$); ein „gemessener" dimensionaler Anker im Sinne der Standardphysik existiert hier gar nicht. Die einzige Asymmetrie bleibt der Dunkelsektor, den allein ΛCDM trägt.

M.8 Methodische Einordnung

Die in Definition M.1.1 eingeführte Trennung „lokal vs. global" ist strukturell dasselbe Muster wie an anderen Stellen des Korpus: eine deterministische, lokal vollständig bestimmte Struktur, deren globale bzw. absolute Verbuchung von der gewählten Auflösungs- bzw. Konventionsebene abhängt (vgl. Markov-Determinismus, Dok. 038). Der Fehler „Energie wird zerstört" entsteht, wenn man eine fehlende globale Buchhaltung als physikalische Aussage liest – genau die Art von Fehlschluss, gegen die das Korrekturverzeichnis (Dok. 190) als Leitplanke schreibt.

Erkenntnis M.8.1 (Was dieses Dokument zeigt)**.** (i) Eine laufende Welle trägt immer positive Energie; (ii) lokal ist Energie immer erhalten; (iii) Rotverschiebung ist beobachterabhängig, kein Verlust; (iv) „global nicht-eindeutig" $\neq$ zerstört; (v) im statischen T^4 ist die Gesamtenergie sogar global erhalten und z eine reine Umbuchung. Auf den *Daten* sind ΛCDM und FFGFT entartet; auf der *Struktur* ist FFGFT die sparsamere Lesart (Tab. M.1). Die kosmische Skala R_H ist dabei ein gemeinsamer empirischer Bezugspunkt, kein freier Parameter – die Asymmetrie liegt allein im Dunkelsektor.

M.9 Zusammenfassung

- Laufende Welle $\Rightarrow$ immer positive Energie (Poynting (M.1), $E = \hbar\omega$ (M.3)).
- Lokal ist Energie immer erhalten ($\partial_t u + \nabla \cdot \mathbf{S} = 0$ (M.2); $\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$ (M.4)).
- Rotverschiebung ist beobachterabhängig (Proposition M.3.1) – kein Verlust ins Nichts.
- Keine eindeutige globale Energie (keine Zeit-Symmetrie, Satz M.4.1) $\neq$ Energie zerstört.
- FFGFT: Energie ist teils Einheiten-Buchhaltung; physikalisch sind die Verhältnisse ($\tilde{T} \cdot m = 1$ (M.6); Dok. 230/270).
- Statischer T^4-Kosmos (keine Expansion): globale Energieerhaltung gilt (Proposition M.7.1), Rotverschiebung ist reine Umbuchung, dunkle Anteile sind nicht nötig. Auf den Daten entartet (Dok. 267/268/166), in den Kosten sparsamer (Tab. M.1); R_H ist gemeinsame Skalen-Referenz, kein freier Parameter – die Asymmetrie ist allein der Dunkelsektor.

Anschlüsse. Dok. 270 (Projektionskette $T^4 \to T^0$, Dualitäts-Dekompaktifizierung über $\tilde{T} \cdot m = 1$), Dok. 230 (verlustfreie Übersetzung $T^4 \leftrightarrow$ Hilbertraum), Dok. 267 (kosmologische Entartung ΛCDM vs. FFGFT), Dok. 268 (CMB-Peaks aus T^4), Dok. 166 (Casimir/CMB/H_0 als ξ-Potenzleiter), Dok. 182 (Maximalskala R_H, kalibriert), Dok. 190 (Korrekturverzeichnis, P35/P36).

[1] E. Noether, *Invariante Variationsprobleme*, Nachr. d. König. Gesellsch. d. Wiss. zu Göttingen, Math-phys. Klasse (1918) 235–257.

[2] J. H. Poynting, *On the Transfer of Energy in the Electromagnetic Field*, Phil. Trans. R. Soc. Lond. **175** (1884) 343–361.

[3] J. D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, 3rd ed., Wiley (1998), Kap. 6 (Poynting-Theorem) und Kap. 7.

[4] G. Breit, J. A. Wheeler, *Collision of Two Light Quanta*, Phys. Rev. **46** (1934) 1087–1091.

[5] C. W. Misner, K. S. Thorne, J. A. Wheeler, *Gravitation*, Freeman (1973), Kap. 25 (Killing-Felder, Erhaltungsgrößen).

[6] R. M. Wald, *General Relativity*, University of Chicago Press (1984), Abschn. C.3 (Killing-Felder und Erhaltungssätze).

[7] J. Pascher, *Dok. 270: Projektionskette $T^4 \to T^0$ – zwei Typen von Dimensionsreduktion*, FFGFT-Korpus (2026).

[8] J. Pascher, *Dok. 230: Übersetzbarkeit FFGFT ↔ Hilbertraum-Quantenmechanik*, FFGFT-Korpus (2026).

[9] J. Pascher, *Dok. 267: Kosmologische Entartung – ΛCDM und FFGFT als zwei Lesarten derselben Beobachtungen*, FFGFT-Korpus (2026).

[10] J. Pascher, *Dok. 268: CMB-Akustikpeaks aus der T^4-Gitterstruktur*, FFGFT-Korpus (2026).

[11] J. Pascher, *Dok. 166: Die Casimir-Skala als kosmisches Bindeglied – Casimir-Effekt, CMB und H_0 in einer ξ-Potenzleiter*, FFGFT-Korpus (2026).

[12] J. Pascher, *Dok. 182: Maximalskala des Universums – R_H als kalibrierte kosmische Skala in ξ-Schreibweise*, FFGFT-Korpus (2026).

[13] J. Pascher, *Dok. 190: Korrekturverzeichnis FFGFT/T0 (K1–K4, P1–P38), P35/P36 Kalibrierungs-Leitplanke*, FFGFT-Korpus (2026).

[14] J. Pascher, *Dok. 038: Markov-Determinismus – deterministisches Substrat, statistische Beschreibung bei fehlender Auflösung*, FFGFT-Korpus (2026).

[15] J. Pascher, *Dok. 009: Ursprung von $\xi = 4/30000$*, FFGFT-Korpus (2026).

Kapitel N

Dok. 279 — Casimir, CMB und H_0 — die gemeinsame ξ-Skala

Worum es geht

Drei Phänomene, die zunächst nichts miteinander zu tun haben: der *Casimir-Effekt* (Vakuumkraft zwischen Platten, $\sim \mu$m), die *kosmische Hintergrundstrahlung* (CMB, $T_{\mathrm{CMB}} = 2{,}725\,\mathrm{K}$) und die *Hubble-Konstante* H_0 (kosmische Expansionsrate). In FFGFT hängen alle drei an *einer* Vakuum-Längenskala $L_\xi \approx 100\,\mu$m und am selben Exponenten $41/4$ des Geometrieparameters $\xi = 4/30000$. Diese Note legt die Verbindung Schritt für Schritt offen (zusammengeführt in Dok. 166 aus Dok. 091, 165, 025/061; Statusbewertung nach Dok. 190).

Durchgehend: $\xi = \dfrac{4}{30000} = 1{,}3333 \times 10^{-4}$.

N.1 Vorbemerkung: Warum „Hubble-Konstante“ irreführend ist

Bevor wir H_0 verwenden, eine begriffliche Klarstellung – denn die übliche Bezeichnung *Hubble-Konstante* ist aus FFGFT-Sicht doppelt irreführend.

Erstens: keine Konstante. Schon in der Standardkosmologie ist H_0 nicht konstant, sondern der *heutige Wert* des zeitabhängigen Hubble-Parameters $H(t) = \dot{a}/a$. „Konstant“ meint dort nur räumlich homogen, nicht zeitlich fest. Der Name ist also bereits dort eine eingebürgerte Ungenauigkeit.

Zweitens (und schärfer): in FFGFT gibt es gar keine Expansionsrate. Das statische ξ-Universum hat keinen Skalenfaktor $a(t)$ und kein zeitveränderliches $H(t)$; die Rotverschiebung ist fraktale Wegverlängerung, kein Expansionseffekt (Dok. 190, R14a/R15). Es gibt also keine „Rate“, deren heutigen Wert man als H_0 nehmen könnte. Die Expansions-Lesart ist eine ΛCDM-Pipeline-Deutung (R18), keine FFGFT-Aussage.

Was physikalisch übrig bleibt, ist eine Länge. Die robuste, modellneutrale Größe ist die *Hubble-Länge*

$$R_H = \frac{c}{H_0}, \tag{N.1}$$

und $H_0 = c/R_H$ ist nur diese Länge, über den SI-Umrechnungsfaktor c als inverse Zeit ausgedrückt. R_H ist eine *Referenzlänge* – die obere Skala des kosmologischen Torus-Sektors –, völlig analog zur Planck-Länge ℓ_P oder zu den systemspezifischen Schranken $R = \hbar/mc$. Sie ist *nicht* die Größe des Universums und *nicht* der beobachtbare Horizont (dieser $\approx 3\,R_H$ in ΛCDM); messbar ist nur eine untere Schranke (Dok. 190, R36).

Begriffsregelung

In dieser Note ist die kosmische Skala primär als *Referenzlänge* R_H gedacht, nicht als „Konstante" H_0. Wo H_0 erscheint, ist es als $H_0 = c/R_H$ zu lesen – eine SI-Umschreibung der Referenzlänge, nicht eine fundamentale Naturkonstante. Das ist konsistent mit H_0 als emergenter, dekompaktifizierter Größe (R16) und mit dem Status von R_H als gemeinsamem empirischem Bezugspunkt (R39). Genau deshalb arbeitet die folgende Herleitung durchgängig mit *Längen* (L_ξ, R_H) und führt H_0 nur als deren Umrechnung.

N.2 Ausgangspunkt: drei Relationen aus drei Dokumenten

Die drei Bausteine

1. **Casimir/Vakuum (Dok. 091):** Die CMB-Energiedichte als T0-Vakuumdichte,
$$\rho_{\text{CMB}} = \frac{\xi\,\hbar c}{L_\xi^4}. \tag{N.2}$$
2. **H_0-Verhältnis (Dok. 165):**
$$\frac{\hbar H_0}{m_e c^2} = \frac{\pi}{2}\,\xi^{10}. \tag{N.3}$$
3. **CMB-Temperatur (Dok. 025/061):** $T_{\text{CMB}} = 2{,}72548\,\text{K}$, eingebunden über das Stefan-Boltzmann-Gesetz (Schritt 1).

Relation (N.2) und (N.3) wurden unabhängig entwickelt. Die Frage: Sind sie zwei Aspekte derselben ξ-Struktur?

N.3 Schritt 1: Casimir ↔ CMB über die Skala L_ξ

1a – Die beiden Energiedichten vergleichen

Die Standard-Casimir-Energiedichte zwischen zwei Platten im Abstand d ist

$$\rho_{\text{Casimir}}(d) = \frac{\pi^2\,\hbar c}{720\,d^4}. \tag{N.4}$$

Die Form $\pi^2\hbar c/(240\,d^4)$ ist der Casimir-*Druck*, nicht die Energiedichte; bei $d = L_\xi$ beträgt die Energiedichte $4{,}29 \times 10^{-12}$ J/m^3. Bei genau dem Abstand $d = L_\xi$ verhält sie sich zur Vakuumdichte (N.2) wie

$$\boxed{\frac{\rho_{\text{Casimir}}(L_\xi)}{\rho_{\text{CMB}}} = \frac{\pi^2\hbar c/(720\,L_\xi^4)}{\xi\hbar c/L_\xi^4} = \frac{\pi^2}{720\,\xi} \approx 102{,}8} \tag{N.5}$$

Bemerkenswert: setzt man (N.2) in (N.5) ein, kürzt sich ξ heraus und man erhält *exakt* die Standard-Casimir-Formel zurück. Die T0-Schreibweise ist also mit der Lehrbuch-Casimirformel konsistent. Das Verhältnis (N.5) ist damit eine Identität, kein Messbeleg: L_ξ wird selbst aus der gemessenen CMB-Energiedichte und ξ bestimmt (Schritt 1b). Bei L_ξ fallen beide Dichten nicht zusammen; Gleichheit läge bei einem größeren Plattenabstand. Die Verbindung ist eine Skalenaussage, kein Beleg.

1b – L_ξ aus der CMB-Temperatur

Die CMB-Dichte ist thermisch (Stefan-Boltzmann):

$$\rho_{\text{CMB}} = \frac{\pi^2}{15}\,\frac{(k_B T_{\text{CMB}})^4}{(\hbar c)^3}. \tag{N.6}$$

Gleichsetzen von (N.2) und (N.6) und Auflösen nach L_ξ:

$$\frac{\xi\hbar c}{L_\xi^4} = \frac{\pi^2}{15}\,\frac{(k_B T_{\text{CMB}})^4}{(\hbar c)^3} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{L_\xi = \left[\frac{15\,\xi}{\pi^2}\right]^{1/4}\frac{\hbar c}{k_B T_{\text{CMB}}}} \tag{N.7}$$

Casimir-Exponent $1/4$

Numerisch: $L_\xi = 100{,}24\,\mu$m (0,11 % von der direkt aus ρ_{CMB} bestimmten Skala). Entscheidend für das Folgende: aus (N.7) steckt ξ in L_ξ *mit der Potenz* $1/4$,

$$L_\xi \;\propto\; \xi^{1/4}.$$

N.4 Schritt 2: H_0 als ξ-Potenz

Relation (N.3) nach H_0/c aufgelöst (mit der reduzierten Compton-Wellenlänge $\bar{\lambda}_e = \hbar/m_e c$):

$$\frac{H_0}{c} = \frac{\pi}{2}\,\xi^{10}\,\frac{m_e c^2}{\hbar c} = \frac{\pi}{2}\,\frac{\xi^{10}}{\bar{\lambda}_e}. \tag{N.8}$$

H_0-Exponent 10

Eingesetzt ergibt $H_0 \approx 66{,}8\,\text{km/s/Mpc}$ – innerhalb $0{,}9\,\%$ des Planck-Werts $67{,}4\,\text{km/s/Mpc}$; der Exponent 10 ist dabei gesetzt, nicht vorwärts hergeleitet (siehe die Einordnung unten). Hier steckt ξ mit der Potenz 10:

$$H_0 \propto \xi^{10}.$$

N.5 Schritt 3: Multiplikation – die Brückenformel

Jetzt das Produkt der beiden Skalen L_ξ (N.7) und H_0/c (N.8). Die Potenzen von ξ addieren sich, $\hbar c$ kürzt sich:

$$\begin{aligned} L_\xi \cdot \frac{H_0}{c} &= \left[\frac{15\xi}{\pi^2}\right]^{1/4} \frac{\hbar c}{k_B T_{\text{CMB}}} \cdot \frac{\pi}{2}\frac{m_e c^2\,\xi^{10}}{\hbar c} \\ &= \frac{\pi}{2}\left[\frac{15}{\pi^2}\right]^{1/4} \frac{m_e c^2}{k_B T_{\text{CMB}}} \cdot \xi^{1/4}\,\xi^{10} \\ &= \frac{\pi}{2}\left[\frac{15}{\pi^2}\right]^{1/4} \frac{m_e c^2}{k_B T_{\text{CMB}}} \cdot \xi^{41/4}. \end{aligned} \tag{N.9}$$

Verbindungsformel Casimir ↔ H_0

$$L_\xi \cdot \frac{H_0}{c} = \underbrace{\frac{\pi}{2}\left(\frac{15}{\pi^2}\right)^{1/4}}_{K_{\text{geo}}=1{,}7441} \cdot \underbrace{\frac{m_e c^2}{k_B T_{\text{CMB}}}}_{=2{,}176\times10^{9}} \cdot \xi^{41/4}. \tag{N.10}$$

Numerische Prüfung: $L_\xi \cdot H_0/c = 7{,}241 \times 10^{-31}$ – direkt gerechnet und über (N.10) algebraisch identisch (bis $10^{-14}\,\%$). Die Herleitung ist *exakt* – keine Näherung, keine freien Parameter *zwischen* den Bausteinen.

N.6 Der Exponent $41/4$ und seine Zerlegung

Der Exponent ist die Summe der beiden Einzelexponenten aus den Schritten 1 und 2:

$$\frac{41}{4} = \underbrace{10}_{\substack{H_0\text{-Exponent}\\(\text{N.3})}} + \underbrace{\frac{1}{4}}_{\substack{\text{Casimir-Exponent}\\(\text{N.7})}} \tag{N.11}$$

Derselbe Exponent $41/4$ erscheint unabhängig in Dok. 026 als $E_H = E_0\,\xi^{41/4}$ (Hubble-Energieskala). Die Zerlegung $41/4 = 10 + 1/4$ ist also nicht zufällig konstruiert: der Anteil 10 trägt die Kopplung Elektronmasse → Hubble-Skala, der Anteil $1/4$ die Casimir-Skalierung der Vakuumenergie.

N.7 Wo steckt der SI-Umrechnungsfaktor?

Eine berechtigte Rückfrage: Wir bewegen uns hier auf der *dekompaktifizierten* Stufe der Formulierung – H_0 existiert überhaupt erst nach der Dekompaktifizierung (Dok. 190, R16: $H_0 = E_H/\hbar$ enthält das erst dann reale $\hbar$), und L_ξ ist eine *physikalische* Länge ($\approx 100\,\mu$m), gebaut aus $\hbar$, c, k_B. Auf dieser Stufe *muss* ein SI-Umrechnungsfaktor auftauchen. Er tut es auch – er sitzt nur an zwei Stellen versteckt, und in der Exponentenschreibweise an einer dritten.

Stelle 1: der Faktor kürzt sich (legitim)

Beide Skalen sind mit demselben $\hbar c$ gebaut:

$$L_\xi \propto \frac{\hbar c}{k_B T_{\mathrm{CMB}}}, \qquad \frac{H_0}{c} = \frac{\pi}{2}\,\xi^{10}\,\frac{m_e c^2}{\hbar c}. \tag{N.12}$$

Im Produkt fällt $\hbar c$ heraus – denn $L_\xi \cdot H_0/c$ ist im Kern ein *Längenverhältnis* ($L_\xi/\bar{\lambda}_e$ mit der reduzierten Compton-Wellenlänge $\bar{\lambda}_e = \hbar/m_e c$), und das Verhältnis zweier Längen ist einheitenfrei. Das ist kein Trick: dieselbe SI-Umrechnung $\hbar c$ baut *beide* Längen, also muss sie sich beim Verhältnis herausheben.

Stelle 2: der Faktor bleibt übrig (der eigentliche Anker)

Was nach dem Kürzen dasteht, ist *nicht* rein geometrisch:

$$\boxed{\frac{m_e c^2}{k_B T_{\mathrm{CMB}}} = 2{,}176 \times 10^9} \tag{N.13}$$

Hier steckt c^2 (Masse → Energie) und k_B (Kelvin → Energie) drin – und es ist ein *Verhältnis zweier gemessener Größen*: Elektron-Ruheenergie zu CMB-Temperatur. *Das* ist der SI-/empirische Umrechnungsfaktor. Die Brückenformel (N.10) ist damit Geometrie-*Form* ($K_{\mathrm{geo}}\,\xi^{41/4}$) **mal** SI-Anker ($m_e c^2/k_B T_{\mathrm{CMB}}$) – *keine* reine Geometrie-Identität.

Stelle 3: im Exponenten – $41/4$ gegen $63/4$

Am saubersten zeigt sich der Faktor im Exponenten selbst. Das $41/4$ ist an die Elektron-/CMB-Energieskala E_0 referenziert, *nicht* an die Planck-Skala. Planck-referenziert (Dok. 190, R35) ist der Exponent $63/4$, und

$$\boxed{\frac{63}{4} = \frac{41}{4} + \frac{11}{2}} \tag{N.14}$$

Die $11/2$ *ist* genau der SI-Skalen-Umrechnungsfaktor $\ell_P \leftrightarrow E_0$ (Plancklänge gegen Elektron-/CMB-Skala). Anders gesagt: schreibt man $\xi^{41/4}$ hin und nennt es „rein geometrisch", dann hat man ℓ_P stillschweigend in den Exponenten absorbiert – exakt die Leitplanke R35 („der SI-Umrechnungsfaktor ℓ_P darf nicht in den Exponenten absorbiert werden"). Welche Referenzskala man explizit macht, ist eine *Wahl*; der Faktor verschwindet dabei nie, er wechselt nur den Ort:

Referenzskala	Exponent	SI-Faktor explizit als
E_0 (Elektron/CMB)	$41/4$	Verhältnis $m_e c^2/k_B T_{\mathrm{CMB}}$
ℓ_P (Planck)	$63/4 = 41/4 + 11/2$	Zusatzexponent $11/2$

Warum wir hier zwingend dekompaktifiziert sind

Das ist keine Stilfrage: H_0 *existiert* in der kompakten T^4-Form gar nicht – es enthält das erst bei der Dekompaktifizierung reale $\hbar$ (R16) –, und L_ξ ist eine konkrete μm-Länge, die ohne $\hbar, c, k_B$ nicht formulierbar ist. Die SI-Faktoren sind hier also nicht optional, sondern *konstitutiv*: sie sind das, was die beteiligten Größen überhaupt erst zu physikalischen Größen macht. Auf der kompakten Stufe gibt es weder H_0 noch diese Brücke – die Frage nach dem SI-Faktor stellt sich dort gar nicht.

Fazit der Konsistenzprüfung

Die Brückenformel ist *schlüssig* – aber als *dekompaktifizierte, SI-verankerte* Relation, nicht als kompaktifizierte T^4-Identität. Der SI-Umrechnungsfaktor taucht genau wie erwartet auf: teils gekürzt ($\hbar c$, legitim als Längenverhältnis), teils als übrigbleibender empirischer Anker ($m_e c^2/k_B T_{\mathrm{CMB}}$), teils – in der Exponentenschreibweise – als die $11/2$ zwischen E_0- und Planck-Referenz (N.14). Das deckt sich vollständig mit Dok. 190: R34 (SI-Umrechnungen für die c-/Zeit-Potenz unverzichtbar, $c = \hbar = 1$ vernichtet die Struktur), R16 (H_0 emergent/dekompaktifiziert) und R35 (kein Absorbieren von ℓ_P in den Exponenten).

N.8 Umkehrung: H_0 direkt aus der Casimir-Skala

Da L_ξ über (N.7) aus ρ_{CMB} (also aus T_{CMB}) folgt, lässt sich (N.10) nach H_0 auflösen:

$$\boxed{H_0 = \frac{\pi}{2}\left[\frac{15}{\pi^2}\right]^{1/4} \frac{c}{L_\xi}\,\xi^{41/4}} \tag{N.15}$$

Das ist der experimentelle Hebel (Dok. 166, §5): eine *Casimir-Präzisionsmessung* der Skala L_ξ fixiert über (N.15) einen Wert für H_0 – eine H_0-Bestimmung im Labor statt am Himmel. Voraussetzung ist, dass L_ξ eine eigene physikalische Casimir-Signatur hat; das ist offen, denn hier wird L_ξ aus T_{CMB} bestimmt.

N.9 Vollständige Zahlenkette

Größe	Ausdruck	Wert
ξ	$4/30000$	$1{,}3333 \times 10^{-4}$
T_{CMB}	Planck 2018	$2{,}72548\,\mathrm{K}$
L_ξ	$[15\xi/\pi^2]^{1/4}\,\hbar c/(k_B T_{\mathrm{CMB}})$	$100{,}24\,\mu\mathrm{m}$
ρ_{CMB}	$\xi\hbar c/L_\xi^4$	$4{,}170 \times 10^{-14}\,\mathrm{J/m^3}$
$\rho_{\mathrm{Casimir}}/\rho_{\mathrm{CMB}}$	$\pi^2/(720\,\xi)$	$\approx 102{,}8$
K_{geo}	$(\pi/2)(15/\pi^2)^{1/4}$	$1{,}7441$
$m_e c^2/(k_B T_{\mathrm{CMB}})$	–	$2{,}176 \times 10^{9}$
$\xi^{41/4}$	$41/4 = 10{,}25$	$1{,}91 \times 10^{-40}$
$\hbar H_0/(m_e c^2)$	$(\pi/2)\,\xi^{10}$	$2{,}789 \times 10^{-39}$
$L_\xi \cdot H_0/c$	$K_{\mathrm{geo}}\,(m_e c^2/k_B T_{\mathrm{CMB}})\,\xi^{41/4}$	$7{,}241 \times 10^{-31}$
H_0	(N.15)	$66{,}82\,\mathrm{km/s/Mpc}$

Gegenprobe: $H_0 = 66{,}82\,\mathrm{km/s/Mpc} = 2{,}166 \times 10^{-18}\,\mathrm{s^{-1}}$ ergibt $\hbar H_0/(m_e c^2) = 2{,}79 \times 10^{-39}$.

N.10 Ehrliche Einordnung des Status (Dok. 190)

Die Kette oben ist algebraisch sauber, aber ihr *epistemischer* Status muss klar bleiben (Korrekturverzeichnis Dok. 190, Einträge R20, R32, R33, R35, R36, R39):

Was hergeleitet ist – und was nicht

- **Form vorwärts:** Dass die Verbindung ein *dimensionsloses ξ-Verhältnis* ist (Casimir-Skala × Hubble-Skala = ξ-Potenz), ist strukturell vorwärts. Die *Verkettung* der Bausteine (N.9) ist exakt.
- **Exponent nicht vorwärts (R20):** Der Wert $41/4$ – bzw. schon der Teilexponent 10 aus (N.3) – ist *nicht* aus der T^4-Geometrie vorwärts hergeleitet. Die schöne Zerlegung $41/4 = 10 + 1/4$ (N.11) ist *strukturell suggestiv*, kein Beweis.
- **ξ^N-Leitplanke (R35):** "$X = \xi^N$" zählt nur als Inhalt, wenn N vorwärts hergeleitet ist; sonst lässt sich jede Magnitude als ξ-Potenz schreiben. Der SI-Faktor ℓ_P darf nicht still in den Exponenten absorbiert werden.
- **H_0 ist emergent, nicht fundamental (R16/R32):** H_0 enthält das erst bei der Dekompaktifizierung reale $\hbar$ und existiert in der kompakten T^4-Form nicht.
- **Gemeinsamer Bezugspunkt (R39):** Die Plancklänge$\leftrightarrow R_H$-Relation folgt aus *keinem* Rahmen aus ersten Prinzipien; ΛCDM fixiert sie über den gemessenen H_0. FFGFT übernimmt den etablierten Wert zur Vergleichbarkeit – das ist *kein* asymmetrischer Nachteil, sondern ein gemeinsamer empirischer Bezugspunkt beider Modelle.

Fazit der Einordnung

Die *Verkettung* ist exakt – eine Konsistenz-Relation unter SI-verankerten Größen (L_ξ, R_H, m_e, T_{CMB}), zusammen mit dem möglichen experimentellen Hebel Casimir $\to H_0$ (N.15), der eine eigene Casimir-Signatur von L_ξ voraussetzt (offen). ℓ_P kommt in der Formel *nicht* vor; über die E_0-Referenz ist es *hochrechenbar* – als Konsistenzprüfung, nicht als Ableitung: das Bein $E_0 \leftrightarrow \ell_P$ ($11/2$) fällt mit dem Exponenten von $\alpha = \xi E_0^2$ zusammen (s. Ausblick), dessen Übereinstimmung mit dem Messwert eine Eigenschaft des Ankers E_0 ist, keine unabhängige Vorhersage; das kosmische Bein ($41/4$) bleibt offen (R20). Eine Erst-Prinzipien-Vorhersage von H_0 ist es damit *nicht*.

N.11 Ausblick: das $11/2$, das Λ-Feinabstimmungsproblem und die H_0-Spannung

Das $11/2$ ist ein Ausgangspunkt, kein Beweis. Der Exponent $11/2$ im Split $63/4 = 41/4 + 11/2$ ist nicht beliebig: er fällt mit dem Feinstruktur-Exponenten zusammen,

$$\alpha = \xi \cdot E_0^2 = K \cdot \xi^{11/2}, \qquad E_0 = \sqrt{m_e m_\mu} \propto \xi^{9/4} \quad \text{(Dok. 011, 070, 202, 210)}, \tag{N.16}$$

und es ist *dasselbe* E_0, auf das der kosmische Exponent referenziert ist ($E_H = E_0\,\xi^{41/4}$, Dok. 026). Die Übereinstimmung von $\alpha = \xi E_0^2$ mit dem Messwert ist eine Eigenschaft des Ankers E_0, der den Anschluss an das SI leistet, keine unabhängige Vorhersage. Numerisch sitzt E_0 genau dort, wo der Split es verlangt: $E_0/E_{\mathrm{Planck}} = \xi^{5{,}48}$ gegen $11/2 = 5{,}5$ – Treffer auf $\sim 0{,}5\,\%$ (genau die Rundung $15{,}72$ vs. $15{,}75$ aus R35).

Aber: der α-Exponent ist an die MeV-/Lepton-Basis referenziert (die $9/4$-Skalierung), der Split-$11/2$ an die Planck-Skala (der Offset) – verschiedene Bezugsbasen, gleiche Zahl. Ob das *strukturell identisch* oder ein Zahlentreffer im dichten ξ^N-Feld ist, ist offen; die Leitplanke (R35, Dok. 271) verlangt für „Inhalt" einen isolierten, vorhergesagten, präzisen Wert. Bewiesen wäre die Identität erst durch $E_0 = E_{\mathrm{Planck}} \cdot \xi^{11/2}$ vorwärts. *Festgehalten als Vermutung, nicht als Beleg.*

Die umgekehrte Frage: warum sitzt ΛCDMs H_0 dort? Bestünde ein echter, fixierter Zusammenhang $\ell_P \leftrightarrow R_H$, so wäre das eine scharfe Aussage über H_0. ΛCDM *wählt* H_0 aber nicht aus Theorie – es *misst* ihn (und umstritten: die H_0-Spannung ~67 vs. ~73); ℓ_P kommt aus den gemessenen $G, \hbar, c$. Das Verhältnis ist kein harmloses:

$$\frac{\ell_P}{R_H} \approx 1{,}2 \times 10^{-61}, \qquad \left(\frac{\ell_P}{R_H}\right)^2 \approx 10^{-122} \sim \frac{\rho_\Lambda}{\rho_{\mathrm{Planck}}}. \tag{N.17}$$

Das $(\ell_P/R_H)^2 \sim 10^{-122}$ *ist* das Kosmologische-Konstanten-Problem – die größte unerklärte Feinabstimmung der Physik. ΛCDM „wählt" den Wert, indem es Λ an die beobachtete Beschleunigung anpasst, ohne theoretischen Grund. FFGFT eliminiert Λ (R17/R39) und erbt die Feinabstimmung *nicht* – verlagert dasselbe „Warum diese Skala" aber in den Exponenten $41/4$.

Der Test. Würde das $41/4$ vorwärts herleitbar (zusammen mit dem $11/2$-Bein), so sagte FFGFT ℓ_P/R_H – und damit H_0 – *voraus* statt es zu importieren; es könnte sogar

die H_0-Spannung entscheiden (welche Seite, 67 oder 73). Genau das verwandelte die Vermutung in einen Beleg (Isolation/Vorhersage/Präzision, Dok. 271). Bis dahin gilt: suggestive Umschreibung eines gemessenen Verhältnisses, offen.

Kapitel O

Dok. 280 — Rotverschiebung in FFGFT: statisch, achromatisch

Worum es geht

In FFGFT entsteht die kosmische Rotverschiebung *nicht* durch Raumexpansion, sondern durch einen statischen geometrischen Mechanismus im ξ-Feld. Diese Note hält drei Punkte fest und korrigiert einen vierten:

1. **Statisch:** $1+z = e^{\xi x}$, also $z \approx \xi x$ – Energieverlust bzw. fraktale Wegverlängerung entlang des Lichtwegs, kein Skalenfaktor $a(t)$ (Dok. 064, 025/026).
2. **Achromatisch:** Die fraktale Wegverlängerung ist rein geometrisch und streckt *alle* Wellenlängen mit demselben Faktor – sie ist *nicht* wellenlängenabhängig. Finite-Elemente-Simulationen der Geometrie bestätigen das. (**Korrektur** der früheren chromatischen Darstellung; Dok. 190 K6.)
3. **Die $z \to$Zeit-Achse ist ein ΛCDM-Konstrukt:** Weil FFGFT kein $a(t)$ hat, ist jede Auftragung einer Größe „über kosmische Zeit“ (z. B. die Lilly–Madau-Sternentstehungsrate) nur eine *Übertragung der Beobachtung auf das expandierende Bild*.
4. **Die Daten passen – über die kosmologische Entartung** (Dok. 267): FFGFT reproduziert dieselben Observablen wie ΛCDM, ohne falsche Vorhersage, aber auch ohne einzelnen Killer-Test.

Durchgehend: $\xi = \frac{4}{30000} = 1{,}3333 \times 10^{-4}$, $H_0^{\mathrm{TO}} \approx 66{,}2$ km/s/Mpc.

O.1 Die statische Rotverschiebung

Im statischen Universum verliert ein Photon Energie entlang des Lichtwegs gemäß

$$\frac{dE}{dx} = -\xi E \qquad \Longrightarrow \qquad E(x) = E_0\, e^{-\xi x}.$$

Die lineare Abhängigkeit von E ist entscheidend: sie macht den *führenden* Effekt frequenzunabhängig. Die Rotverschiebung ist

$$z = \frac{E_0 - E(x)}{E(x)} = e^{\xi x} - 1, \qquad \boxed{1 + z = e^{\xi x}}, \qquad z \approx \xi x \text{ (für kleine } z\text{)}.$$

Der Vergleich mit dem Hubble-Gesetz $z = H_0 d/c$ liefert (natürliche Einheiten, $c = 1$) die Identifikation

$$H_0^{\mathrm{T0}} = E_H/\hbar, \qquad E_H = E_0\,\xi^{41/4} = 1{,}41 \times 10^{-33}\ \mathrm{eV} \ \Rightarrow\ H_0^{\mathrm{T0}} \approx 66{,}2\ \mathrm{km/s/Mpc}$$

(Dok. 064/026; der Exponent $41/4$ ist nicht aus ersten Prinzipien hergeleitet, Dok. 190 P20). Die *Lichtlaufzeit* zu einem Objekt mit Rotverschiebung z ist damit

$$\boxed{\tau(z) = \frac{\ln(1+z)}{H_0^{\mathrm{T0}}}}.$$

Es gibt *kein* endliches kosmisches Alter und *keinen* Urknall: τ wächst mit $\ln(1+z)$ unbeschränkt.

O.2 Achromatisch, nicht wellenlängenabhängig (Korrektur)

Frühere Dokumente (Dok. 004, 025, 030, 039, 041, 053, 061, 063, 068, 081) führten eine *wellenlängenabhängige* Rotverschiebung an (z. B. $z(\lambda_0) \propto \lambda_0$, „UV stärker als Radio“). Diese Darstellung ist **überholt**.

Der reife FFGFT-Mechanismus ist die *fraktale Wegverlängerung*: der Pfad, den das Signal durch die rekursive Zeitgeometrie zurücklegt, wird um einen Faktor gestreckt, der allein von der Distanz/Geometrie abhängt – *nicht* von der Wellenlänge des Photons. Daher gilt $1 + z = e^{\xi x}$ für *alle* Wellenlängen mit demselben Faktor: die Rotverschiebung ist **achromatisch**.

Beleg: Finite-Elemente-Simulationen der fraktalen Wegverlängerung ergeben *keine* wellenlängenabhängige Rotverschiebung. Das ist auch physikalisch zwingend: ein *energie-/wellenlängenspezifischer* Verlustterm wäre chromatisch, aber ein *geometrischer* Streckfaktor wirkt auf Wellenlänge *und* Pulsdauer im selben Verhältnis (vgl. Gravitations- und Standard-Kosmologie-Rotverschiebung, ebenfalls achromatisch).

Konsequenz für die Beobachtung: Die kosmologische Rotverschiebung ist bis hohe Präzision achromatisch – FFGFT trifft das damit *richtig*. Der frühere „wellenlängenabhängige Diskriminator“ entfällt; er wandert von der Spalte „Test“ in die Spalte „passt“. Die Korrektur ist in Dok. 190 als **K6** verzeichnet; die betroffenen Dokumente sind dort gelistet.

O.3 Die $z \to$Zeit-Abbildung ist modellabhängig

Modellunabhängig ist allein die *Rotverschiebung* z (und die bei diesem z gemessene Größe). Die Umrechnung $z \to$Zeit hingegen ist Modellsache:

- **ΛCDM** rechnet über $a(t)$ (Friedmann-Integral). Die Lookback-Zeit läuft flach gegen $t_0 \approx 13{,}8$ Gyr – die „Urknall-Decke“. Diese Decke existiert *nur, weil Expansion angenommen wird*.
- **FFGFT** rechnet über $\tau = \ln(1+z)/H_0^{\mathrm{T0}}$. Es gibt keine Decke; τ wächst unbeschränkt.




Abbildung O.1: Rotverschiebung → Zeit ist modellabhängig. ΛCDM-Lookback (rot, Expansion $+\Lambda$) saturiert bei der Urknall-Decke $13{,}8$ Gyr; FFGFT (blau, statisch, $1+z = e^{\xi x}$) liefert eine unbeschränkte Lichtlaufzeit $\ln(1+z)/H_0$ ohne Urknall. Bei „cosmic noon“ ($z \approx 1{,}9$): ΛCDM $10{,}3$ vs. FFGFT $15{,}5$ Gyr. Rekombination: ΛCDM $z_* \approx 1100$, FFGFT $z_* \approx 875$ (Dok. 267).

Folgerung: Eine Auftragung „Sternentstehungsrate über kosmische Zeit 0–14 Gyr“ (Lilly–Madau) ist intrinsisch ein ΛCDM-Akt. In FFGFT existiert keine kosmische Zeitachse – nur Distanz bzw. Lichtlaufzeit. Die Datenpunkte (z, SFRD) bleiben gültig; ihre Platzierung auf einer 0–14-Gyr-Achse *ist* bereits die Übertragung auf das expandierende Bild.

O.4 Wie passen die Messdaten? – die kosmologische Entartung

Dok. 267 zeigt die zentrale Tatsache: FFGFT und ΛCDM sind auf den Standard-Tests *beobachtungs-entartet*. Was eine bestimmte $z(d)$-Relation erzeugt, erzeugt dieselben Flüsse, Winkel und Zeitdehnungen.

- **Supernova-Zeitdilatation:** Ferne SN Ia laufen gedehnt ab, $b \approx 1$ (DES: $b = 1{,}003 \pm 0{,}011$). Die fraktale Wegverlängerung dehnt Wellenlänge *und* Pulsdauer im selben Verhältnis $\Rightarrow b = 1$. Der Test schließt nur *nicht-dilatierendes* tired-light ($b = 0$) aus – FFGFT sagt $b = 1$ voraus und ist nicht betroffen.

- **BAO-Winkelskalen:** Die nicht-lineare zeitliche Rekursion krümmt $z(d)$ wie eine beschleunigte Expansion ⇒ dieselben Winkel. Vorbehalt P20: BAO nutzt D_M/r_s mit r_s aus ΛCDM – Modell gegen Modell.
- **CMB-Peaks:** Beide reproduzieren die Peakstruktur; ξ spielt für die Peaks keine Rolle; beide gleich zirkulär (Dok. 267/268).
- **Lilly–Madau / SFRD:** Das z-Raum-Signal (Anstieg bis $z \sim 2$, Abfall) ist modellunabhängig und in FFGFT astrophysikalische Galaxienentwicklung über die Lichtlaufzeit. Die SFRD-*Werte* ($M_\odot$/yr/Mpc^3) sind jedoch doppelt ΛCDM-abgeleitet – über die Leuchtkraftdistanz $d_L(z)$ und das mitbewegte Volumen. Ein fairer FFGFT-Test rechnet sie mit $d(z)$ und Volumen aus $1 + z = e^{\xi x}$ neu.

Ehrliche Lage: Die Entartung schneidet in beide Richtungen. Die Daten *passen* zu FFGFT (keine falsche Vorhersage, achromatisch wie beobachtet), aber sie *erzwingen* es nicht. Der Fall für FFGFT ruht damit auf *Sparsamkeit* (kein Λ, keine dunkle Energie, keine H_0-Spannung – Dok. 064) und auf der Ableitung der Konstanten aus ξ – nicht auf einem einzelnen Diskriminator.

O.5 Kein Urknall – die Entwicklungsrichtung kehrt um

FFGFT kennt keinen Urknall. Der scheinbare Hochrotverschiebungs-„Anfang" – der Abfall der SFRD und das vermeintliche Einsetzen der ersten Galaxien bei $z \sim 14$ – ist in FFGFT *kein* zeitlicher Beginn, sondern ein *geometrischer Umkehrpunkt* (Dok. 263).

Die beobachtete Größe ist die kumulierte fraktale Wegverlängerung $z_{\text{obs}} = (L_{\text{eff}} - d)/d$ (Dok. 026/263). Für kleine z ist sie linear, $z(d) = \kappa d$ mit $\kappa = E_H/(\hbar c)$ – die Steigung, die ΛCDM „H_0" tauft. Nahe der kosmologischen Maximalskala R_H besitzt die $z(d)$-Kurve jedoch einen *Extremwert*: FFGFT *berechnet* dort $z_* \approx 875$ (Dok. 267, Referenzwert; Vorbehalt P20) – dieselbe Fläche, die ΛCDM als Rekombination/Entkopplung bei $z \approx 1089$ liest. Der ΛCDM-Wert 1089 ist also nur die Expansionsdeutung; der FFGFT-eigene Wert ist 875, *nicht* 1100. *Jenseits* von R_H gilt $z \to \infty$ – ohne Teilchenhorizont und ohne Urknall.

Was ist z_* aus FFGFT-Sicht? Es ist *keine* Rekombinationszeit. FFGFT hat keine heiße Frühphase, kein Photon-Baryon-Plasma, keine Entkopplung. Die CMB ist der *stationäre Quanten-Grundzustand* des Φ-Feldes (Dok. 025), und ihre Akustikpeaks sind diskrete T^4-*Gitterresonanzen* (analog zu Emissionslinien eines Atoms oder Phonon-Dispersionen im Kristall) – *nicht* eingefrorene Schallwellen eines Urplasmas. Der Zahlenwert selbst ist ein *geometrisches Verhältnis* (Dok. 267):

$$z_* \approx \left(\frac{\lambda_e}{L_0}\right)^{1/\ln(1/\xi)} \approx 875,$$

mit der reduzierten Compton-Wellenlänge λ_e und der Sub-Planck-Länge $L_0 = \xi \ell_P$ – also eine *Resonanz- bzw. Strukturskala* des T^4-Gitters, kein thermisches Ereignis in der Zeit. (Vorbehalt P20: der Exponent $1/\ln(1/\xi)$ ist noch nicht aus der T^4-Geometrie hergeleitet; z_* ist derzeit ein Referenzwert in der richtigen Größenordnung, kein abgeleitetes FFGFT-Resultat.)

Damit **kehrt sich die scheinbare Entwicklungsrichtung an der Maximalskala um**: Was ΛCDM als „früher = schnellere Entwicklung bis zu einem Anfang" liest,

ist in FFGFT die Annäherung an den geometrischen Extremwert nahe R_H. Der Hochrotverschiebungs-Abfall der SFRD ist daher die Annäherung an diesen Umkehrpunkt, *kein* Beginn. H_0 ist dabei emergent, kein fundamentaler Parameter – in der kompakten T^4-Form gibt es überhaupt kein H_0 (Dok. 263).

Symmetrisch offen bleibt allein die Vorwärts-Herleitung des Exponenten $41/4$ aus ξ (Dok. 190 P20) – sie fehlt jedem Rahmen, nicht nur FFGFT.

Status

Statische Rotverschiebung $1 + z = e^{\xi x}$: *Kern* (Dok. 064/026). Achromatie: *korrigiert/etabliert* (FE-Simulation; Dok. 190 K6). $z \to$Zeit als ΛCDM-Übertragung und kosmologische Entartung: *etabliert* (Dok. 267). Status durchgehend nach Dok. 190.

Kapitel P

Dok. 281 — Der Goldene Schnitt in FFGFT

Abstract

Der Goldene Schnitt $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$ tritt im FFGFT-Korpus in mehreren, klar zu unterscheidenden Rollen auf – und unter zwei verschiedenen Schriftzeichen, die teilweise mit anderen Groessen (Skalarfeld, Winkel, Potential, Wellenfunktion) kollidieren. Dieses Dokument aendert die frueheren Texte *nicht*; es legt die kanonische Notations- und Lesart fest, ordnet jedes substantielle Vorkommen einer Rolle zu und trennt sauber, was aus φ *hergeleitet*, was nur *behauptet* und was schlicht *falsch gerechnet* ist. Kernaussagen: (i) φ ist in FFGFT nirgends Fundament – das ist $\xi = 4/30000$; (ii) die einzige φ-Verwendung mit echtem geometrischem Gehalt ist $\arctan(\varphi^{-3})$ in der CP-Phase (Dok. 172), weil $\varphi^{-3} = \sqrt{5}-2$ die natuerliche Zwischenskala der Fibonacci-Konvergenz ist; (iii) φ-Massenleitern (Dok. 172/188) sind heuristisch, numerisch fehlerhaft und fallen unter die φ^N-Trivialitaetswarnung P35; (iv) $1/\varphi$ ist Durchgangspunkt, kein Fixpunkt (Dok. 275); (v) π und e werden nirgends hergeleitet.

P.1 Anlass und Geltungsbereich

Bei der Pflege des Korpus zeigte sich ein Notationsproblem: dasselbe Zeichen `\phi` meint in verschiedenen Dokumenten verschiedene Dinge, und der Goldene Schnitt selbst wird mal als ϕ (geschlossene Form, aus `\phi`), mal als φ (offene Form, aus `\varphi`) geschrieben. Da die alten Dokumente in der Version v1.1.2 abgeschlossen sind und nicht mehr nachtraeglich umgeschrieben werden, dient dieses Dokument als *verbindliche Referenz*: Wer in einem aelteren Text auf φ oder ϕ trifft, schlaegt hier nach, welche Rolle gemeint ist.

Wichtig

Geltungsregel. Dieses Dokument ist normativ fuer die *Lesart*, nicht fuer den *Wortlaut* der alten Dokumente. Wo ein alter Text und dieses Dokument sich

widersprechen, gilt fuer den physikalischen Gehalt die hier festgehaltene, gegen Dok. 190 (P35/P37) und Dok. 275 abgeglichene Fassung.

P.2 Kanonische Notation

Die folgende Zuordnung ist die kanonische Konvention. Sie beschreibt zugleich, *wie* der Korpus die Zeichen faktisch verwendet – mit der bekannten Inkonsistenz beim Goldenen Schnitt.

Befehl	Glyphe	Kanonische Bedeutung	Bemerkung
`\varphi`	φ (offen)	Goldener Schnitt $(1+\sqrt{5})/2$	empfohlenes Standardzeichen
`\phi`	ϕ (geschlossen)	Skalarfeld / Winkel / Index	NICHT Goldener Schnitt
`\Phi`	Φ (gross)	Potential / komplexes Feld	z. B. $\Phi = \rho e^{i\theta}$
`\psi`	ψ	Wellenfunktion	Quantenmechanik

Vorsicht

Bekannte Altlast. In v1.1.2 schreiben mehrere Dokumente den *Goldenen Schnitt* faelschlich als `\phi` statt `\varphi` (u. a. Dok. 005, 009, 022, 023, 028, 035, 036, 083, 133, 147, 187, 188). Gleichzeitig nutzen Feldtheorie-Dokumente `\phi` korrekt fuer das *Skalarfeld* (z. B. Dok. 202: $\phi_{n,l,j}$ mit $\Box\phi_{n,l,j} = -m^2\phi_{n,l,j}$) und `\phi` als *Wicklungsindex* n_ϕ in (n_θ, n_ϕ) (z. B. Dok. 051, 202). Innerhalb *eines* Dokuments ist ϕ jeweils eindeutig; die Ueberladung besteht nur *zwischen* Dokumenten. Daher darf nicht pauschal `\phi`→`\varphi` ersetzt werden – das wuerde die Feld-/Winkel-Dokumente zerstoeren.

Numerische Festlegung. Durchgehend gilt

$$\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = 1{,}6180339887\ldots, \qquad \varphi^2 = \varphi + 1, \qquad \varphi^{-1} = \varphi - 1 = 0{,}6180\ldots, \tag{P.1}$$

$$\varphi^{-3} = \sqrt{5} - 2 = 0{,}2360679\ldots, \qquad \arctan\left(\varphi^{-3}\right) = 13{,}2825^\circ. \tag{P.2}$$

P.3 Die Rollen von φ im Korpus

Aufbauend auf der Dreiteilung in Dok. 190 (P37) – (1) mikroskopisch/ξ-Ebene, (2) makroskopisch/$1/\varphi$-Durchgangspunkt, (3) Teilchenphysik – wird hier feiner aufgeloest. Jede Rolle ist mit ihren Fundstellen und ihrem Status versehen.

Rolle A – Selbstaehnlichkeits-Attraktor (behauptet)

Fundstelle: Dok. 172, § „Der goldene Schnitt als fraktaler Attraktor“. **Aussage:** Die fraktale Feldgeometrie mit $D_f = 3 - \xi$ erzwinge eine Selbstaehnlichkeitsrekursion, deren einziger stabiler Fixpunkt φ sei (algebraisch $\varphi^2 = \varphi + 1$). **Status: behauptet, nicht hergeleitet.** $\varphi^2 = \varphi + 1$ *ist* die Definitionsgleichung von φ; der eigentliche Schritt

„$D_f = 3 - \xi$ *erzwingt* genau diese Rekursion“ wird assertiert, nicht gezeigt. Die Variante in Dok. 188 („φ als stabilstes inkommensurables Verhaeltnis“) ist staerker motiviert – φ ist via Kettenbruch $[1; 1, 1, \dots]$ die „irrationalste“ Zahl –, haengt aber ebenso daran, dass die Geometrie genau dieses Verhaeltnis selektiert.

Rolle B – CP-Phase $\arctan(\varphi^{-3})$ (echter Gehalt)

Fundstelle: Dok. 172, § „Formaler Beweis: $\arctan(\varphi^{-3})$ als geometrische Notwendigkeit“. **Aussage:** Die Fibonacci-Quotienten $F(n+1)/F(n)$ konvergieren gegen φ mit Fehlern der Ordnung $\varphi^{-2n}/\sqrt{5}$; das geometrische Mittel von erster und zweiter Ordnung ist $\sqrt{\varphi^{-2}\varphi^{-4}} = \varphi^{-3} = \sqrt{5} - 2$. Mit der Torsionsphase folgt $\delta = 270^\circ + \arctan(\varphi^{-3}) \approx 283{,}28^\circ$ (NOvA/T2K 2024: $283{,}1^\circ \pm 14^\circ$).

Korrekt

Status: am besten begruendete φ-Verwendung des Korpus. Hier ist φ^{-3} keine Wahl, sondern die natuerliche Zwischenskala der Fibonacci-Konvergenz; der Exponent 3 ist ueber die Z3-Ordnung (3 Generationen/Sektoren) vorwaerts motiviert. Das ist qualitativ verschieden von einer angepassten φ-Potenz.

Rolle C – Feinstrukturkonstante $\alpha = \xi\varphi^3 F(7)$

Fundstelle: Dok. 172, § „α aus reiner Geometrie“. **Aussage:**

$$\alpha \approx \xi \cdot \varphi^3 \cdot F(7) = \xi \cdot \varphi^3 \cdot 13 \;\Rightarrow\; \alpha^{-1} = 136{,}19 \quad (-0{,}62\%). \tag{P.3}$$

Status: numerisch korrekt nachgerechnet, aber als eine von mehreren α-Routen zu verstehen. Die Haupt-Route laeuft ueber $\alpha = \xi E_0^2$ mit $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}} = 7{,}398$ MeV (Dok. 011); ihre Uebereinstimmung mit dem Messwert ist eine Eigenschaft des Ankers E_0, keine unabhaengige Vorhersage. Die $\varphi^3 \cdot 13$-Form ist die geometrisch-„saubere“, aber gegenueber dem Messwert um $0{,}62\%$ abweichende Variante.

Rolle D – Massen-/Generationenleiter (heuristisch, fehlerhaft)

Fundstellen: Dok. 172 ($m_\mu/m_e \approx \varphi^{10}$), Dok. 188 (Leptonleiter $\varphi^5\pi^2$, φ^5), Dok. 009 ($\varphi^{12}/(1-\xi)^2$), Dok. 022/035/133 (φ^{gen}-Skalierung). **Status: heuristisch; in Dok. 172/188 numerisch falsch** (siehe Abschnitt P.4). Die belastbare Massenherleitung erfolgt *nicht* ueber φ, sondern ueber ξ und Quantenzahlen (Dok. 006, Abschnitt P.4). Diese Rolle faellt unter P35.

Rolle E – Fraktaler Skalierungsfaktor $\alpha = \varphi^{-1}$ (KEIN Fehler)

Fundstelle: Dok. 188, § „Fraktale Kopplungskonstante“. **Aussage:** $\alpha = \varphi^{-1} = 0{,}6180$ als Skalierungsfaktor zwischen fraktalen Ebenen, $(x_{k+1}, \dots) = \varphi^{-1}(x_k, \dots)$.

Wichtig

Status: eigene, klar definierte Groesse – nicht die Feinstrukturkonstante. Im selben Dokument steht die Feinstruktur sauber getrennt als $\alpha_{\mathrm{EM}} = \xi E_0^2 = 1/137{,}04$. Es liegt also *kein* Rechenfehler vor, sondern eine bewusste Doppelbelegung des Buchstabens α. Reine Lesbarkeitsfrage; Dok. 190 P37(a) fuehrt diese Verwendung bereits.

Rolle F – Durchgangspunkt $1/\varphi$ der ξ-Rekursion

Fundstelle: Dok. 275. **Aussage:** Die Daempfungsfolge $r(k{+}1) = r(k)(1-\xi)$, $r(0) = D_f/3$, passiert $1/\varphi$ bei $k^* = \log \varphi/\xi \approx 3609$ (exakt $k^*_{\mathrm{exakt}} = 3608{,}51$).

Vorsicht

Status: Durchgangspunkt, kein Fixpunkt. Einziger Fixpunkt der Rekursion ist 0. Da $k^*(c)$ fuer *jedes* Ziel c existiert, ist die Beobachtung unverankert, solange $1/\varphi$ nicht unabhaengig motiviert wird – die φ^N-Trivialitaetswarnung P35 greift.

Rolle G – Pentagonale Symmetriebrechung

Fundstellen: Dok. 018 (anomales $g{-}2$), Dok. 149 (Torsion), Dok. 019, 153, 154. **Aussage:** φ als Trager der pentagonalen (fuenfzaehligen) Symmetriebrechung. **Status: strukturelles Motiv;** teilt den Begruendungsstand von Rolle A (die Selektion gerade der pentagonalen Symmetrie ist die offene Stelle).

Rolle H – HLV-Substrat (nicht FFGFT)

Fundstelle: Dok. 271. **Aussage:** In Hidden-Layer-Vacuum (HLV, Krueger) ist φ die Substrat-Geometrie. **Status: gehoert HLV, nicht FFGFT.** Beim Bruecken-Vergleich darf φ nicht stillschweigend von der HLV- auf die FFGFT-Seite uebertragen werden.

Rolle I – Triviale Darstellung $X = \varphi^N$

Fundstellen: Dok. 190 (P35), 271, 272, 274. **Aussage und Status:** Jede Magnitude laesst sich als φ^N *oder* ξ^N schreiben; ein Exponent allein ist keine Vorhersage. Gilt fuer beide Basen gleichermassen.

P.4 Ehrliches Register: korrekt / offen / falsch

Korrekt nachgerechnet

- $\alpha = \xi\varphi^3 \cdot 13 \Rightarrow \alpha^{-1} = 136{,}19$ ($-0{,}62\%$), Dok. 172.
- $\varphi^{-3} = \sqrt{5} - 2 = 0{,}23607$, $\arctan(\varphi^{-3}) = 13{,}28^\circ$, Dok. 172.

- $1/\varphi = 0{,}6180$ als Durchgangspunkt bei $k^* \approx 3609$, $r(3609) = 0{,}617994\ldots$, Dok. 275 (Status: unverankert).
- $245 = 5 \cdot 7^2 \approx \varphi^{12}/\left[1{,}314\,(1-\xi)^2\right] = 245{,}1$, Dok. 009 – mit *deklariertem* empirischem Anker $1{,}314$ (P10/P37(d)).

Numerisch falsch – in den Altdokumenten, hier korrigiert

Kritisch

Dok. 188, Leptonleiter (Z. ≈318):

$$\text{behauptet: } \frac{m_\mu}{m_e} \approx \varphi^5 \cdot \pi^2 \approx 206{,}7 \quad \text{tatsaechlich } \varphi^5\pi^2 = 109{,}46 \text{ (gemessen } 206{,}768), \tag{P.4}$$

$$\text{behauptet: } \frac{m_\tau}{m_\mu} \approx \varphi^5 \approx 16{,}94 \qquad \text{tatsaechlich } \varphi^5 = 11{,}09 \text{ (gemessen } 16{,}82). \tag{P.5}$$

Dok. 172 (Z. ≈356): $m_\mu/m_e \approx \varphi^{10} = 122{,}99$ – 40% daneben und im Widerspruch zur (ebenfalls falschen) Dok.-188-Form. Selbst arithmetisch korrigiert braeuchte man krumme Exponenten ($\varphi^{11{,}08}$ bzw. $\varphi^{5{,}87}$): es gibt keine glatte φ-Potenz, die die Leptonverhaeltnisse trifft. **Konsequenz:** Die φ-Leptonleiter ist als Numerologie zu markieren (P35-Nullbefund), nicht als geometrische Konsequenz.

Die belastbare Leptonmassen-Herleitung – ueber ξ, nicht φ

Dok. 006 setzt $m_i = r_i\,\xi^{p_i}\,v$ mit aus Quantenzahlen bestimmten Exponenten:

$$p_e = \tfrac{3}{2},\ r_e \approx 1{,}349; \qquad p_\mu = 1,\ r_\mu = \tfrac{16}{5} = 3{,}2; \tag{P.6}$$

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{r_\mu}{r_e}\,\xi^{p_\mu - p_e} = 2{,}372 \cdot \xi^{-1/2} = 2{,}372 \cdot 86{,}6 = 205{,}4 \quad (-0{,}65\%). \tag{P.7}$$

Der *Exponentenunterschied* $-\frac{1}{2}$ ist der strukturelle, vorwaerts gerichtete Gehalt; die $O(1)$-Koeffizienten (r_e ist rueckgerechnet) tragen den Restfit (vgl. P40: nur Verhaeltnisse exakt). φ wird hier nicht benoetigt und fuegt nichts hinzu.

P.5 Was NICHT aus φ (oder ξ) folgt

- π **wird nicht hergeleitet.** π ist die vorausgesetzte Kreis-/Torus-Konstante. Die schoenste Deutung (Dok. 159): auf dem Kreis konvergiert $\sum 1/n^2 = \pi^2/6$, die periodische Geometrie erzwingt Konvergenz – aber π ist gedeutet, nicht abgeleitet.
- e **(Eulersche Zahl) wird nicht hergeleitet**, sie tritt nur als $\exp(\cdot)$ auf.
- **Emergent abgeleitet** sind dagegen: $13 = F(7)$ (Fibonacci) und $27 = 3^3$ (Z3-Struktur, drei Generationen).

P.6 Vorkommens-Tabelle (substantielle Faelle)

Die Tabelle listet die *inhaltlich relevanten* Vorkommen. Reine Definitions- oder Durchlaufnennungen folgen derselben kanonischen Lesart.

Dok.	Zeichen	Rolle (s. o.)	Status
172	φ	A Attraktor, B CP-Phase, C α, D φ^{10}	B korrekt; A behauptet; D falsch
188	ϕ	D Leptonleiter, E Skalierungsfaktor	D falsch; E ok (eigene Groesse)
275	φ	F Durchgangspunkt $1/\varphi$	korrekt, aber unverankert (P35)
190	φ	I Trivialitaet P35, Rollen-Map P37	normativ
009	ϕ	D $\varphi^{12}/1{,}314$	empirischer Anker deklariert
271	φ	H HLV-Substrat, I Trivialitaet	Abgrenzung HLV/FFGFT
272	φ	I $X = \varphi^N$ keine Vorhersage	korrekt
274	φ	I Trivialitaet gilt fuer φ und ξ	korrekt
018	φ	G Pentagonale Symmetriebrechung ($g{-}2$)	strukturelles Motiv
149	φ	G Pentagonale Symmetriebrechung (Torsion)	strukturelles Motiv
019, 153, 154	φ	G Pentagonale Symmetriebrechung	strukturelles Motiv
022, 035, 133	ϕ	D φ^{gen}-Skalierung	heuristisch (P35)
036	ϕ	D kosmische Skalen $r_n = r_0\varphi^n$ (BAO)	heuristisch (P35)
083, 147, 187	ϕ	D Qubit-/Photonik-Frequenzen	heuristisch
005, 028, 035, 150	ϕ/φ	Definition $(1+\sqrt{5})/2$	Grundlage
241, 261	φ	F „zur Ruhe gekommene“ Rekursion	vgl. Dok. 275
202	ϕ	*Skalarfeld* $\phi_{n,l,j}$, Index n_ϕ	NICHT Goldener Schnitt
051	ϕ	*Wicklungsindex* n_ϕ	NICHT Goldener Schnitt
067, 097, 129	ϕ	*Skalarfeld* (Lagrange/QFT)	NICHT Goldener Schnitt

P.7 Empfehlung

1. **Notation kuenftig:** Goldener Schnitt ausschliesslich `\varphi` (φ). `\phi` bleibt Feld/Winkel, `\Phi` Potential, `\psi` Wellenfunktion.
2. **Altdokumente:** nicht umschreiben; diese Referenz gilt.
3. **φ-Massenleitern (Dok. 172/188):** als P35-Numerologie lesen, nicht als Herleitung. Belastbar ist allein die ξ-Route (Dok. 006).
4. **Echter φ-Gehalt** bleibt: $\arctan(\varphi^{-3})$ in der CP-Phase (Dok. 172) und die Begriffstrennung der drei φ-Rollen (Dok. 190 P37).

Kapitel Q

Dok. 282 — FFGFT im Hilbertraum — Vom gemeinsamen Loop-Objekt zum Massenoperator

Abstract

Die bisherige Hilbertraum-Brücke von FFGFT (Dok. 230/231/232) bildet bereits beschriebene QM-Operationen ab – aber nur diese, und ohne die Zeit. Dieses Dokument macht die Übersetzung vollständiger und zeigt, dass sie bis zu den *Massen* reicht. Drei Ebenen: (0) QM-äquivalent – beide, FFGFT und HLV, sind ein Connection-Laplace auf einem faserwertigen Hilbertraum (Eichfreiheit = unitäre Äquivalenz, Verschränkung = Holonomie um Zyklen). (1) Prozess – ein CP-Teilbarkeits-Test trennt berechenbar QM-intern (Markovsch) von historien-gekoppelt (nicht-Markovsch); das ist die Zeit als Prozessstruktur. (2) Masse – der eigentliche neue Befund: der Massenoperator ist ein hermitescher Z_3-Zirkulant auf der $\mathbb{C}^3$-Faser, seine Eigenvektoren sind die drei Z_3-Charaktere (die Generationen), sein Spektrum S^2 sind die Massen. Mit zwei reinen Zahlen – $r = \sqrt{2}$ (Koide $Q = 2/3$) und dem Winkel $\theta = 2/9$ – reproduziert er m_μ/m_e und m_τ/m_μ auf vier bis fünf Stellen, ohne den früher gefitteten Leiter-Koeffizienten. $2/9 = 2/3^2$ ist dabei keine getunte Dezimale, sondern eine Strukturzahl auf der Stufe von ξ: eine Grundbedingung des fraktalen offenen Raumes. Der FFGFT↔HLV-Vergleich ist nur die Eingangstür; keine theoretische Äquivalenz wird behauptet.

Q.1 Anlass und Geltungsbereich

Der Austausch mit Marcel Krüger (HLV/HICE) warf die Frage auf, ob FFGFT und HLV verbunden sind. Beim Verfolgen dieser Frage zeigte sich das Wesentliche: Die Hilbertraum-Abbildung von FFGFT ist *unvollständig* – sie übersetzt die bereits beschriebenen QM-Operationen, aber die *Zeit* kommt darin nicht vor, obwohl sie in der realen Welt und in den T^4-Tori sehr wohl existiert. Und solange die Zeit fehlt, fehlen die *Massen*. Dieses Dokument schließt diese Lücke so weit, wie es derzeit ehrlich geht.

Geltungsregel

Es wird *keine* theoretische Äquivalenz FFGFT = HLV behauptet. Der HLV-Vergleich liefert nur das gemeinsame Objekt (Connection-Laplace) und die Prozess-Messgröße (Nicht-Markovianität). Das Thema ist die Vervollständigung der FFGFT-eigenen Hilbertraum-Übersetzung bis zu den Massen.

Q.2 Der Hilbertraum explizit

Bevor wir rechnen, der Raum selbst. Der volle Hilbertraum von FFGFT ist das Tensorprodukt aus Basis und Faser:

$$\mathscr{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3. \tag{Q.1}$$

Basen und Skalarprodukt

Basis $L^2(T^4)$ – Funktionen auf dem Vier-Torus, zwei natürliche Basen:

- Knotenbasis $|x\rangle$, $x \in T^4$ (Knoten des diskreten Torus-Graphen);
- Windungsbasis $|n\rangle$, $n = (n_1, n_2, n_3, n_4) \in \mathbb{Z}^4$, da $H_1(T^4) = \mathbb{Z}^4$ (Dok. 189) – Eigenzustände der Translationsgeneratoren, die n_i sind die Windungszahlen.

Faser $\mathbb{C}^3$ – die drei Z_3-symmetrischen ICE-Kanäle (Dok. 206), zwei Basen:

- Kanalbasis $|c\rangle$, $c = 1, 2, 3$;
- Z_3-Charakterbasis $|f_k\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \sum_c \omega^{kc} |c\rangle$, $k = 0, 1, 2$, $\omega = e^{2\pi i/3}$ – die *Generationen*.

Skalarprodukt: $\langle \psi | \phi \rangle = \sum_{x \in T^4} \sum_c \overline{\psi(x,c)}\, \phi(x,c)$. Ein allgemeiner Zustand: $|\psi\rangle = \sum_{n,k} a_{n,k} \, |n\rangle \otimes |f_k\rangle$.

Auf diesem Raum wirken drei Operatorenfamilien – und sie teilen die Physik sauber auf:

Die drei Operatoren auf $\mathscr{H}$

(1) Connection-Laplace L auf der Basis (Eich-/Holonomie-Sektor): $L = D - \sum_{\langle vw \rangle} U_{vw}$, $U_{vw} = e^{iA_{vw}}$. Eigenwerte = innere Modenzahlen; Eichtransformation = unitäre Konjugation; Holonomie um Zyklen = Verschränkung (Dok. 230). Lebt auf $L^2(T^4)$.

(2) Zeit-Generator H_t (Energie-/Massensektor): Generator der Translation in der $\tilde{T}$-Richtung des Torus. Über $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist sein Eigenwert die Ruhemasse; er setzt die Skala $M = 1/\tilde{T}$.

(3) Massenoperator S auf der Faser (Generationensektor): der hermitesche Z_3-Zirkulant auf $\mathbb{C}^3$. Eigenwerte $\sqrt{m_k}$, Eigenvektoren = Z_3-Charaktere = Generationen.

So zerfällt die Physik: die Basis $L^2(T^4)$ trägt Eichstruktur, Verschränkung und Dynamik; die Faser $\mathbb{C}^3$ trägt Generation und Masse; die $\tilde{T}$-Richtung setzt die Skala.

Der vollständige Operator eines Sektors ist ein Produkt (Basis-Operator) ⊗ (Faser-Z_3-Zirkulant).

Q.3 Ebene 0 – das gemeinsame Objekt: Connection-Laplace

Im Kern ist die QM-Abbildung ein Connection-Laplace auf einem faserwertigen Funktionenraum über einem diskreten Basisraum – bei FFGFT der T^4, bei HLV der Zell-Graph:

$$L = D - \sum_{\langle vw \rangle} U_{vw}, \qquad U_{vw} = e^{iA_{vw}} \in \mathrm{U}(n), \qquad \Omega(C) = \textstyle\sum_{e \in C} A_e \pmod{2\pi}. \tag{Q.2}$$

Was FFGFT auf dieser Ebene leistet

Zustände = faserwertige Felder; QM-Operation = unitärer Paralleltransport U_{vw}; Eichfreiheit = unitäre Äquivalenz (gauge-null, beidseitig bestanden, $\sim 10^{-14}$); Verschränkung = Holonomie um Zyklen (Dok. 230) mit $H_1(T^4) = \mathbb{Z}^4$ (Dok. 189); CP-Phase = akkumulierte Torsionsphase (Dok. 172). Gegenstücke: FFGFT-Loop-Hamiltonian (Dok. 231/232) ↔ HLV-L_{HICE}.

Das ist solide, aber es ist nur QM, sauber als Gitter-Eichmodell – und es enthält weder Zeit noch Masse.

Q.4 Ebene 1 – die Prozessebene: CP-Teilbarkeit

Die erste Erweiterung über die statische QM hinaus ist die Zeit als *Prozess*. Eine Faser-Qubit wird durch ein Bad dephasiert, dessen Frequenzen $\omega_k = \sqrt{\lambda_k}$ die Loop-Frequenzen des T^4-Connection-Laplace sind (Independent-Boson):

$$\Gamma(t) = \sum_k \frac{2g_k^2}{\omega_k^2}\big(1 - \cos\omega_k t\big), \quad c(t) = e^{-\Gamma(t)}, \quad \gamma(t) = \dot\Gamma(t) = \sum_k \frac{2g_k^2}{\omega_k} \sin\omega_k t. \tag{Q.3}$$

Verglichen werden zwei reduzierte Beschreibungen desselben Operators: (M) memoryless / zeit-lokal (konstante Rate ⇒ CP-teilbar) und (NM) historien-gekoppelt (volles T^4-Bad ⇒ darf CP-Teilbarkeit verletzen). Zwei Standard-Zeugen (BLP-Spurdistanz-Rückfluss, RHP/Choi):

Beschreibung	BLP-Rückfluss	D belebt	min Choi-EW	$\gamma < 0$
(M) memoryless / zeit-lokal	0,000	nein	+0,013	—
(NM) historien-gekoppelt (T^4)	5,125	ja	−0,041	1928

Nur die historien-gekoppelte Variante verlässt die Markovsche Klasse. Das ist die operationale „jenseits-Markov"-Signatur – aber jenseits der zeit-lokalen *reduzierten* Beschreibung, nicht jenseits der Quantentheorie.

Q.5 Ebene 2 – Zeit und Masse: der Hilbertraum-Massenoperator

Hier liegt der eigentliche Befund. Eine Masse ist eine Ruheenergie: der Eigenwert des *Zeit-Translations-Generators* (Casimir $m^2 = E^2 - p^2$). Die Grundrelation $\tilde{T} \cdot m = 1$ macht die Masse zum *Dual* des Zeitzyklus. Ein statischer Graph-Laplace hat die Zeit weggeworfen – seine Eigenwerte sind innere Modenzahlen, keine Massen. Wer die Zeit zurückbringt, bekommt Massen; und weil $\hbar, c$ nur SI-Umrechnungsfaktoren sind, ist das Physikalische das *Verhältnis*, während die Skala $M = 1/\tilde{T}$ vom Zeitzyklus gesetzt wird.

Ein gewöhnlicher Laplace reicht nicht

Ein symmetrischer T^4-Connection-Laplace mit $m^2 = \lambda_k$ gibt die drei niedrigsten „Massen“ im Verhältnis $1 : 1 : 1{,}46$ und Koide $Q = 0{,}345$ – also O(1)-Verhältnisse, keine Hierarchie, Koide weit weg von $2/3$. Zeit als gleichförmige Zusatzdimension genügt nicht; nötig ist die Z_3-Kanalstruktur.

Der Operator

Die Faser ist $\mathbb{C}^3$ – die drei Z_3-symmetrischen ICE-Kanäle (Dok. 206: $\det A_\xi = 1 - \xi$), also der Generationenraum. Der volle Raum ist $L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$; der $\tilde{T}$-Zyklus des Torus setzt die Skala. Der Massenoperator ist ein *hermitescher Z_3-Zirkulant*

$$S = \mathrm{circ}(t_0, t_1, t_2), \qquad t_0 = M \in \mathbb{R}, \quad t_2 = \bar{t}_1, \tag{Q.4}$$

mit Eigenwerten

$$\mu_k = t_0 + 2|t_1| \cos\!\left(\arg t_1 + \tfrac{2\pi k}{3}\right) = M\left(1 + r\cos\!\left(\theta + \tfrac{2\pi k}{3}\right)\right), \qquad k = 0, 1, 2, \tag{Q.5}$$

wobei $r = 2|t_1|/M$ und $\theta = \arg t_1$. Die *Eigenvektoren* sind die drei Z_3-Fourier-Charaktere $f_k = (1, \omega^k, \omega^{2k})/\sqrt{3}$, $\omega = e^{2\pi i/3}$ – numerisch verifiziert mit Überlappung $1{,}0000$. Die drei Generationen *sind* die Z_3-Charaktere; die Massen sind das Spektrum von S^2.

Koide aus dem Operator

Mit $\sqrt{m_k} = \mu_k$ folgt die Koide-Identität direkt:

$$Q = \frac{\sum_k m_k}{\left(\sum_k \sqrt{m_k}\right)^2} = \frac{1 + r^2/2}{3} \implies Q = \tfrac{2}{3} \iff r = \sqrt{2}. \tag{Q.6}$$

Koide $Q = 2/3$ ist also nichts anderes als die Operator-Bedingung $r = \sqrt{2}$ – die $Z_3{+}\sqrt{2}$-Struktur (Dok. 258/259), nicht ein Fit.

Die Lepton-Massen aus zwei reinen Zahlen

Mit $r = \sqrt{2}$ und $\theta = 2/9$ – zwei reinen Zahlen, kein gefitteter Koeffizient:

	Operator	Daten	Fehler
m_μ/m_e	206,770	206,768	0,00 %
m_τ/m_μ	16,818	16,817	0,01 %
Koide Q	0,666667	0,666661	exakt $2/3$

Mehr als ein Fit

Der früher gefittete Leiter-Koeffizient ($r_e \approx 1{,}349$, Dok. 006) ist *verschwunden* – ersetzt durch die Strukturzahl $2/9$. Und es ist mehr als eine Anpassung: *ein* Winkel θ reproduziert *beide* unabhängigen Verhältnisse gleichzeitig (andere θ zerschießen m_μ/m_e sofort). Zwei reine Zahlen → drei Massen auf 4–5 Stellen.

Numerische Vorsicht: das Elektron ist eine Auslöschung

Der leichteste Eigenwert ist eine Fast-Total-Auslöschung, $\mu_e = M\big(1 + r\cos\big(\theta + \frac{2\pi}{3}\big)\big) = M(1-0{,}95965) = 0{,}04035\,M$ – die Differenz zweier fast gleich großer Zahlen. Eine Rundung der Kosinuswerte auf nur drei Stellen verschiebt μ_e um Größenordnungen: $\cos\big(\theta + \frac{2\pi}{3}\big)$ als $-0{,}658$ statt korrekt $-0{,}6786$ (ein 3 %-Fehler) macht aus $\mu_e = 0{,}040$ ein $0{,}069$ (72 % Fehler), und da $m_e = \mu_e^2$, kippt m_μ/m_e von 207 auf ≈ 70. Die Verhältnisse sind daher nur in *voller Maschinenpräzision* zu prüfen; gerade weil das Elektron der leichteste Zustand ist, ist m_μ/m_e der schärfste Test, ob θ exakt $2/9$ ist (Skript `ffgft_mass_operator_C3.py`, numpy-Präzision).

Wie genau? Gegen die hochpräzisen e/μ-Daten ist der Winkel auf $|\theta - 2/9| \approx 1{,}8\cdot10^{-7}$ bestätigt – sieben signifikante Stellen. Die Leptonmassen gehören zu den genauesten Messgrößen der Physik; genauer wird die Datenlage nicht. Damit ist die empirische Frage beantwortet: $2/9$ ist die Zahl.

$2/9$ als Grundbedingung

Muss $2/9$ aus etwas Tieferem hergeleitet werden? Nein. Der entscheidende Unterschied ist der zwischen einem *gefitteten stetigen Regler* (schlecht – das war r_e) und einer *festen strukturellen Rationalzahl*, von der Geometrie erzwungen (gut – wie $2/3$, wie $2\pi/3$, wie die Drei-Kanal-Zählung selbst).

Strukturzahl, nicht Fit

$2/9 = 2/3^2$ ist eine saubere Rationalzahl, keine getunte Dezimale – genau die Art Primitiv, die der fraktale offene Raum tragen kann, *auf der Stufe von* ξ. Wie $\xi = 4/30000$ braucht sie keine tiefere Herleitung; sie ist eine Grundbedingung der Geometrie.

Das verschiebt die Leptonen von einer ξ-*Potenz*-Geschichte zu einer Z_3-*Geometrie*-Geschichte: die Verhältnisse hängen an den reinen Zahlen $\sqrt{2}$ und $2/9$, nicht an ξ (das im Verhältnis gar nicht auftritt). Das passt dazu, dass die ξ-Leiter für Leptonen ohnehin der schwache Teil war. Der fraktale Raum trägt dann ein kleines Set von Primitiven: ξ für den Kopplungssektor, $(\sqrt{2},\, 2/9)$ für den Generationensektor.

Q.6 Rechnen im Hilbertraum: Rezept und Beispiele

Das Verfahren ist immer dasselbe – jede physikalische Größe ist ein Eigenwert, eine Eigenwert-Relation oder eine Überlappung von Eigenbasen auf $\mathscr{H}$.

Das Rezept – vier Schritte

1. **Sektor wählen** – welche Größe (Massen, Prozessgröße, Mischungswinkel, ...).
2. **Operator hinschreiben** – der zugehörige selbstadjungierte Operator auf $\mathscr{H}$ (Z_3-Zirkulant auf $\mathbb{C}^3$ für Massen; zeit-erweiterter Connection-Laplace für Dynamik; Überlappung zweier Eigenbasen für Mischung).
3. **Diagonalisieren** – Eigenwerte $=$ Größen (als dimensionslose Verhältnisse), Eigenvektoren $=$ Zustände; Relationen (Koide) folgen algebraisch.
4. **Skala + SI** – Skala $M = 1/\tilde{T}$ aus dem Zeitzyklus, dann $\hbar, c$ als reine SI-Umrechnung.

Bereits gerechnet.

- *Massen:* S auf $\mathbb{C}^3$, Eigenwerte^2 $=$ Massen, Verhältnisse aus $(\sqrt{2}, 2/9)$ (Ebene 2).
- *Koide:* $Q = (1 + r^2/2)/3$ aus der Eigenwertstruktur, $= 2/3$ bei $r = \sqrt{2}$ (Ebene 2).
- *Prozess / Nicht-Markov:* der zeit-erweiterte Operator auf $L^2(T^4) \otimes$ (Qubit), CP-Teilbarkeits-Zeuge (Ebene 1).

Wie man weitere Größen rechnet (Programm). Dasselbe Rezept, neue Operatoren – die Methode liegt fest, die Ergebnisse sind noch offen:

- **Mischungswinkel (PMNS-/CKM-artig).** Sind zwei Sektoren (etwa geladene Leptonen und Neutrinos) jeweils Z_3-Zirkulanten, aber in *gegeneinander verdrehten* Faserbasen, so ist die Mischungsmatrix die Überlappung $\langle f_k^{(A)} | f_l^{(B)} \rangle$ ihrer Eigenvektoren. Die Mischungswinkel kodieren den *Verdrehungswinkel* zwischen den beiden Z_3-Strukturen – eine einzige geometrische Zahl pro Sektorpaar, berechnet genau wie $2/9$.
- **Weitere Sektoren (Quarks).** Dasselbe Schema: ein Z_3-Zirkulant pro Ladungssektor mit eigenem Strukturwinkel; die offene Frage ist dieselbe – welche Rationalzahlen erzwingt die Topologie.

- **Dynamik und Korrelationen.** Holonomie- und Verschränkungsgrößen aus dem Basis-Connection-Laplace (Dok. 230), bereits in den Witness-Skripten demonstriert.

Was „Rechnen“ hier heißt

Jede Größe ist ein Eigenwert, eine Eigenwert-Relation oder eine Eigenbasis-Überlappung auf $\mathscr{H}$, festgelegt durch strukturelle Rationalzahlen plus die eine Skala $\tilde{T}$. Das ist der Sinn, in dem die Hilbertraum-Abbildung „weitere Sachen rechnet“ – nicht durch neue Fits, sondern durch neue Operatoren nach demselben Rezept. Die Quark-Sektoren sind als Operator-Spektrum gerechnet (nächster Abschnitt) – treu, aber ohne reine Zahlen; die Mischungswinkel bleiben noch offen. Festgelegt ist die Methode.

Q.7 Die drei Sektoren explizit: treue Übersetzung, leptonspezifische Zahlen

Weil die Hilbertraum-Abbildung eine *treue Übersetzung* ist (die $T^4 \leftrightarrow$ Hilbert-Bijektion, Dok. 270, Typ III), muss sie auch die Massen tragen, die FFGFT über die ξ-Route gewinnt ($m = r\xi^p v$, Dok. 006) – Leptonen *und* Quarks. Hier ist das ausgeführt: jeder Ladungssektor ist exakt das Spektrum S^2 eines hermiteschen Z_3-Zirkulanten.

Sektor	M	r	Koide Q	max. rel. Fehler
Leptonen (e,μ,τ)	17,72	$\sqrt{2} = 1{,}4142$	0,6667	$2 \cdot 10^{-14}$
Up (u,c,t)	150,7	1,757	0,848	$7 \cdot 10^{-14}$
Down (d,s,b)	25,73	1,546	0,732	$2 \cdot 10^{-14}$

In jedem Sektor reproduziert S^2 die Massen auf Maschinenpräzision (Skript `ffgft_z3_alle_sektoren.py`). Die Hilbertraum-Rechnung ist also *universell* – die Quarks sind eingeschlossen.

Treue Übersetzung ist für sich kein Gewinn

Diese Universalität ist *automatisch*: die Kreis-Abbildung $\sqrt{m_j} = M\big(1 + r\cos\big(\theta + \frac{2\pi j}{3}\big)\big)$ ist eine *Bijektion* (drei Massen $\leftrightarrow M, r, \theta$). Jedes Triplett lässt sich exakt hineinschreiben – das *muss* so sein, sonst wäre es keine Übersetzung. „Es geht im Hilbertraum“ ist daher keine Vorhersage, sondern die Bedeutung von Treue (vgl. die ξ^N/φ^N-Trivialität, Dok. 190 P35).

Der eigentliche Gehalt steckt darin, ob die Operator-Parameter *reine Zahlen* sind:

- **Leptonen:** $r = \sqrt{2}$ – das *ist* Koide $Q = 2/3$, die $Z_3 + \sqrt{2}$-Strukturbedingung (Dok. 258/259) – *und* $\theta = 2/9$ (saubere Rationale). Zwei reine Zahlen (siehe oben).
- **Quarks:** $r_{\text{up}} \approx 1{,}76$, $r_{\text{down}} \approx 1{,}55$ – *nicht* $\sqrt{2}$; die Winkel sind keine glatten Rationalen. Der Operator trägt die Massen treu, aber mit *unspezifischen* Parametern.

Das deckt sich Punkt für Punkt mit der ξ-Route (Dok. 006): dort tragen die Lepton-Verhältnisse echte Struktur (Koide), während die Quark-(r, p) Pro-Teilchen-Klassifikation sind. Eine treue Übersetzung *muss* sich darin einig sein, *wo* Struktur sitzt – und sie ist es.

Folge für einen universellen Z_3-Winkel

Der Versuch, die Lepton-Bedingung $r = \sqrt{2}$ (also $k = 1$, Koide $2/3$) auf die Quark-Sektoren zu übertragen, wird von der treuen Übersetzung selbst *falsifiziert*: der Up-Sektor braucht $r \approx 1{,}76$, der Down-Sektor $r \approx 1{,}55$. Es gibt keinen Spielraum für $\sqrt{2}$ – und damit keinen für einen einzigen universellen $k = 1$-Z_3-Winkel über alle Sektoren.

Q.8 Dieselbe Skala trägt auch die Kopplungen: α und (knapp) G

Der Z_3-Operator des Lepton-Sektors legt nicht nur die Massen fest, sondern auch eine *Skala* M_T und die dimensionslosen Eigenwerte μ_e, μ_μ, μ_τ. Die Feinstrukturkonstante nutzt genau diese Größen – sie ist also kein separater Eingang.

α als Eigenwert-Relation auf $\mathscr{H}$

Genau das Rezept – jede Größe ein Eigenwert oder eine Eigenwert-Relation auf $\mathscr{H}$ – liefert auch α, aus *demselben* Operator, der die Massen gibt. Die Eigenwerte von S sind $\lambda_j = \sqrt{m_j}$; die Feinstrukturkonstante ist das Produkt der beiden kleineren, skaliert mit ξ:

$$\alpha = \xi\left(\frac{\lambda_e\,\lambda_\mu}{\mathrm{MeV}}\right)^2, \qquad \lambda_e\,\lambda_\mu = \sqrt{m_e\,m_\mu} = E_0. \tag{Q.7}$$

Das ist die ξ-Route ($\alpha = \xi(E_0/\mathrm{MeV})^2$, Dok. 011), aber als *Hilbertraum-Variante*: E_0 ist kein separater Eingang, sondern eine Eigenwert-Relation desselben aus $\sqrt{2}$ und $2/9$ gebauten Operators. α und die Leptonmassen folgen so aus *einem* Objekt und *einer* Skala. Zahlenwert: der Operator/geometrische Wert gibt $1/\alpha = 138{,}9$ (nacktes $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu} = 7{,}348$ MeV); mit der fraktalen Korrektur $E_0 = 7{,}348/\sqrt{K_{\mathrm{frak}}} = 7{,}398$ MeV folgt $1/\alpha = 137{,}04$ – die $1{,}35\,\%$ sind bis auf $0{,}017\,\%$ der Faktor $K_{\mathrm{frak}} = 1 - 100\xi$. Die Übereinstimmung mit dem Messwert ist dabei eine Eigenschaft des Ankers E_0, keine unabhängige Vorhersage. Skript `ffgft_kopplungen_hilbertraum.py`.

G – strukturell durch ξ, aufwendig nur in der SI-Umrechnung

Die Gravitationskopplung tritt *ebenso* über ξ ein, über die T0-Fundamentalrelation

$$\xi = 2\sqrt{Gm} \implies G = \frac{\xi^2}{4m} \tag{Q.8}$$

(Dok. 006, calc-o). Der strukturelle Befund ist derselbe wie bei α: die Kopplung ist *nicht unabhängig*, sondern durch ξ festgelegt. Die Hilbertraum-Abbildung liefert dabei die Skala: m ist die Operator-Skala $M_T = M^2 = 1/\tilde{T}$ des Lepton-Sektors. Anders als das dimensionslose α trägt G jedoch Dimensionen; seine SI-Realisierung erfordert die volle Umrechnung über $\ell_P, c, \hbar$ und ist daher deutlich aufwendiger – sie ist in calc-o ausgeführt und liefert dort G_{SI} auf Promille-Ebene; diese Übereinstimmung ergibt sich erst mit dem kleinen Rest der Ein-Anker-Kette in C_{conv} (Dok. 383) und ist kein eigener Präzisionsbeleg. Aufwendig ist also die *SI-Umrechnung*, nicht die strukturelle Herkunft.

Massen und Kopplungen aus einem Objekt

α und die Leptonmassen folgen aus *demselben* Z_3-Operator und seiner Skala; die Gravitationskopplung ist durch *dasselbe* ξ fixiert. Der reine-Zahlen-Gehalt sitzt in ξ und der Operator-Struktur; die SI-Zahlenwerte – bei G besonders – sind Umrechnungen, keine zusätzlichen Eingaben.

Q.9 Die QM-Übersetzung und was ihre Erweiterung ändert

Die Übersetzung der QM-*Operationen* hat ein eigenständiges Dokument (Dok. 230/231/232): Eichfreiheit = unitäre Äquivalenz, Verschränkung = Holonomie um Zyklen, Bell-Korrelationen = topologische Verbindungen auf T^4 (Dok. 230). Diese Übersetzung enthält *Masse und Zeit nicht* – sie bildet nur die Operationen ab. Naheliegende Frage: ändert sich an den QM-Ergebnissen etwas, wenn man sie erweitert – um die $\mathbb{C}^3$-Massefaser (Ebene 2) und die Zeit als Prozess (Ebene 1)? Nachgerechnet (`ffgft_qm_uebersetzung_erweiterung.py`):

Erweiterung	QM-Ergebnis	Änderung
Masse ($\mathbb{C}^3$-Faser)	CHSH/Bell auf der Basis	$4 \cdot 10^{-16}$ (keine)
Zeit (Prozess)	Kohärenz-Rückfluss	$0 \to 0{,}53$
Zeit (Prozess)	min. Choi-EW	$+0{,}0003 \to -0{,}0056$

Masse wirkt auf einem *separaten* Tensorfaktor. Eine QM-Korrelation (CHSH auf zwei Basis-Qubits, $= 2\sqrt{2}$, Tsirelson) ist mit und ohne angehängte $\mathbb{C}^3$-Massefaser bis auf $4 \cdot 10^{-16}$ identisch. Die Masse-Erweiterung vergrößert nur den Raum und liefert die Massen; *kein* statisches QM-Ergebnis ändert sich.

Zeit ändert die *dynamischen* Größen. Die QM-Brücke behandelt die reduzierte Dynamik zeit-lokal (unitär/Markovsch); die erweiterte Übersetzung trägt die Schleifen-Historie. Dieselbe Faser-Qubit-Kohärenz $c(t)$ ist Markovsch CP-teilbar ohne Rückfluss, historien-gekoppelt aber nicht-Markovsch: Rückfluss $0{,}53$, min. Choi-Eigenwert kippt ins Negative, $\max|\Delta c(t)| \approx 0{,}78$. Einzelzeit-Größen bleiben, sequenzielle/dynamische bekommen die nicht-Markovsche Korrektur.

Geringfügig unvollständig – nur im Umfang

Die QM-Übersetzung ist nicht falsch, sondern *im Umfang* unvollständig: keine Masse, zeit-lokal. Erweitert lässt sie jedes *statische* QM-Ergebnis unverändert (Masse faktorisiert) und fügt genau *einen* neuen Effekt hinzu – nicht-Markovsches Gedächtnis in der Dynamik –, der selbst noch innerhalb der Quantentheorie liegt (ein ausgespurtes unitäres Bad reproduziert ihn, Ebene 1). Die Erwartung, dass die Erweiterung „einen Einfluss auf die Ergebnisse hat", trifft also zu, aber genau lokalisiert: auf die *Zeit*, nicht auf die Masse, und nur auf *dynamische* Größen.

Testdauer entscheidet. Der Unterschied lebt allein in der Zeit und hat zwei Skalen: eine *schnelle* Dekohärenzzeit (Kohärenz unter $1/e$ bei $t \approx 0{,}4$, fast verschwunden bei $t \approx 1{,}4$) und eine *späte* Gedächtnis-/Wiederkehrzeit (erstes Revival bei $t \approx 2{,}8$, rund $6\times$ später). Daraus drei Regime: (i) sehr kurzer Test ($t \ll 0{,}4$) – Kohärenz ≈ 1, QM-only und erweiterte Übersetzung identisch, das QM-Ergebnis exakt; (ii) bis in die Dekohärenz – beide fallen praktisch gleich, die Markovsche Beschreibung reicht; (iii) erst ab der Wiederkehrzeit trennen sich die Kurven (Markovsch $\sim 0{,}53$ gegen nicht-Markovsch $\sim 0{,}22$). Da eine einzelne Operation typischerweise *vor* der Dekohärenz endet, ist der nicht-Markovsche Term für schnelle Operationen *operationell unsichtbar*; messbar wird er erst, wenn die Testdauer die T^4-Gedächtniszeit erreicht – in gezielt langen, kohärenzerhaltenden, sequenziellen Experimenten.

Skaliert das mit vielen Qubits oder Masse? Nein – gerade dort nicht. Massebehaftete Systeme koppeln stärker ans Bad, dekohärieren also *schneller*: bei vervierfachter Kopplung sinkt die Dekohärenzzeit von $t \approx 0{,}44$ auf $0{,}11$, und die absolute Kohärenz am ersten Revival fällt von $0{,}22$ auf $\sim 10^{-5}$ – der nicht-Markovsche Term ist dann *begraben*. Masse macht ihn also weniger sichtbar, nicht mehr; was bleibt, ist schnellere *gewöhnliche* (Markovsche) Dekohärenz. Bei vielen tausend Qubits wächst nicht der Gedächtnisterm, sondern die gewöhnliche Dekohärenz und die Fehlerakkumulation (Gate-Fehler, Crosstalk) – Markovsch und von der Fehlerkorrektur adressiert; ob Revivals überhaupt überleben, hängt an der *Struktur* des Bades (inkommensurable Frequenzen schieben die Poincaré-Wiederkehr ins praktisch Unerreichbare), nicht an der Qubit-Zahl. Der einzige legitime Vorbehalt ist *korreliertes* (nicht-Markovsches) Rauschen über Gates hinweg – relevant nur, wenn die Bad-Gedächtniszeit an die Sequenzdauer heranreicht, was schnelle Gates und schnell dekohärierende (schwere) Systeme gerade verhindern.

Q.10 Kompakt oder rekursiv? Wann die kompakte Rechnung genügt

Eine Frage entscheidet, wie weit die kompakte Hilbertraum-Rechnung trägt: Genügt die kompakte (zyklische, endliche, einmalige) Variante *immer* – sodass die Dekompaktifizierung erst der letzte Schritt nach SI ist – oder gibt es Größen, die sich *nur rekursiv* berechnen lassen? Das Entscheidungskriterium ist **Linearität**.

Linear ⇒ kompakt genügt

Wird die Dynamik von einem *festen linearen* Operator auf $\mathscr{H}$ mit diskretem (kompaktem) Spektrum erzeugt, so existiert immer die geschlossene spektrale Darstellung

$$\langle A(t)\rangle = \sum_{k,l} c_{kl}\, e^{i(\omega_k-\omega_l)t}. \tag{Q.9}$$

Einmal diagonalisieren genügt. Der Gedächtniskern $K(t)$, der in der Zeitdarstellung *rekursiv* erscheint (Faltung, Memory), ist nur die Fourier-Transformierte der diskreten Spektraldichte $\sum_k g_k^2\,\delta(\omega-\omega_k)$. Die Rekursion ist also bloß *eine Darstellung* (Zeitdomäne); die Spektralsumme ist die äquivalente geschlossene. Bei diskretem Spektrum existiert die geschlossene Form stets – dekompaktifiziert wird erst am Schluss, beim SI-Schritt.

Konkreter Beleg: der CP-Teilbarkeits-Test (Ebene 1) erhielt das *nicht-Markovsche* Ergebnis – Rückfluss, Revivals – aus genau so einer endlichen Spektralsumme, in geschlossener Form, *ohne* Rekursion. Selbst „Gedächtnis" war kompakt rechenbar.

Wann Rekursion erzwungen ist

Die Rekursion wird nur dann unvermeidlich, wenn eine der beiden Linearitäts-Voraussetzungen bricht:

1. **Fundamental kontinuierliches Spektrum** – dann keine endliche Summe. Doch das Kontinuum tritt erst auf der SI-/Erlebnisebene auf; fundamental ist kompakt. Dieser Fall fällt weg.
2. **Nichtlineare / selbstreferentielle Dynamik** – der Generator hängt vom *Zustand oder der Vorgeschichte selbst* ab, nicht nur von der Zeit. Dann gibt es keine feste Eigenbasis, keine Diagonalisierung, und die Rekursion ist echt.

Damit reduziert sich die Frage auf eine *Klassifikation*: Für jede Größe fragt man – ist der Generator ein fester linearer Operator auf $\mathscr{H}$? Ja ⇒ kompakt, einmalig, SI erst am Ende. Hängt er vom Zustand/Trajektorie ab ⇒ Rekursion möglicherweise irreduzibel.

Massensektor, Eichung, Verschränkung und Mischung sind linear – für sie genügt die kompakte Rechnung, und HLVs Rekursionen sind dort *vermeidbar*. Der einzige Kandidat für genuine Rekursion ist die *selbstreferentielle* Ebene (Dok. 248, §8: der Ursprungsgedanke als materieller T^4-Prozess): dort, wo der Prozess sich selbst verarbeitet, könnte der Generator zustandsabhängig werden. Das zu prüfen – linear oder selbstreferentiell, Größe für Größe – ist ein klar umrissenes Programm und markiert die einzige Stelle, an der die offene/rekursive Variante echte, nicht wegrechenbare Arbeit leisten würde.

Q.11 Claim-State und Grenzen

Was gezeigt ist – und was nicht

1. **Echte Hilbertraum-Abbildung.** Der Massenoperator ist ein konkreter hermitescher Operator auf $\mathbb{C}^3$ mit Eigenvektoren (Generationen) und Spektrum (Massen) – keine Parametrisierung.
2. **Koide vorwärts.** $Q = 2/3$ folgt exakt aus $r = \sqrt{2}$; das ist Struktur, kein Fit.
3. **Zwei Zahlen, drei Massen.** $(\sqrt{2}, 2/9)$ reproduzieren beide Verhältnisse auf 4–5 Stellen; ein Winkel deckt zwei Observablen (eine echte Überbestimmung).
4. **Strukturannahmen.** Die *Form* (Z_3-Zirkulant) und $r = \sqrt{2}$ sind als geometrisch behauptet (Dok. 206/258/259).
5. **Empirisch ausgereizt.** $\theta = 2/9$ ist gegen die e/μ-Daten auf $\sim 2 \cdot 10^{-7}$ bestätigt (sieben Stellen im Winkel); die Verhältnisse stimmen auf 10^{-5} bis $6 \cdot 10^{-5}$, beim τ innerhalb der Messunsicherheit. Genauere Leptondaten sind nicht zu erwarten – die empirische Frage ist beantwortet. Der winzige Rest ($Q = 0{,}6666605$ vs. $2/3$) liegt auf der Ebene von Strahlungskorrekturen, kein Defekt der Identifikation.
6. **Die einzige offene Frage ist theoretisch:** wird $\theta = 2/9$ (wie $r = \sqrt{2}$) von der T^4/Z_3-Topologie erzwungen?
7. **Kein „jenseits Quantentheorie".** Der CP-Test (Ebene 1) zeigt Nicht-Markov in der reduzierten Dynamik; ein ausgespurtes unitäres Bad reproduziert es.

Der scharfe, jetzt erreichbare Rest ist damit präzise: nicht „eine krumme Zahl herleiten", sondern die eine klare Frage – **wird $\theta = 2/9$ von der T^4/Z_3-Topologie erzwungen, so wie $2/3$?** Eine einzige Rationalzahl, kein Leiter-Fit.

Topologie rahmt, Dynamik bestimmt – die schon richtige Lesart. Die Antwort, die hier trägt, war im Kern immer schon die dynamische: ein Massenverhältnis ist *nur* dynamisch denkbar. Das Spektrum $\sqrt{m_k}$ ist die Lösung eines Eigenwertproblems, und der Fixpunkt $\mathscr{R}(\Phi_*) = \Phi_*$ (Dok. 203) ist *beides zugleich*: die Topologie (Z_3, T^4) legt die *Form* fest, die Selbstkonsistenz den *Wert*; trennen lässt sich das nicht. Ein gerechneter Befund (`kann_topologie_2_9_erzwingen.py`) *stützt* genau diese Lesart: $\theta = 2/9$ *rad* ist keine statische Fluss-Einheitswurzel – $\theta/2\pi = 1/(9\pi)$ ist irrational, nach Lindemann-Weierstrass ist $e^{i\theta}$ transzendent. Eine *rein kombinatorisch-abzählende* Topologie (Fluss-Quantisierung einer endlichen Gruppe) liefert daher nur die *Spacing* $2\pi/3$ (Z_3, den Nenner; $Q = 2/3$ ist für *jedes* θ allein durch $r = \sqrt{2}$ erzwungen), nicht den Offset. Das stellt aber *nicht* Topologie gegen Dynamik: Transzendenz-in-2π ist hier *kein Verbot*, sondern das *erwartbare* Merkmal einer dynamisch (statt abgezählt) bestimmten Größe – ein abgezählter Wert wäre eine Einheitswurzel, ein dynamisch eingestellter ist es typischerweise nicht. Richtig gestellt lautet die offene Frage daher: die Topologie rahmt (Z_3-Spacing, die Form), eine *dynamische* Bedingung auf dieser Bühne fixiert den Offset – und *welche* Bedingung genau $\theta = 2/9$ erzeugt, ist der harte,

noch offene Kern. Ausgeschlossen ist allein die reine Abzähl-Topologie, nicht die topologisch gerahmte Dynamik (der Fixpunkt selbst). *(Randnotiz:* der Wert $2/9$ tritt im Korpus auch als dimensionslose Mode-Locking-Rotationszahl auf, Dok. 286; diese ist mit dem Radiant-Winkel θ *nicht* dimensionsgleich – $2\pi \cdot 2/9 = 4\pi/9 \neq 2/9$ –, die Identifikation bleibt offen.)

Warum $2/9$ nicht symmetrisch zu haben ist (der $\cos 3\theta$-Satz). Es gibt einen exakten Grund, warum kein einfaches *symmetrisches* Prinzip $\theta = 2/9$ liefert (`einfachstes_prinzip_2_9.py`). Die gesamte θ-Abhängigkeit der Massenkonfiguration $a_k = 1 + \sqrt{2}\cos(\theta + 2\pi k/3)$ läuft *nur* über $\cos 3\theta$: die elementarsymmetrischen Funktionen sind $e_1 = 3$ und $e_2 = 3/2$ (beide θ-unabhängig), nur $e_3 = \det = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\cos 3\theta$ trägt θ. Also extremiert *jede* Z_3-invariante Größe ausschließlich bei $3\theta = n\pi$, d. h. $\theta = n\pi/3$ – den Z_3-symmetrischen Punkten $\{0, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \dots\}$. Konkret wählen das kleinste-Nenner-, das breiteste-Zungen- und das Spektral-Determinanten-Prinzip alle $1/3$ oder $1/2$, nie $2/9$. Der Grund ist ein Struktursatz, kein Rechenmangel: *symmetrische Funktionale können asymmetrische Werte nicht als Extrema haben*, und $\theta = 2/9$ rad liegt bei rund $21\,\%$ des Weges zwischen 0 und $\pi/3$, irreduzibel Z_3-brechend. Damit ist das Einfachheitsprinzip nicht widerlegt, sondern verschoben: nicht *einfachster symmetrischer Bruch* ($= 1/3$), sondern *minimal symmetriebrechender Wert* – und der Holonomie-Test (Dok. 286) zeigt, dass $2/9$ genau das ist: das einzige Glied der 9er-Familie, das unter der Holonomie als Singulett abspaltet ($1/9, 4/9$ bleiben gepaart). Die Einfachheit sitzt im *Brechen*, nicht im symmetrischen Grundzustand; präzise offen bleibt allein das definierte symmetriebrechende Maß, dessen Minimum $2/9$ (statt $1/9$ oder $4/9$) ergibt.

Test: das Brechen erreicht $2/9$, fixiert es aber nicht. Ein direkter Test (`symmetriebrechung_2_9.py`) koppelt das zweite Triplett $3'$ der Verdopplung ($6 = 3 \oplus 3'$, Dok. 285) mit Stärke δ und relativer Phase χ an und sucht das verschobene Extremum θ^* der Massenkonfiguration. Ergebnis: das Brechen *erreicht* $\theta^* = 2/9$ – es ist also nicht nur nötig, sondern hinreichend –, aber bei einer Stärke δ, die durchgestimmt werden muss ($\delta \approx 0{,}52$ bei $\chi = 0$, $0{,}24$ bei $\chi = \pi/2$) und mit keinem unabhängig festgelegten Wert (ξ, $1/\sqrt{2}$, $1/\varphi$, $1/3$) zusammenfällt. Damit ist $2/9$ über dieses Funktional *erreichbar, aber nicht punkt-hergeleitet*: die Brechungsstärke bleibt ein freier Modulus – konsistent mit der Transzendenz und der freien Holonomie-Phase. Die offene Frage ist damit präzise verschoben – nicht mehr „warum $2/9$", sondern *was die Stärke der Z_3-Brechung festlegt*. *(Caveat:* dies ist *ein* natürliches Brechungs-Funktional; es schließt nicht aus, dass ein anderes δ unabhängig bindet – etwa die Selbstkonsistenz des Fixpunkts mit den festen Lepton-Exponenten, Dok. 203.)

Der gemeinsame Grund: alles Determinierte ist radial, θ ist angular. Genau dieser Fixpunkt-Weg wurde geprüft (`fixpunkt_radial_vs_winkel.py`) – und er bindet θ nicht. Der Fixpunkt $\mathcal{R}(\Phi_*) = \Phi_*$ (Dok. 203) mit der Bedingung $\xi_0^{p_i - 1} K_{\text{frak}} = 1$ und den Exponenten $(3/2, 1, 2/3)$ legt ξ_0 nicht fest (die drei Exponenten liefern kein gemeinsames ξ_0, in keiner Lesart $4/30000$; vgl. Dok. 203); θ kommt darin *nicht* vor. Radialer Sektor (ξ_0, Hierarchie) und Winkel-Sektor (θ, Q) sind entkoppelt: ξ_0 ist θ-frei, $Q = 2/3$ ist

ξ_0-frei. Dasselbe Muster trägt die ganze Untersuchung: *alles, was FFGFT determiniert, ist radial* – ξ, die Exponenten, die Hierarchie, $Q = 2/3 = r{=}\sqrt{2}$, der Mittelwert $\langle f \rangle$ der fraktalen Korrekturfunktion in $g = \eta(1 + \xi f)$ (keine Frequenz, nicht die Grundwindungszahl $f = 1/\xi$) –, und *alles Offene ist angular* – $\theta = 2/9$, die Holonomie-Phase, die Harmonischen-Phasen von f, die Brechungsstärke δ. Fixpunkt, Dualität, Rekursion und der Torus-Abzähl-Apparat leben ausnahmslos im radialen Sektor; keiner berührt den Winkel. Das ist der gemeinsame, strukturelle Grund, warum $\theta = 2/9$ jedem Werkzeug widersteht. Um den Offset zu fixieren, braucht es ein *angulares* Prinzip – eine dynamische Winkelbedingung –, das FFGFT bisher nicht besitzt und das nach dem Transzendenz-Befund kein abzählendes/topologisches sein kann.

Auch nicht statisch-geometrisch – der Abschluss der Elimination. Bleibt die Frage, ob das angulare Prinzip ein *fester geometrischer Winkel* der gemeinsamen ikosaedrischen Bühne ist, auf der FFGFTs 3-Zähligkeit (C_3) und HLVs 5-Zähligkeit (C_5) koexistieren ($C_3 < A_5$, Dok. 283). Geprüft (`ikosaeder_winkel_2_9.py`, streng, Trefferschwelle $0{,}05^\circ$): die Ikosaeder-Achsenwinkel sind $20{,}9^\circ$, $31{,}7^\circ$, 36°, $37{,}4^\circ$, $41{,}8^\circ$, $54{,}7^\circ$, $58{,}3^\circ$, 60°, $63{,}4^\circ$, $69{,}1^\circ$, $70{,}5^\circ$, 72°, $79{,}2^\circ$, 90°. $\theta = 2/9$ rad $= 12{,}73^\circ$ trifft *keinen* (nächster $20{,}9^\circ$, Abstand $8{,}2^\circ$), ebensowenig 2θ oder $\theta/2$. Kontrolle: $\arccos(1/\sqrt{5}) = 63{,}43^\circ$ trifft den C_5–C_5-Winkel *exakt* – die Methode ist korrekt, das Nein also echt. (Auch Koides 45° ist kein Achsenwinkel: FFGFTs Winkelstruktur ist nicht die Ikosaeder-Geometrie.) Damit ist die Elimination abgeschlossen: $\theta = 2/9$ ist *nicht* symmetrisch ($\cos 3\theta$-Satz), *nicht* abzählend-topologisch (Transzendenz), *nicht* radial (Fixpunkt), *nicht* statisch-geometrisch (diese Rechnung). Übrig bleibt genau *eine* Kategorie – die *dynamische schief-adjungierte Phase* R (Dok. 283), ein akkumulierter, Berry-artiger Winkel. FFGFTs eigene Rekursion $\mathscr{R}$ (Dok. 203) ist rein reell und besitzt keinen solchen Generator; ihn trägt allein die HLV-Seite (R = BD17A). Die statisch-radiale FFGFT-Seite ist für θ damit *nachweislich erschöpft*; das angulare Prinzip ist strukturell HLVs dynamische R, mit präziser Zielvorgabe: ein akkumulierter angularer Phasenwinkel, der $\theta = 2/9$ liefert – transzendent in 2π, Z_3-brechend, das Singulett der 9er-Familie.

Q.12 Fazit

Fazit

Die Hilbertraum-Übersetzung von FFGFT reicht weiter als bisher gezeigt. Ebene 0 bildet die QM-Operationen sauber ab (gemeinsam mit HLV). Ebene 1 bringt die Zeit als Prozess (CP-Teilbarkeit, Nicht-Markovianität). Ebene 2 bringt die Zeit als Geometrie und damit die *Massen*: der Massenoperator ist ein hermitescher Z_3-Zirkulant auf der $\mathbb{C}^3$-Faser, dessen Spektrum die Lepton-Massen aus zwei reinen Zahlen $\sqrt{2}$ und $2/9$ liefert – Koide exakt, beide Verhältnisse auf 4–5 Stellen, ohne den alten gefitteten Koeffizienten. $2/9 = 2/3^2$ ist eine Strukturzahl auf der Stufe von ξ, eine Grundbedingung des fraktalen Raumes. Das ganze Leptonenproblem ist damit auf eine einzige Frage eingedampft – und diese ist durch die Untersuchung dieses Dokuments *angular* geworden: nicht, *ob* T^4/Z_3 den Winkel erzwingt (keine Abzähl-Topologie kann es, $2/9$ ist transzendent

in 2π), sondern welches *dynamische* Winkelprinzip ihn liefert. Die Elimination zeigt: alles Determinierte ist radial (ξ, Hierarchie, $Q = 2/3 = \sqrt{2}$), allein der Offset $2/9$ ist offen – strukturell HLVs schief-adjungierte dynamische Phase R.

Schlussbemerkung: Übersetzung ist nicht Begründung. Vereinfacht lässt sich das Ergebnis dieser Erweiterungen in einem Satz bündeln: *Eine treue Übersetzung in die Hilbertraum-Schreibweise ist für alle Massen und alle Konstanten möglich – aber gerade weil sie treu ist, liefert sie keine Begründung.* Die Treue ist mathematisch eine Bijektion: drei Massen entsprechen umkehrbar eindeutig dem Tripel (M, r, θ), α ist eine Eigenwert-Relation desselben Operators, G folgt über dieselbe Skala $1/\tilde{T}$. Eine Bijektion trägt jedoch *alles* hinüber und erklärt *nichts*; sie ist ein Koordinatenwechsel, keine Herleitung. Dass sich eine Größe „im Hilbertraum rechnen lässt" ist deshalb nie ein eigenständiger Befund – es ist die Bedeutung von Treue.

Die Begründung kommt aus der ursprünglichen T^4-Torus-Darstellung, die generativ vorgeordnet ist (Dok. 206/270): der Hilbertraum ist das *Bild*, der Torus das *Original*. Erst dort sind $\sqrt{2}$ (die Koide-Bedingung $Q = 2/3$), der Winkel $2/9$ und das Primitiv ξ *geometrische bzw. topologische Tatsachen* und keine abgelesenen Parameter. Die saubere Arbeitsteilung lautet also: der Hilbertraum *rechnet und stellt dar* (universell – Leptonen, Quarks, α, G); das T^4 *begründet und leitet her*. Selbst dort, wo die Übersetzung *keine* reinen Zahlen liefert – bei den Quarks –, ist das kein Mangel der Übersetzung, sondern Ausdruck dessen, dass die Torus-Geometrie dort keine erzwingt. Die offene Frage des ganzen Aufbaus ist somit eine einzige, und sie ist auf der Torus-Seite zu stellen: ob T^4/Z_3 die reinen Zahlen $\sqrt{2}$, $2/9$ und ξ erzwingt.

Begleitende Skripte (numpy). `ffgft_t4_cp_divisibility.py` (Ebene 1, CP-Teilbarkeit), `ffgft_t4_mass_operator.py` (Z_3-Kreis-Analyse, KK-Vergleich), `ffgft_mass_operator_C3.py` (der Massenoperator auf $\mathbb{C}^3$), `ffgft_z3_alle_sektoren.py` (alle drei Sektoren als Operator-Spektrum), `ffgft_kopplungen_hilbertraum.py` (α und G über die Hilbertraum-Abbildung), `ffgft_qm_uebersetzung_erweiterung.py` (Masse-/Zeit-Erweiterung der QM-Übersetzung).

Kapitel R

Dok. 283 — FFGFT ↔ HLV: die Brücke und die Gabelung

Abstract

Marcel Krügers HLV baut den Raum als ikosaedrischen 6D→3D-Cut-and-Project-Quasikristall. Ob FFGFT und HLV verbunden sind, wird hier streng nach dem Drei-Teile-Kriterium geprüft: (1) dasselbe strukturelle Objekt aus der *eigenen* Geometrie jedes Modells, (2) eine explizite Abbildung zwischen den Herleitungen, (3) ein Divergenzpunkt, der bloßes Stufe-0-Gerüst ausschließt. Befund: Ein Z_3-Zirkulant – der Typ von FFGFTs Massenoperator – lebt nachweislich in HLVs eigener Geometrie, entlang einer C_3-Achse der Ikosaedergruppe (Kriterien 1+2 erfüllt). Die innere Invariante aber divergiert *fundamental*: HLVs geschützte Struktur liefert rigide $r = 2/\sqrt{5}$ (5-zählig, φ), FFGFT verlangt $r = \sqrt{2}$ (3-zählig, Koide $Q = 2/3$). Kein Cut-and-Project-Parameter erreicht $\sqrt{2}$ ($r(\tau) \leq 1$ für alle τ); $\sqrt{2}$ taucht in HLV nur als ungeschützter Zufallswinkel auf. Ergebnis: eine *genuine* Verbindung mit einer *fundamentalen* Gabelung an der Symmetrie-Ordnung – keine Stufe-0-Trivialität, keine Identität. Die Gabelung sitzt im *Raum*: HLVs Phasen-Schicht ist sein Spiral-Time-Operator (nicht $\theta = 0$), und auf der Zeit/Gedächtnis-Ebene sind HLVs χ-Kern und FFGFTs Dok.-282-Kern nicht-Markovsche Kerne derselben Klasse – ein Brücken-Kandidat (§ 8). Alle geometrischen Aussagen sind mit `ffgft_hlv_c3_bridge_probe.py` reproduzierbar.

R.1 Anlass und Kriterium

Der Austausch mit Marcel Krüger (HLV/HICE) wirft wiederholt die Frage auf, ob FFGFT und HLV verbunden sind. Eine ehrliche Antwort braucht ein scharfes Kriterium, sonst landet man bei Scheinverbindungen, die nur gemeinsames Gerüst teilen (beide benutzen Planck-Einheiten, beide haben irgendwo eine Wurzel). Das Kriterium hat drei Teile:

1. **Gleiches Objekt:** dasselbe strukturelle Objekt, hergeleitet aus der *eigenen* Geometrie jedes Modells – nicht aus geteiltem Skalengerüst.
2. **Abbildung:** eine explizite Abbildung zwischen den beiden Herleitungen.

3. **Divergenzpunkt:** ein Punkt, an dem sich die Modelle trennen – sonst ist die „Verbindung“ entweder triviale Identität oder Stufe-0-Gerüst.

Dieses Dokument wendet das Kriterium konkret an. Es behauptet keine theoretische Äquivalenz; es lokalisiert präzise, *wo* sich FFGFT und HLV treffen und *wo* sie auseinanderlaufen.

R.2 Wie Marcel seinen Raum baut

Aus dem HLV-Homologie-Skript (Dok. 271/276) ist die Konstruktion direkt lesbar: ein **ikosaedrischer 6D→3D-Cut-and-Project-Quasikristall**. Ein $\mathbb{Z}^6$-Gitter wird über zwei Projektoren in einen 3D-Parallelraum (physisch) und einen 3D-Senkrechtraum (die „hidden layer“) zerlegt; ein Akzeptanzfenster im Senkrechtraum wählt aus, welche Gitterpunkte in den physischen Quasikristall projizieren. Krügers exakter Projektor:

$$P(\tau) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & \tau & \tau \\ \tau & \tau & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \tau & \tau & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{(Spalten normiert)},$$

mit $\tau = \varphi$ (golden) im Parallelraum und $\tau = \sigma = -1/\varphi$ im Senkrechtraum. Die sechs Spalten sind die sechs ikosaedrischen Fünfachsen (eine pro Antipodenpaar). Innere Symmetrie: ikosaedrisch (5-zählig); das Punktset ist aperiodisch. Auffällig für eine Brücke: der versteckte Raum ist *3D* – dieselbe Dimensionszahl wie FFGFTs Generationenfaser $\mathbb{C}^3$.

R.3 Das gemeinsame Objekt: ein Z_3-Zirkulant auf der C_3-Achse

Die Ikosaedergruppe enthält C_3-Achsen. Die zyklische Koordinaten-Abbildung $(x, y, z) \mapsto (z, x, y)$ ist eine Drehung der Ordnung 3; sie zerlegt Krügers sechs Spalten in zwei 3-Zyklen, $\{c_1, c_3, c_5\}$ und $\{c_2, c_4, c_6\}$. Die Gram-Matrix eines solchen C_3-Orbits ist – durch die C_3-Symmetrie erzwungen – ein *exakter reeller Z_3-Zirkulant*, genau der Typ von FFGFTs Massenoperator $S = \mathrm{circ}(t_0, t_1, t_2)$ auf $\mathbb{C}^3$:

$$G_{\text{orbit}} = \mathrm{circ}\left(1,\ \tfrac{1}{\sqrt{5}},\ \tfrac{1}{\sqrt{5}}\right) \quad (\tau = \varphi,\ \text{normiert}),$$

mit $r = 2g_1/g_0 = 2/\sqrt{5} \approx 0{,}894$ und Phase $\theta = 0$ (reell). Der Senkrechtraum ($\tau = \sigma$) gibt $r = -2/\sqrt{5}$. Geschlossene Form: $|r| = 2|\tau|/(1+\tau^2)$, und für $\tau = \varphi$ kürzt sich φ exakt zu $2/\sqrt{5}$ heraus ($1 + \varphi^2 = \sqrt{5}\,\varphi$).

Kriterien 1 und 2 erfüllt

Ein Z_3-Zirkulant lebt *innerhalb* von HLVs eigener ikosaedrischer Geometrie – nicht aufgesetzt, sondern als Gram-Matrix eines C_3-Orbits. Das ist dasselbe Objekt wie FFGFTs Massenoperator (Kriterium 1). Die Abbildung ist explizit

(Kriterium 2): FFGFTs Z_3-Generationensymmetrie ↔ eine C_3-Achse von HLVs Ikosaedergruppe, mit dem Orbit $\{c_1, c_3, c_5\}$ als Bild.

R.4 Die Gabelung: 5-zählig gegen 3-zählig

Der Divergenzpunkt (Kriterium 3) ist scharf und, wie drei Checks zeigen, *fundamental* – nicht durch einen Parameter zu schließen.

Nur $1/\sqrt{5}$. Alle 6×6 Skalarprodukte von Krügers Spalten haben *einen einzigen* Betrag: $1/\sqrt{5}$. Die 5-zählige Geometrie kennt nur den Winkel $\arccos(1/\sqrt{5}) \approx 63{,}4°$; den $45°$-Winkel ($\cos = 1/\sqrt{2}$), den FFGFT braucht, gibt es zwischen den Vakuumrichtungen nicht. Jeder geschützte 3-Orbit liefert also $r = 2/\sqrt{5}$.

Kein τ erreicht $\sqrt{2}$. Die geschlossene Form $r(\tau) = 2\tau/(1+\tau^2)$ ist für *jedes* τ durch 1 gedeckelt (Maximum bei $\tau = 1$, kubisch). FFGFT verlangt $r = \sqrt{2} \approx 1{,}414 > 1$ – das liegt *außerhalb* der erreichbaren Spanne von Krügers Konstruktion, für jeden Parameter.

$\sqrt{2}$ braucht 3-Zähligkeit. In einer allgemeinen 3-zähligen Geometrie (zyklische Basis (a, b, c), $r = 2(ab + bc + ca)/(a^2 + b^2 + c^2)$) ist $\sqrt{2}$ sehr wohl erreichbar, z. B. $v = (1, 1, \sqrt{2} - 2^{1/4})$. FFGFTs Koide-Punkt (circ$(1, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$, Eigenwerte $0{,}29/0{,}29/2{,}41$, positiv semidefinit) ist also geometrisch legitim – er verlangt nur eine *3-zählige* Spalte, nicht Krügers 5-zählige.

	r	θ	Koide Q	Quelle
HLV (geschützt)	$2/\sqrt{5} = 0{,}894$	0	$7/15$	5-zählig / φ
FFGFT (Massenop.)	$\sqrt{2} = 1{,}414$	$2/9$	$2/3$	3-zählig / Koide

R.5 Geschützt gegen generisch: kein Schlupfloch

Ein Einwand bleibt: der HLV-Quasikristall hat tausende projizierte Punkte – könnte ein C_3-Orbit *irgendeines* Punkts zufällig $\sqrt{2}$ treffen? Bei 9822 projizierten Punkten im Akzeptanzfenster füllen die C_3-Orbit-Verhältnisse g_1/g_0 tatsächlich das ganze Kontinuum $[-\frac{1}{2}, 1]$, und $1/\sqrt{2}$ ist 150-mal darunter.

Ein generischer Treffer beweist nichts

Dass generische projizierte Punkte bei *jedem* Winkel sitzen – auch bei $1/\sqrt{2}$ –, gilt für jedes dichte 3-zählige Punktset, sogar für ein kubisches. Das ist die Stufe-0-Trivialität: man pickt eine *ungeschützte* Richtung mit dem passenden Winkel. Die *symmetriegeschützten* Orbits – Krügers sechs Vakuumrichtungen – geben dagegen rigide nur $\pm 1/\sqrt{5}$. $\sqrt{2}$ ist in HLVs geschützter Struktur nicht vorhanden; es erscheint nur als bedeutungsloser Zufallswinkel.

R.6 Die Brücke ist Enthaltensein, kein Widerspruch

Die obige Gabelung ist eine Aussage über den *geschützten* Invarianten; sie darf nicht so gelesen werden, als wären die beiden Modelle unvereinbare Realitäten. Auf der Ebene der Gruppen und Dimensionen sind sie durch *Enthaltensein* vereinbar. Die Ikosaedergruppe enthält die 3-Zähligkeit: $C_3 < A_5$ – eine 120°-Drehung um eine $(1,1,1)$-Achse und eine 72°-Vertex-Drehung sind *beide* Symmetrien desselben Ikosaeders – und $T^7 = T^4 \times T^3$ ($7 = 4 + 3$). Also HLV $\supset$ FFGFT: HLV ist FFGFTs 4D-Kern, erweitert um die drei Perp-Kreise und die volle 5-Zähligkeit. Was die Gabelung also belegt, ist keine Unverträglichkeit, sondern die *realisierte geschützte Geometrie*: FFGFT schützt eine unabhängige 3-zählige Spalte ($\sqrt{2}$, Koide $2/3$), HLV die 5-Zähligkeit ($2/\sqrt{5}$), und $\sqrt{2}$ ist nicht unter HLVs geschützten Richtungen (es erscheint nur als ungeschützter Zufallswinkel, voriger Abschnitt). Die Modelle teilen das ambiente $3{+}1$ und sind gruppen-/dimensionsmäßig vereinbar, realisieren aber verschiedene geschützte Struktur – das ist der empirisch entscheidbare Unterschied, kein Koordinaten-Artefakt und keine logische Unverträglichkeit. Gerechnet in Dok. 285 (`recompute_reconcile.py`, `dim_bridge_1..3`).

Wo dies behauptet wird. Dies alles lebt im kompaktifizierten Bild — die Tori mit allen Kreisen kompakt, wo kein Kreis als Zeit ausgezeichnet ist. Die Brücke zu physikalischen, dekompaktifizierten Observablen läuft über den einen Schritt $S^1 \to \mathbb{R}$, den Messvorgang (Dok. 270); das Enthaltensein wird also vor dem Messvorgang, im kompakten Zustand, behauptet — nicht auf der physikalischen Zeitachse.

R.7 HLV ist die dekompaktifizierte Variante: Masse und Zeit nur durch den Zusatz

Eine Schicht der Gabelung liegt noch tiefer als die Symmetrie-Ordnung und ist leicht zu übersehen. HLVs Cut-and-Project projiziert in einen unendlichen, aperiodischen $\mathbb{R}^3$ – es ist die *dekompaktifizierte* Variante. FFGFTs Raum ist dagegen *kompakt* (T^4). Das ist nicht kosmetisch: Masse und Zeit sind in FFGFT intrinsisch, weil die Kompaktheit die Moden quantisiert – das ist die Zeit-Masse-Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$. Ohne Kompaktheit keine Modenquantisierung, also *kein intrinsischer Massenmaßstab und keine Zeit*. Genau deshalb ist HLVs geschützte *räumliche* Struktur rein geometrisch: eine reelle Gram-Metrik mit $\theta = 0$ und dimensionslosen Winkeln. Der intrinsische *Massen*maßstab fehlt, weil die dekompaktifizierte Variante keine Modenquantisierung hat; er kommt, wie schon in Dok. 282 festgehalten, erst *durch den Zusatz*. Wichtig ist aber: dieses $\theta = 0$ ist die räumliche Metrik, *nicht* HLVs Zeit. HLV ist nicht zeit- oder phasenlos – seine Zeit sitzt in den nativen Spiral-Time-Operatoren (§ 8), die der räumliche Gram gar nicht erfasst. Der C_3-Probe hat nur die Geometrie gesehen, nicht die Dynamik.

Das schärft Kriterium 1. Der gemeinsame Z_3-Zirkulant ist nur *algebraisch* gleich (dieselbe zyklische Form). Physikalisch ist er verschieden: in HLV (dekompaktifiziert) eine *räumliche Metrik* ohne Masse und Zeit, in FFGFT (kompakt) der *Massenoperator* mit Masse und Zeit intrinsisch. Die Brücke trägt die Form, nicht den Inhalt.

Die Gabelung hat drei Schichten

Schicht	HLV	FFGFT
Kompaktheit	dekompaktifiziert (Metrik)	kompakt ($\tilde{T}\cdot m = 1$)
Symmetrie-Ordnung	5-zählig (φ, $1/\sqrt{5}$)	3-zählig ($\sqrt{2}$)
Phase	Spiral-Time: schief-adj. R (dyn., § 8)	skalar, $\theta = 2/9$

Die oben geforderte komplexe Holonomie ($\theta = 2/9$, FFGFT) ist die *operationale Folge* der Kompaktheit: Masse und Phase entstehen dort durch die quantisierten Moden. Die HLV-Spalte der Phasen-Zeile ist dabei subtiler als ein bloßes $\theta = 0$ – das war die *räumliche* Gram-Metrik; HLVs eigene Zeit-Phase sitzt im schief-adjungierten Spiral-Time-Operator R (§ 8). Eine vollständige Rekompaktifizierung von HLV muss diese Operatoren *mit-integrieren*, nicht nur den Raum periodisieren – ein kompaktes HLV ist zudem kein Quasikristall mehr.

R.8 Eine kompaktifizierte Variante von HLV: der rationale Approximant

Lässt sich diese Rekompaktifizierung konkret durchführen, um den Vergleich fair zu machen? Ja – mit einem etablierten Begriff der Quasikristall-Physik, dem *rationalen Approximanten*. Man ersetzt das irrationale φ im Projektor durch rationale Fibonacci-Verhältnisse $\tau_n = F_{n+1}/F_n$ $(1, 2, \frac{3}{2}, \frac{5}{3}, \frac{8}{5}, \ldots \to \varphi)$. Bei rationalem $\tau = p/q$ wird der physische Projektor nach Multiplikation mit q *ganzzahlig* – die Projektion von $\mathbb{Z}^6$ landet auf einem skalierten Ganzzahlgitter $(1/q)\mathbb{Z}^3$, also auf einem *periodischen Kristall* auf T^3. Bei irrationalem φ gibt es keinen solchen Faktor; das Punktset bleibt dicht und aperiodisch. Das ist der präzise Sinn von „kompaktifiziertes HLV" – und es ist, wie § 6 schon sagte, kein Quasikristall mehr, sondern sein periodischer Kristall-Approximant.

Der Approximant ist periodisch, hat also diskrete Moden – ein *Massenmaßstab wird möglich*. Damit ist die tiefste Schicht der Gabelung (Kompaktheit) geschlossen: HLV liegt jetzt im selben Regime wie FFGFT. Das C_3-Verhältnis konvergiert dabei:

$\tau = F_{n+1}/F_n$	r (C_3)	Koide Q
$2/1$	$0{,}800$	$0{,}440$
$5/3$	$0{,}882$	$0{,}463$
$13/8$	$0{,}893$	$0{,}466$
$\to \varphi$	$0{,}894 = 2/\sqrt{5}$	$7/15$

Aber der Approximant erbt HLVs 5-Zähligkeit: $r \to 2/\sqrt{5}$, Koide $\to 7/15$; die *räumliche* Metrik bleibt reell ($\theta = 0$). Damit divergiert die Symmetrie-Ordnung weiter. Die Phasen-Schicht jedoch ist mit „$\theta = 0$" nicht erledigt: der rein räumliche Approximant rekompaktifiziert nur den Raum; HLVs Zeit-Phase liegt in den Spiral-Time-Operatoren, die er noch integrieren muss (§ 8).

Die Gabelung übersteht den fairen Vergleich

Mit dem Approximanten ist der Vergleich *kompakt gegen kompakt* und damit fair. Er bestätigt die Gabelung: *selbst kompaktifiziert* gibt HLV Koide $7/15$, nicht FFGFTs $2/3$. Die Divergenz war also *kein Kompakt/Dekompakt-Artefakt* – sie sitzt echt in der 5- gegen 3-Zähligkeit. Man kann HLV kompaktifizieren; der Befund hält.

R.9 Was die Kompaktifizierung integrieren muss: HLVs Spiral-Time

Der Approximant aus § 7 rekompaktifiziert HLVs *Raum*. Aber HLV ist nicht rein räumlich: seine definierende Dynamik sind die nativen 6D-*Spiral-Time*-Operatoren

$$\Psi(t) = t + i\,\phi(t) + j\,\chi(t), \tag{R.1}$$

mit $\phi(t)$ als Phasen-/Kohärenzkanal und $\chi(t)$ als Gedächtnis-/Hysteresekanal (Krüger, Zenodo 20668125 und 20512650). Eine kompaktifizierte Variante, die HLV *bleiben* soll, muss diese Operatoren integrieren – der rein räumliche Approximant tut das noch nicht. Das korrigiert die Phasen-Schicht der Gabelung.

Krüger wendet Ψ nicht direkt an (das ergäbe hyperkomplexe Felder), sondern über eine *konservative Übersetzung* in zwei reelle Operatoren:

Kanal	wird zu	Anforderung
ϕ (Phase)	Phasen-/Vortizitätsordnung	schief-adjungierter Generator R (energie-neutral)
χ (Memory)	Geschichtsabhängigkeit	positiv-typiger Kern K (dissipativ)

mit Exponentialbeispiel $K_\tau(t) = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau}$, das auf eine interne Variable reduziert. Daraus folgt dreierlei:

1. **Die Phasen-Schicht ist nicht $\theta = 0$.** Das $\theta = 0$ aus § 3 ist die *räumliche* Gram-Metrik, nicht HLVs Zeit. HLVs Phase sitzt im schief-adjungierten Operator R, dynamisch getrieben von $\dot{\phi}(t)$. Die Schicht lautet also richtig: *dynamische Operator-Phase* R (HLV) gegen *feste skalare Phase* $\theta = 2/9$ (FFGFT) – nicht phasenfrei gegen phasenbehaftet.
2. **Die Zeit/Gedächtnis-Schicht ist ein echter Brücken-Kandidat.** HLVs χ-Kanal ist ein positiv-typiger, nicht-Markovscher Gedächtniskern $\int_0^t K(t-s)\,u(s)\,ds$. FFGFTs Zeit-Erweiterung in Dok. 282 ergibt einen Gedächtniskern als Fourier-Transformierte der diskreten Spektraldichte $\sum_k g_k^2\,\delta(\omega - \omega_k)$ – nicht-Markovsch mit *Rückfluss und Revivals*, also ein *diskret-spektraler, oszillierender* Kern (Exponential-Grenzfall $\to$ interne Variable). Das ist nicht ganz dieselbe Gestalt wie HLVs χ im Fluid-Sektor, der ein *positiver abklingender* Kern ist (Krügers Navier-Stokes-Erweiterung, Zenodo 20512650): beide nicht-Markovsch und positiv-typig, aber verschiedener Form. Wo der Raum forkt (5- gegen 3-zählig), stehen sich auf der Zeit-Ebene zwei Kerne derselben *Klasse* (nicht-Markovsches positives Gedächtnis) gegenüber: *räumliche Gabelung, möglicher χ-Gedächtnis-Brücke*.

3. **Zwei ehrliche Grenzen.** Erstens: Die $i \cdot j$-Produktrelation der Spiral-Algebra ist in *keiner* Quelle Krügers (Dok 271, FA-Hub, Navier-Stokes) festgelegt – sie wird stets über die Operator-Übersetzung umgangen. Der Phasenvergleich ist deshalb *operator-*, nicht algebra-seitig zu führen; ob die Operator-Phase R FFGFTs $2/9$ trifft, lässt sich erst mit einer expliziten R-Spezifikation entscheiden. Zweitens: Krüger selbst hält fest, dass viele gewöhnliche reduzierte Modelle Gedächtnis erzeugen; die HLV-Deutung sei nur eine Kandidaten-Modellklasse, keine demonstrierte Ontologie (Run M1: HLV-Kern schlägt schwache Nulls, ist aber auf dem *überdämpften* Beobachtungssektor von einem generischen Biexponential statistisch *nicht unterscheidbar* – HLV nur per Parsimonie/BIC bevorzugt). Die χ-Brücke ist also *strukturelle Verwandtschaft*, kein Eindeutigkeitsanspruch – konsistent mit Dok. 276/281 (auch φ ist nicht spezifisch). Das hängt am Sektor: FFGFTs diskret-spektraler Kern trägt im *Kohärenz-/Revival-Sektor* eine Signatur (BLP-Rückfluss $5{,}125$), die jeder *abklingende* Kern verfehlt – die Eindeutigkeit gegen andere *strukturierte* Kerne bleibt aber offen.

Die drei Ebenen sind nicht gleich stark

Liest man die Verbindung nach physikalischer Ebene – Raum, Zeit, Masse – so sind die drei *nicht* gleichwertig, und das ist methodisch entscheidend:

- **Masse (Z_3-Zirkulant):** die *genuine* Brücke – aus jeder Geometrie eigenständig hergeleitet, mit expliziter C_3-Abbildung und echtem Divergenzpunkt. Sie allein besteht das Drei-Teile-Kriterium vollständig.
- **Zeit (χ-Gedächtnis):** *strukturelle Verwandtschaft*, Kandidat – nicht HLV-eindeutig (Run M1: auf dem überdämpften Sektor ist ein generischer Biexponential *ununterscheidbar*; HLV nur per Parsimonie bevorzugt). Bridge-Kandidat, kein Eindeutigkeitsanspruch.
- **Raum (Connection-Laplace auf Faserbündel):** *geteilte Sprache*, keine Brücke. Dass beide ein Connection-Laplace auf einem faserwertigen Raum sind, gilt für *jede* Gitter-Eichtheorie – das ist Stufe-0-Gerüst, genau das, was das Kriterium ausschließt. Es darf nicht als tragende Verbindung gezählt werden, sonst bläht man die Verbindung in Richtung Trivialität auf.

Nur die Masse-Ebene ist also eine Brücke im Sinne des Kriteriums; die Zeit-Ebene ein ehrlicher Kandidat; die Raum-Ebene ein gemeinsamer Rahmen, nicht mehr.

R.10 Was übrig bleibt: hexagonal, nicht pentagonal

Streift man HLV die beiden Achsen ab, an denen es forkt – Symmetrie-Ordnung und Kompaktheit –, bleibt genau ein Bestandteil, der nicht schon FFGFT ist: die Spiral-Time. Ihre Operatoren (R, K) hängen weder an der 3- noch an der 5-Zähligkeit und überleben den Wechsel auf 3-zählig unverändert. *Was von HLV substanziell bleibt, ist also nicht eine Geometrie, sondern eine Zeit* – und genau dort, in der Dynamik, trifft sie FFGFTs nicht-Markovschen Kern aus Dok. 282. Der geometrische Rest –

die ikosaedrische 5-Zähligkeit – ist ein eleganter, aber physikalisch leerer Ast: kein Sektor realisiert ihn, und φ ist nicht spezifisch (Dok. 276/281).

Daraus folgt eine knappe geometrische Lehre. Die 5-Zähligkeit ist *nicht-kristallographisch* – sie parkettiert nicht periodisch und erzwingt die Dekompaktifizierung; die 3-Zähligkeit ist *kristallographisch*, aus derselben Familie wie die 6-Zähligkeit (Dreiecks-/Hexagonalgitter). Wo Geometrie die Massenstruktur trägt, ist sie damit hexagonal, nicht pentagonal – und das ist kein neuer Befund, sondern FFGFTs eigener Anker: das *Euler-Tonnetz* ist ein hexagonales Gitter (Dok. 275, „der Rahmen ankert im Euler-Tonnetz, nicht im Goldenen Schnitt“).

Die belastbare Form der These

„Hexagonal“ meint die kristallographische Familie (3-/6-zählig), nicht die Behauptung, die Raumzeit sei eine Hexagonal-Parkettierung – FFGFTs Basis bleibt T^4 mit Z_3-Generationensymmetrie. Empirisch 3-zählig bestätigt sind bisher allein die geladenen Leptonen; die Hadronen sind fast entartet ($Q \approx 1/3$), also weder 3- noch 5-zählig. Belastbar bleibt: *wo Geometrie die Massenstruktur trägt, ist sie hexagonal/kristallographisch; das Pentagonale bleibt ein eleganter, physikalisch leerer Ast; und was von HLV substanziell übrig bleibt, ist seine Zeit, nicht seine Geometrie.*

R.11 Fazit

Alle drei Teile des Kriteriums sind beantwortet. (1) Gleiches Objekt: ein Z_3-Zirkulant aus HLVs eigener Geometrie. (2) Abbildung: die C_3-Achseneinbettung von FFGFTs Z_3 in HLVs Ikosaedergruppe. (3) Divergenz: fundamental, und in drei Schichten – Kompaktheit (dekompaktifiziert/Metrik gegen kompakt/$\tilde{T}\cdot m = 1$), Symmetrie-Ordnung (5-zählig φ, $1/\sqrt{5}$ gegen 3-zählig Koide, $\sqrt{2}$) und Phase (HLVs dynamische Spiral-Time-Operator-Phase R gegen FFGFTs feste skalare $2/9$; § 8). Die Kompaktheit bleibt entscheidend für den *Massen*maßstab (ohne quantisierte Moden kein intrinsisches m); HLVs *Zeit* jedoch sitzt in der Spiral-Time, unabhängig davon. Kein Parameter von HLV erreicht FFGFTs geschützten Koide-Punkt – doch auf der Zeit/Gedächtnis-Ebene stehen sich beide nicht-Markovschen Kerne derselben Klasse gegenüber: *räumliche Gabelung, möglicher Zeit-Brücke* (§ 8).

Das ist genau, was das Kriterium liefern soll: eine *genuine* Verbindung – gemeinsame Z_3-Zirkulant-Familie, explizite C_3-Abbildung – *mit* einem echten Divergenzpunkt, und nachweislich *keine* Stufe-0-Trivialität (das Geschützte trennt sich, nur das Bedeutungslose fällt zusammen). FFGFT und HLV sitzen an zwei *verschiedenen* Punkten derselben Familie. Es ist eine *Gabelung*, kein Zusammenfall: gemeinsamer Stamm (Z_3-Zirkulant aus höherdimensionalem Gitter mit verstecktem Raum), zwei Äste je nach Symmetrie-Ordnung.

Für die Korrespondenz ist die Aussage präzise und fair: *Wir treffen uns im Z_3-Zirkulanten entlang deiner C_3-Achse; wir trennen uns, weil deine ikosaedrische 5-Zähligkeit rigide $1/\sqrt{5}$ erzwingt, während FFGFTs Koide-Bedingung 3-zählig $\sqrt{2}$ verlangt – und kein Parameter deiner Konstruktion überbrückt das.* Reproduzierbar mit `ffgft_hlv_c3_bridge_probe.py` (sechs Checks, numpy-only).

Kapitel S

Dok. 284 — Eine Formel-genaue Lesung des Spiral-Zeit-Neurodynamik-Modells

Kurzfassung

Dieses Dokument ist eine reproduzierbare, formel-genaue Lesung von *Information-Theoretic Modeling of Neural Coherence via Triadic Spiral-Time Dynamics: A Framework for Neurodynamic Collapse* (Krüger, Feeney & Wende, *Medinformatics* 2026, DOI 10.47852/bonviewMEDIN62029043). Jeder Befund wird von einem kurzen, lauffähigen Skript erzeugt. Die Lesung trennt, was trägt (ein interpretierbares Phasen-Abweichungsmerkmal; echte Oktonion-Nichtassoziativität), von dem, was falsch etikettiert ist (die Tripel-Algebra ist quaternionisch, nicht bikomplex), intern widersprüchlich (zwei unvereinbare Definitionen von $\Delta\Phi$), nicht hergeleitet (die $0{,}40$-Schwelle; die behaupteten Spiralen und Grenzzyklen) oder aus dem Papier nicht reproduzierbar (das berichtete $r \approx 0{,}96$). Darunter liegt *ein* grundlegendes Problem: der Operator $\psi(t) = t + i\varphi(t) + j\chi(t)$ ist auf der physikalischen, linearen Zeit als Basisachse aufgebaut – der dekompaktifizierten, nach-der-Messung-Koordinate – sodass sein Gedächtnis per Konstruktion generisch ist. Die FFGFT-Lesung macht das präzise: das System ist kompakt und trägt Gedächtnis. Nach Dok. 270 ist die Dekompaktifizierung in die SI-Zeit ein mode-erhaltendes Embedding (verlustfrei), und FFGFT hat sehr wohl framework-spezifische SI-Observable (Massen/Koide, CHSH$\sim \xi$ – mit heutiger Hardware nicht auflösbar –, D_f, L_0; Dok. 270/249); was die Wiederkehr entfernt, ist nicht die SI-Umwandlung, sondern das endliche, nichtperiodische Beobachtungsfenster plus Dekohärenz. Die scharfe, enge Folge: die Kohärenz-Sektor-Recurrence ist auf einem warmen, endlich-gefensterten SI-Zeit-Signal wie EEG nicht *auflösbar*. Dies ist eine Gutachter-Notiz an die Autoren; der Maßstab ist die Falsifikations-Disziplin, die die HLV/HICE-Seite bereits anwendet.

S.1 Anlass und Methode

Das Medinformatics-Papier wendet den HLV-Spiral-Zeit-Operator auf neuronale Kohärenz an und schlägt das Information–Kohärenz–Energie-Prinzip (ICE) sowie eine $\Delta\Phi$-gestützte "neurodynamische Kollaps"-Grenze vor. Statt aus dem Eindruck zu argumentieren, wird hier jede mathematische Behauptung rechnerisch geprüft. Die Skripte sind `test_algebra.py`, `test_deltaphi.py`, `test_dynamics.py`, `test_compactification.py` und `make_figures.py`; durchgängig feste Seeds. Die Befunde teilen sich in: *trägt*, *falsch etikettiert*, *intern widersprüchlich*, *nicht hergeleitet*, *aus dem Papier nicht reproduzierbar* und *spekulative Prämisse*. Ein Problem ist grundlegend – die Zeitachse, auf der der Operator aufgebaut ist – und wird zuerst behandelt, weil die Befunde zu $\Delta\Phi$ und zur Dynamik seine Symptome sind.

Nr.	Behauptung	Abschnitt	Befund
0	Basis-Zeitachse $\psi(t) = t + i\varphi(t) + j\chi(t)$ auf physikalischer Linearzeit	2.1, 2.2.1	Grundlegend – Operator auf der nach-der-Messung-Achse (ordnet 3 & 5 unter)
1	Tripel-Zeit "reduzierte bikomplexe/oktonionische Ebene"	2.1	Falsch etikettiert – es sind die Quaternionen
2	Oktonionischer Operator; Nichtassoz. "erklärt Psychologie"	2.10	Mathematik trägt, Behauptung überdehnt
3	$\Delta\Phi$-Instabilitätsfunktional	2.6 vs 12/15	Intern widersprüchlich (zwei Definitionen)
4	kritisch $\Delta\Phi_c \approx 0{,}40$, "kein freier Parameter"	2.5, 2.6.2	Nicht hergeleitet (freier Parameter)
5	gesunde Spiralen / Trauma-Grenzzyklen	2.2.3, 2.9	Nicht aus den Gleichungen hergeleitet
6	$r \approx 0{,}96$, $\Delta\Phi_c \approx 0{,}40$ "über Probanden"	3.4	Aus dem Papier nicht reproduzierbar
7	Axon-Biphotonen-Kopplung Γ_{axon}	2.7–2.8	Spekulative Prämisse als etabliert

S.2 Die Basis-Zeitachse (grundlegend)

Dies ist die folgenreichste Wahl im Papier und jene, unter der die Befunde 3 und 5 nachgeordnete Symptome sind. Der Spiral-Zeit-Operator

$$\psi(t) = t + i\,\varphi(t) + j\,\chi(t) \tag{S.1}$$

nimmt die physikalische, lineare Zeit t als Skalarbasis und schreibt φ, χ als Funktionen ebendieser t. Das Papier benennt t ausdrücklich als physikalisch: U_1 ist als "lineare physikalische Zeit", äußere Chronologie definiert (§2.2.1). Das legt die Darstellung fest, in der jede spätere Gedächtnis- und Holonomie-Behauptung getroffen wird.

Einheiten-unabhängig. Damit $t + i\varphi + j\chi$ *ein* algebraisches Objekt ist, müssen die drei Komponenten dieselbe Art von Größe sein. Das Papier behauptet Dimensionslosigkeit (§2.1.2), nennt t aber zugleich physikalische Zeit und Chronologie (§2.2.1); φ und χ sind interne Phasen-/Identitätskoordinaten. Eine physikalische Zeit zu internen Phasen in einer quaternionischen Summe zu addieren ist dimensionell inkohärent, solange nicht alle drei zuvor auf ein gemeinsames dimensionsloses Maß reduziert werden. (Da i, j antikommutieren, ist das Objekt quaternionisch – t ist der Realteil eines Quaternions, dessen Kreuzterm $ij = k$ nie mitgeführt wird; siehe §S.3.)

Tieferes. Ein framework-spezifisches Gedächtnis lebt auf dem kompakten internen Zeitkreis S^1: ein diskretes Spektrum, eine exakte Wiederkehr (in FFGFT der Back-flow $5{,}125$ im Kohärenz-Sektor, Dok. 282). $\varphi(t), \chi(t)$ als einwertige Funktionen der physikalischen linearen t zu schreiben, legt S^1 auf $\mathbb{R}$ flach – es führt die Projektion $S^1 \to \mathbb{R}$ *vor jeder Dynamik* aus, und eine einwertige Funktion über linearer Zeit hat keine kompakte Periodizität, sodass die Wiederkehr auf dieser Achse gar nicht darstellbar ist. Nach dem Prinzip Umwandlung-als-Messung (§S.11) ist die Festlegung auf physikalische Zeit selbst die störende, informationsverwerfende Projektion – kein Apparat nötig. Die Schreibweise hat diesen Schritt stillschweigend vollzogen und verbirgt die eine Operation – die Umwandlung/Messung von der kompakten internen Zeit auf die physikalische SI-Zeit –, die entscheidet, ob eine Gedächtnis-Behauptung framework-spezifisch oder generisch ist.

Folge. Der Operator ist per Konstruktion nach-der-Messung: was immer er auf physikalischer (EEG-)Zeit an Gedächtnis trägt, ist generisch. Das ist reproduzierbar (`test_compactification.py`): das Rückkehr-Signal des diskreten Spektrums hat auf dem kompakten Horizont den Back-flow $11{,}5$, den ein endliches physikalisches Auslesefenster auf $0{,}000$ treibt, während die sechs Linien nie auflösbar werden ($2\pi/T_{\text{Fenster}} \gg$ Linienabstand $0{,}091$) – die Auslesung ist eine nicht-invertierbare Projektion. Dieselbe Wurzel erklärt die beiden nachgeordneten Befunde: eine Berry-Phasen-Holonomie (Gl. 12/15, §S.5) braucht eine geschlossene Schleife – einen kompakten Zyklus –, und ein Grenzzyklus (§S.7) braucht nicht-gradiente geschlossene Orbits; beides ist auf einer linearen physikalischen Zeitachse nicht tragfähig.

Konstruktiver Ausweg. Den Operator auf die kompakte, dimensionslose interne Zeit (zyklisch) stellen, auf der das diskrete Spektrum und die Wiederkehr leben, und die physikalische SI-Zeit nur über eine ausdrücklich deklarierte Umwandlung eintreten lassen – und genau diese projiziert den framework-spezifischen Anteil heraus. Entweder bleibt der Operator intern/kompakt (keine direkte EEG-Aussage), oder er ist physikalisch/SI (generisches Gedächtnis). $\psi(t) = t + i\varphi(t) + j\chi(t)$ versucht beides. Die minimale Änderung ist, zwei verschiedene Zeiten zu deklarieren und die Umwandlung zwischen ihnen ausdrücklich als die Messung zu schreiben, die sie ist.




Abbildung S.1: Auslesung als nicht-invertierbare Projektion. Links: in der kompakten Darstellung erzeugt das diskrete Spektrum Wiederkehren (Back-flow $\gg 0$); das rote Band markiert ein endliches physikalisches Auslesefenster. Rechts: im Fenster zerfällt das Observable ohne Wiederkehr, und die diskreten Linien sind unaufgelöst.

S.3 Tripel-Zeit-Algebra – falsch etikettiert

Die angegebenen Relationen $i^2 = j^2 = -1,\ ij = -ji$ sind genau die imaginären Quaternionen: mit $k := ij$ ist $k^2 = -1$, und $\{1, i, j, k\}$ schließt zu $\mathbb{H}$, das assoziativ und nichtkommutativ ist (`test_algebra.py`, A). Eine *bikomplexe* Ebene verlangt, dass die beiden imaginären Einheiten kommutieren ($ij = ji$); hier gilt $ij = -ji$, also ist die Algebra *nicht* bikomplex. Ein Drei-Term-Operator $t + i\varphi + j\chi$ lebt in einer Quaternionen-Unteralgebra; Oktonionen sind dafür nicht nötig. Der korrekte Name ist quaternionisch.

S.4 Oktonionische Struktur – Mathematik trägt, Deutung überdehnt

Die Oktonion-Nichtassoziativität ist real: der Assoziator $(e_1e_2)e_4 - e_1(e_2e_4) = 2e_7 \neq 0$ (Cayley–Dickson), während Assoziatoren auf einem quaternionischen Tripel verschwinden (`test_algebra.py`, B). Das ist korrekte Mathematik. Der weitere Schritt – dass dies "empirische Psychologie direkt abbildet" und "die erste physikbasierte Erklärung psychologischer Nichtlinearität" sei – ist eine interpretierende Analogie, keine Herleitung: keine psychologische Größe wird aus der Algebra berechnet oder gegen sie getestet, und die acht Basisrichtungen werden per Festsetzung mit Bedeutungen belegt.

S.5 $\Delta\Phi$ – zwei unvereinbare Definitionen unter einem Symbol

- **Definition 1 (§2.6):** $\Delta\Phi = \alpha|\Delta S| + \beta|\Delta I| + \gamma|\Delta C|$, konvexe Gewichte, jede Komponente in $[0, 1]$ – ein einheitenloser gewichteter L^1-Index in $[0, 1]$. Er ist in jeder Komponente linear, hat also keine Krümmung und keine intrinsische Bifurkation; die Niveaumenge $\Delta\Phi = c$ ist für jedes c eine flache Polytop-Facette.

- **Definition 2 (Gl. 12, 15):** $\Delta\Phi = \oint(\nabla \times A) \cdot da \approx \operatorname{Im} \oint \langle\psi|\nabla\theta|\psi\rangle\, d\theta$ – eine Berry-Phasen-Holonomie, ein Winkel im Bogenmaß über $0 \dots 2\pi$, ohne Grund, in $[0, 1]$ oder nahe $0{,}40$ zu liegen (eine Schleife mit $|\gamma| = 0{,}40$ rad ist ein winziger $\sim 29°$-Kegel).

Ein normierter Abweichungsindex und eine Holonomie im Bogenmaß sind verschiedene mathematische Objekte. Beide "$\Delta\Phi$" zu nennen und beiden denselben kritischen Wert $0{,}40$ zuzuweisen, ist eine Äquivokation (`test_deltaphi.py`, C/D).




Abbildung S.2: Die zwei $\Delta\Phi$-Definitionen sind unvereinbare Objekte: eine Holonomie im Bogenmaß ($0 \dots 2\pi$) gegenüber einem einheitenlosen Index ($0 \dots 1$).

S.6 Die $0{,}40$-Schwelle – nicht hergeleitet

§2.5 sagt, der Wert sei "kein freier Tuning-Parameter" und die Operatorstruktur "erzwinge" eine begrenzte Instabilitätsfläche. Doch das L^1-Funktional hat keinen intrinsischen kritischen Punkt (es ist linear); die einzig verfügbare strukturelle Aussage ist die triviale Schranke $0 \le \Delta\Phi \le 1$ und die symmetrische Referenz $\Delta\Phi = d$ (also $1/3$ bei $d = 1/3$). §2.6.2 selbst schreibt die Differenz $0{,}40$ vs $0{,}333$ "datensatzspezifischer Gewichtungs-Asymmetrie … und Normierung" zu, und bei gleicher Abweichung $d = 0{,}40$ liefert jede konvexe Gewichtung $0{,}40$ (`test_deltaphi.py`, C/E). Also ist $0{,}40$ ein empirischer/Konturwert, keine strukturell erzwungene Bifurkation.

S.7 Spiralen und Trauma-Grenzzyklen – nicht hergeleitet

Der einzige mit expliziten Potenzialen angegebene dynamische Mechanismus (§2.4) ist der Gradientenfluss-Teil der Mastergleichung, $\partial_t \Psi = -\nabla V_{\mathrm{DLHR}}(\Psi)$. Für jeden Gradientenfluss gilt

$$\frac{dV}{dt} = \nabla V \cdot \frac{d\Psi}{dt} = -|\nabla V|^2 \le 0, \tag{S.2}$$

also ist V eine strikte Ljapunow-Funktion, und das System kann keine periodischen Orbits, Grenzzyklen oder anhaltenden Spiralen haben – es relaxiert in Fixpunkte (Theorem). Numerisch (`test_dynamics.py`, F): über 40 Trajektorien ist $V(t)$ monoton fallend (0 Verletzungen) und 0 geschlossene Orbits werden gefunden. Die Phänomenologie "gesunde Kognition → stabile Einwärtsspiralen", "Trauma-Schleifen → Grenzzyklen" folgt daher nicht aus der spezifizierten Dynamik; sie bräuchte die Advektionsterme $\lambda_\varphi \partial_\varphi$, $\lambda_\chi \partial_\chi$ oder W_{oct}, die nie konkret angegeben werden. (Der kubische M^3-Term macht V zudem nach unten unbeschränkt.)




Abbildung S.3: Gradientenfluss mit den DLHR-Potenzialen des Papiers: Trajektorien relaxieren in Fixpunkte (keine geschlossenen Orbits, keine anhaltende Spirale), und $V(t)$ fällt monoton, sodass Grenzzyklen unmöglich sind.

S.8 Empirische Behauptungen – aus dem Papier nicht reproduzierbar

Das berichtete $r \approx 0{,}96$ und $\Delta\Phi_c \approx 0{,}40$ "über Probanden" (§3.4) lassen sich aus dem Papier nicht nachrechnen, das keine Datentabelle gibt. Die Reproduktion braucht den externen Datensatz (Zenodo 10.5281/zenodo.17990696) und das Validierungs-Notebook. Ein fairer Test bräuchte den Datensatz plus ein vorregistriertes Protokoll mit den Nullmodellen, die die Autoren auf der HICE-Seite bereits verwenden (Zeit-Shuffle, present-state-matched, phasen-randomisiert).

S.9 Axon-Biphotonen-Verschränkung – spekulative Prämisse als etabliert

$\Gamma_{\text{axon}} = g\, e^{i\varphi} E_{12} + g'\, e^{j\chi} E_{23}$ (§2.8) ruht auf "experimentellen Befunden" von Biphotonen-Verschränkung und Langstrecken-Kohärenz in myelinisierten Axonen, dargestellt als gesicherte Forschung. Verschränkung in warmen, nassen, myelinisierten Axonen ist keine etablierte Physik. Das ist kein Formelfehler, aber eine tragende empirische Prämisse, die als Tatsache behauptet wird und als Hypothese zu kennzeichnen ist.

S.10 Ein verteidigbarer Kern

Ohne den Überbau bleibt ein solides, bescheidenes Objekt: $\Delta\Phi = |\omega(t) - \omega_{\text{memory}}(t)|$ – die Abweichung der momentanen Phasengeschwindigkeit von einem kurzen Phasengedächtnis – ist ein interpretierbares, leichtes Zeitreihen-Instabilitätsmerkmal, und als Signalanalyse-Operator (die Rahmung des begleitenden Atem-Papiers) legitim. Die Probleme beschränken sich auf den HLV-/Oktonionen-/Bewusstseins-Überbau, die $\Delta\Phi$-Umdefinition sowie die nicht hergeleitete Schwelle und Dynamik.

S.11 Eine FFGFT-Lesung: Umwandlung als Messung

Zeitliche Rekursion trägt Gedächtnis, und das bildet auf FFGFTs eigene Struktur ab (der Rekursionsoperator $\mathscr{R}$; der Gedächtniskern als Fourier-Transformierte der Spektraldichte des Verbindungs-Laplace-Operators, Dok. 282). Das Folgende ist als konstruktive Brücke und ausdrückliche Vermutung gemeint, nicht als Resultat.

FFGFTs Gedächtnis hat zwei Gesichter. Auf dem überdämpften / Relaxations-Observablen ist der Kern eine positive Multiexponentielle, und ein generischer Biexponential reproduziert ihn (Residuum $\sim 10^{-3}$): nicht-identifizierbar, Stufe-0. Auf dem Kohärenz-Observablen $c(t) = e^{-\Gamma(t)}$ – seinem Heimat-Sektor – erzeugt das diskrete Spektrum eine echte Wiederkehr: Back-flow $5{,}125$, den generische zerfallende Kerne nicht reproduzieren (Back-flow 0). Das Gedächtnis ist also diskriminierend, aber nur im Kohärenz-Sektor und nur, wenn *beides* zugleich gilt: ein diskretes Spektrum *und* erhaltene Kohärenz (kleines Γ).

FFGFT ist fundamental kompakt (T^4, diskretes Spektrum), und in dieser dimensionslosen Darstellung hat das System immer Gedächtnis. Es ist wichtig, den Verlust präzise zu verorten, denn die Umwandlung in SI ist *nicht* die Stelle, wo er geschieht. Nach Dok. 270 ist die Typ-I-Dualitäts-Dekompaktifizierung $S^1_m \to \mathbb{R}_t$ (geregelt durch $\tilde{T} \cdot m = 1$) ein *mode-erhaltendes Embedding* – verlustfrei; die Periodizität ist bloß nicht mehr direkt sichtbar und überlebt als diskretes Spektrum und als physikalische Observable (die Revival-Zeit T_{rev}, die CHSH-Abweichung $\sim \xi$, letztere mit heutiger Hardware nicht auflösbar). Eine reine Einheiten-Skalierung (mit $\hbar, c$) ist ebenso invertierbar und verliert nichts. Die wirklich verlustbehafteten Operationen sind drei und verschieden: die *Rückrichtung* der Kompaktifizierung $\mathbb{R} \to S^1$ (nichtperiodische Anteile steigen nicht herab), die räumlichen Projektionen $D3 \to D0$ (Dok. 270) und – für jede Auslesung – die Beschränkung auf ein *endliches, nichtperiodisches Beobachtungsfenster plus Dekohärenz*. Es ist dieser letzte Schritt, nicht die Einheiten-Umwandlung, der das lokale Kurzzeitverhalten behält und die globale Wiederkehr verwirft – genau wie eine Messung eine Basis wählt und die Kohärenzen fallen lässt (Test G). Eine physikalische Messung ist dieselbe Fenster-und-Dekohärenz-Projektion an ihrem Starkkopplungs-Ende. Das ist verträglich mit dem, was der Korpus bereits führt: die Vakuumenergie ist kompaktifiziert vorhanden, dekompaktifiziert sichtbar, mit $c, \hbar c$ als SI-Umrechnungsfaktoren (Dok. 263) – die dekompaktifizierte Sicht ist nicht weniger wahr, nur anders aufgelöst.

Die Lesung stützt also den bescheidenen Kern (Rekursion trägt Gedächtnis) und begrenzt die Behauptung präzise. Die framework-spezifische Signatur überlebt sehr wohl in die SI-Welt – in den richtigen Kanälen: Mass-reading, CHSH$\sim \xi$ (mit

heutiger Hardware nicht auflösbar), D_f, L_0 (Dok. 270/249). Was *nicht* überlebt, ist die Kohärenz-Sektor-Recurrence, gelesen auf einem warmen, endlich-gefensterten SI-Zeit-Observablen: dort haben Fenster und Dekohärenz die globale Wiederkehr bereits verworfen, sodass gerade das Observable, das die klinischen Abschnitte verwenden – SI-Zeit-EEG –, in genau diesem Sinn nach-der-Messung ist und das Regime darstellt, in dem der FFGFT-Harness (Dok. 282/283) das Gedächtnis als generisch zeigt, nicht als Fingerabdruck. Auch deshalb ist die Wahl der Basis-Zeitachse (§3) entscheidend: der Operator wird von Anfang an auf dieser endlichen, nach-der-Messung-Achse geschrieben.

S.12 Reproduzierbarkeit

- `test_algebra.py` – Quaternionen-Abschluss + Bikomplex-Widerlegung (A); Oktonion-Assoziator (B).
- `test_deltaphi.py` – L^1-Schranke/Linearität (C); Berry-Phasen-Bereich (D); $0{,}40$ als freier Knopf (E).
- `test_dynamics.py` – Gradientenfluss-Ljapunow / Test ohne Grenzzyklen (F).
- `test_compactification.py` – Auslesung als nicht-invertierbare Projektion: kompakter Back-flow vs. Fenster (G).
- `make_figures.py` – die oben verwendeten Abbildungen.

Die Abbildungen `fig_deltaphi.png`, `fig_dynamics.png` und `fig_compactification.png` werden von diesen Skripten erzeugt; alle mit festen Seeds.

Kapitel T

Dok. 285 — Die einheitliche kompakte Sicht und die gerechnete 3-vs-6-Brücke

Kurzfassung

FFGFT und HLV reduzieren beide auf das beobachtbare $3{+}1$. Das wirft eine scharfe Frage auf: wenn die vier Kreise von FFGFT und die sechs (plus Zeit) von HLV beide in $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_t$ enden – sind die 3 und die 6 dann bloß zwei Koordinatenbeschreibungen desselben, also nur eine mathematische Transformation? Dieses Dokument gibt die Antwort der kompakten Sicht in *einer* Notation und prüft sie rechnerisch. Im kompakten Bild sind beide Modelle von derselben Form: ein Torus $T^N = (S^1)^N$ mit einer endlichen Symmetriegruppe G und einer Typ-I-Dekompaktifizierung (dem Messvorgang), die einen Kreis als Zeit auswählt. FFGFT ist $(T^4, \mathbb{Z}_3)$, HLV ist $(T^7 = T^6 \times S^1, A_5)$. Drei reproduzierbare Ergebnisse klären die Frage. (1) "6 ist die Verdopplung der 3" ist wörtlich: die ikosaedrische 6D-Darstellung zerfällt in $\mathbf{3} \oplus \mathbf{3}'$, die beiden 3D-Irreps von A_5, die sich exakt durch $\varphi \leftrightarrow 1 - \varphi$ unterscheiden; der 6D-Charakter ist ganzzahlig, jeder 3D-Block irrational (φ). (2) Das Dreieck ist der fundamentalere, minimale Träger: 3-Zähligkeit ist kristallographisch und lebt in 3D, 5-Zähligkeit ist nicht-kristallographisch und *verlangt* die 6D-Einbettung. (3) Die beiden Modelle sind *durch Enthaltensein vereinbar*: die Ikosaedergruppe A_5 enthält die 3-Zähligkeit C_3 (beide sind Symmetrien desselben Ikosaeders), und $T^7 = T^4 \times T^3$, also ist HLV das 4D von FFGFT, erweitert um die drei Perp-Dimensionen ($7 = 4 + 3$, HLV $\supset$ FFGFT). Die geschützten Werte $\sqrt{2}$ (Koide $2/3$) und $2/\sqrt{5}$ (φ) gehören zu zwei *verschiedenen geschützten Geometrien* – FFGFTs unabhängiger 3-Zähligkeit und HLVs 5-Zähligkeit; die Gruppen koexistieren ($C_3 < A_5$), also keine Unverträglichkeit, und dass die cut-and-project-Familie $r(\tau) \leq 1$ den einen nicht auf den anderen abbildet, zeigt nur, dass die Ineinander-Überführung die falsche Frage ist. (Nach Dok. 283 ist $\sqrt{2}$ *nicht* aus HLVs ikosaedrisch geschützten Richtungen geerbt, die nur $2/\sqrt{5}$ geben; es ist eine eigene 3-zählige geschützte Wahl.) Der echte Unterschied ist, *welcher Symmetrie-Sektor physikalisch realisiert ist*: FFGFT realisiert den minimalen kristallographischen 3-Zähligkeits-Kern (Koide $\theta = 2/9$, empirisch bestätigt), HLV fügt die 5-Zähligkeits-/Perp-Struktur als testbare Erweiterung hinzu. Daher ist "nur eine mathematische Transformation" zu schwach

(der realisierte Sektor ist ein echtes, empirisch entscheidbares Merkmal) und "inäquivalente Strukturen" zu stark (sie sind vereinbar, HLV ⊃ FFGFT): die präzise Aussage ist ein gemeinsamer $3{+}1$-Kern, mit HLV als ikosaedrischer Erweiterung von FFGFTs minimalem 3-Zähligkeits-Kern.

T.1 Anlass: beide reduzieren auf $3{+}1$ – ist der Rest eine Transformation?

Dok. 270 trennt die Reduktionen von FFGFT ($T^4 \to 3{+}1$) und Dok. 283 die FFGFT↔HLV-Beziehung (eine $\mathbb{Z}_3$-Zirkulant-Brücke entlang einer C_3-Achse, an der Symmetrie-Ordnung gegabelt, $\sqrt{2}$ vs. $2/\sqrt{5}$). HLV baut den Raum als 6D→ 3D-Cut-and-Project und trägt die Zeit separat (Spiral-Time). Beide Modelle enden somit in demselben beobachtbaren $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_t$. Die natürliche Frage ist, ob der Unterschied zwischen FFGFTs 3 und HLVs 6 dann bloß eine Koordinatenwahl ist – eine verlustfreie mathematische Transformation ein und desselben $3{+}1$. Die Antwort braucht eine gemeinsame Notation und eine Rechnung; beides folgt. Alle numerischen Aussagen sind mit drei kurzen Skripten reproduzierbar (§T.21).

T.2 Die einheitliche kompakte Notation (T^N, G)

In der kompakten Darstellung gibt es kein "Raum" gegen "Zeit" und kein "intern" gegen "extern": ein Kreis ist ein Kreis. Beide Modelle sind dann von einer Form:

$$\mathscr{M} = T^N = (S^1)^N, \qquad G \subset O(N) \text{ wirkt,} \tag{T.1}$$

mit einer Typ-I-Dekompaktifizierung (dem Messvorgang), die einen Kreis als Zeit wählt. Die übrigen Kreise bleiben kompakt (diskretes Spektrum) oder projizieren (Raum, Typ II, Dok. 270). Die beiden Modelle sind zwei Instanzen von (T^N, G):

	FFGFT	**HLV**
kompakte Form	$T^4 = (S^1)^4$	$T^7 = T^6 \times S^1$
Symmetriegruppe G	$\mathbb{Z}_3$ (3-zählig, kristallographisch)	A_5 ikosaedrisch (5-zählig, nicht-kristallographisch)
Raum (kompakt)	3 Kreise	6 Kreise $= \mathbf{3} \oplus \mathbf{3}'$
Zeit	ein Kreis (Masse-Kreis, $\tilde{T} \cdot m = 1$); über die Dualität skalenverknüpft, *kein* abgespaltener Faktor	ein Kreis (Spiral-Time); ein A_5-Singlet, der Torus *faktorisiert* $T^6 \times S^1$
wie G auf die Zeit wirkt	über $\tilde{T} \cdot m = 1$ eingebunden	trivial (Singlet)
geschützter Invariant	$r = \sqrt{2}$, Koide $Q = 2/3$, $\theta = 2/9$	$r = 2/\sqrt{5}$, φ
warum dieses N_{Raum}	3 genügt (3-zählig kristallographisch)	6 nötig (5-zählig nicht-kristallographisch)

Der ganze Vergleich reduziert sich auf eine Frage – *wie wirkt G auf die Kreise des Torus?* Die Etiketten "intern/extern" sind Dekompaktifizierungs-Sprache und haben im kompakten Bild keinen Platz; die korrekte kompakt-konsistente Unterscheidung für den Zeit-Kreis ist gruppentheoretisch: in HLV ist er ein A_5-Singlet (der Torus faktorisiert $T^6 \times S^1$, Zeit von der räumlichen Symmetrie entkoppelt); in FFGFT ist er über die Dualität $\tilde{T}\cdot m = 1$ an die anderen Kreise gebunden (kein direkter Produktfaktor). Welcher Kreis zur beobachteten Zeit wird, ist durch den Messvorgang festgelegt, d. h. durch die erlebte Situation des eingebetteten Beobachters (Dok. 270, Dok. 248), nicht durch die Geometrie.

T.3 "6 ist die Verdopplung der 3" – wörtlich (`dim_bridge_1`)

Die ikosaedrische 6D-Darstellung des Cut-and-Project zerfällt als

$$\mathbf{6} \;=\; \mathbf{3} \oplus \mathbf{3}', \tag{T.2}$$

die beiden inäquivalenten 3D-Irreps von A_5 (physikalisch $\oplus$ perp). Auf der 5-fach-Konjugationsklasse sind die Charaktere

$$\chi_{\mathbf{3}}(g_5) = 1 + 2\cos 72^\circ = \varphi, \qquad \chi_{\mathbf{3}'}(g_5) = 1 + 2\cos 144^\circ = 1 - \varphi = -\tfrac{1}{\varphi}, \qquad \chi_{\mathbf{6}}(g_5) = 1. \tag{T.3}$$

Die Verdopplung ist also wörtlich – **6** sind zwei Kopien eines 3D-Raums – und der Goldene Schnitt sitzt *im Split selbst*: die beiden 3D-Blöcke unterscheiden sich exakt durch $\varphi \leftrightarrow 1 - \varphi$. Der 6D-Charakter ist die ganze Zahl 1, jeder 3D-Block irrational (φ); das ist die erste Hälfte des Grundes, warum ein 6D-Gitter existiert, wo ein 3D-Gitter nicht kann (nächster Abschnitt). Dieses φ in der Verdopplung ist HLVs 5-Zähligkeit / $2/\sqrt{5}$ an der Wurzel (vgl. Dok. 281, Dok. 283).

T.4 Das Dreieck ist fundamental, das Fünfeck braucht die Sechs (`dim_bridge_2`)

Eine Rotation der Ordnung n ist genau dann eine Gitter-Symmetrie in 2D/3D, wenn $2\cos(2\pi/n) \in \mathbb{Z}$ (kristallographische Restriktion). Ganzzahlige Werte treten nur für $n \in \{1, 2, 3, 4, 6\}$ auf:

$$2\cos\tfrac{2\pi}{3} = -1 \in \mathbb{Z} \quad \text{(3-zählig, kristallographisch)}, \qquad 2\cos\tfrac{2\pi}{5} = \tfrac{1}{\varphi} \notin \mathbb{Z} \quad \text{(5-zählig, verboten)}. \tag{T.4}$$

Also lebt 3-Zähligkeit ($\mathbb{Z}_3$, Koide) nativ in 3D – drei Dimensionen *genügen*, und das Dreieck ist der minimale, fundamentalere Träger. 5-Zähligkeit kann in keinem 3D-Gitter sitzen; sie existiert nur als Projektion aus 6D, wo sie (nach dem vorigen Abschnitt) einen ganzzahligen Charakter erhält. Die Verdopplung $3 \to 6$ ist daher keine optionale Verzierung: sie ist genau das, was die Beherbergung einer nicht-kristallographischen Symmetrie kostet.

T.5 Dasselbe ambiente $3{+}1$: was die cut-and-project-Familie zeigt und was nicht (`dim_bridge_3`)

Das cut-and-project-Verhältnis

$$r(\tau) = \frac{2\tau}{1+\tau^2} \le 1, \qquad r(1) = 1, \tag{T.5}$$

ist die Familie der cut-and-project-"mathematischen Transformationen". HLVs geschützter Invariant $2/\sqrt{5} \approx 0{,}894$ wird bei $\tau = \varphi$ (und $\tau = 1/\varphi$) erreicht. FFGFTs $\sqrt{2} \approx 1{,}414$ liegt *über dem Maximum der ganzen Familie* und wird von keinem τ erreicht.




Abbildung T.1: Der cut-and-project-Invariant $r(\tau) \le 1$ erreicht HLVs $2/\sqrt{5}$ bei $\tau = \varphi$, aber nie FFGFTs $\sqrt{2}$. Dass $\sqrt{2}$ über dem Maximum dieser Familie liegt, heißt nur, dass diese eine Projektion die beiden Invarianten nicht ineinander überführt – nicht, dass die Strukturen unverträglich sind (siehe nächster Abschnitt).

Was das zeigt – und was nicht:

- **Ambientes $3{+}1$:** beide Modelle enden in $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_t$; auf der Ebene der bloßen Koordinaten-Mannigfaltigkeit ist das eine verlustfreie Darstellungs-Transformation (Typ III, Dok. 270/230).
- **Die cut-and-project-Abbildung:** $\sqrt{2}$ liegt außerhalb des Bereichs $r \le 1$, also überführt *diese* Ein-Parameter-Familie HLVs $2/\sqrt{5}$ nicht in FFGFTs $\sqrt{2}$. Das ist eine Aussage über *eine* Abbildung, *kein* Beweis von Unverträglichkeit: Vereinbarkeit heißt nicht "überführe die beiden Invarianten ineinander", sondern "bette beide in eine gemeinsame Struktur ein" – Thema des nächsten Abschnitts. (Und $\sqrt{2} > 1$ gegen $r \le 1$ sind nicht streng kommensurabel, ihre Ungleichheit hier ist bestenfalls schwaches Indiz.)

T.6 Die Vereinbarkeit: HLV enthält FFGFT (`recompute_reconcile`)

Die entscheidende Tatsache ist gruppentheoretisch. Die Ikosaedergruppe A_5 *enthält* die 3-Zähligkeit C_3: eine 120°-Drehung um eine $(1,1,1)$-Achse und eine 72°-Drehung um eine Vertex-Achse sind *beide* Symmetrien desselben regulären Ikosaeders – beide permutieren seine zwölf Ecken (`recompute_reconcile.py`). Also $C_3 < A_5$, und auf der Dimensionsebene $T^7 = T^4 \times T^3$, d. h.

$$7 \;=\; \underbrace{3_{\text{phys}} + 1_{\text{Zeit}}}_{\text{FFGFT } T^4} \;+\; \underbrace{3_{\text{perp}}}_{\text{HLV-Erweiterung}} \,. \tag{T.6}$$

Konkret $T^4 \hookrightarrow T^7$, $(x,t) \mapsto (x,0,t)$ mit $0 \in T^3_{\text{perp}}$ – eine total geodätische Untermannigfaltigkeit: jede FFGFT-Konfiguration ist die spezielle HLV-Konfiguration mit verschwindender Perp-Koordinate. Die Relation zwischen den Modellen ist daher *Enthaltensein*, HLV $\supset$ FFGFT: FFGFT ist der minimale kristallographische 3-Zähligkeits-Kern, HLV die ikosaedrische Erweiterung, die die drei Perp-Kreise und die volle 5-Zähligkeit hinzufügt. Die geschützten Werte $\sqrt{2}$ und $2/\sqrt{5}$ sind Invarianten der koexistierenden C_3- und A_5-Sektoren *derselben* enthaltenden Struktur; sie müssen sich nicht, und tun es nicht, ineinander transformieren – und das ist kein Widerspruch. Das Enthaltensein gilt auf der Ebene der Gruppen und Dimensionen; der *geschützte* Invariant bleibt eine eigene, realisierte Wahl – FFGFT schützt eine unabhängige 3-zählige Geometrie ($\sqrt{2}$), HLV die 5-zählige ($2/\sqrt{5}$), und (Dok. 283) HLVs geschützte Vakuum-Richtungen enthalten $\sqrt{2}$ nicht. Enthaltensein macht die Modelle vereinbar, ohne sie identisch zu machen.

Wo dies behauptet wird. Dies alles lebt im kompaktifizierten Bild — die Tori mit allen Kreisen kompakt, wo kein Kreis als Zeit ausgezeichnet ist. Die Brücke zu physikalischen, dekompaktifizierten Observablen läuft über den einen Schritt $S^1 \to \mathbb{R}$, den Messvorgang (Dok. 270); das Enthaltensein wird also vor dem Messvorgang, im kompakten Zustand, behauptet — nicht auf der physikalischen Zeitachse.

T.7 Auflösung

Die Spannung – "beide reduzieren auf $3{+}1$, also können die 3 und die 6 nur dasselbe beschreiben" – löst sich nicht durch eine Gabelung, sondern durch *Enthaltensein*. Die 3 und die 6 teilen denselben physikalischen $3{+}1$-Kern, und die Modelle sind mathematisch vereinbar: HLV $\supset$ FFGFT sowohl in der Symmetrie ($A_5 \supset C_3$) als auch in den Dimensionen ($7 = 4 + 3$). Was bleibt, ist keine mathematische Unverträglichkeit, sondern die Frage, *welcher Symmetrie-Sektor physikalisch realisiert ist*. FFGFT realisiert den minimalen, kristallographischen 3-Zähligkeits-Kern, und sein Invariant – Koide $\theta = 2/9$ – ist empirisch bestätigt; HLV fügt die 5-Zähligkeits-/Perp-Struktur als Erweiterung hinzu, deren eigenes Observable (das ikosaedrische / quasikristalline Kohärenz-Signal, Dok. 282/283) genau das ist, was ein Test von HLV gegen FFGFT prüfen würde. Damit greifen beide naheliegenden Formulierungen daneben: "nur eine mathematische Transformation" ist zu schwach (der realisierte Sektor ist ein echtes,

empirisch entscheidbares Merkmal) und "inäquivalente, unvereinbare Strukturen" ist zu stark (die Einbettung HLV $\supset$ FFGFT existiert). Die präzise Aussage: ein gemeinsamer $3{+}1$-Kern, mit HLV als ikosaedrischer *Erweiterung* von FFGFTs minimalem 3-Zähligkeits-Kern, der Unterschied im realisierten Symmetrie-Sektor.

T.8 Rekursion im einheitlichen kompakten Bild: λ^n

Die Notation (T^N, G) setzt sich in der *Rekursion* fort: in beiden Modellen ist die selbstähnliche Struktur eine Dilatation um einen einzigen Eigenwert λ, die Rekursion ist λ^n. Der Rekursions-Eigenwert ist *verschieden* vom geschützten Invarianten ($\sqrt{2}$, $2/\sqrt{5}$); beide zu verwechseln ist ein Fehler.

FFGFT: $\lambda = \xi = 4/30000$ (Dok. 270). Die Rekursion ξ^n ist einseitig kontrahierend ($\xi, \xi^2, \ldots$ verschwinden sofort) und gibt die fraktale Korrektur

$$D_f = 3 - \xi = 2{,}999867, \tag{T.7}$$

eine Dimension knapp unter 3 – fast-kristallin. Der geschützte Invariant $\sqrt{2}$ (Koide $2/3$) ist eine *separate* Größe, nicht die Rekursions-Skala.

HLV: $\lambda = \varphi$ (goldene Inflation). Der ikosaedrische Quasikristall ist selbstähnlich unter der goldenen Inflation, mit der Fibonacci-Rekursion $\varphi^2 = \varphi + 1$. Die Fibonacci-Substitutionsmatrix (Zeilen $(1,1)$, $(1,0)$) hat die Eigenwerte φ (expandierend) und $-1/\varphi$ (kontrahierend) – dasselbe $\varphi \leftrightarrow -1/\varphi$-Paar wie der $\mathbf{3} \oplus \mathbf{3}'$-Split (physikalisch/Perp). Zweiseitig, also selbstähnlich auf *allen* Skalen: ein echter Quasikristall. Der geschützte Invariant $2/\sqrt{5}$ ist wieder separat.

	Rekursion λ	Charakter	gesch. Invariant
FFGFT	$\xi = 4/30000$	einseitig kontrahierend, $D_f = 3 - \xi$	$\sqrt{2}$ (Koide $2/3$)
HLV	φ	zweiseitig (φ, $-1/\varphi$), $\varphi^2 = \varphi + 1$	$2/\sqrt{5}$

Der Fork erscheint also erneut, nun in der Rekursion: ξ winzig (einseitig, fast-kristallin) gegen φ golden (zweiseitige Inflation). Die zusätzliche kontrahierende Mode ($-1/\varphi$, die Perp-Richtung) ist genau HLVs Erweiterung über FFGFT, konsistent mit HLV $\supset$ FFGFT. In jedem Modell steuert eine Zahl sowohl die geschützte Geometrie als auch die Rekursion.

Ein Rekursions-*Phasenwinkel* (ein Analogon zu FFGFTs Koide-Winkel $\theta = 2/9$) wird hier *nicht* festgelegt. Er müsste aus der A_5-Darstellung *hergeleitet* werden; das naive $2/9 + 1/5 = 19/45$ ist Numerologie, hat keine Herleitung und wird nicht übernommen. Gerechnet: `recursion_unify.py`.

Status von φ. Der goldene Schnitt erhält hier eine Bedeutung, die er in reinem FFGFT nicht hatte – aber *nicht* als FFGFT-Konstante, sondern als hergeleiteter Eigenwert von HLVs 5-fach-/Perp-Sektor und damit als Marker der Grenze HLV$\setminus$FFGFT. Das ist mit Dok. 190 (P35) verträglich: dort war φ^N das Warnbeispiel einer beliebigen Fitting-Basis ohne Vorwärts-Gehalt; hier ist φ ein Eigenwert einer benannten Symmetrie (golden inflation $\varphi^2 = \varphi + 1$), keine in einen Exponenten gesteckte Messskala. φ wird damit keine FFGFT-Vorhersage.

T.9 Der HLV-Phasenwinkel aus A_5: $\theta = 0$, die Amplitude trägt den Unterschied

Die geschützte Geometrie lässt sich zu einem *Phasenwinkel* verschärfen. FFGFTs Koide-Winkel $\theta = 2/9$ ist ein Phasen-Offset im 3-komponentigen Zirkulant

$$\sqrt{m_k} = 1 + A\cos\Big(\tfrac{2\pi k}{3} + \theta\Big), \qquad k = 0, 1, 2, \tag{T.8}$$

dessen Koide-Größe $Q = (2 + A^2)/6$ ist, *unabhängig von* θ. Der Modellinhalt zerfällt damit sauber in Amplitude A und Phase θ.

FFGFT. $A = \sqrt{2}$ (die 3-zählige geschützte Amplitude) und $\theta = 2/9$ – ein *freier*, empirischer Offset ($Q = 2/3$ für jedes θ; $2/9$ ist der gemessene Koide-Wert), also $Q = 2/3$.

HLV. $A = 2/\sqrt{5}$ (die 5-zählige/ikosaedrische Amplitude: die 5-fach-Eigenwert-Phasen $e^{\pm 2\pi i/5}$ setzen sie über das Skalarprodukt $1/\sqrt{5}$). Die geschützten Vakuum-Richtungen sind symmetrie-starr, also gibt es *keinen freien Offset*: $\theta_{\mathrm{HLV}} = 0$, was $Q = (2 + \frac{4}{5})/6 = 7/15$ ergibt – genau der Wert in der Fork-Tabelle von Dok. 283.

A_5's Eigenwert-Phasen spielen also explizite, verschiedene Rollen: die 3-fach-Phasen $\pm 2\pi/3$ setzen das Zirkulant-*Gitter* (beide Modelle); die 5-fach-Phasen $\pm 2\pi/5$ (und $\pm 4\pi/5$ in **3′**) setzen HLVs *Amplitude* $2/\sqrt{5}$ – keine freie Phase. Der ehrlich abgeleitete HLV-Phasenwinkel ist daher $\theta_{\mathrm{HLV}} = 0$, und der ganze Modellunterschied steckt in der Amplitude (geschützter Invariant $\sqrt{2}$ vs $2/\sqrt{5}$, d. h. Koide $2/3$ vs $7/15$).

	Amplitude A	Phase θ	Koide $(2+A^2)/6$	Quelle
FFGFT	$\sqrt{2}$	$2/9$ (frei, empirisch)	$2/3$	3-fach
HLV	$2/\sqrt{5}$	0 (starr, geschützt)	$7/15$	5-fach

Das erledigt auch die naive Vermutung $\theta = 2/9 + 1/5 = 19/45 \approx 0{,}422$: sie trifft *weder* die abgeleitete Phase (0) *noch* das Koide-Verhältnis ($7/15 \approx 0{,}467$) und wird nirgends übernommen. Das Ergebnis ist unter der 3-komponentigen Koide-Parametrisierung abgeleitet; $\theta_{\mathrm{HLV}} = 0$ folgt aus der Starrheit der ikosaedrisch geschützten Richtungen (vgl. Dok. 283). Gerechnet: `phase_from_a5.py`.

T.10 Wie FFGFT ausrollt: die Dekompaktifizierung als Brücke zur Beobachtung

FFGFT rollt aus, indem **ein Kreis des Torus T^4 durch den Messvorgang zur Zeit wird** (Typ-I-Dekompaktifizierung). Die drei übrigen Kreise liefern den beobachteten Raum, bleiben aber strukturell unangetastet. Die Rekursion ξ^n wird dabei zum kontinuierlichen Dilatationsfluss mit Log-Periode $|\ln \xi| = \ln 7500 \approx 8{,}92$. Entscheidend: das Ausrollen ist *nicht* Teil der Theorie, sondern die Brücke zur Beobachtung (Dok. 248, Dok. 270) — der Torus bleibt das Original, der ausgerollte Raum ist das Bild.

Die kompakte Form

Im kompakten Bild ist FFGFT der Vier-Torus $\mathscr{M} = T^4 = (S^1)^4$ mit $G = \mathbb{Z}_3$. Alle vier Kreise sind *gleichberechtigt* — es gibt keine ausgezeichnete Zeit. Die drei Raum-Kreise tragen die Eichstruktur (Connection-Laplace), der vierte ist der Masse-Kreis mit der Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$.

Der Messvorgang rollt einen Kreis auf (Typ I)

Die Dekompaktifizierung ist kein mathematischer Grenzübergang $S^1 \to \mathbb{R}$, sondern ein physikalischer Akt: der Messvorgang wählt einen Kreis als Zeit und rollt ihn auf. Das ist Eigenschaft des *eingebetteten Beobachters* (Dok. 248), nicht der Geometrie. Die Typ-I-Abbildung $S^1_{\text{Masse}} \to \mathbb{R}_t$ macht aus der dualen Masse $m = 1/\tilde{T}$ die Ruheenergie; dabei wird die Windungszahl verworfen — der informationsverwerfende Schritt, der den Beobachter in die Zeit zwingt.

Typ	Was passiert	Beispiel
I	ein Kreis wird zur Zeit (aufgerollt, Windung verworfen)	$S^1_m \to \mathbb{R}_t$
II	ein Kreis bleibt kompakt (diskretes Spektrum)	$S^1_x \to S^1_x$ (unverändert)
III	verlustfreie Koordinatentransformation	$T^4 \to \mathbb{R}^3 \times S^1$

Wichtig für die saubere Buchhaltung: der *beobachtete* Raum $\mathbb{R}^3$ entsteht durch die verlustfreie Koordinatentransformation (Typ III) $T^4 \to \mathbb{R}^3 \times S^1$ und trägt kontinuierliche Impulse; das *diskrete, massentragende* Spektrum sitzt dagegen auf der kompakten $\mathbb{Z}_3$-Faser, nicht auf der ausgerollten Achse. „Kompakt/diskret“ (Faser, Massen) und „$\mathbb{R}^3$/kontinuierlich“ (Typ-III-Projektion, Raum) sind also zwei verschiedene Dinge und nicht zu vermengen.

Die Rekursion rollt mit aus

Im kompakten Bild ist die Rekursion diskret, λ^n mit $\lambda = \xi = 4/30000 = 1/7500$. Beim Aufrollen wird daraus ein kontinuierlicher Dilatationsfluss $t \mapsto \xi t$, $t = t_0\,\xi^s$ ($s \in \mathbb{R}$) — der Skalenfluss. Eine diskrete Skaleninvarianz im Kontinuum ist **Log-Periodizität** mit Periode $|\ln \xi| = \ln 7500 \approx 8{,}92$ e-folds. Das ist eine sehr lange Periode; daher ist FFGFT *fast-kristallin*, die fraktale Korrektur winzig: $D_f = 3 - \xi = 2{,}9998667$. Die Ausführung (Dilatationsfluss, Log-Periode, Verzweigung) folgt im nächsten Abschnitt.

Was überlebt — und was nicht

	Kompakt (T^4)	Dekompaktifiziert ($\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_t$)
Masse-Kreis	S^1, $m = 1/\tilde{T}$	$\mathbb{R}_t$, Ruheenergie $E = m$
Raum	$3 \times S^1$	$\mathbb{R}^3$ (Typ III, kontinuierliche Impulse)
Massenspektrum	Eigenwerte von S auf der $\mathbb{Z}_3$-Faser (diskret)	unverändert; $m_k = \mu_k^2\, M$, $M = 1/T$
Rekursion	ξ^n (diskret)	ξ^s (Fluss), Log-Periode $\ln 7500$
Symmetrie	$\mathbb{Z}_3$	$\mathbb{Z}_3$ (erhalten)
Beobachter	keiner	eingebettet (Messvorgang)

Die Physik sitzt im *kompakten* Bild und überlebt das Ausrollen, weil sie aus *Verhältnissen* besteht: die $\mathbb{Z}_3$-Symmetrie (auf der Faser, nicht auf dem Torus), die Koide-Struktur ($r = \sqrt{2}$, $\theta = 2/9$, rahmenunabhängig) und die Massenverhältnisse. Der Massenoperator $S = \mathrm{circ}(t_0, t_1, t_2)$ ändert sich beim Ausrollen nicht — er lebt auf der C_3-Faser, die vom Torus unabhängig ist; die Skala $M = 1/T$ kommt aus dem Zeit-Kreis. Verworfen wird allein die Windungszahl des aufgerollten Kreises. (Drei Zeit-Aspekte: Connection-Laplace ohne Zeit, Prozess-Zeit über den Nicht-Markov-Kern, Geometrie-Zeit über $\tilde{T} \cdot m = 1$; Dok. 282.)

Folge für den D7-Vergleich: FFGFT rollt den Masse-Kreis zur Zeit und behält den massentragenden 3-Kern; Krügers dekompaktifizierte Variante deckt davon nur $\{3' + \text{Zeit}\}$ ab (unten). Gerechnet: `decompact_recursion.py`.

T.11 Dekompaktifizierte rekursive Zeit: kontinuierlicher Dilatations-Fluss und Log-Periodizität

Kompakt und dekompakt hängen über $S^1 \to \mathbb{R}$ zusammen – den Messvorgang (Dok. 270), und die Rekursion folgt dieser Abbildung. Im kompakten Bild ist die Rekursion die *diskrete* Dilatation λ^n ($n \in \mathbb{Z}$): eine *diskrete Skaleninvarianz* (invariant nur unter Skalierung mit λ). Rollt der Masse-Kreis zur nichtkompakten Zeit auf, wird aus der diskreten Rekursion ein *kontinuierlicher* Dilatations-Fluss

$$t \longmapsto \lambda\, t, \qquad t = t_0\, \lambda^s, \quad s \in \mathbb{R}, \tag{T.9}$$

also der Renormierungsgruppen-/Skalenfluss. Eine diskrete Skaleninvarianz im Kontinuum ist *Log-Periodizität* der Periode $|\ln \lambda|$ – gleichwertig: komplexe Skalenexponenten $\alpha = \alpha_0 + \mathrm{i}\, k\, 2\pi/|\ln \lambda|$.

	kompakt	dekompaktifiziert
FFGFT	ξ^n (diskret)	Fluss $t \to \xi t$; Log-Periode $\lvert\ln \xi\rvert = \ln 7500 \approx 8{,}92$
HLV	φ^n (diskret)	Fluss $t \to \varphi t$; Log-Periode $\ln \varphi \approx 0{,}481$

Der Fork bleibt in der dekompaktifizierten Zeit erhalten. **FFGFT**: eine Log-Periode von $\approx 8{,}9$ e-folds – sehr lang, also kaum log-periodisch; fast-kristallin. Es ist dieselbe diskrete Skaleninvarianz, die $D_f = 3 - \xi$ erzeugt. **HLV**: eine Log-Periode von $\approx 0{,}48$ e-folds – kurz und dicht; ein voller Quasikristall, selbstähnlich auf jeder Skala.

FFGFTs *Rekursion* R ist genau dieses Objekt: diskret (ξ^n) im kompakten Bild, ein kontinuierlicher RG-/Skalenfluss nach der Dekompaktifizierung – das R liest sich beidseitig (Rekursion ↔ Renormierungsfluss). Gerechnet: `decompact_recursion.py`.

Marcels dekompaktifizierte Variante: der overdamped Kern ist das dekompaktifizierte leere Fenster

Die Verdopplung hat zwei Zweige; die Dekompaktifizierung $S^1 \to \mathbb{R}$ (der Messvorgang) macht aus jedem einen kontinuierlichen Skalenexponenten $\alpha = \ln \mu$:

Zweig	$\mathrm{Re}\,\alpha$	dekompaktifizierter Charakter
expandierend φ (der D4-Kern, Massen)	$+0{,}481$	relevant; Kohärenz / Revival (Back-flow $5{,}125$)
kontrahierend $-1/\varphi$ (das $3'$-Fenster)	$-0{,}481$	irrelevant; abklingend / overdamped

Beide teilen $|\ln\varphi| \approx 0{,}481$; nur das Vorzeichen unterscheidet sich. Der abklingende Zweig ist genau HLVs overdamped, abklingender Kern (Dok. 282–284): **Marcels overdamped Kern ist das dekompaktifizierte leere Fenster** — das kompakte „leere $3'$" ($\to 0$ diskret) und das dekompaktifizierte „overdamped, abklingend" ($\mathrm{Re}\,\alpha < 0$, $\to 0$ kontinuierlich) sind dasselbe Objekt auf den zwei Seiten der Messung.

Entscheidend: die Containment-Relation überlebt die Dekompaktifizierung. Dekompaktifiziertes D7 ist *nicht* der overdamped Kern allein: es ist der D4-Kern (der relevante, kohärenztragende φ-Zweig mit den Massen und dem Revival $5{,}125$) *plus* das $3'$-Fenster (der irrelevante overdamped Zweig). Der D4-Kern bleibt in dekompaktifiziertem D7 als dessen relevanter Sektor enthalten; Marcels Kern ist das *zusätzliche* Fenster, nicht das Ganze. Das ist nur das dekompaktifizierte Bild von $T^4 \subset T^7$.

Zwei Vorbehalte. Die Identifikation „overdamped Kern = dekompaktifiziertes Fenster" ist eine vorgeschlagene Lesart (beide sind der abklingende, nichtdiskriminierende Sektor), kein Satz. Und weil die Dekompaktifizierung der Messvorgang ist (informationsverwerfend), sitzt dieser Zweig konstruktionsbedingt auf der null-reproduzierbaren Seite: der diskriminierende Inhalt (Revival $5{,}125$) liegt im relevanten D4-Kern, nicht im overdamped Kern. Gerechnet: `decompact_branches.py`.

Bezug zu Krügers HLV-Kernel und Claim-State-Note

Krügers tatsächlicher HLV-Memory-Kernel ist eine positive Mischung abklingender Exponentiale, $K(t) = \sum_i w_i \tau_i^{-1} e^{-t/\tau_i}$ (Krüger, *Pre-Registered Null-Model Benchmark for HLV-Constrained Memory Kernels*, 2026). Jeder Mode ist reines Abklingen (Skalenexponent $\mathrm{Re} < 0$), der Kernel *ist* also das dekompaktifizierte kontrahierende $-1/\varphi$-Fenster des vorigen Unterabschnitts. Entscheidend: Krügers eigener vorregistrierter Benchmark findet diesen Kernel von einem generischen positiven Zwei-Exponential-Kernel statistisch ununterscheidbar — das Uniqueness-Gate bleibt falsch, „not a unique

physical signature.“ Das ist die null-reproduzierbare Seite, durch sein Ergebnis belegt, nicht bloß von uns behauptet.

Der volle HLV-Operator fügt dem positiven Kernel einen skew-adjungierten Phasenkanal ($J^\top = -J$) hinzu. Der skew-adjungierte (nicht-Gradienten-)Teil ist genau die Struktur, die seine Claim-State-Note für anhaltende Rekurrenz fordert — reiner Gradientenfluss trägt keine Zyklen — und ist das Analogon zum relevanten, oszillatorischen FFGFT-Revival ($5{,}125$); der abklingende Kernel ist das overdamped Fenster. Die zwei Sektoren passen: diskriminierender Inhalt sitzt im rekurrenten/kohärenten (nicht-Gradienten-)Teil, nicht in der abklingenden Magnitude.

Ein dritter, schärferer Bezug kommt vom Path-Memory-Komparator (De Jesus, HICE-MEM, für Krüger): zeitliche Ordnung ist antisymmetrisch, $\mathrm{Area}(P) = \sum_{i<j}[A_i, A_j]$ mit $\mathrm{Area}(P^{\mathrm{rev}}) = -\mathrm{Area}(P)$, also sind Magnitude und Spektrum einer *einzelnen* Historie *gerade* unter Umkehr — das anti-hermitesche Spektrum $\{i\lambda\} \mapsto \{-i\lambda\}$ ist dieselbe Menge. Das Ordnungs-Vorzeichen geht verloren, solange man es nicht gegen eine orientierte Referenz (eine zweite Historie) kontrahiert. Das ist dieselbe Struktur wie die Messung $S^1 \to \mathbb{R}$, die die Windung verwirft, während die Magnitude überlebt: der diskriminierende Inhalt ist relational, nicht einzel-historisch.

Schließlich der Claim-State. Krügers Klärungs-Note (2026) trennt kompakte interne Spiral-Time, SI-Messzeit und den Signal-Index $\Delta\Phi_{\mathrm{sig}}$ und verbietet ihre Gleichsetzung ohne explizite Projektions-/Kalibrierungskarte K — dieselbe Disziplin wie „Struktur ≠ Physik ohne Karte.“ Es wird keine Identität der beiden Spiral-Begriffe und keine Holonomie behauptet: Krügers Spiral-Time tritt als beschränkter kinetischer Vorfaktor $A_\psi(t)$ am Kernel (Benchmark) und als triadische kompakte Koordinate $\theta \in S^1$ (Note) auf, keiner davon ist die log-periodische Log-Spirale der dekompaktifizierten Rekursion. Gerechnet: `marcel_kernel_match.py`.

Krügers ausgerollte Variante deckt nur $\{3' + \text{Zeit}\}$ ab — nicht den vollen D7

Eine Einordnung der dekompaktifizierten Seite, *ohne* Übernahme von Krügers Formeln. Das kompakte FFGFT-Resultat — $6 = 3 \oplus 3'$ als fraktale innere Rekursion, rein aus dem Goldenen Schnitt (Fibonacci-Operator, Eigenwerte φ expandierend / $-1/\varphi$ kontrahierend) — ist hergeleitet und skriptgedeckt (`recursion_doubling_empty.py`, `verify_recursion_doubling.py`, $11/11$) und steht unabhängig von HLV. Es wird hier nicht angetastet; der folgende Vergleich berührt es nicht.

Krügers jüngste dekompaktifizierte Konstruktion (*Recursive Spiral-Time Nesting as a Route to a Six-Dimensional Host Carrier*, 2026, mit den null-gegateten Läufen Zenodo 20770402 / 20772007) erreicht einen 6D-Host über eine *Stabilitäts-Selektion* (eine Spektrallücke), *nicht* über φ — ein anderer Mechanismus, kein φ-Ersatz. Für die Vereinbarkeit zählt jedoch nicht der Mechanismus, sondern *was die ausgerollte Variante füllt*: ausschließlich den **leeren** Sektor. Sein abklingender Kern ist das dekompaktifizierte $-1/\varphi$-Fenster (oben); sein Host-Sektor ist candidate-only und massenlos („host dimension, not masses“); und seine kompakte Zeit erfüllt $\chi(t) \neq \ln t$ (Klärungs-Note), ist also nicht die Log-Spirale der FFGFT-Rekursion.

Die Volltext-Fassung (2026) ergänzt die downstream-Kette BD3–BD5 (Zenodo 20773678): nativer endlicher Carrier (BD3), low-q-Lorentz/EFT-Pre-Screen (BD4) und semantischer Transfer (BD5). Sie fügt nur weitere Struktur hinzu und erreicht

weiterhin keine Physik — BD4-HARD weist das low-q-Verhalten selbst als *carrier-bedingt, nicht HLV-spezifisch* aus (matched nulls bestehen ebenso), BD0/BD1 bleiben negativ. Das verstärkt das $\{3' + \text{Zeit}\}$-Bild: der Carrier ist elaboriertere, aber massenlose Struktur. (Die Nesting-Idee selbst datiert Krüger auf die Januar-2026-HLV-Grundlage, Zenodo 18255159.)

In D7-Buchhaltung — $7 = [\,3\text{-Kern (kristallographisch, Massen)} + \text{Zeit}\,] + 3'$ — rollt seine Variante damit nur $3'$ **+ Zeit** aus: das leere Perp-Fenster plus die ausgerollte Zeitachse ($S^1_m \to \mathbb{R}_t$, gemeinsam). Der massentragende kristallographische 3-Kern (φ/ξ, $\sqrt{2}$, Koide $2/3$) wird von ihr *nicht erreicht* und bleibt FFGFTs. Genaugenommen ist sein HLV — dekompaktifiziert realisiert — *nicht* der vollständige D7-Raum, sondern der Untersektor $\{3' + \text{Zeit}\}$; den vollen D7 (Mass-Kern + Zeit + $3'$) realisiert FFGFT.

Daraus die Vereinbarkeit, knapp: seine Seite $\subseteq$ FFGFTs $\{3' + \text{Zeit}\}$. Der formale Containment $T^7 \supset T^4$ ($A_5 \supset C_3$) bleibt; er wird hier nur präzisiert, *wo* Krügers ausgerollte Konstruktion tatsächlich sitzt. Kompatibel ist das, *solange er die candidate-only-Linie hält* (seine Gates B0–B7); überzöge er später („6D-Host = physische Raumzeit mit Massen"), wäre die Vereinbarkeit neu zu prüfen — aktuell tut er das ausdrücklich nicht. Abgedeckt durch `decompact_branches.py` und den Leere-Satz oben; für seine Formeln ist kein neues Skript nötig.

T.12 Was der d7-Sektor berechnet: Massen aus ξ, Spektren aus φ

In Analogie zu ξ fragt man, was das d7-Modell (T^7, A_5) berechnet. Die ehrliche Antwort lautet: *keine Massen*. Massen sind der Output des kristallographischen 3-fach-Sektors mit ξ, den d7 bereits enthält (HLV $\supset$ FFGFT); d7 reproduziert sie *durch* seinen FFGFT-Unterteil, nicht als neuen Inhalt. Die *zusätzliche* d7-Struktur (5-Zähligkeit, Perp-Richtungen, φ) ist genau der Teil, der keine Massen trägt. Was er stattdessen trägt:

Größe	d7 / 5-fach-Output	Status
geschützte Amplitude	$2/\sqrt{5}$, Koide-Analogon $Q = 7/15$	hergeleitete Zahl
Phase	$\theta_{\text{HLV}} = 0$ (kein freier Koide-Winkel)	hergeleitet
Rekursionsskala	φ; Turm φ^n; Log-Periode $\ln\varphi \approx 0{,}481$	hergeleitet
Spektrum	aperiodisches Quasikristall-Lückenspektrum, φ-Skalierung	Diskriminator (271/283)

Warum das Spektrum hier nicht zu Massen führt

FFGFTs Massen sind selbst spektral – Eigenwerte des T^4-Verbindungs-Laplace, die Koide-Zirkulant-Niveaus – die Frage ist also berechtigt; die Antwort hängt davon ab, *welches* Spektrum. Eine Masse ist ein scharfes, isoliertes Niveau, also braucht das Ablesen von Massen ein *diskretes Punktspektrum*. Die 3-Zähligkeit ist gitterverträglich ($2\cos(2\pi/3) = -1 \in \mathbb{Z}$): sie schließt auf einem periodischen Torus zu

genau drei scharfen Eigenwerten $\{-1,-1,2\}$ – dem Triple. Die 5-Zähligkeit ist gitterunverträglich ($2\cos(2\pi/5) = 1/\varphi \notin \mathbb{Z}$): kein periodisches Gitter trägt sie, ihr einziger Träger ist ein aperiodischer Quasikristall, dessen Spektrum *singulär-stetig* (Cantor-artig) ist – eine dichte Lückenmenge, selbstähnlich unter φ, ohne isolierte Niveaus (eine Fibonacci-Kette zersplittert auf jeder Skala in Lücken, gegen die wenigen Bänder der periodischen Kette; `spectrum_to_mass.py`). Es gibt kein ausgezeichnetes Triple zum Ablesen. Daher braucht „Spektrum → Masse" ein Punktspektrum, also einen periodischen / kristallographischen Träger – und der einzige kristallographische Teil von d7 ist sein 3-fach-Kern, also FFGFT. Der Weg kehrt stets nach FFGFT zurück; das echt d7-eigene (aperiodische) Spektrum kann keine Massen liefern. Und ein dichtes selbstähnliches Spektrum hat ein Niveau nahe *jeder* Zahl, also „passt" φ^N zu allem – die P35-Numerologie-Falle (Dok. 190, R44): die Reichhaltigkeit des Quasikristall-Spektrums ist genau das, was das Ablesen einer Masse gehaltlos macht, während die Sparsamkeit des diskreten Torus-Spektrums einen Eigenwert dort zur echten Vorhersage macht.

Informationsgehalt: Struktur-Spektrum gegen Energie-Spektrum

Der vorige Punkt darf *nicht* als „das Quasikristall-Spektrum trägt keine Information" gelesen werden. Es trägt sehr wohl welche – ein Quasikristall hat *zwei* Spektren verschiedenen Typs. Das *Struktur-/Beugungsspektrum* $S(q) = |\sum_n e^{\mathrm{i}qx_n}|^2$ ist *rein punktförmig*: scharfe Bragg-Spitzen an φ-Modul-Positionen, hier $\approx 21\times$ über dem Rausch-Boden eines Zufalls-Nullmodells gleicher Zusammensetzung (`quasicrystal_information.py`). Diese scharfe, vom Nullmodell unterscheidbare Ordnung *ist* die Information – genau HLVs Substrat-Unterscheidbarkeit, und die steht. Das *Energie-/Laplace-Spektrum* ist das singulär-stetige (Cantor-artige) aus dem vorigen Unterabschnitt; ihm fehlen die scharfen Niveaus, daher keine Massen. Die beiden sind verschiedene Objekte: die Information liegt in der relationalen langreichweitigen Ordnung (Struktur-Spektrum), nicht in einzelnen Energie-Niveaus (die Energiezustände sind kritisch / fraktal, keine sauberen Knoten). Der P35-Vorbehalt ist daher eng: gehaltlos ist allein das Anpassen *einer einzelnen Zielzahl* als φ^N; das Struktursignal nicht.
Ehrlicher Rest. Die Stelle, an der die FFGFT-Analyse ein HLV-Signal *null-reproduzierbar* fand, ist der *zeitliche* überdämpfte Gedächtniskern (Dok. 282–284, biexponentiell, nicht-identifizierbarer Sektor) – die Zeit-Domäne, ein anderes Objekt als das räumliche Struktur-Spektrum. Also: räumliche Struktur informativ (HLVs Punkt gilt); zeitlicher überdämpfter Kern = der stehende Kritikpunkt. Die unterscheidende Information lebt im strukturell-spektralen Signal (rein-punktförmige Beugung; periodisch-gegen-aperiodisch) – der Diskriminator aus Dok. 271/272/283. FFGFT und HLV sind sich einig, *wo* die Information sitzt (in der Struktur); die Kritik betraf eine andere (zeitliche) Behauptung.

Die eine Stelle, an der d7 Massen berühren könnte (Vermutung)

Der $6 = 3 \oplus 3'$-Split lässt die Perp-Darstellung $3'$ (Charakter $1-\varphi = -1/\varphi$) als *zweite* Triplett-Position; FFGFT realisiert die eine 3 (geladene Leptonen, Koide $2/3$),

die $3'$ ist leer. *Falls* dort ein physikalisches Triple säße, wäre seine Vorhersage $Q = 7/15$ – ein falsifizierbares Ziel, keine hergeleitete Teilchenmasse. Gerechnet: `what_d7_computes.py`.

T.13 Das Elektron-Mode in D7: die Einbettung existiert, das Massen-Label ist C_3-Rahmen

Eine natürliche Konsistenzfrage: wird ein Mode in D4 als Elektron abgelesen, so muss es ein Bild in D7 haben, da $T^4 \subset T^7$. Das hat es. Das Elektron-Mode hebt sich zum D7-Mode mit gleicher Windung auf den vier D4-Kreisen und Null-Windung auf den drei Zusatzkreisen; da es ganz im D4-Block sitzt, bleibt sein Laplace-Eigenwert — die Masse — unverändert. Die Übersetzung ist die Einbettung selbst.

Das widerspricht nicht „Massen brauchen den D4-Kern." Das scharfe Label „Elektron" ist eine C_3-(kristallographische) Aussage, keine A_5-Aussage: das Elektron-Mode ist Eigenvektor der 3-Zähligkeit. Die volle D7-Symmetrie ist A_5, deren 5-fach-Elemente nicht mit C_3 kommutieren — sie drehen das Elektron-Mode in eine Myon/Tau-Mischung. Unter einer echten ikosaedrischen 5-Drehung behält die Elektron-Richtung $0{,}762$ ihres Gewichts und leckt $0{,}238$ in die μ/τ-Richtungen (`electron_mode_in_d7.py`). Im vollen A_5-Rahmen ist „Elektron" also kein scharfer Eigenzustand; um es als Elektron (scharfe Masse) zu lesen, wählt man die C_3-Eigenbasis — die Einschränkung auf den kristallographischen Block, also „zurück nach D4." Die Entsprechung ist die Einbettung; die Massen-Ablesung ist die Rahmen-Wahl; beides ist dieselbe Aussage.

Zwei Absicherungen. Das Mischen ist ein Basiswechsel, kein Verschmieren: die 5-Zähligkeit dreht den Bezeichnungs-Rahmen und zerstört das physikalische Mode nicht, das in jedem C_3-Rahmen perfekt scharf bleibt. Und das Mode bleibt im periodischen „3"-Block (Punktspektrum) — es leckt nicht in den aperiodischen $3'$-Sektor; die 5-Zähligkeit dreht nur $e \leftrightarrow \mu \leftrightarrow \tau$ innerhalb der physikalischen „3". Schließlich ist es wieder der Messvorgang (Dok. 270/248), welcher Rahmen als 3-Zähligkeit zählt: das Mode existiert rahmenunabhängig in D7, das scharfe Teilchen-Label ist rahmenabhängig.

T.14 Das $3'$ ist die erste Rekursion: warum Rekursionsrichtungen im kompakten Bild leer sind

Die Spaltung $6 = 3 \oplus 3'$ und die goldene Rekursion sind nicht zwei Tatsachen, sondern eine: die Verdopplung *ist* die einmal angewandte Rekursion. Dieser Abschnitt macht das explizit und zieht die Folge für das leere $3'$.

Die Verdopplung ist der Rekursionsoperator

Der Fibonacci-/Inflations-Operator ist

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \det M = -1, \quad \operatorname{tr} M = 1, \quad \text{charakteristisches Polynom } \lambda^2 - \lambda - 1 = 0. \tag{T.10}$$

Seine beiden Eigenwerte sind $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1{,}618$ (expandierend, $|\varphi| > 1$) und $-1/\varphi = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \approx -0{,}618$ (kontrahierend, $|-1/\varphi| < 1$), und $\varphi^2 = \varphi + 1$. Entscheidend: die Galois-Konjugierte, die die beiden 3-dimensionalen A_5-Irreps unterscheidet, $\varphi \leftrightarrow 1 - \varphi$, ist genau der kontrahierende Eigenwert: $1 - \varphi = -1/\varphi$. Die beiden Eigenrichtungen von M *sind* also die beiden Irreps:

$3 =$ der φ- (expandierende) Eigenmode, $\qquad 3' =$ der $-1/\varphi$- (kontrahierende) Eigenmode.

Das Erscheinen von $3'$ neben 3 ist daher eine Anwendung der goldenen Rekursion — die Verdopplung ist die Eigenstruktur der Rekursion. (Dass M der Rekursionsoperator ist, bestätigt $M^n = \left(\begin{smallmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{smallmatrix}\right)$, die Fibonacci-Zahlen.)

Der innere Zweig ist das Fenster — und damit leer

Im Cut-and-Project-Bild eines Quasikristalls ist der physikalische Raum die expandierende Richtung (φ) und der innere Raum die kontrahierende ($-1/\varphi$). Der innere Raum trägt das Akzeptanz-*Fenster*, keine physikalischen Positionen. Unter Iteration zerfällt die innere Komponente geometrisch, während die physikalische wächst:

n	|physikalisch (φ)|	|innen $(3')$| $\sim (1/\varphi)^n$
0	1,01	0,27
2	2,64	0,10
8	47,4	0,0058
20	—	$1{,}2 \times 10^{-9}$

Die Zerfallsrate pro Schritt ist $1/\varphi^2 \approx 0{,}382$. Das $3'$ (innerer Zweig) trägt also keine physikalischen Positionen und verschwindet unter der Rekursion: deshalb ist es leer.

Das allgemeine Prinzip: der Keim trägt, die Rekursion ist leer

Der kristallographische Keim (die „3", φ-Zweig) hält die Massen; alles, was die goldene Rekursion daraus erzeugt — die konjugierte $3'$ und der φ^n-Turm — ist leer von *neuem* Massengehalt. „Leer" heißt kein neues scharfes Niveau / kein neues Tripel, nicht „tut nichts": die Rekursion trägt Struktur (FFGFTs ξ^n liefert die fraktale Korrektur $D_f = 3 - \xi$; HLVs φ^n das Quasikristall-Fenster). Mehrere frühere Ergebnisse fallen in einen Satz zusammen:

$3'$ *leer* $=$ *Rekursionsrichtungen leer* $=$ *Massen brauchen den kristallographischen Kern* $=$ *der Rekursions-Sektor hat kein Punktspektrum* $=$ *der Cut-and-Project-Innenraum trägt keine physikalischen Positionen.*

Folge für den 3′-Kandidaten: warum eine Dynamik nötig ist

Das gibt einen *strukturellen* Grund für die zuvor genannte Lücke. Ein physikalisches Tripel ins $3'$ zu setzen heißt, Massengehalt in den inneren / Fenster-Raum zu legen — genau das, was die kompakte Rekursion leer hält. Die Rekursion allein kann das

nicht liefern; es braucht eine Dynamik, die das Fenster füllt (ein Hamiltonian / eine Wechselwirkung auf dem 7D-Torus). Der konditionale $3'$-Kandidat (der Neutrino-Sektor) braucht eine Dynamik also nicht nur aus methodischer Vorsicht, sondern aus diesem strukturellen Grund: die Rekursion lässt diesen Zweig konstruktionsbedingt leer.

Prüfskripte

- `recursion_doubling_empty.py` — Demonstration: Eigenstruktur von M (φ / $-1/\varphi$), physikalisch gegen innen unter Iteration.
- `verify_recursion_doubling.py` — Assertions (PASS/FAIL): Eigenwerte, char. Polynom, $1-\varphi=-1/\varphi$, M^n Fibonacci, innerer Zweig $\to 0$ mit Rate $1/\varphi^2$. $11/11$ PASS.

T.15 Der Rekursionsturm D(4+3n): Höhe ist leer, Tiefe braucht Dynamik

Nach dem vorigen Abschnitt ist die Verdopplung eine goldene Rekursion. Die Konstruktion iteriert: jede Rekursion fügt eine 3 hinzu (den kontrahierenden $-1/\varphi$-Zweig), was einen Dimensionsturm $D(4+3n)$, $n=0,1,2,\ldots$ ergibt.

n	Dim	
0	D4	Keim (FFGFT, kristallographischer Kern)
1	D7	eine Rekursion (die erste $3'$)
2	D10	zwei Rekursionen
3	D13	
100	D304	formal unbegrenzt

Aber der Satz des vorigen Abschnitts legt fest, was das bedeutet: jede hinzugefügte 3 ist ein *leeres* inneres Fenster (der kontrahierende $-1/\varphi$-Zweig, der unter Iteration $\to 0$ geht). Also sind 100 Rekursionen 100 leere Fenster, *nicht* 100 Physik-Schichten; die Massen liegen auf *jeder* Stufe des Turms nur im D4-Keim. Der Turm ist eine geometrische Hierarchie (geschachteltes Cut-and-Project), kein neuer testbarer Inhalt — und der Satz ist es, der ihn vor der Zahlenmühle bewahrt (man könnte sonst beliebig viele „Stufen" behaupten, alle leer).

Zwei Vorbehalte. **(i)** „$+3$ pro Schritt" setzt voraus, dass jede Stufe das ikosaedrische $3+3$-Muster wiederholt; eine andere nicht-kristallographische Symmetrie (z. B. 8-zählig, Silberzahl $1+\sqrt{2}$) gäbe ein anderes Inkrement, also ist $D(4+3n)$ die ikosaedrisch-wiederholte Wahl, nicht zwingend. **(ii)** Jedes Fenster zu füllen braucht eine Dynamik — dieselbe offene Lücke auf jeder Stufe; der Turm entkommt der Lücke nicht, er vervielfältigt sie.

Konstruktive Konsequenz. Der produktive nächste Schritt ist nicht Höhe (D10, D100 — mehr leere Fenster), sondern Tiefe: die Dynamik, die das *erste* Fenster füllt. Und ein physikalisch interessantes erstes Fenster existiert bereits — das $3' \to$ Neutrino-Sektor (konditional, nächster Abschnitt). Dort liegt der Hebel, nicht im Hinaufzählen des Turms. Gerechnet: `recursion_tower.py`.

Zwei Rekursionen — und wozu die leeren Fenster gut sind

Eine naheliegende Spannung: „jede $+3$-Stufe ist eine Rekursionstiefe, Rekursionen sind fraktale Vertiefungen — aber wenn alle leer sind und 4D schon alles trägt, warum sollte das Ausrollen dann Masse geben?“ Sie löst sich, sobald man *zwei verschiedene* Rekursionen trennt, die leicht verschmelzen:

- **Skalen-Rekursion** $\xi_{n+1} = \xi_n(1 - 100\xi)$: verfeinert *dieselben* vier Dimensionen über Skalen (Log-Periode $\ln 7500$) und trägt $D_f = 3-\xi$ bzw. K_{frak} — sie fügt *keine* Dimension hinzu. Das ist die eigentliche „fraktale Vertiefung“.
- **Dimensions-Rekursion** $D(4 + 3n)$ (goldener Operator, $\varphi/-1/\varphi$): stapelt leere $3'$-/$3''$-Fenster; das Gewicht des inneren Zweigs zerfällt $(1/\varphi^2)^n \to 0$, kein Punktspektrum.

Der Massengehalt beim Dekompaktifizieren kommt vom Aufrollen des *Masse-Kreises* (4. Kreis von D4, $\tilde{T}\cdot m = 1$, Typ I), der die *eine* Skala $M = 1/T$ liefert; die dimensionslosen Verhältnisse lagen schon kompakt in 4D. Die Kaluza-Klein-Intuition (Extra-Dimension ausrollen → Massenleiter) gilt also für den Masse-Kreis, *nicht* für die $3'$/$3''$-Fenster: ein leeres Fenster ausgerollt ergibt leeren Perp-Raum, keine Massenleiter, solange keine *Dynamik* (ein Hamiltonian auf dem Fenster) es füllt.

Wozu dann die Rekursion, wenn sie keine neuen Massen liefert? Nicht für Niveaus, sondern für *Struktur*: die Skalen-Rekursion trägt die fraktale Korrektur (D_f, K_{frak}), die Dimensions-Rekursion das Cut-and-Project-*Fenster*, das die aperiodische Ordnung und die *spektrale Feinstruktur* (Aufsplitterung, Inharmonizitäten) auf den kristallographischen Grundniveaus formt — nicht neue Grundtöne, sondern deren Feinstruktur. Das $3'$-Fenster ist insofern ein von der Geometrie bereitgestellter *Platz*; ob er physikalischen Inhalt bekommt, entscheidet eine Dynamik (der konditionale Neutrino-Kandidat, nächster Abschnitt), nicht das bloße Ausrollen. Gerechnet: `klaer_rekursion_masse.py`.

T.16 Kandidat für das 3′: der Neutrino-Sektor (konditional)

Was könnte im leeren $3'$ liegen? Eine *offene* Frage — ein konditionales Ziel, keine Vorhersage. Der Diskriminator ist der Koide-Wert $Q = \sum m/(\sum \sqrt{m})^2$; das konditionale $3'$-Ziel wäre $Q = 7/15 \approx 0{,}467$. Die gemessenen Tripel:

Tripel	Q	
geladene Leptonen e, μ, τ (die „3“)	$0{,}667$ $(= 2/3)$	weit über Ziel
Up-Quarks u, c, t	$0{,}849$	weit über Ziel
Down-Quarks d, s, b	$0{,}731$	weit über Ziel

Alle gemessenen geladenen Tripel liegen bei $Q \geq 0{,}67$ — keines trifft $7/15$; sie sind als $7/15$-Träger ausgeschlossen (robust, auch unter den Massenunsicherheiten). Es bleibt *ein* offener Kandidat: die **Neutrinos**. Ihr Q ist nicht festgelegt, da die absolute Massenskala unbekannt ist; im Scan (normale Ordnung) ist $Q \approx 0{,}586$ bei hierarchischem Spektrum und sinkt mit wachsender Skala gegen $1/3$. Es kreuzt $7/15$ bei einer leichtesten Masse $m_0 \approx 1{,}9$ meV ($\sum m_\nu \approx 61$ meV, innerhalb der Kosmologie-Schranke

~ 120 meV). Strukturell ist das der natürliche Partner: Leptonen zerfallen in ein geladenes Tripel (die „3“) und ein neutrales (Neutrinos), und das zweite 3-Irrep ist der Platz für das neutrale Tripel.

Status (streng). Es ist ein konditionales Ziel, *keine* Vorhersage. Q läuft *stetig* mit m_0, also ist „$7/15$ getroffen“ nur dann gehaltvoll, wenn $7/15$ unabhängig durch eine Dynamik fixiert ist (das fehlende Stück aus dem Abschnitt „Stand der D7-Massenberechnung“) *und* ein Nullmodell schlägt. Es ist genau Marcel Krügers Struktur: Träger = Neutrinos, Observable = Koide-Q, Nullkontrolle = gegen generische Tripel. Damit ist die Frage von „raten“ auf „prä-registrierbares Ziel“ gehoben — mehr nicht. Gerechnet: `which_triple_in_3prime.py`.

Interpretation (Konjektur, nicht aus den Sätzen abgeleitet). Dass der Rekursions-Sektor kein Punktspektrum trägt, ist mit dem besonderen Charakter des Neutrino-Sektors verträglich. Es liefert jedoch keine Massen, keine Δm^2 und keine Mischungswinkel — diese verlangen die noch fehlende Dynamik. Und der Turm fügt leere Fenster hinzu, keine zusätzlichen Neutrino-Spezies.

Welcher Energietyp das Fenster füllt — und die offene Rechenlücke. Über $\tilde{T} \cdot m = 1$ erzwingt FFGFT *zwei* Energietypen (Dok. 255): *statisch* (Ruhemasse = topologisch eingefrorene Windung, der kristallographische Kern) und *kinetisch* (frei; für Masselose die einzige Form, $E = hf$) — „Masse ist eingefrorene kinetische Energie“. Die Dynamik, die das $3'$-Fenster füllt — die zeitliche, holografische Skalen-Entwicklung (Dok. 263) —, liefert daher den *kinetischen* Typ, nicht eingefrorene Ruhemasse: ein gefülltes Fenster ist photon-/neutrino-artig (masselos / fast-masselos), kein massives Tripel. Das passt zum Neutrino als „near-massless photon“ (Dok. 047, $m_\nu \sim \frac{\xi^2}{2} m_e$) und zur Zeit-als-Energie $\tilde{T} = 1/\max(m, \omega)$ (Dok. 067/080): für $m = 0$ ist $\tilde{T} = 1/\omega$.

Offene Rechenlücke. Was fehlt, ist die *abgeleitete* Regel, den kinetischen Anteil über die Dualität als ξ*-fraktalen* Bruchteil des statischen zu berechnen. Vorhanden sind das Gerüst (Dok. 080: $\tilde{T} = 1/\max(E, \omega)$, Elektron = Ruhe + γ-Kinetik, Photon = rein kinetisch) und *eine* Instanz (Dok. 047: $\xi^2/2$-Suppression — aber als Ansatz, nicht hergeleitet; Dok. 204 hat eine ξ-Korrektur auf die kinetische Energie). Die allgemeine Herleitung „kinetisch = ξ-fraktaler Anteil des statischen, via $\tilde{T} \cdot m = 1$“ ist genau die noch fehlende Dynamik — der nächste Rechenschritt, kein gelöstes Stück.

T.17 Stand der D7-Massenberechnung: Lücke und nächster Schritt

Die HLV-Konstruktion liefert eine konsistente geometrische Einbettung (T^7, A_5, $3 \oplus 3'$) und qualitative Vorhersagen (5-zählige Kohärenz, $2/\sqrt{5}$ statt $\sqrt{2}$). Eine explizite Massenformel auf T^7 existiert jedoch nicht — die Symmetrie allein legt die Massenmatrix nicht fest. Es fehlt eine spezifizierte Dynamik (Hamiltonian, Wechselwirkungen) auf dem 7D-Torus. Solange diese nicht gegeben ist, bleiben die 5-zähligen Vorhersagen qualitativ („es sollte Signaturen geben“) und nicht quantitativ („bei diesem Wert“). Die FFGFT bleibt damit das einzige Modell mit einer expliziten, getesteten Massenformel.

Die HLV ist eine Struktur-Vermutung, die eine Dynamik braucht — und das ist die nächste Baustelle.

T.18 Wo die fraktalen Korrekturen sitzen

Die fraktalen Korrekturen sitzen an zwei kausal verketteten Ebenen — und ausdrücklich *nicht* in den Verhältnissen.

Wurzel: die konforme fraktale Metrik

Die fundamentale fraktale Größe ist $\xi = 4/30000$ mit der Rekursion $\xi_{n+1} = \xi_n(1 - 100\xi_n)$ (Dok. 133/275). Ihre metrische Manifestation ist *konform*, nicht diagonal:

$$g_{\mu\nu}^{(\text{frak})}(x) = \eta_{\mu\nu}(1 + \xi f(x)), \qquad D_f = 3 - \xi \quad \text{(Dok. 051)},$$

wobei $f(x)$ die Ortsfunktion der konformen fraktalen Metrik ist (keine Frequenz und nicht die Grundwindungszahl $f = 1/\xi$), mit der ξ-Korrektur speziell auf der Zeit-Komponente, $ds^2 = (1 + \xi\lambda_0/E_\xi)\,dt^2 - dx^2$ (Dok. 025). In der Wicklungs-/Harmonik-Struktur erscheint sie als Dämpfungs-Exponent $\tau^{-(1+\xi)}$ (Dok. 159). *Nicht* als statische Metrik $\text{diag}(1, 1, 1, 1+\xi)$ — diese Form ist nicht belegt; der Masse-Kreis ist über $\tilde{T} \cdot m = 1$ ausgezeichnet.

Ebene 1: lokale Raumzeit-Porosität

Die erste manifeste Korrektur ist die lokale Raumzeit-Dimension

$$D_f^{\text{Raum}} = 3 - \xi \approx 2{,}99987 \quad \text{(Dok. 133)},$$

eine winzige Abweichung von der Ganzzahligkeit ($\sim 0{,}003\%$, praktisch 3). Dies ist *nicht* die Typ-II-Projektion (Dok. 270: $T^4 \to T^3 \to \mathbb{R}^3$, sauber, bei großem R); die Porosität ist ein separater quantengravitativer Effekt.

Ebene 2: effektive Dimension und K_{frak}

Über den kumulativen RG-Lauf (17 Größenordnungen, Planck → elektroschwach) wird aus der Porosität eine *effektive* Dimension $D_f^{\text{eff}} \approx 2{,}973$, die laut Dok. 133 „nicht identisch“ mit D_f^{Raum} ist. Aus ihr emergiert die Korrektur für Absolutwerte:

$$K_{\text{frak}} = \left(\frac{D_f^{\text{eff}}}{3}\right)^{D_f^{\text{eff}}/2} \approx 0{,}9867 \approx 1 - 100\xi.$$

Der Skalenlauf allein ergibt dabei nur 39ξ; der Verstärkungsfaktor 100 und damit der Wert $D_f^{\text{eff}} \approx 2{,}973$ sind eine Setzung (Dok. 133). Bestätigt wird $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ durch den Vergleich des nackten und des korrigierten E_0 mit α. Die kausale Kette:

$$\underbrace{3 - \xi}_{\text{Porosität } \sim 0{,}003\%} \xrightarrow{\text{RG-Lauf, 17 GO}} \underbrace{D_f^{\text{eff}} \approx 2{,}973}_{\text{effektiv}} \xrightarrow{\text{Formel}} \underbrace{K_{\text{frak}} \approx 0{,}9867}_{\sim 1{,}3\%}.$$

K_{frak} ist also *keine* unabhängige Korrektur „im SI-Schritt“, sondern als die RG-kumulierte Folge von $3-\xi$ gedacht, mit dem gesetzten Faktor 100; sichtbar wird sie erst im Absolut-/SI-Übergang (Dok. 122).

Wo sie *nicht* sitzen

Größe	enthält ξ / K_{frak}?
$r=\sqrt{2}$, $\theta=2/9$	nein (reine $\mathbb{Z}_3$-Struktur)
μ_k (Eigenwerte von S)	nein
Massenverhältnisse	nein (K_{frak} kürzt sich)
α (einheitenfrei)	ja (K_{frak} über E_0)
Koide $Q=2/3$	nein (reine $\mathbb{Z}_3$-Struktur)
$D_f^{\text{Raum}}=3-\xi$, D_f^{eff}	ja (Dimension)
Absolutwerte (m in kg, G in SI)	ja (K_{frak})

Die Korrekturen betreffen nur die Dimensionen (D_f^{Raum}, D_f^{eff}), die Absolutwerte und α über E_0 (K_{frak}). **Massenverhältnisse sind ξ- und K_{frak}-frei** — die entscheidende Aussage aus Dok. 101/122.

T.19 Von der Geometrie zu SI: die Umrechnung

Diese abschließende Brücke ist *rein konventionell* — sie fügt keine Physik hinzu, sondern übersetzt die geometrischen Größen in menschengemachte Einheiten. Fundamental ist allein die dimensionslose Zahl $\xi=4/30000$; $c,\hbar$ sind Konvention (SI-2019), G ist Messdatum, und Massenverhältnisse, Koide $2/3$ sowie α sind dimensionslose Verhältnisse (Dok. 101, Dok. 122). Die entscheidende Trennung: *Massenverhältnisse* sind einheiten- und K_{frak}-frei (α ist einheitenfrei, enthält K_{frak} aber über E_0); die fraktale Korrektur $K_{\text{frak}}=1-100\xi\approx 0{,}9867$ tritt *erst* im Übergang zum *Absolutwert* (SI) auf. Die „Zirkularität“ der Umrechnung ist damit metrologisch (SI-2019), kein physikalisches Problem (Dok. 101).

Die kompakten Größen (rein geometrisch)

Größe	Kompakter Wert	Bedeutung
r	$\sqrt{2}$	$\mathbb{Z}_3$-Zirkulant-Amplitude
θ	$2/9$	$\mathbb{Z}_3$-Phase
ξ	$4/30000$	fraktale Rekursion (fundamental)
μ_k	$\{0{,}04035;\ 0{,}58021;\ 2{,}37944\}$	dimensionslose Eigenwerte von S
Q	$2/3$	Koide-Invariante

Diese sind einheitenfrei und K_{frak}-frei.

Die Skala M aus dem Zeit-Kreis

Der Masse-Kreis S^1 trägt über $\tilde{T}\cdot m = 1$ die *einzige* dimensionsbehaftete Größe $M = 1/T$ — eine Masse in natürlichen Einheiten. Sie wird aus *einer* gemessenen Masse fixiert (Myon):

$$M = \frac{m_\mu^{\text{gem}}}{\mu_\mu^2} = \frac{105{,}6583755}{0{,}58021^2} \approx 313{,}86\ \text{MeV}.$$

Alle anderen Massen sind dann *vorhergesagt* — das ist der Test der Theorie.

Die Massen (Verhältnis-Ebene, K_{frak}-frei)

Lepton	μ_k	$m_k = \mu_k^2 M$ (MeV)	gemessen (MeV)
Elektron	0,04035	0,51100	0,51099895
Myon	0,58021	105,658 (Anker)	105,6583755
Tau	2,37944	1776,98	1776,86

Die Massenverhältnisse sind einheiten- und K_{frak}-frei: $m_\mu/m_e = 206{,}77$, $Q = 2/3$. (Elektron auf fünf Stellen, Tau als $\sim 0{,}007\%$-Vorhersage; μ_k aus $r = \sqrt{2}$, $\theta = 2/9$, an Koide + (e,μ) gebunden.)

Die Feinstrukturkonstante α (einheitenfrei, mit K_{frak} über E_0)

$$\alpha = \xi\left(\frac{\sqrt{m_e m_\mu}}{\text{MeV}}\right)^2.$$

Mit $\sqrt{m_e m_\mu} \approx 7{,}348$ MeV: $\alpha \approx 0{,}007199$, also $1/\alpha \approx 138{,}9$; der Bridge-Wert $E_0 = 7{,}398$ MeV liefert $1/\alpha = 137{,}04$ (die $\sim 1{,}3\%$ sind bis auf $0{,}017\,\%$ $1 - K_{\text{frak}} = 100\,\xi$: $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}} = 7{,}348/\sqrt{0{,}98667}$ MeV). α ist einheitenfrei, enthält K_{frak} aber über E_0; E_0 ist eine Bridge-Konstante aus den Massenverhältnissen (Dok. 101). Die Übereinstimmung mit dem Messwert ist eine Eigenschaft des Ankers E_0, keine unabhängige Vorhersage.

Die Gravitationskonstante G (Absolut-Ebene, mit K_{frak})

G ist die einzige Größe, die echte SI-Umrechnung braucht ($[G] = \text{m}^3\,\text{kg}^{-1}\,\text{s}^{-2}$). Die strukturelle Herleitung (Dok. 006/122/133) liefert sie als Absolutwert, in dem die fraktale Korrektur *erst hier* auftritt:

$$G_{\text{SI}} = \frac{\xi^2}{4m_e}\cdot C_{\text{conv}}\cdot K_{\text{frak}}, \qquad C_{\text{conv}} = 7{,}783\times10^{-3}\ \text{m}^3\,\text{kg}^{-1}\,\text{s}^{-2}\,\text{MeV},$$

$G_{\text{SI}} \approx 6{,}6745\times10^{-11}\ \text{m}^3\,\text{kg}^{-1}\,\text{s}^{-2}$ $(K_{\text{frak}} = 0{,}986;$ mit $K_{\text{frak}} = 1-100\xi = 0{,}9867:\ 6{,}679\times10^{-11})$.

Dabei ist C_{conv} die SI-Umrechnung der Ein-Anker-Kette (Dok. 383); ihr Zahlenwert $7{,}783\times10^{-3}$ enthält zusätzlich den kleinen Rest dieser Kette (Kettenwert $7{,}58\times10^{-3}$). Die Form von G und seine Größenordnung folgen aus ξ und dem einen Anker (in

Dok. 383 numerisch geprüft); mit dem Anker m_e liegt G bei $-2{,}6\,\%$, mit v bei $-0{,}46\,\%$. Die Übereinstimmung des Werts $6{,}6745 \times 10^{-11}$ mit CODATA auf $0{,}003\,\%$ ergibt sich erst mit diesem Rest und ist kein eigener Präzisionsbeleg. Das ist die *berechnete* Gravitationskonstante (kein Eingang) – in Form und Größenordnung, nicht in der letzten Stelle; die Skalen-Verankerung über die RG-Verstärkung steht in Dok. 133/275, nicht in dieser Umrechnung.

Die allgemeine Umrechnungsregel

$$\boxed{\text{Größe}_{\text{SI}} = \text{Größe}_{\text{geom}} \times \text{Umrechnungsfaktoren} \times K_{\text{frak}}}$$

mit den Umrechnungsfaktoren $\hbar, c$ und der Skala M (Konvention, SI-2019). Die Trennung in einer Zeile:

Ebene	Größen	K_{frak}
Verhältnis	m_μ/m_e, m_τ/m_μ, Q	kürzt sich heraus
einheitenfrei	α	tritt über E_0 auf
Absolut (SI)	m_e, m_μ, m_τ, G	tritt auf

Bezug: Dok. 101 (Zirkularität metrologisch), Dok. 122 (Verhältnis vs. absolut, K_{frak}), Dok. 133/006 (Herleitung von G mit E_0, K_{frak}, Skala).

T.20 BD12-XCORE: die FFGFT-Massenkern-Deklaration

Auf Krügers offene Frage — was ein *legitimes* Mass-Core-Docking-Kriterium ausmacht statt eines post-hoc-Fits — antwortet FFGFT operativ, nicht durch Behauptung: mit einer *eingefrorenen, vor-registrierten* Deklaration im matched-null-Format (sein BD-Stil). Die Regel hat *keine* freien Parameter: $r = \sqrt{2}$, $\theta = 2/9$, und das Z_3/Foot-Koide-Spektrum $\mu_k = 1 + \sqrt{2}\cos(\theta + 2\pi k/3)$.

Sie liefert: Koide $Q = \Sigma\mu^2/(\Sigma\mu)^2 = 2/3$ exakt (durch $r = \sqrt{2}$ erzwungen); die Leptonen-Verhältnisse m_μ/m_e auf $0{,}001\%$, m_τ/m_e auf $0{,}007\%$; und — als *echte Vorhersage* aus Koide $+\{m_e, m_\mu\}$, ohne τ-Eingabe — $m_\tau = 1776{,}97$ MeV gegen $1776{,}86$ gemessen ($0{,}006\%$). Der matched-null-Test (Toleranz Koide $0{,}1\%$, Ratio 1%) zeigt: zufälliges r trifft Koide in $0{,}18\%$, zufälliges θ beide Ratios in $0{,}025\%$, zufälliges (r, θ) das *gemeinsame* Set in $0{,}000\%$ der Fälle. Die eingefrorene Regel ist also *speziell*, kein generischer Fit — **PASS**; und symmetrisch, zufällige Eingaben gäben **FAIL**.

Zwei Auflagen halten den Dock ehrlich: (i) *nicht* auf L_{nat} docken — die Massen liegen nicht im Carrier-Laplace, sondern im kompakten Z_3-Kern + Massenkreis ($\tilde{T}\cdot m = 1$); (ii) der Dock ist eine *feste Umformung* (eine vor-registrierte algebraische Abbildung auf $\{\sqrt{2},\ 2/9,\ M = 1/T\}$), keine neue Physik — darum *kein* post-hoc-Fit, sondern eine Äquivalenz, die reproduziert oder scheitert. Gerechnet: `bd12_xcore_ffgft.py`.

T.21 Reproduzierbarkeit

- `dim_bridge_1_doubling.py` – $\mathbf{6} = \mathbf{3} \oplus \mathbf{3}'$; Charaktere φ, $1-\varphi$, ganzzahliger 6D-Charakter; Orthogonalität und Ordnung 5.
- `dim_bridge_2_crystallographic.py` – kristallographische Restriktion $2\cos(2\pi/n)$; 3-zählig ganzzahlig, 5-zählig $= 1/\varphi$.
- `dim_bridge_3_same_ambient_fork.py` – $r(\tau) \leq 1$; $2/\sqrt{5}$ bei $\tau = \varphi$; $\sqrt{2}$ über dem Maximum der Familie (eine Aussage über nur eine Abbildung).
- `recompute_reconcile.py` – $C_3 < A_5$ (3- und 5-Zähligkeit permutieren denselben Ikosaeder) und $7 = 4 + 3$; das Enthaltensein HLV $\supset$ FFGFT.
- `recursion_unify.py` – Rekursion λ^n: $\lambda = \xi$ ($D_f = 3 - \xi$) vs. $\lambda = \varphi$ ($\varphi^2 = \varphi + 1$).
- `phase_from_a5.py` – der A_5-Phasenwinkel: $\theta_{\mathrm{HLV}} = 0$, $Q = 7/15$; $19/45$ ausgeschlossen.
- `decompact_recursion.py` – dekompaktifizierte Rekursion: diskret $\lambda^n \to$ kontinuierlicher Fluss $t \to \lambda t$, Log-Periode $|\ln \lambda|$.
- `what_d7_computes.py`, `spectrum_to_mass.py` – was der d7-Sektor berechnet (keine Massen; $Q = 7/15$, φ, Spektren) und warum Massen ein Punktspektrum brauchen.
- `quasicrystal_information.py` – Struktur-/Beugungsspektrum rein punktförmig gegen Zufalls-Nullmodell: der Informationsgehalt des Substrats.
- `electron_mode_in_d7.py` – das Elektron-Mode bettet in D7 ein ($\mathrm{T}^4 \subset \mathrm{T}^7$); eine 5-Drehung mischt es (0,762/0,238), das scharfe Massen-Label ist C_3-Rahmen = der D4-Kern.
- `which_triple_in_3prime.py` – Kandidaten fürs 3′ via Koide-Q: Leptonen/Up/Down ausgeschlossen ($Q \geq 0{,}67$), Neutrinos der offene Kandidat (kreuzt $7/15$ bei $m_0 \approx 1{,}9$ meV).
- `recursion_doubling_empty.py`, `verify_recursion_doubling.py` – das 3′ als kontrahierender ($-1/\varphi$) Rekursions-Eigenmode; innerer Zweig $\to 0$ (11/11 PASS).
- `recursion_tower.py` – der Turm $D(4+3n)$ (D4/D7/D10/.../D304) und die Leere jedes hinzugefügten Fensters.
- `decompact_branches.py` – die zwei Zweige dekompaktifiziert ($\mathrm{Re}\,\alpha = \pm 0{,}481$): φ relevant (D4-Kern), $-1/\varphi$ overdamped (Marcels Kern); D4-Kern bleibt enthalten.
- `marcel_kernel_match.py` – geerdeter Abgleich mit Krügers Kernel $K(t) = \sum_i w_i \tau_i^{-1} e^{-t/\tau_i}$ (overdamped $= -1/\varphi$-Fenster) und der antisymmetrischen Path-Memory-Ordnung (Einzel-Historie-Spektrum gerade unter Umkehr).
- `bd12_xcore_ffgft.py` – die BD12-XCORE-Deklaration: eingefrorene Regel ($r = \sqrt{2}$, $\theta = 2/9$), Koide $2/3$, Ratios, τ-Vorhersage und der matched-null-Test (Nulls $0{,}000\%$ auf dem gemeinsamen Set).

Alle Skripte sind `numpy`-only mit festen Werten. Hinweis: das $\sqrt{2}$ bei $n = 8$ in der kristallographischen Tabelle ist $2\cos 45^\circ$ (die oktagonale Rotation), ein numerischer Zufall – nicht FFGFTs $\sqrt{2}$, das das Koide-/$\mathbb{Z}_3$-Zirkulant-Verhältnis *innerhalb* der kristallographischen 3-Zähligkeit ist, keine Rotationsordnung.

Teil III

Teil III — Dynamischer Sektor, Betrag und Phase, $\theta = 2/9$

Kapitel U

Dok. 286 — Der dynamische Sektor: kinetische Energie als ξ-fraktaler Anteil des statischen

Kurzfassung

FFGFT trennt über die Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$ zwei Energietypen: *statisch* (Ruhemasse = topologisch eingefrorene Windung, der kristallographische Z_3-Kern) und *kinetisch* (frei; für masselose Zustände die einzige Form, $E = hf$). Der statische Sektor ist hergeleitet und gerechnet (Z_3-Massenoperator + Massenkreis; Dok. 285, BD12-XCORE). Der dynamische Sektor ist es *nicht*: es fehlt die abgeleitete Regel, den kinetischen Anteil über die Dualität als ξ-fraktalen Bruchteil des statischen zu berechnen. Dieses Dokument ist ein *Problemstellungs-Dokument* – es hält fest, was feststeht (die Dualität platziert das Fenster im kinetischen Sektor), den einen vorhandenen Datenpunkt (Neutrino, $m_\nu \sim \xi^2/2\, m_e$, als Ansatz), die Eingrenzung der ξ-Potenz auf $p = 2$, und den strukturellen Faden $m_{\text{window}} = \xi \cdot \omega$. Was zu derivieren bleibt, wird ausdrücklich als offen markiert. Vorangestellt ist die feste, reversible Hilbertraum-Grundlage (Dok. 282/270/230), auf der der Sektor aufsitzt; sein eigentliches Ziel ist, aus dem Hilbertraum heraus die komplementäre, über $D_f = 3 - \xi$ und ξ auf SI-Einheiten abbildende Beschreibung zu finden.

U.1 Anschluss: woher die Frage kommt

In Dok. 255 erzwingt $\tilde{T} \cdot m = 1$ zwei Energietypen. Die Ruhemasse ist *statisch*: eine topologisch stabile Windungszahl auf T^4, im kompakten Bild durch den Z_3-Massenoperator ($r = \sqrt{2}$, $\theta = 2/9$) fixiert. Die kinetische Energie ist *frei*; für ein masseloses Teilchen ist sie die einzige Form ($E = hf$). „Masse ist eingefrorene kinetische Energie."

Dok. 285 zeigt, dass die leeren Rekursionsfenster ($3'$, $3''$, …) keine *neuen* Massen tragen, sondern Struktur; und dass eine *Dynamik*, die ein Fenster füllt, den *kinetischen* Typ liefert – ein gefülltes Fenster ist photon-/neutrino-artig, kein massives Tripel. Dort wurde die Lücke benannt: die *abgeleitete* Regel, den kinetischen Anteil über die Dualität als ξ-fraktalen Bruchteil des statischen zu berechnen, fehlt. Dieses Dokument

nimmt genau diese Lücke auf. Es ist die in Dok. 285 angekündigte „weitere Arbeit“ zum dynamischen Sektor.

U.2 Die fixe Grundlage: die reversible Hilbertraum-Basis

Bevor der dynamische Sektor entwickelt wird, sei die feststehende Grundlage festgehalten, auf der er aufsitzt. Die QM-Übersetzung von FFGFT (Dok. 282) ist in drei Stücken abgeschlossen:

1. **Die eindeutige Hilbert-Abbildung** (Typ III, Dok. 270): $\mathscr{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$, Zustände = faserwertige Felder, QM-Operation = unitärer Paralleltransport, Verschränkung = Holonomie um Zyklen (Dok. 230), drei Massen $\leftrightarrow (M, r, \theta)$. Eine *Bijektion* – vollständig reversibel.
2. **Die zeitfreie Masse-Form:** Masse sitzt auf einem separaten Tensorfaktor; CHSH $= 2\sqrt{2}$ bleibt mit und ohne $\mathbb{C}^3$-Faser bis auf $4 \cdot 10^{-16}$ identisch – kein statisches QM-Ergebnis ändert sich. Zeit ist hier *nicht mitgerechnet*; die reduzierte Dynamik ist zeit-lokal, unitär, Markovsch.
3. **Die Zeit-Form:** fügt genau *einen* Effekt hinzu – nicht-Markovsches Gedächtnis in der reduzierten Dynamik (Rückfluss $0 \to 0{,}53$, CP-Teilbarkeit verletzt) –, der selbst noch innerhalb der QM liegt: ein ausgespurtes unitäres Bad reproduziert ihn (Dok. 282/283). Am vollen Level also unitär/reversibel.

Die Reversibilität ist präzise *pro Typ* (Dok. 270): Typ III (Hilbert) vollständig reversibel; Typ I (Massekreis → Zeit, „Zeit in den Raum genommen“) *fast* reversibel – verlustfrei im Modeninhalt, nur die Windungszahl bleibt mehrdeutig; Typ II (räumliche Projektion $D3 \to D0$) *nicht* reversibel. Die einzige echte Irreversibilität ist die räumliche Projektion – der Messvorgang / die Dekompaktifizierung (Dok. 270/284) –, nicht die Zeit-Hineinnahme. Das nicht-Markovsche Gedächtnis ist nicht der Bruch der Reversibilität, sondern die reduzierte Sicht.

Zielsetzung des dynamischen Sektors. Auf dieser fixen, reversiblen Grundlage ist die eigentliche Aufgabe die *Hilbertraum-Erweiterung und ihre Übersetzung*: eine *andere* Beschreibung *aus dem Hilbertraum heraus* – die komplementäre, dekompaktifizierte/projizierte Seite, die rechnerisch über $D_f = 3 - \xi$ und ξ auf SI-Einheiten abbildet. Die SI-Abbildung ist genau die Mess-/Projektionsseite (Typ I/II), und D_f und ξ sind die Brückengrößen (Dok. 270/249/133). Der dynamische Sektor ist damit kein Verlassen der Grundlage, sondern ihr Ausrollen in messbare Einheiten – und der gesuchte kinetische ξ-Anteil ist ein Baustein genau dieses Ausrollens.

U.3 Was feststeht

Die Dualität legt die *Platzierung* fest, nicht die Größe. Mit $\tilde{T} = 1/\max(m, \omega)$ (Dok. 067, 080) gilt für einen fast-masselosen Fensterzustand $\omega \gg m$, also $\tilde{T} = 1/\omega$: der Zustand sitzt im *kinetischen* Sektor. Das ist gesichert. Gesichert ist ebenso die Trennung der Begriffe:

	statisch	kinetisch
Form	$E_0 = mc^2$ (Ruhe)	$E = hf$ (frei)
Sitz	Z_3-Kern (Windung)	Fenster, wenn eine Dynamik läuft
Zeit	$\tilde{T} = 1/m$	$\tilde{T} = 1/\omega$
Status	hergeleitet (Dok. 285)	*offen* (dieses Dokument)

Wichtig ist die Unterscheidung zweier kinetischer Größen: die gewöhnliche Bewegungsenergie des Elektrons, $(\gamma - 1)mc^2$ (Dok. 080), ist *nicht* ξ-unterdrückt. Der hier gesuchte ξ-fraktale Anteil ist die *Fenster-Restmasse* eines sonst masselosen Zustands – nicht die Bewegungsenergie eines massiven.

U.4 Der eine Datenpunkt: das Neutrino

Dok. 047 behandelt das Neutrino als „near-massless photon“: $E^2 = (pc)^2 + (\sqrt{\xi^2/2}\, mc^2)^2$, mit $v_\nu = c(1 - \xi^2/2) \approx 0{,}9999999911\, c$ und $m_\nu \sim \frac{\xi^2}{2} m_e$. Das ist der einzige vorhandene Wert für eine Fenster-Restmasse als ξ-Potenz einer Kernmasse. Er ist jedoch ausdrücklich ein *Ansatz* (aus der Geschwindigkeits-/Photon-Analogie), nicht aus der Dualität *hergeleitet*. Dok. 204 liefert zusätzlich eine ξ-Korrektur auf die kinetische Energie ($+0{,}69\,\xi_0$). Mehr Datenpunkte gibt es nicht; insbesondere reicht ein einzelner Wert nicht für das Δm^2-Spektrum.

U.5 Eingrenzung der ξ-Potenz: $p = 2$

Setzt man $m_{\text{window}} = C \cdot \xi^p \cdot m_{\text{ref}}$ an und prüft gegen die Schranken (Reproduktion des $\xi^2/2$-Wertes; Photon-Limit; Dimensionskonsistenz; Oszillations-Boden $\gtrsim \sqrt{\Delta m^2_{\text{atm}}} \approx 49$ meV; direkte kinematische Schranke $m_\nu < 0{,}45$ eV (KATRIN 2025, 90 % CL, modellunabhängig)), so bleibt allein $p = 2$ mit der meV-Skala verträglich: $p = 1$ ergibt $\mathcal{O}(10\text{–}70)$ eV (weit über der Schranke), $p \geq 3$ liegt unter jedem Anker. $p = 2$ ist also *eindeutig* die mit der Größenordnung verträgliche Potenz – eine echte Größenordnungs-Schranke, kein Fit.

Numerologie-Warnung. *Innerhalb* $p = 2$ sind Koeffizient ($\frac{1}{2}$) und Referenzmasse durch den einen Anker *nicht* festgelegt. Verschiedene Referenzen treffen irgendwo ins Neutrino-Fenster (etwa $\xi^2/2 \cdot m_e \approx 4{,}5$ meV, $\xi^2 \cdot m_e \approx 9$ meV, $\xi^2/2 \cdot \sqrt{m_e m_\mu} \approx 65$ meV). Das ist *kein* Beleg, sondern die P35-Falle: Koeffizient und Referenz brauchen eine Herleitung, kein Anpassen. Gerechnet: `kinetik_xi_anteil.py`.

U.6 Der strukturelle Faden: $m_{\text{window}} = \xi \cdot \omega$

Der Dok.-047-Geschwindigkeitsausdruck $v_\nu = c(1 - \xi^2/2)$ ist exakt äquivalent zu einer ξ^1-Relation. Für $m \ll p$ gilt $v/c = 1 - \frac{1}{2}(m/p)^2$; Einsetzen ergibt $(m/p)^2 = \xi^2$, also

$$m_{\text{window}} = \xi \cdot p \quad \big(\approx \xi \cdot \omega \text{ über } \tilde{T} \cdot m = 1 \big). \tag{U.1}$$

Das „ξ^2“ in der Schreibweise „Masse $= \xi^2/2 \cdot m_e$“ ist also vermutlich das *Quadrat-Bild* einer fundamentalen ξ^1-Relation: die statische Restmasse ist ξ mal die kinetische Skala. Das ist der natürliche Ansatzpunkt für eine Herleitung *über die Dualität*, denn $\omega = 1/\tilde{T}$ ist genau die Dualitäts-Größe. Damit verschiebt sich die offene Frage von „warum ξ^2?“ zu „warum ξ^1 zwischen Restmasse und kinetischer Skala, und was setzt ω absolut?“.

U.7 Was zu derivieren bleibt

Drei Punkte sind ausdrücklich offen:

1. **Die Referenz/Skala – weitgehend geschlossen** (folgende Sektion). Die zwei Labor-Anker selektieren die Referenz als die *eine* FFGFT-Skala $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu}$; in deren Einheiten ist $\omega/E_0 = \xi/2$ und $m_{\text{window}}/E_0 = \xi^2/2$. Verbleibender Rest: die *eine* strukturelle Aussage $\omega = \xi E_0$ (genau eine fraktale ξ-Potenz).
2. **Der Koeffizient.** Der Faktor $\frac{1}{2}$ im $\xi^2/2$ ist nicht hergeleitet; möglicherweise rein das Geschwindigkeits-Quadrat ($\frac{1}{2}(m/p)^2$), also gar kein freier Faktor.
3. **Das Spektrum.** Ein einzelner ξ-fraktaler Wert setzt die *Skala*, nicht das *Spektrum* (Δm^2_{sol}, Δm^2_{atm}, Mischungswinkel). Das verlangt die spezifizierte T^7-Dynamik (die zweite offene Berechnung, Dok. 285).

U.8 Die Schließung der Skalen-Frage: die Labor-Anker selektieren E_0

Der erste offene Punkt – was ω absolut setzt – schließt sich weiter, als ein freier Parameter es täte. In FFGFT gibt es nur *eine* absolute Skala; alles andere sind dimensionslose Verhältnisse. Die Frage ist also nicht „welcher Zahlenwert“, sondern „welche der vorhandenen Skalen“. Mit $m_{\text{window}} = \frac{\xi^2}{2} \cdot$ Referenz klammern die zwei *Labor*-Anker (Oszillations-Boden $\gtrsim 49$ meV; KATRIN $< 0{,}45$ eV) die Referenz ein:

Referenz	m_{window}	Boden ≥ 49 meV	KATRIN $< 0{,}45$ eV
m_e	$4{,}5$ meV	*fällt* (zu leicht)	ja
$E_0 = \sqrt{m_e m_\mu}$	65 meV	ja	ja
$M \approx 314$ MeV	$2{,}8$ eV	ja	*fällt*
m_μ	940 meV	ja	*fällt* (zu schwer)

m_e ist zu leicht, M und m_μ zu schwer – *nur* $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu}$ passt, und das ist genau die eine natürliche FFGFT-Skala (Dok. 282, $\lambda_e \lambda_\mu = E_0$). Die Referenz ist damit keine freie Größe, sondern die vorhandene Skala, vom Labor selektiert.

In Einheiten von E_0 wird dann alles zur reinen ξ-Potenz mal $\frac{1}{2}$:

$$\frac{\omega}{E_0} = \frac{\xi}{2}, \qquad \frac{m_{\text{window}}}{E_0} = \frac{\xi^2}{2}. \tag{U.2}$$

Kein freier Parameter bleibt. Das $\frac{1}{2}$ ist das Geschwindigkeits-Quadrat ($\frac{1}{2}(m/p)^2$, Dok. 047) – kinematisch, kein Anpassfaktor; seine *strukturelle* Herkunft ist der AM-Seitenband-Faktor (s. die nachrichtentechnische Lesart unten).

Was ehrlich bleibt. Das Labor-Fenster (49–800 meV) hat Faktor-~wenige Breite: es selektiert die *Skala* E_0 scharf (schließt die Alternativen um Größenordnungen aus), pinnt aber den exakten Koeffizienten nicht allein. Übrig ist genau *eine* strukturelle Aussage,

$$\omega = \xi E_0 \,, \tag{U.3}$$

– E_0 um genau *eine* fraktale ξ-Potenz unterdrückt ($D_f = 3 - \xi$). Das ist nicht mehr „freie Skala, selbstbezüglich", sondern ein nicht-zirkulärer Rechenschritt: ω als ξ-unterdrückter Eigenwert der Connection-Laplace in der zeit-erweiterten Hilbertraum-Struktur (Dok. 283 §8). Er schließt die Stelle – oder falsifiziert sie. Gerechnet: `schliesse_omega.py`.

U.9 Der ξ^1-Mechanismus: Anhebung des Nullmodes durch das Dimensions-Defizit

Der verbleibende Rest – warum $\omega = \xi E_0$ mit genau *einer* ξ-Potenz – hat einen konkreten Mechanismus. Die Connection-Laplace auf T^4 hat einen exakten Nullmode (die holonomie-flache Konstante). Die fraktale Korrektur $g = \eta(1+\xi f)$ – f ist hier die fraktale Korrekturfunktion der Metrik, keine Frequenz und nicht die Grundwindungszahl $f = 1/\xi$ – wirkt als diagonale Potential-Störung und hebt ihn an; Störungstheorie erster Ordnung gibt

$$\delta\lambda_0 = \xi\langle 0|f|0\rangle = \xi \cdot \bar{f}, \tag{U.4}$$

also die Potenz ξ^1 *genau dann*, wenn die Korrektur einen nicht-verschwindenden Torus-Mittelwert $\bar{f} \neq 0$ hat; bei $\bar{f} = 0$ verschwindet die erste Ordnung und der Mode hebt sich erst in ξ^2.

$D_f = 3 - \xi$ ist ein Dimensions-*Defizit* – eine systematische, nicht volumenerhaltende Änderung des Maßes –, also $\bar{f} \neq 0$. Damit ist die Potenz *eins*. Numerisch (`xi1_eigenwert.py`): die Nullmode-Anhebung skaliert mit $p = 0{,}999$ für ein Defizit ($\bar{f} \neq 0$) gegen $p = 1{,}98$ für eine volumen-erhaltende Welligkeit ($\bar{f} = 0$) – die Potenz ist also kein Zufall, sondern folgt aus der Natur von $D_f = 3 - \xi$.

Stand. Die ξ^1-Potenz ist damit *hergeleitet* (Anhebung des Nullmodes durch das Dimensions-Defizit), nicht behauptet. Übrig bleibt nur noch der $O(1)$-Koeffizient – kinematisch das $\frac{1}{2}$ (Dok. 047) – und die Bestätigung, dass der physikalische kinetische Zustand dieser gehobene Nullmode ist. Damit ist $\omega = \frac{\xi}{2}E_0$ bis auf einen $O(1)$-Faktor geschlossen – dieser $O(1)$-Faktor wird in der nachrichtentechnischen Lesart unten strukturell als Seitenband-$\frac{1}{2}$ identifiziert.

U.10 Die nachrichtentechnische Lesart: AM-Seitenbänder und Mode-Locking

FFGFT entstand aus der Nachrichtentechnik und der Fourier-Dualität Zeit↔Frequenz (Dok. 001a); $\tilde{T}\cdot m = 1$ *ist* diese Dualität. Im dynamischen Sektor liefert dieselbe Sprache zwei konkrete Aussagen – eine solide, eine als Kandidat.

Das $\frac{1}{2}$ ist der AM-Seitenband-Faktor. Die fraktale Korrektur $g = \eta(1+\xi f)$ ist formal eine Amplitudenmodulation des Trägers mit Modulationsindex ξ (Dok. 057: multiplikativ = AM, additiv = FM). Marcels kinetischer Prefaktor $A(t) = 1+\varepsilon(t)$, $|\varepsilon| \ll 1$, ist dieselbe Größe ($\xi \leftrightarrow \varepsilon$). Für einen Träger $\cos(\omega_c t)$ folgt zwingend

$$\cos(\omega_c t)\,[1+\xi\cos(\omega_m t)] = \cos(\omega_c t) + \frac{\xi}{2}\big[\cos((\omega_c+\omega_m)t) + \cos((\omega_c-\omega_m)t)\big], \tag{U.5}$$

die Seitenbänder sitzen also bei Amplitude $\xi/2$. Die kinetische Skala $\omega = \frac{\xi}{2}E_0$ ist damit das *erste AM-Seitenband des Massen-Trägers* E_0: das ξ aus dem Modulationsindex (= Dimensions-Defizit, vorige Sektion), das $\frac{1}{2}$ aus der Seitenband-Aufspaltung ($\cos\cdot\cos = \frac{1}{2}(\text{Summe} + \text{Differenz})$). Das vereinigt die ξ^1-Potenz (gehobener Nullmode = erstes Seitenband) und den $O(1)$-Koeffizienten in *einen* Mechanismus: das $\frac{1}{2}$ ist nicht kinematisch zugesteckt, sondern strukturell – das Geschwindigkeits-Quadrat ($\frac{1}{2}(m/p)^2$, Dok. 047) ist sein kinematischer Schatten, nicht seine Herkunft.

$\theta = 2/9$ als Mode-Locking-Verhältnis (Kandidat). Die Phasen-Schicht der Gabelung (Dok. 283) lautet: *dynamische Operator-Phase* R (HLV, schief-adjungiert, von $\dot{\phi}$ getrieben) gegen *feste skalare Phase* $\theta = 2/9$ (FFGFT). Eine dynamische Phase auf einen festen rationalen Wert „einzurasten" ist nachrichtentechnisch wohldefiniert: Injektions-Locking bzw. Arnold-Zungen. Ein getriebener nichtlinearer Oszillator rastet auf rationale Rotationszahlen p/q ein; die stabilen Plateaus bilden eine Teufelstreppe. $\theta = 2/9$ wäre dann das Lock-Plateau einer rationalen Rotationszahl – was direkt an FFGFTs *Windungszahlen* $(n_\theta, n_\varphi, n_3, n_4)$ anschließt (Dok. 210): eine gelockte rationale Windung. Mode-Locking *ist* eine Quantisierungsregel – rationale Werte sind die stabilen Fixpunkte –, also genau die Art von „Holonomie-/Fixpunkt-/Quantisierungsregel", die der offene θ-Punkt verlangt. Damit bekäme der *offene statische* θ-Input einen *dynamischen* Ursprung im selben Sektor.

Was Kandidat bleibt. Der Seitenband-Punkt ist solide: er reproduziert $\xi/2$ zwingend. Das Mode-Locking-Reading ist ein *Mechanismus-Kandidat*, keine Herleitung. Es gibt eine Spannung: kleine Nenner ($1/2, 1/3, 2/5$) haben die breitesten Zungen, $2/9$ (Nenner 9) wäre ein schmaleres Plateau; *warum gerade* $2/9$ einrastet, ist offen. Aber das Reframing ist produktiv: aus „warum dieser Wert?" wird „welche Arnold-Zunge, und warum ist sie stabil?" – eine testbare Frage an einen getriebenen Oszillator, nicht an eine bloße Zahl. Eine ehrliche Schranke des Kandidaten: die Rotationszahl $2/9$ ist *dimensionslos* (Zyklen), der Koide-Offset $\theta = 2/9$ ist ein *Radiant*-Winkel –

$2\pi \cdot 2/9 = 4\pi/9 \neq 2/9$ –; beide als dasselbe zu lesen ist eine zusätzliche, offene Annahme, nicht Teil des gerechneten Kandidaten (vgl. Dok. 282).

Z_3-Protektion: der Nenner ist erklärt, der Zähler nicht. Der FFGFT-Massenkern ist ein Z_3-Zirkulant (Dok. 282); trägt die treibende Nichtlinearität diese Symmetrie (invariant unter $\theta \to \theta + 1/3$, also nur Harmonische $k = 3, 6, 9, \ldots$), verschiebt sich das Bild. Eine strukturgemäße Z_3-Treibung verbreitert die Zungen mit Nenner aus 3-Potenzen *selektiv*: bei gleicher Kritikalität wird $1/3$ um das 24-fache breiter und die ganze 9er-Familie um das 11–12-fache, während die Kontroll-Zunge $2/5$ (Nenner 5, kein Vielfaches von 3) *flach* bleibt ($0{,}97\times$) – die Signatur echter Symmetrie-Protektion, kein Artefakt (`z3_modelock_test.py`). Damit ist „warum überhaupt ein Nenner-9-Lock" beantwortet: die Z_3-Struktur des Kerns; $2/9$ ist nicht mehr absurd schmal, sondern symmetrie-geschützt robust. *Offen bleibt der Zähler:* die Symmetrie schützt die 9er-Familie gemeinsam ($1/9 = 2/9 = 4/9$ identisch), sie singelt $2/9$ nicht aus, und $1/3$ bleibt breiter. Die Frage zerfällt damit sauber – „warum $2/9$" = „warum Nenner 9" (Z_3, geklärt) + „warum Zähler 2 in der Familie" (offen, genau Marcels BD17A-Holonomie-Gebiet).

Der Zähler braucht eine Holonomie. Die 9er-Familie ist ein Z_3-Orbit; eine einzige 3-zählige Treibung ist daher zähler-blind. Den Zähler wählt erst eine *zweite* 3-Struktur mit definierter relativer Phase ϕ – eine Holonomie, die im Einbettungsraum lebt (3′ der Verdopplung $6 = 3 \oplus 3'$, $T^4 \to T^7$, Dok. 285), nicht im Kern. Mit zwei 3-zähligen Harmonischen (h=3, h=9) und relativer Phase ϕ (nicht eich-wegtransformierbar) bricht die Entartung auf (`z3_holonomie_test.py`, Bisektion): $1/9$ und $4/9$ bleiben gepaart, $2/9$ ist der Singulett, der wandert – für $\phi \in (\pi, 2\pi)$ ist $2/9$ die *breiteste* Zunge (klarster Vorsprung bei $\phi = 3\pi/2$), Crossover exakt bei $\phi = \pi$. *Ehrlich:* der Effekt ist klein ($\sim 0{,}5\%$), ϕ ist frei (FFGFT fixiert ihn nicht), und das Minimal-Modell spaltet nur 2-gegen-1. Aber die Struktur-Aussage steht: eine Holonomie *kann* $2/9$ auswählen, und $2/9$ ist genau das Glied, auf das sie wirkt. Die offene Frage ist damit präzise verschoben – nicht mehr „warum $2/9$", sondern „was lockt ϕ in das Band, in dem $2/9$ gewinnt" – und das ist Marcels BD17A-„locked holonomy".

Eine fraktale Korrektur, zwei orthogonale Phasen. Holonomie und Zeit-Modulation entspringen *derselben* fraktalen Korrektur $g = \eta(1 + \xi f)$ – die treibende Nichtlinearität *ist* f (Dok. 051, Dok. 270). Man könnte fürchten, sie als unabhängig zu behandeln sei inkonsistent. Die Rechnung (`eine_fraktale_quelle.py`, 3-adische Weierstrass-Funktion) zeigt das Gegenteil: es sind zwei *orthogonale* Funktionale von f. Die Zeit-Phase $A = 2\pi\xi\langle f \rangle$ liest den *Mittelwert* $\langle f \rangle$ (den DC-Anteil, das Dimensionsdefizit, $O(\xi)$); die Holonomie $\phi = \arg \hat{f}_9 - 3 \arg \hat{f}_3$ liest die *Phasen der 3-Potenz-Harmonischen* ($O(1)$). Beide sind analytisch entkoppelt – $\langle f \rangle$ ist von der Harmonischen-Phase unabhängig (numerisch bis $2 \cdot 10^{-16}$), da $\cos(k\theta + \psi)$ für jedes ψ verschwindenden Mittelwert hat. Die Sorge ist damit aufgelöst: A zu vernachlässigen berührt ϕ nicht, sie lesen verschiedene Fourier-Anteile *derselben* f. Die echte Konsistenz sitzt anderswo: A und der ξ^1-Massen-Lift hängen *beide* an $\langle f \rangle$ – die Zeit-Phase ist also an das Massen-Fenster gebunden, nicht frei. Und kein Gratis-Lock: ein phasen-kohärenter Fraktal ($\psi = 0$) gibt $\phi = 0$ (Entartung), während $2/9$ verlangt, dass fs 3-Potenz-Harmonische eine relative

Phase in $(\pi, 2\pi)$ tragen (eine Rampe $\delta = \pi/2$ pro Oktave trifft $\phi = 3\pi/2$ exakt, das $2/9$-Maximum – aber als Wahl, nicht hergeleitet). Damit ist „was lockt ϕ" konkret benannt: nicht irgendeine Phase, sondern die relative Phase der 3-Potenz-Harmonischen der fraktalen Korrektur f – die FFGFT-interne Zielgröße für BD17A.

Abgrenzung: was hier *kein* Mechanismus ist. Modulationsindex und Lock-Verhältnis sind verschiedene Größen in verschiedenen Sektoren: $\xi = 4/30000$ ist der feste AM-Index im Amplituden-Sektor (er liefert das Seitenband-$\frac{1}{2}$), $2/9$ ist eine Rotationszahl im Phasen-Sektor. Das Lock-Verhältnis ist *nicht* ξ. Jede „Herleitung", die ξ auf einen $O(1)$-Wert setzt (etwa $1/3$ oder $\tan(\pi/9) \approx 0{,}364$), um $2/9$ zu erzwingen, hat FFGFT verlassen – ξ ist fest und um Größenordnungen kleiner ($\sim 10^{-4}$). Ebenso ist die offene Frage die *Stabilität* des $2/9$-Plateaus, nicht eine Algebra zwischen ξ und $2/9$; und der Gedächtniskern, an dem das Locking hinge, ist der diskret-spektrale, oszillierende Kern aus Dok. 282 ($\sum_k g_k^2 \delta(\omega - \omega_k)$, mit Rückfluss/Revivals), kein dispersiver Allpass.

U.11 Rekursion als Rückkopplung: Schleifenverstärkung, Regime, Disziplin

FFGFT entstand aus der Nachrichtentechnik (Dok. 001a), und ihre Rekursionen sind *Rückkopplungsschleifen*. Das ordnet die obigen Ergebnisse in einen Rahmen – und legt zugleich fest, was an ihnen *frei* ist und was nicht.

Die Schleifenverstärkung ist eine ξ-Größe – und fest. Der Betrag der Schleifenverstärkung entscheidet das Verhalten. In FFGFT ist er geometrisch gegeben, kein Stellrad:

- $|v| < 1$ (Gegenkopplung): die Schleife kontrahiert. Die ξ-Dämpfungs-Rekursion $r(k{+}1) = r(k)(1-\xi)$ (Dok. 275) hat Verstärkung $1-\xi$, nur um ξ unter eins – daher der enorme, langsame Skalenturm; sie läuft gegen den einzigen Fixpunkt 0 und *durchläuft* $1/\varphi$ nur (kein Attraktor).
- $|v| = 1$ (Barkhausen): marginale Dauerschwingung.
- $|v| > 1$ (Mitkopplung): die Schleife läuft weg. Der goldene φ-Zweig ($|\varphi| > 1$) rollt aus, der $-1/\varphi$-Zweig ($|-1/\varphi| < 1$) ist das overdamped leere Fenster (Dok. 285).

Dekompaktifizierung ist genau dieser Übergang: *ein* Kreis kippt aus dem kompakten (kontrahierenden) ins weglaufende Regime – der Masse-Kreis $\tilde{T} \cdot m = 1$ rollt zur nichtkompakten Zeit aus (Dok. 270), und dieses Kippen *ist* der Messvorgang.

Die Phase stellt sich selbst ein. Eine Rückkopplungsschleife erzwingt keine Phase: die Barkhausen-Phasenbedingung schließt bei der Frequenz, die die Schleife *findet*; beim Injektions-Locking gleitet die Lock-Phase im Fangbereich (Adler-Gleichung). Deshalb ist $\theta = 2/9$ als *selbstgewähltes Lock-Verhältnis* (Rotationszahl) zu lesen, nicht als eng aufgezwungene Phase. Eine „Herleitung", die eine feste Phase $2/9$ vorgibt

und daraus ξ rückwärts löst, verkennt diese Selbst-Einstellung (vgl. die Abgrenzung oben).

Zwei Etagen. Linear und schwach (ξ klein): erste Ordnung = das AM-Seitenband $\frac{1}{2}$ (oben, solide); eine rein lineare Schleife rastet nicht. Nichtlinear: Mode-Locking auf rationale Rotationszahlen = der $\theta = 2/9$-Kandidat (oben); die Fangbereich-Breite skaliert mit der Rückkopplungsstärke ξ, und $\xi \sim 10^{-4}$ mit Nenner 9 macht die $2/9$-Zunge extrem schmal – das ist das offene Stabilitätsproblem, nicht ein fehlendes Stück Algebra.

Gegenkopplung als Entzerrung. Die fraktale Korrektur $g = \eta(1 + \xi f)$ (mit K_{frak}/RG, Dok. 133/051) wirkt als breitbandige Gegenkopplung, die den nackten Träger linearisiert und $D_f = 3 - \xi$ setzt – schwach, kein scharfer Phasenabgleich nötig.

Disziplin. Daraus folgt, wie die Ansätze *korrekt* zu verwenden sind: (i) die Schleifenverstärkung (ξ, die Eigenwerte $\varphi/-1/\varphi$) ist fest, nie ein Stellrad – ein Ergebnis durch Setzen von ξ zu erzwingen ist der Kardinalfehler; (ii) die offenen Fragen sind stets *Regime und Fangbereich* (kontrahierend/marginal/weglaufend; Zungenbreite), nie eine Algebra *auf* der Verstärkung; (iii) die Phase ist selbstgewählt, quantisierte Werte sind Lock-Verhältnisse; (iv) das Regime der Rückkopplung trägt die Physik – Gegenkopplung = kompakte stabile Skalen + Entzerrung, Mitkopplung = Dekompaktifizierung/Messung.

U.12 Verhältnis zum statischen Sektor

Der statische Sektor ist abgeschlossen und gerechnet: der Z_3-Massenoperator ($r = \sqrt{2}$, $\theta = 2/9$) plus der Massenkreis liefert Koide $2/3$, die Lepton-Verhältnisse und – als vor-registrierte, matched-null-geprüfte Deklaration – die BD12-XCORE-Schnittstelle (Dok. 285). Der dynamische Sektor ist die *komplementäre, offene* Seite: derselbe Parameter ξ, aber als *Anteil* statt als *Eigenwert*. Eine Herleitung von $m_{\text{window}} = \xi \cdot \omega$ würde die fensterfüllende Dynamik (Dok. 263, holografische Skalen-Projektion) von der Beschreibung zur Rechnung führen und den neutrino-artigen $3'$-Kandidaten (Dok. 285) von konditional zu abgeleitet.

Rückblick: zwei Dinge, die beide „$2/9$“ heißen. Es lohnt, den roten Faden festzuhalten, denn $\theta = 2/9$ tritt in zwei Rollen auf. (i) $2/9$ als *Zahl/Input*: der Z_3-Zirkulant des Kerns benutzt es und reproduziert die Leptonen (Koide), empirisch geschlossen – das war immer da (Dok. 282; Dok. 285, die „geschützter-Invariant“-Zeile $r = \sqrt{2}$, $Q = 2/3$, $\theta = 2/9$). (ii) $2/9$ als *Frage* („warum dieser Wert“, speziell der Zähler): die wird erst mit der Dimensions-Erweiterung relevant. Der Grund ist strukturell, kein Mangel an Rechnung: der nackte Z_3-Kern ist *zähler-blind* – $1/9, 2/9, 4/9$ sind ein Z_3-Orbit, eine einzige kompakte 3-Struktur kann „warum $2/9$ statt $1/9$“ prinzipiell nicht beantworten. Den Zähler sieht erst eine zweite 3-Struktur mit relativer Phase = eine Holonomie =

genau das, was die Erweiterung liefert ($3 \oplus 3'$, $T^4 \hookrightarrow T^7$). Die „warum-$2/9$"-Frage hat im Kern also kein Zuhause; sie ist von Natur aus eine Erweiterungs-Frage.

Wo das schon im Korpus steht. Drei Dokumente tragen den Faden bereits. **Dok. 285** (Dimensionsbrücke) ist die Erweiterung selbst: HLV $\supset$ FFGFT, $T^4 \hookrightarrow T^7$ ($7 = 4 + 3$, die drei Perp-Dimensionen), die Verdopplung $6 = 3 \oplus 3'$ („wörtlich"), die Gabelung (FFGFT 3-zählig $\sqrt{2}/Q = 2/3/\theta = 2/9$ gegen HLV 5-zählig $2/\sqrt{5}/\varphi$); $\theta = 2/9$ steht dort in der Invarianten-Zeile. **Dok. 283** (Brücke und Gabelung, §8) führt $\theta = 2/9$ ausdrücklich als *komplexe Holonomie*, „operationale Folge der Kompaktheit", mit der Phasen-Schicht „dynamische Operator-Phase R (HLV) gegen feste skalare Phase $\theta = 2/9$ (FFGFT)" – dort ist $2/9$ schon ein Holonomie-/Erweiterungs-Objekt, keine bloße Kern-Zahl. **Dok. 282** ist der Kern, der $2/9$ *benutzt* (Leptonen), mit der ehrlichen Zeile „Übersetzung ist nicht Begründung" – die Schreibweise *stellt* $2/9$ dar, *begründet* es aber nicht.

Der Fixpunkt und der Schluss. Warum der statische Sektor überhaupt geschlossen *ist*: die Lepton-Massen sitzen an einem *selbstkonsistenten Fixpunkt* – der Massenoperator $\Phi_* = \sum_i m_i P_i$ ist der nicht-triviale Fixpunkt der Rekursion $\mathscr{R}(\Phi_*) = \Phi_*$ (Dok. 203, Lepton-Exponenten $p_e = 3/2,\ p_\mu = 1,\ p_\tau = 2/3$); *deshalb* ist er exakt, kein angepasster Wert. Aus den Lepton-Messwerten liest man diesen Fixpunkt *ab* (das ist die Schließung); fest und offen trennen sich sauber: $Q = 2/3$ *ist* die Operator-Bedingung $r = \sqrt{2}$ (algebraisch fest, Dok. 282), $\theta = 2/9$ ist die Holonomie (der Zähler, offen). Daraus der Schluss: die ganze jüngste Arbeit oben (Rückkopplung, Mode-Locking, Holonomie-Test) ist *kein neuer Schauplatz*, sondern die mechanistische, nachrichtentechnische Version dessen, was $282 \to 283 \to 285$ strukturell schon sagen – $2/9$ ist eine Holonomie, und eine Holonomie lebt in der Erweiterung.

Betrag und Phase: warum die Trennung zwangsläufig ist. In nachrichtentechnischer Sprache fällt der ganze Befund auf einen einzigen, bekannten Satz zusammen. Der Massenoperator *ist* ein Z_3-Zirkulant, und ein Zirkulant wird von der DFT diagonalisiert – seine Eigenwerte sind die DFT seiner ersten Zeile. Die drei Lepton-Massen sind also wörtlich ein *Drei-Punkt-Spektrum*: $\sqrt{2}$ ist die *Amplitude* der Spektralkoeffizienten, $\theta = 2/9$ ihre *Phase*. Damit ist der radial/angular-Schluss (Dok. 282) nichts anderes als *Betragsspektrum gegen Phasenspektrum*: alles Determinierte sitzt im Betrag (ξ als Skala, die Hierarchie als Hüllkurve, $Q = 2/3 = \sqrt{2}$ als Amplitudenverhältnis, $\langle f \rangle$ als DC-Term), alles Offene in der Phase (θ, die Holonomie $\varphi = \arg \hat{f}_9 - 3 \arg \hat{f}_3$, die Harmonischen-Phasen). Der tiefe Grund ist der Lehrsatz selbst: *ein Betragsspektrum legt das Phasenspektrum nicht fest* – gleiche Leistung, beliebige Gestalt. Genau *deshalb* widersteht θ jedem FFGFT-Werkzeug: die Rekursion $\mathscr{R}$ ist rein reell, also reine Verstärkung, und reelle Verstärkung berührt die Phase nicht. Die Orthogonalität, die oben gerechnet wurde, *ist* „Betrag $\perp$ Phase". Daraus wird sogar die FFGFT↔HLV-Arbeitsteilung ein Schaltbild: FFGFT ist die *reelle Verstärkerstufe* (Betrag, Hierarchie), HLVs schief-adjungierte R ist die *Allpass-/Phasenstufe* ($e^{i\varphi}$, betragserhaltend, dreht nur die Phase). Eine schief-adjungierte Operation *ist* ein Allpass. Das fehlende angulare Prinzip ist die Phasenstufe – und die trägt die HLV-Seite, nicht FFGFT. (Grenze

derselben Linse: Mode-Locking liefert eine *Rotationszahl* (dimensionslos), θ einen *Radiant*; $2\pi \cdot 2/9 \neq 2/9$ – die Linse erkennt den *Typ* richtig, eine eingerastete Phase, doch die wörtliche Gleichsetzung schließt nicht.)

U.13 Reproduzierbarkeit

`kinetik_xi_anteil.py` (numpy-only): Eingrenzung der ξ-Potenz gegen die Schranken, Dualitäts-Rahmung ($\tilde{T} = 1/\max(m, \omega)$), und der Befund $p = 2$ mit der ausdrücklich offen markierten Referenz/Koeffizient/Spektrum-Lücke. Das Skript behauptet keine Herleitung; es grenzt ein. `schliesse_omega.py`: die Labor-Selektion der Referenz E_0 (Tabelle) und die Reduktion $\omega/E_0 = \xi/2$, $m_{\text{window}}/E_0 = \xi^2/2$, mit dem ξ^1-Rest als markiertem Schlusspunkt. `xi1_eigenwert.py`: die Nullmode-Anhebung als ξ^1 aus dem Dimensions-Defizit ($p = 0{,}999$ gegen $p = 1{,}98$). `am_seitenband_modelock.py`: bestätigt das Seitenband-Verhältnis $\xi/2$ zwingend (Abweichung 0%) und misst am Sinus-Kreisabbildungs-Modell die Arnold-Zungen-Breiten – $2/9$ rastet als Plateau ein, ist aber $\sim 12\times$ schmaler als $1/3$: Kandidat, keine Herleitung. `z3_modelock_test.py`: Z_3-symmetrische Treibung (Harmonische $=$ Vielfache von 3) verbreitert die 3-Nenner-Zungen selektiv ($1/3$ um $24\times$, die 9er-Familie um 11–$12\times$), während die Kontrolle $2/5$ flach bleibt ($0{,}97\times$) – der Nenner 9 ist Z_3-geschützt (Dok. 282), der Zähler 2 bleibt offen. `z3_holonomie_test.py`: zwei 3-zählige Harmonische ($h{=}3, h{=}9$) mit relativer Phase ϕ; präzise (Bisektion) gemessen bricht ϕ die 9er-Entartung auf – $1/9, 4/9$ bleiben gepaart, $2/9$ wandert und ist für $\phi \in (\pi, 2\pi)$ die breiteste Zunge ($\sim 0{,}5\%$, Maximum $\phi = 3\pi/2$); ϕ frei $\Rightarrow$ verschiebt die offene Frage auf den ϕ-Lock (BD17A). `eine_fraktale_quelle.py`: zeigt rechnerisch (3-adische Weierstrass-f), dass Zeit-Phase und Holonomie *orthogonale* Funktionale derselben fraktalen Korrektur sind – $A = 2\pi\xi\langle f\rangle$ liest den Mittelwert ($O(\xi)$), $\phi = \arg \hat{f}_9 - 3 \arg \hat{f}_3$ die Harmonischen-Phasen ($O(1)$), $\langle f\rangle$ phasen-unabhängig bis $2\cdot 10^{-16}$; Zeit-Phase an den ξ^1-Massen-Lift gebunden (beide $\langle f\rangle$), die Holonomie-Phase bleibt eigenständiges Datum (kohärent $\Rightarrow \phi = 0$; $\delta = \pi/2$-Rampe $\Rightarrow \phi = 3\pi/2$).

Kapitel V

Dok. 287 — Interne Darstellungs-Äquivalenzen

Kurzfassung

FFGFT liegt in mehreren mathematischen Sprachen vor – Torus-Geometrie, Matrix-Algebra, Hilbertraum-Operatoren, Informationsformalismus, Rekursion, Zwei-Schichten. Dieses Dokument fragt nicht, wie FFGFT zu *anderen* Rahmenwerken steht (das leistet Dok. 265 nach aussen), sondern wie diese internen Darstellungen *untereinander* stehen. Befund: sie sind kein flacher Satz von Gleichwertigen, sondern ein *generativer Kern* (der T^4-Torus) plus drei klar verschiedene Beziehungstypen – **Identität**, **Bijektion**, **Projektion**. Die Geometrie und die 3×3-Matrix-Algebra sind *dieselbe Sache* (Dok. 206); der Standard-QM-Hilbertraum ist eine *verlustfreie Bijektion* (Dok. 230); der Informationsformalismus und die räumliche Reduktion sind *verlustbehaftete Projektionen* mit formalismus-relativem Residuum (Dok. 243/270). Der entscheidende Punkt: *nur* die volle T^4-Geometrie verliert nichts. Dasselbe Resultat trägt die θ=2/9-Arbeit von der anderen Seite: alle Darstellungen sind im radialen (Betrags-)Sektor treu, irreduzibel ist allein der angulare (Phasen-)Sektor.

V.1 Die Frage und ihre Abgrenzung

In den letzten Monaten ist FFGFT in auffallend vielen Sprachen formuliert worden, und der Eindruck mehrerer „paralleler Wege“ ist berechtigt. Die Frage dieses Dokuments ist intern: *Welche Beziehung* besteht zwischen diesen Wegen? Sind es austauschbare Bilder desselben Objekts, oder unterscheiden sie sich strukturell?

Abzugrenzen ist das von Dok. 265. Dort wird ein *Vergleichsoperator* (drei Ebenen – Fast-Äquivalenz, struktureller Überlapp, komplementär; sechs Achsen) entwickelt und auf FFGFT *gegen ein externes Rahmenwerk* angewandt (Blume-Maleev). Hier wird derselbe Operator *nach innen* gewendet: nicht FFGFT gegen Fremd, sondern FFGFT-Darstellung gegen FFGFT-Darstellung. Das Ergebnis ist schärfer, als der Aussen-Operator es zulässt – und es legt einen Beziehungstyp frei, den der symmetrische Aussen-Operator nicht kennt (Abschnitt V.7).

V.2 Der generative Kern: warum T^4 keine Darstellung unter vielen ist

Zwei Dokumente sagen dasselbe von verschiedenen Seiten. Dok. 152 (ontologische Priorität) setzt den T^4-Torsionskristall als *fundamentale ontologische Realität*; die fraktale Granulation $D_f = 3-\xi$, die effektiven Gesetze und die klassische 3D-Physik sind emergente Approximationen „nach oben projiziert“. Dok. 243 liefert das strukturelle Pendant: jeder Informationsformalismus verwirft mindestens eine der drei Größen θ_4, (n_θ, n_φ), ε; die T^4-Geometrie ist der *einzige* Formalismus, der alle drei zugleich strukturell enthält.

Schlüsselergebnis

Der T^4-Torus ist nicht eine Darstellung unter vielen, sondern der generative Kern: die einzige Sprache, die den vollen Inhalt hält. Alle anderen Darstellungen sind Abbildungen *von* T^4 – und zerfallen nach dem Typ dieser Abbildung in drei Klassen.

V.3 Die drei Beziehungstypen

Identität: Geometrie ≡ Matrix-Algebra (Dok. 206)

Das Z_3-Dreieck (als Graph) und die 3×3-Matrix A sind nicht nur isomorph, sondern *algebraisch identisch*: das Spektrum von A ist die Charaktertafel von Z_3. In Dok. 206 wörtlich: Geometrie und Matrix-Algebra sind „keine zwei Bilder derselben Sache, sie sind dieselbe Sache.“ Das ist der stärkste Typ – kein verlustfreier Übersetzungskanal, sondern Identität. Wichtig und ehrlich: diese Identität ist *sektor-lokal*. Sie gilt auf dem C_3/Z_3-Kern (3×3). Global – mit der angularen Phase θ und den φ-Harmonischen – ist es keine endliche Identität mehr; der Zirkulant fängt das Betragsspektrum, nicht die Phase (Dok. 286).

Bijektion: der verlustfreie Kanal (Dok. 230, Dok. 070)

Die Hilbertraum-Übersetzung (Dok. 230) ist eine *bijektive Strukturaussage*: jede QM-Rechnung sitzt im FFGFT-Formalismus und zurück, *ohne Verlust*. Sie ist nicht ärmer als FFGFT und nicht reicher im Rechnen – aber FFGFT *fügt hinzu*, was die Standard-QM nicht liefert: das *Warum* der Konstantenwerte. Im Bild der Projektionskette (Dok. 270) ist das die *Aufwärts*-Bewegung (Typ III), und gerade weil sie keine geometrischen Extra-Dimensionen einführt, ist sie verlustfrei.

Ein zweiter Bijektionsfall ist korpusintern: die zwei Massenformen in Dok. 070, die kompakte (gekürzte) und die erweiterte (geometrisch ursprüngliche). Sie sind mathematisch äquivalent, aber nur die erweiterte trägt den physikalischen Ursprung – darum darf nicht direkt gekürzt werden.

Projektion: der verlustbehaftete, gerichtete Kanal (Dok. 243, Dok. 270)

Dok. 243 bildet FFGFT in einen Informationsformalismus ab – als *Projektion* π, *nicht* als Isomorphismus. Es geht ein Residuum verloren, und dieses Residuum ist *formalismus-relativ*: es hängt vom gewählten Informationsformalismus ab, nicht von der Geometrie. Dieselbe Abbildung ins neuronale Netz teilt diesen Charakter. Geometrisch entspricht das den *räumlichen* Reduktionen der Projektionskette (Dok. 270, Typ II): streng verlustbehaftet, nicht reversibel, mit Residuum $\sim \xi$ (als CHSH-Abweichung, mit heutiger Hardware nicht auflösbar).

Davon zu trennen ist der erste Reduktionsschritt $D4 \to D3$ (Dok. 270, Typ I): keine verlustbehaftete Projektion, sondern eine *Dualitäts-Dekompaktifizierung* über $\tilde{T} \cdot m = 1$ – informationserhaltend; einzig die direkte Sichtbarkeit der Kompaktheit geht verloren.

V.4 Zwei Achsen, die keine konkurrierenden Darstellungen sind

Nicht jede „Sprache“ ist eine rivalisierende Kodierung desselben Inhalts. Zwei sind orthogonale Trennungen:

- **Zwei-Schichten** (Dok. 241): die Trennung von verhältnisbasiertem, parameterlosem Inhalt (Schicht 1) und einem einzigen SI-Anker (Schicht 2). Das ist Buchhaltung – was Eingabe ist, was folgt – nicht eine alternative Geometrie. Orthogonal zur Geometrie/Matrix/Hilbert-Wahl.
- **Rekursion / Fixpunkt** (Dok. 203/275): die *dynamische* Achse. Sie erzeugt die Hierarchie (der $\xi \to \varphi$-Durchgang) und ist – entscheidend – rein *reell/radial*. Sie trägt keinen angularen (Phasen-)Generator.

V.5 Der entscheidende Befund

Zwei Aussagen, die zusammen die stärkste interne Konsistenzaussage ergeben.

Wichtig

(1) Nur T^4 verliert nichts. Jede projektive Kodierung lässt ein Residuum fallen, und das Residuum ist relativ zur *Darstellung*, nicht zur Physik. Die vielen Wege stimmen also überein; wo sie abweichen, ist es genau das, was die jeweilige Kodierung weggeworfen hat. Der „Verlust“ ist ein Artefakt der Darstellung, nicht der Theorie.
(2) Die Asymmetrie (Dok. 270). Geometrisch *runter* ist verlustbehaftet (Typ II); repräsentationell *hoch* zum Hilbertraum ist verlustfrei (Typ III). Genau das erlaubt FFGFT, *gleichzeitig* „$_4$D-Torus-Theorie“ und „gewöhnliche QM“ zu sein, ohne Widerspruch.

V.6 Die Klammer zur θ=2/9-Phase

Die Darstellungs-Analyse und die θ-Eliminationskette (Dok. 282/286) sind dasselbe Resultat von zwei Seiten. Alle Darstellungen sind auf dem *radialen* (Betrags-)Sektor treu: die Identität (206) und die Bijektion (230) erfassen ihn vollständig, der ξ, die Hierarchie, die Koide-Amplitude $Q = 2/3 = r\sqrt{2}$, der Mittelwert $\langle f \rangle$ der fraktalen Korrekturfunktion in $g = \eta(1 + \xi f)$ (keine Frequenz, nicht die Grundwindungszahl $f = 1/\xi$). Die *eine* Stelle, an der die Geometrie irreduzibel ist, ist der *angulare* (Phasen-)Sektor: der Offset $\theta = 2/9$. Den hält nur die volle T^4-Geometrie; die reelle Rekursion erreicht ihn nicht, der Zirkulant fängt ihn nicht. Treu im Betrag, unersetzbar in der Phase.

V.7 Der 265-Operator nach innen

Wendet man den Vergleichsoperator aus Dok. 265 nach innen, zeigt sich zweierlei. Erstens sind die internen Beziehungen *schärfer*: wo der Aussen-Operator nur *Fast*-Äquivalenz erreichte (verschiedene Herleitungswege, identische abstrakte Struktur), sind die internen Bijektionen *exakt* (Isomorphismus, Dok. 230) und der Matrix-Fall sogar *Identität* (Dok. 206). Zweitens legt die Innen-Anwendung einen Typ frei, den die drei symmetrischen Ebenen des Aussen-Operators nicht haben: die *gerichtete Projektion* (243/270-II). Die 265-Ebenen vergleichen zwei Formalismen symmetrisch; die interne Projektion ist gerichtet ($T^4 \to$ Kodierung) und trägt ein Residuum. Das ist kein Mangel des 265-Operators, sondern ein Befund: nach innen braucht es eine vierte, asymmetrische Relation.

V.8 Offene Kanten

Ehrlich deklariert, nicht verborgen:

- Die **Identität Matrix** ≡ **Geometrie** (206) ist sektor-lokal (3×3, C_3). Eine globale endliche Identität, die θ und die φ-Harmonischen einschliesst, gibt es nicht; offen ist, ob es sie geben *kann* (Dok. 286).
- Die **Residuen-Tabelle** der Informationsformalismen (243) ist ein Arbeitsstand, kein Minimalitätsbeweis, dass T^4 der einzig vollständige Formalismus ist.
- Der **265-Vergleichsoperator** ist selbst mit drei deklarierten Residuen offen (Achsen-Vollständigkeit, -Gewichtung, -Unabhängigkeit); die hier gefundene vierte, gerichtete Relation gehört nachgetragen.

Bilanz: ein Kern, drei Beziehungen

Die parallelen Wege von FFGFT sind nicht gleichrangig. Der T^4-Torus ist generativ – die einzige Darstellung, die nichts verliert. Alles andere steht zu ihm in genau einer von drei Beziehungen: *Identität* (Matrix-Algebra, sektor-lokal), *Bijektion* (Hilbertraum; kompakt/erweiterte Massenform), *Projektion* (Informationsformalismus, neuronales Netz, räumliche Reduktion – mit formalismusrelativem Residuum). Zwei weitere Sprachen (Zwei-Schichten, Rekursion) sind

Tabelle V.1: Die internen Darstellungen, nach Beziehungstyp zum generativen T^4-Kern.

Darstellung	**Dok.**	**Beziehung**	**hält / verliert**
Z_3-Dreieck $\equiv$ 3×3-Matrix	206	Identität	dieselbe Sache; sektor-lokal (C_3)
Hilbertraum $H = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$	230	Bijektion (verlustfrei)	QM $\leftrightarrow$ FFGFT; FFGFT ergänzt das „Warum“
kompakte vs. erweiterte Massenform	070	Bijektion (äquivalent)	gleich; nur erweiterte trägt Ursprung
Informationsformalismus	243	Projektion π	Residuum, formalismus-relativ
neuronales Netz	243	Projektion	dito
räumliche Reduktion $T^3 \to T^0$	270	Projektion (Typ II)	Residuum $\sim \xi$ (CHSH)
Dualitäts-Dekompakt. $D4 \to D3$	270	Typ I (erhaltend)	nur Sichtbarkeit der Kompaktheit
Zwei-Schichten (Verhältnis/SI)	241	orthogonale Achse	Buchhaltung, keine Rivalin
Rekursion / Fixpunkt	203/275	orthogonale Achse	dynamisch, rein reell/radial

keine Rivalinnen, sondern orthogonale Achsen. Der gemeinsame Boden aller Wege ist der radiale Betrags-Sektor; die einzige irreduzible Stelle ist die angulare Phase $\theta = 2/9$. Damit ist die Darstellungsfrage so weit geschlossen, wie es ehrlich geht: treu im Betrag, generativ allein im vollen Torus, offen nur in der Phase.

Kapitel W

Dok. 288 — Nachrichtentechnische Rechenwege

Kurzfassung

Dok. 287 ordnet die parallelen Darstellungen von FFGFT nach Beziehungstyp (Identität, Bijektion, Projektion). Dieses Dokument liest dieselben Darstellungen *anders*: nicht als Landkarte, sondern als *Werkzeugkasten*. Die nachrichtentechnische Erfahrung – Transformationen existieren, weil sie Rechnungen billig machen (Faltung wird Multiplikation) – überträgt sich direkt. Der Massenoperator ist ein Z_3-Zirkulant; die DFT diagonalisiert ihn. Daraus folgen fünf konkrete, maschinengenau geprüfte Rechenhebel: (1) die Lepton-Massenwurzeln sind eine *3-Punkt-DFT* statt ein Eigenwertproblem; (2) Koide $Q = 2/3$ fällt in *zwei Parseval-Zeilen* und ist manifest phasenunabhängig; (3) *jede* Operatorfunktion (Potenz, Inverse, Exponential) ist eine Skalar-Auswertung an drei Eigenwerten; (4) das Hintereinanderschalten von Z_3-Kopplungen ist *punktweise Multiplikation* im DFT-Bild; (5) die ξ-Rekursion ist ein *IIR-Filter 1. Ordnung* mit Pol bei $1-\xi$, und die drei Regime sind Pol-Lagen. Ehrlich: das ist Rechenerleichterung, keine Herleitung – die Transformation bewegt $\sqrt{2}$ und θ, sie erzeugt sie nicht.

W.1 Die Idee: Darstellungswechsel als Rechenhebel

In der Nachrichtentechnik wechselt man die Darstellung nicht aus Geschmack, sondern aus Rechenvorteil. Eine Faltung im Zeitbereich ist im Frequenzbereich eine punktweise Multiplikation; ein lineares zeitinvariantes System ist im z-Bild eine algebraische Übertragungsfunktion; Betrag und Phase trennen sich, sodass man sie unabhängig rechnet. Genau dieselbe Hebelwirkung steckt in FFGFTs parallelen Darstellungen – man muss sie nur als Transformationen statt als Weltbilder lesen.

Der Schlüssel ist eine Beobachtung aus Dok. 286: der Massenoperator *ist* ein Z_3-Zirkulant. Ein Zirkulant wird von der diskreten Fouriertransformation (DFT) diagonalisiert – das ist der nachrichtentechnische Grundsatz „zyklische Faltung ↔ DFT“. Alles Weitere folgt daraus.

Schlüsselergebnis

Der Z_3-Zirkulant-Massenoperator C wird von der unitären DFT-Matrix F diagonalisiert: $C = F^\dagger \Lambda F$, $\Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2)$. Damit wird jedes Problem „Funktion von C“ zu einer Auswertung an den drei Skalaren λ_k.

W.2 Der Aufbau: erste Zeile und DFT

Die Foot-Koide-Konfiguration $\sqrt{m_k} = 1 + \sqrt{2}\cos(\theta + 2\pi k/3)$ ist die DFT eines *3-Vektors*, der erste Zeile des Zirkulants:

$$c = \left(1,\ \tfrac{\sqrt{2}}{2}\, e^{i\theta},\ \tfrac{\sqrt{2}}{2}\, e^{-i\theta}\right), \qquad r = \sqrt{2}, \quad \theta = \tfrac{2}{9}.$$

Hier sitzt der Betrag $r = \sqrt{2}$ in $|c_1| = |c_2| = \sqrt{2}/2$ und die Phase θ im Argument – Betrags- und Phasenanteil sind von vornherein getrennt. C ist hermitesch (geprüft: $\max|C - C^\dagger| = 0$), also reell-spektral.

W.3 Hebel 1: Eigenwerte ohne charakteristisches Polynom

Die drei Massenwurzeln $\sqrt{m_k}$ sind die DFT von c: $\lambda_k = \sum_j c_j \omega^{jk}$, $\omega = e^{2\pi i/3}$. Kein 3×3-Eigensolver, kein Polynom – eine DFT. Numerisch: $\sqrt{m} = (0{,}0404,\ 0{,}5802,\ 2{,}3794)$, übereinstimmend mit der geschlossenen Foot-Koide-Form und mit `eigvalsh` bis $8{,}9 \cdot 10^{-16}$ (`dft_eigenwerte.py`).

W.4 Hebel 2: Koide Q in zwei Parseval-Zeilen

Mit λ_k als DFT-Koeffizienten liefert der Satz von Parseval direkt:

$$\sum_k \sqrt{m_k} = 3\, c_0 = 3, \qquad \sum_k m_k = 3 \sum_j |c_j|^2 = 6, \qquad Q = \frac{\sum m_k}{(\sum \sqrt{m_k})^2} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}.$$

$\sum\sqrt{m}$ liest nur den DC-Term c_0, $\sum m$ nur die Energie $\sum |c_j|^2$. Beide hängen *nur am Betrag* $|c_j|$, also an r – nicht an θ. Über ganz $\theta \in [0, 2\pi)$ bleibt Q exakt $0{,}666667$; ein anderer Betrag verschiebt Q ($r = 1 \to 1/2$, $r = \sqrt{2} \to 2/3$, $r = 1{,}6 \to 0{,}76$). Damit ist der radial/angular-Schluss aus Dok. 282 keine separate Aussage, sondern eine triviale Parseval-Folge: das Betragsspektrum legt die Invariante fest, das Phasenspektrum geht nicht ein (`parseval_koide.py`).

W.5 Hebel 3: jede Operatorfunktion gratis

Aus $C = F^\dagger \Lambda F$ folgt $f(C) = F^\dagger f(\Lambda) F$ für jede Funktion f (hier eine beliebige Operatorfunktion, keine Frequenz und nicht die Grundwindungszahl $f = 1/\xi$). Eine Operatorfunktion ist also drei Skalar-Auswertungen $f(\lambda_k)$ statt Matrixalgebra:

- **Potenz** C^n – für Rekursion / Skalenfluss;
- **Inverse** C^{-1};
- **Exponential** $\exp(C)$ – für Zeitentwicklung / Propagator.

Geprüft gegen `matrix_power`, `inv` und eine Taylor-Reihe: C^5 bis $3{,}6 \cdot 10^{-14}$, C^{-1} bis $4{,}8 \cdot 10^{-15}$, $\exp(C)$ bis $2{,}7 \cdot 10^{-15}$ (`operatorfunktionen.py`). Das ist genau der Sektor, in den der dynamische Teil (Dok. 286) geht: dort braucht man Funktionen des Operators, und die sind im DFT-Bild trivial.

W.6 Hebel 4: Faltung wird Multiplikation

Eine Z_3-zyklische Kopplung zwischen den drei Generationen ist eine zirkuläre Faltung. Der Faltungssatz macht sie im DFT-Bild zu einer punktweisen Multiplikation: $\mathrm{DFT}(a * b) = \mathrm{DFT}(a) \cdot \mathrm{DFT}(b)$. Das Hintereinanderschalten zweier Z_3-Kopplungen – ein Matrixprodukt zweier Zirkulanten – wird zu drei Skalarprodukten. Geprüft bis $9 \cdot 10^{-16}$ (`faltung_multiplikation.py`). Das ist der eigentliche nachrichtentechnische Kern: die teure Operation (Matrixprodukt) wird billig (drei Multiplikationen), sobald man in der richtigen Darstellung rechnet.

W.7 Hebel 5: die Rekursion ist ein Filter

$r(k{+}1) = r(k)(1-\xi)$ ist ein IIR-Filter 1. Ordnung mit z-Übertragungsfunktion $H(z) = 1/(1-(1-\xi)z^{-1})$, ein Pol bei $z = 1-\xi = 0{,}99986667$. $|z| < 1$ heisst stabil / kontrahierend; der Pol-Abstand zum Einheitskreis ist gerade ξ, also die Zeitkonstante $k^* \sim 1/\xi = 7500$ Schritte. Die drei Regime aus Dok. 285/286 sind Pol-Lagen: innen (Gegenkopplung, kontrahiert), auf dem Kreis (Barkhausen-Grenzfall), aussen (Mitkopplung, Weglauf). Impulsantwort und direkte Rekursion stimmen bis 10^{-15} überein (`rekursion_iir.py`). Log-Periodizität, $\xi \to \varphi$-Durchgang und Dekompaktifizierung-als-Weglauf sind damit Pol-Rechnungen, kein eigener Formalismus.

W.8 Betrag und Phase, Minimalphase und Allpass

Die fünf Hebel haben einen gemeinsamen Grund, der die θ-Arbeit (Dok. 286) wiederholt: in der spektralen Darstellung trennen sich Betrag und Phase. Alles, was FFGFT determiniert, ist Betragsinhalt (ξ, Hierarchie, $Q = 2/3$, der Mittelwert $\langle f \rangle$ der fraktalen Korrekturfunktion); der eine offene Wert θ ist reine Phase. Nachrichtentechnisch ist FFGFTs reelle Rekursion eine Minimalphasen-/Verstärkerstufe (der Betrag trägt alles), und eine Phasenstufe $e^{i\varphi}$ ist ein Allpass (betragserhaltend) – genau HLVs schief-adjungierte R (BD17A). Der Allpass lässt sich *anhängen*, ohne den Betrag (und damit die Massen und Q) zu berühren; deshalb ist die Phase rechnerisch separierbar und der offene Rest.

W.9 Was das praktisch bedeutet

Der Gewinn ist überall dort, wo man *Funktionen des Operators* oder *Verkettungen von Kopplungen* braucht – also im dynamischen / kinetischen Sektor (Dok. 286), bei Skalenfluss und Zeitentwicklung. Statt 3×3-Matrixalgebra rechnet man an drei Eigenwerten; statt Matrixmultiplikation drei Skalarprodukte; statt Rekursionsschleifen eine Pol-Lage. Die radialen Invarianten (Massen, Q) sind Parseval-Einzeiler. Der Werkzeugkasten ist Standard-Nachrichtentechnik, angewandt auf den Z_3-Kern.

W.10 Ehrliche Grenze

Wichtig

Das ist Rechenerleichterung, *keine* neue Physik (P35). Der Darstellungswechsel *bewegt* $\sqrt{2}$ und θ, er *erzeugt* sie nicht – beide bleiben Inputs. Die volle Hebelwirkung liegt am C_3/Z_3-Sektor (3×3-Zirkulant); der volle T^4 mit den φ-Harmonischen ist grösser, dort ist die DFT-Diagonalisierung nur der Generationen-Block. Und kein Hebel ändert den Status der offenen Phase: er macht nur sichtbar, *warum* sie separat steht.

Bilanz: die Darstellungen rechnen mit

Die parallelen Darstellungen sind nicht nur Einordnung (Dok. 287), sondern Rechenwerkzeug. Weil der Massenoperator ein Z_3-Zirkulant ist, diagonalisiert ihn die DFT, und fünf Standard-Hebel der Nachrichtentechnik werden anwendbar: Eigenwerte als DFT, Invarianten als Parseval, Operatorfunktionen als Skalar-Auswertung, Verkettung als Multiplikation, Rekursion als Filter-Pol. Alle fünf maschinengenau geprüft. Der Gewinn ist konkret im dynamischen Sektor; die Grenze ist ehrlich: ein schnellerer Rechenweg, keine zusätzliche Herleitung. Damit ist die nachrichtentechnische Sicht, die in Dok. 287 fehlte, als eigener Werkzeugkasten nachgetragen.

Kapitel X

Dok. 289 — Magnitude/Phase-Karte der vier Fermion-Sektoren

Kurzfassung

Helfen die nachrichtentechnischen Darstellungen (Dok. 288), Quarks und Neutrinos besser zu fassen? Die ehrliche Antwort: *als Sprache und Diagnose ja, als Herleitung nein* – und für die beiden Sektoren sehr unterschiedlich. Jedes Fermion-Triplett bekommt eine Magnitude-Koordinate (Koide Q, bzw. $r = \sqrt{6Q - 2}$) und eine Phasen-Koordinate. Gerechnet: nur die geladenen Leptonen sitzen am speziellen Punkt $r = \sqrt{2}$ ($Q = 2/3$); die Quarks liegen anderswo ($r \approx 1{,}54$ bzw. $1{,}76$, zudem skalenabhängig), und für Neutrinos lässt sich Q gar nicht bilden. Der Gewinn ist eine *vereinheitlichende Karte*: Leptonen und Quarks sind betrags-dominiert (Hierarchie gross, Mischung klein), Neutrinos phasen-dominiert (Betrag flach/entartet, Mischung gross – PMNS/CKM-Gewicht $0{,}55$ gegen $0{,}035$, Faktor 16). FFGFTs eigene Neutrino-Hypothese (gleiche Massen + Oszillation aus geometrischer Phase) ist dann wörtlich der *reine Allpass-Sektor*: Betrag flach, alles in der Phase – und sie wird falsifizierbar, weil die geometrische Phase die gemessenen Δm^2-Phasen reproduzieren muss.

X.1 Die Frage

Dok. 288 hat gezeigt, dass der Z_3-Zirkulant-Massenoperator über die DFT konkrete Rechenhebel gibt. Naheliegend ist: greifen dieselben Darstellungen auch bei den schwierigen Sektoren – Quarks und Neutrinos? Vorab nötig ist eine ehrliche Bestandsaufnahme, denn der Korpus behandelt diese Sektoren nicht wie die sauberen geladenen Leptonen.

X.2 Was der Korpus schon tut (pro Sektor)

- **Geladene Leptonen** (Dok. 006/046/258): der saubere Fall – Foot-Koide-Form, $Q = 2/3$, $r = \sqrt{2}$, Z_3-Zirkulant. Hier greift alles aus Dok. 288 unmittelbar.
- **Quarks** (Dok. 006/005): im Prinzip dieselbe r_i/p_i-Geometrie, aber die direkte geometrische Methode reicht nur $\sim 1{,}2\%$; für Quarks braucht es die *erweiterte fraktale Methode* mit QCD-Dynamik und *ML-Kalibrierung an Lattice-Daten* (FLAG 2024). Also nicht rein geometrisch – und Quarkmassen *laufen* (skalen-/schemaabhängig).
- **Neutrinos** (Dok. 007/047): ein *anderer* Mechanismus – Photon-Analogie, $m_\nu = \frac{\xi_0^2}{2} m_e \approx 4{,}54$ meV, alle drei Flavours (nahezu) gleich schwer, Oszillation aus *geometrischen Phasen* statt Massendifferenzen. Im Korpus durchgehend als **spekulativ, ohne empirische Basis** markiert.

X.3 Die (Q, r)-Koordinate: wo die Sektoren sitzen

Über $Q = \frac{1}{3} + \frac{r^2}{6}$ (also $r = \sqrt{6Q - 2}$) bekommt jedes Triplett eine Magnitude-Koordinate. Gerechnet (`koide_q_sektoren.py`, PDG-nahe Werte):

Tabelle X.1: Magnitude-Koordinate der drei bildbaren Triplette. Quarkwerte sind skalenabhängig (MS-bar).

Sektor	Koide Q	$r = \sqrt{6Q - 2}$	Lage
geladene Leptonen (e, μ, τ)	$0{,}6667$	$\sqrt{2} = 1{,}4142$	speziell
up-Quarks (u, c, t)	$0{,}849$	$1{,}759$	nicht speziell
down-Quarks (d, s, b)	$0{,}730$	$1{,}543$	nicht speziell
Neutrinos	—	—	kein Triplett

Das ist schon die erste Antwort: *nur die geladenen Leptonen sitzen am speziellen Punkt* $r = \sqrt{2}$. Die Quark-r sind nicht erkennbar besonders (und laufen mit der Skala); für Neutrinos fehlt die absolute Skala und die Ordnung, sodass Q nicht bildbar ist – nur $\Delta m^2_{21} \approx 7{,}5 \cdot 10^{-5}$ und $\Delta m^2_{31} \approx 2{,}5 \cdot 10^{-3}$ eV^2 sind gemessen.

X.4 Die Magnitude/Phase-Karte

Die nachrichtentechnische Zerlegung (Betrag = Massenspektrum, Phase = Mischung/Oszillation) ordnet die vier Sektoren in *eine* Karte:

- **Quarks**: starke Massenhierarchie (Betrag gross), kleine Mischung (CKM nahe Identität) – *betrags-dominiert*.
- **Geladene Leptonen**: Betrag an einem speziellen Wert ($r = \sqrt{2}$), kleine Phase ($\theta = 2/9$) – *betrags-dominiert*.
- **Neutrinos**: flacher Betrag (entartet), grosse Mischung (PMNS weit von Identität) – *phasen-dominiert*.

Der CKM/PMNS-Kontrast lässt sich quantifizieren (`ckm_pmns_kontrast.py`, Off-Diagonal-Gewicht der $|U|^2$-Matrix): CKM $0{,}035$ gegen PMNS $0{,}554$ – ein Faktor ~ 16. Die „kleine gegen grosse Mischung“ ist also genau ein *Betrag-gegen-Phase*-Kontrast.

X.5 Die Neutrinos als Allpass-Sektor

Hier liegt der stärkste Punkt. FFGFTs eigene Hypothese – gleiche Massen, Oszillation aus geometrischer Phase – ist in der Magnitude/Phase-Sprache wörtlich ein *Allpass*: $|H| = 1$ (flaches Betragsspektrum), nichttriviale Phase. Ein flaches Betragsspektrum kann keine Oszillation kodieren; alles Physikalische sitzt in der Phase (`neutrino_allpass.py`).

Das macht den Test *konkret und falsifizierbar*. Die Standard-Oszillationsphase ist $\Delta\phi_{ij} = 1{,}267\,\Delta m^2_{ij} L/E$; bei T2K-artigem L/E ($L = 295$ km, $E = 0{,}6$ GeV) sind das $\Delta\phi_{31} \approx 1{,}557$ rad und $\Delta\phi_{21} \approx 0{,}047$ rad. FFGFTs geometrische Phase (aus $\tilde{T} \cdot m = 1$, Quantenzahlen n, ℓ, j) *muss* genau diese L/E-abhängigen Phasen reproduzieren. Tut sie es nicht, ist die Entartungs-Hypothese widerlegt.

X.6 Was das leistet – und was nicht

Wichtig

Leistung (diagnostisch). Die Magnitude/Phase-Zerlegung erklärt die *Arbeitsteilung* zwischen den Sektoren: warum die Leptonen sauber sind (Betrag an speziellem Wert, kleine Phase), die Quarks nicht (Betrag nicht speziell, extreme Hierarchie), die Neutrinos ganz anders (Betrag flach, alles Phase). Das ist echtes Einordnungs-Wissen – und es gibt der spekulativen Neutrino-Hypothese eine scharfe, falsifizierbare Form.
Grenze (P35). Das ist bessere Sprache, eine vereinheitlichende Karte und ein schärferer Test – *keine* neue Herleitung von Quark- oder Neutrinomassen. Die Quark-r sind nicht speziell und skalenabhängig, und der Quark-Sektor stützt sich im Korpus ohnehin auf QCD plus Lattice-Kalibrierung, nicht auf reine Geometrie. Der Neutrino-Sektor bleibt spekulativ (eigene Markierung, Dok. 007) und in Spannung zur sehr gut getesteten Δm^2-Deutung der Oszillation. Die saubere Allpass-Karte ist eine bestechende Umformulierung, kein neuer Beleg.

Bilanz: eine Karte, kein neuer Sektor

Die nachrichtentechnischen Darstellungen fassen Quarks und Neutrinos *besser* – aber im präzisen Sinn: sie geben eine gemeinsame Magnitude/Phase-Koordinate, in der nur die geladenen Leptonen am speziellen Punkt $r = \sqrt{2}$ sitzen, die Quarks betrags-dominiert daneben, und die Neutrinos als reiner Phasen-/Allpass-Sektor. Der CKM/PMNS-Kontrast wird Betrag gegen Phase (Faktor 16). Und FFGFTs eigene Neutrino-Hypothese erhält eine falsifizierbare Form: die

geometrische Phase muss die gemessenen Δm^2-Oszillationsphasen treffen. Das ist Diagnose und Test, keine Massenherleitung – ehrlich abgegrenzt.

Kapitel Y

Dok. 290 — Folgen für die Informationsfrage: Betrag, Phase und der zweite Kanal

Kurzfassung

Die Betrag/Phase-Zerlegung des FFGFT-Massenoperators (Dok. 288/289) ordnet die Informationsfrage neu. Information hat eine *Betragsseite* (Masse/Energie – Landauer und Vopson, von FFGFT aus der T^4-Geometrie hergeleitet) und eine unabhängige *Phasenseite* (Holonomie, Mischung – das eine offene Datum θ). Der reinste Beleg ist das **Photon**: exakt masselos – null Ruhemasse-Betrag, im Massenkanal also reine Phase – und das Quantum des $U(1)$-Eichpotentials A_μ, das die Verbindung ist; FFGFTs Informationseinheit $E_{\text{bit}} = \hbar c/L$ *ist* eine Photonenenergie. Die *Menge* an Information ist dabei nicht darstellungs-relativ, sondern absolut und dimensionslos in ξ verankert: $I_1 = \log_2(1/\xi) \approx 12{,}87$ Bit pro Freiheitsgrad; Energie und Kapazität sind ihre dimensionalen, frequenz-skalierenden Beiwerke. Die Frage ist nicht „ist Information fundamental?“, sondern **welcher Kanal** – und nur die Geometrie hält beide. Strukturelle Diagnose, keine neue Herleitung.

Y.1 Ausgangslage: Geometrie zuerst, und die Betrag/Phase-Brille

FFGFTs Position zur Informationsfrage ist dokumentiert und geometrie-zuerst. Dok. 243 (Diskussion mit Onur Teker, UIFT): die Abbildung von FFGFT in einen Informationsformalismus ist eine *Projektion* π, kein Isomorphismus; die Bit-Zählung $I = \log_2|\mathscr{W}|$ *setzt* den geometrischen Zustandsraum *voraus*. Dok. 255/257 leiten Landauers Prinzip und Vopsons Masse-Information-Äquivalenz *aus* der T^4-Geometrie ab: ein Bit ist eine minimale topologische Windung $\Delta w = 1$, „Information ist topologisch eingefrorene kinetische Energie“, $E_{\text{bit}}(L) = \hbar c/L = pc$. Dok. 274 stellt FFGFT *geometrie-primitiv* neben informations-primitiv (Vopson). FFGFT lehnt Vopson also nicht ab – es begründet ihn.

Die neue Brille ist die Betrag/Phase-Zerlegung des Massenoperators (Dok. 288/289): der Operator ist ein Z_3-Zirkulant, DFT-diagonalisiert, und sein Inhalt zerfällt in ein *Betragsspektrum* (Massen, Energie) und ein *Phasenspektrum* (Mischung, Holonomie). Der θ-Befund (Dok. 282) sagt: das Betragsspektrum legt das Phasenspektrum nur bis auf einen Allpass-Faktor fest (präzisiert in §2). Das ist der Schlüssel zu allem Folgenden.

Y.2 Zwei Kanäle: Betrag und Phase

$\Delta w = 1$ und $E_{\text{bit}} = \hbar c/L$ sind Betrags-/Energie-Aussagen. Da das Betragsspektrum das Phasenspektrum nur bis auf einen Allpass-Faktor festlegt (siehe unten), folgt:

Vopsons Masse-Information-Äquivalenz – die FFGFT herleitet – erfasst strukturell *nur den Betragskanal*. Der Phasenkanal (Holonomie, Mischung, θ) ist unabhängige Information, nicht auf Masse/Energie reduzierbar.

Das zeigt sich an zwei Stellen konkret. *Erstens, Mischungsblindheit:* ein Massenoperator $M = U\,\mathrm{diag}(m)\,U^\dagger$ trägt die Eigenwerte m (Betragskanal) und die Eigenvektoren U (Mischung, Phasenkanal); jede Funktion der Eigenwerte allein ($\sum m$, Koide Q) ist gegenüber U invariant. Numerisch (`masse_information_phasenblind.py`): bei festen Massen $(0{,}5,\,1{,}5,\,3{,}0)$ bleiben $\sum m = 5$ und $Q = 0{,}372$ über drei Mischungen gleich, während $\|M_{\text{offdiag}}\|$ ($1{,}42$ bis $1{,}78$) variiert – zwei physikalisch verschiedene Operatoren mit derselben Masse-Information.

Zweitens, die Phase trägt die Struktur: nachrichtentechnisch seit Oppenheim/Lim (1981) bekannt – tauscht man Betrags- und Phasenspektrum zweier Muster über Kreuz, folgt die Rekonstruktion dem *Phasen*-Spender. Numerisch (`phase_traegt_struktur.py`): Phase-only korreliert mit dem Original ($+0{,}53$), Magnitude-only nicht ($-0{,}24$). Eine Masse-Energie-Buchhaltung erfasst also den *strukturärmeren* Kanal.

Drittens, präzise: „der Betrag legt die Phase nicht fest" gilt nur *bis auf einen Allpass-Faktor*. Jede stabile Transferfunktion zerfällt in $H = H_{\text{min}} \cdot H_{\text{ap}}$: für den *minimalphasigen* Anteil legt der Betrag die Phase sehr wohl fest (Bode-/Hilbert-Relation, $\arg = \mathscr{H}\{\log|H|\}$), während der *Allpass* ($|H_{\text{ap}}| = 1$) eine Phase trägt, die der Betrag *nicht* festlegt. Numerisch (`minimalphase_allpass.py`): die allein aus dem Betrag rekonstruierte Phase trifft $\arg H_{\text{min}}$ (Fehler $\sim 10^{-15}$), die Restphase ist exakt der Allpass. Frei – und damit das Offene – bleibt der *Allpass-Anteil*, und genau dort sitzt die θ-Holonomie (Lesart Minimalphase (FFGFT) $\times$ Allpass (HLV-R), Dok. 288).

Y.3 Das Photon: der exakte Anker

Der reinste Beleg ist das Photon – und der Korpus enthält die Teile bereits. Dok. 007 behandelt Neutrinos über die Photonen-Analogie: Photon $E^2 = (pc)^2 + 0$ (exakt masselos), Neutrino $E^2 = (pc)^2 + (\sqrt{\xi^2/2}\,mc^2)^2$ (quasi-masselos). Das Photon ist der $m = 0$-Grenzfall, das Neutrino „Photon plus erste $\xi^2/2$-Korrektur".

Das Photon hat Ruhemasse-Betrag exakt null – der exakte Allpass *im Massenkanal*: der gesamte Ruhemasse-Inhalt ist Phase. (Die Energie $\hbar\omega$ bleibt eine Betragsgröße;

„reine Phase“ meint den Ruhemasse-, nicht den Energiekanal.) Drei Dinge fallen zusammen:

1. **Ungefrorene Information.** Das Photon ist der ungefrorene Fall von „Information = eingefrorene kinetische Energie“ ($E = pc$); FFGFTs Einheit $E_{\text{bit}} = \hbar c/L$ *ist* eine Photonenenergie, Landauers thermischer Bit ihre Einfrierung.
2. **Photon und Verbindung.** Das Eichpotential A_μ *ist* die $U(1)$-Verbindung; das Photon ist deren Quantum. *Ein* eichinvarianter Observable ist die Holonomie ($\oint A\,\mathrm{d}l$, Aharonov-Bohm, sogar wo $F = 0$) – neben Energie $\hbar\omega$, Impuls und Polarisation, die keine Holonomien sind. Der Bezug zu „it from connection“ ist *begrifflich* (relationaler Charakter), keine formale Identität mit θ.
3. **Gegenbeispiel zu „Masse = Information“.** Null Ruhemasse, doch Träger praktisch unserer gesamten Informationsübertragung.

Das Neutrino ist nur die erste Korrektur daran: ein „gedämpftes Photon“ mit winzigem Betrag statt exakt null. Im entarteten Grenzfall wäre $M = m \cdot \mathbb{1}$ für jedes U ($\|M - m\mathbb{1}\| \sim 10^{-16}$), die Mischung verließe M, der Oszillationsinhalt säße in der Propagations-/Holonomie-Phase – dieselbe Lage, die das Photon *exakt* und ohne Entartungs-Hypothese realisiert.

Y.4 Was „Informationsmenge“ heißt: Paket, Zahl, Energie, Kapazität

Ist ein Photon das kleinste Paket? Nur *pro Mode*. Ein Einzelfrequenz-Photon ist eine ebene Welle; ein lokalisiertes Photon ist ein Wellenpaket. Wichtig: ein zeitlich begrenztes Paket behält den *definiten* Träger f_0 (die Laserfarbe, der Energiesprung); die Begrenzung erzeugt nur ein Band $\Delta f \sim 1/\Delta t$ *um* f_0 (Fensterwirkung), kein Spektrum. Die Zyklenzahl ist $N = f_0\,\Delta t$: bei festem Zeitfenster $\propto f_0$, aber bei fester Zyklenzahl ist die fraktionale Bandbreite $\Delta f/f_0 = 1/N$ *frequenz-unabhängig*. Beim Photon aus einem Energiesprung ist die Lebensdauer τ das Fenster: die natürliche Linienbreite $\Delta f = f_0/Q$ mit $Q = \omega_0\tau = 2\pi N$ ($\tau = 10\,\text{ns}$, $f_0 = 5 \cdot 10^{14}\,\text{Hz} \Rightarrow N = 5 \cdot 10^6$, $\Delta f \approx 16\,\text{MHz}$; numerisch `fenster_zyklen_linienbreite.py`). Definiter Träger *plus* Fenster ergibt das Band.

Weder Periodenzahl noch Fensterlänge ist intrinsisch. Beide setzt der Emissionsprozess, nicht das „Photon-Sein“: eine monochromatische Mode hat unendlich viele Perioden und unendliches Fenster (ebene Welle); ein spontan emittiertes Photon erbt f_0 *und* τ vom Übergang ($N = f_0\tau = Q/2\pi$, beides gekoppelt); ein technisches Paket fixiert eine Größe, die andere folgt aus $N = f_0\Delta t$. Intrinsisch – skalen-invariant – ist die dimensionslose Zahl N ($\Delta f/f = 1/N$), $\Delta t = N/f$ ist ihre dimensionale Einkleidung. Die Spannweite ist groß: Few-Cycle-Puls $N \approx 2$, schmale Atomlinie $N \approx 5 \cdot 10^6$ (numerisch `quant_bit_modeninfo.py`) – es gibt keine universelle Periodenzahl und keine universelle Fensterlänge.

Damit sind drei Größen sauber zu trennen (numerisch `photon_paket_count_energie.py`):

- **Zahl**: die Quantenzahl (Besetzung) ist ein *Zählwert* – eine Anregung, frequenzunabhängig, relational –, *kein* Bitmaß. Was ein Quant an *Information* trägt, steht unten.
- **Energie** pro Bit: $E = \hbar\omega = \hbar c/L$ – frequenz-abhängig (Radio $\sim 2 \cdot 10^{-10}$ eV bis Gamma $\sim 2 \cdot 10^{5}$ eV).
- **Kapazität**: Shannon $C = B \log_2(1 + \mathrm{SNR})$, $B \propto f$ – frequenz-abhängig ($\sim 2 \cdot 10^{5}$ bis $\sim 2 \cdot 10^{20}$ Bit/s).

„Höhere Frequenz → mehr Information“ ist genau die Kapazität: mehr Bandbreite, mehr Moden pro Sekunde. Das ist eine *andere* Achse als Betrag/Phase: *innerhalb* einer Mode trägt jedes Symbol Amplitude *und* Phase (I/Q bzw. QAM), *über* die Moden zählt die Bandbreite. FFGFT spiegelt beides: innerhalb der Mode der Z_3-Zirkulant (r, θ), über die Moden $|\mathscr{W}|$.

Ein Quant ist ein Zählwert, kein Bit. „Ein Quant = ein Bit“ ist keine allgemeine Gleichung – sie verwechselt Zählen mit Messen. Ein Quant ist eine *Anregung* (Zählwert 1); sein *Informationsgehalt* ist $\log_2 M$ Bit, wenn es aus M unterscheidbaren Moden gewählt ist – *variabel*, pro Freiheitsgrad gedeckelt bei $I_1 = \log_2(1/\xi) \approx 12{,}9$ Bit (§5). „Ein Quant = ein Bit“ gilt nur für $M = 2$ (Mode auf ein Binär-Alphabet fixiert) – eine Kodierkonvention, kein Naturgesetz. Zählwert und Bitgehalt sind verschiedene Achsen: ein Quant in 2^{13} Moden trägt 13 Bit, 13 binäre Quanten ebenso – gleiche Bitzahl, verschiedene Quantenzahl (numerisch `quant_bit_modeninfo.py`). Das Quant *zählt*; $\log_2 M \le I_1$ *misst*. Damit ist auch §5 sauber eingeordnet: I_1 ist nicht der Gehalt *eines* Quants, sondern die absolute *Decke* pro Freiheitsgrad, die der variable Modengehalt $\log_2 M$ nie überschreitet.

Y.5 Die absolute Menge: in ξ verankert

Eine frühere Lesart – der Informationsgehalt sei darstellungs-relativ, es gebe keine absolute Bit-Zahl – war überzogen und FFGFT-untreu. Der absolute, frequenzunabhängige Gehalt ist die *dimensionslose* Größe, und ξ verankert sie. $\xi = 4/30000$ ist dimensionslos (der absolute Parameter); $\hbar, c$ sind SI-Buchhaltung.

ξ deckelt die Windungszahl bei $n_{\max} \sim 1/\xi$ (Dok. 243/009) – ohne diese Schranke divergierte $I = \log_2 |\mathscr{W}|$. Eine Windungskoordinate kann also $\sim 1/\xi$ unterscheidbare Werte annehmen: $I_1 = \log_2(1/\xi) = \log_2(7500) \approx 12{,}87$ Bit. Gesamt $I_{\text{gesamt}} \sim N_{\max} \cdot \log_2(1/\xi)$ (Zellen $N_{\max} = V/L_0^d$, Dok. 251, mal Tiefe). Dimensionslos, von ξ gesetzt – die Energie $\hbar c/L$ ist nicht die Menge, sondern ihr dimensionaler Preis, und die Kapazität sättigt an der ξ-Skala.

Nur *schwach* relativ bleibt die Bit-Zahl einer *Beschreibung* bei gewählter Auflösung und das, was eine verlustbehaftete Projektion verwirft (Dok. 243) – eine Aussage über Näherungen, nicht über die Information selbst. Die volle Information (Geometrie bzw. ihr verlustfreies Hilbert-Bild, Dok. 230) ist absolut.

Absolut und relational sind kein Widerspruch. Die beiden Aussagen – die Menge ist *absolut* (§5), das offene Datum θ ist *relational* (§8) – liegen auf verschiedenen

Achsen: „absolut“ misst die *Menge*/das Maß, „relational“ beschreibt die *Natur* eines Datums. Eine Holonomie (Windung) ist das Musterbeispiel für *beides*: relational definiert (Schleifenintegral, kein lokaler Punktwert) *und* absolut bewertet (eichinvariant, ganzzahlig). Numerisch (`absolut_relational.py`): eine Windung $w = 3$ ist nur als Schleifenintegral ablesbar (die halbe Schleife liefert 1) und bleibt unter einwertiger Umphasung unverändert (eichinvariant); und die absolute Zahl $\log_2(1/\xi)$ *zählt* genau solche relationalen Objekte (~ 15000 Windungssektoren bis $n_{\max} \sim 1/\xi$, $\log_2 \approx 13{,}9$ Bit). Die Absolutheit sitzt im Boden (der Geometrie, ξ), die Relationalität in den Freiheitsgraden darauf – die absolute Bit-Zahl zählt relationale Windungen.

Y.6 Statische und dynamische Definition des Bits

Die bisherige Definition ist durchweg *statisch*: das Bit als Struktur – Windung $\Delta w = 1$, Zähldecke $\log_2 M \le I_1$, Energie $E_0 = \hbar c/L$ (Betragsseite). Das sagt, *was* ein Bit ist, nicht was es *tut*. Die dynamische Definition ist kein Zusatz, sondern die konjugierte Seite – und sie zerfällt selbst in zwei, in denen die Energie *verschiedene* Rollen spielt.

Kinematisch (reversibel), die $\tilde{T}$-Seite: ein Flip dauert $\tilde{T} = \hbar/E_0 = 1/m_0$, die Rate ist $1/\tilde{T} = E_0/\hbar$. Hier ist $E_0 \cdot \tilde{T} = \hbar$ nichts anderes als $\tilde{T} \cdot m = 1$ – die Zeit-Masse-Dualität, das FFGFT-Fundament. Das Quanten-Speed-Limit (Margolus-Levitin) $\tau \ge \pi\hbar/2E$ macht es scharf: die Energie *setzt die Uhr*, ohne dissipiert zu werden (unitär). Die Kosten sind *Zeit*. Die Kapazitätsachse (Bit/s, §4) ist genau diese Rate.

Thermodynamisch (irreversibel), die Landauer-Seite: ein Bit trägt Entropie $k_B \ln 2$; das *Löschen* (Vergessen) in ein Bad bei Temperatur T dissipiert $k_B T \ln 2$ Wärme. Das hängt an T, *nicht* an E_0, und die Wärme wird *dissipiert* – die Kosten sind *Wärme*, nicht Zeit. In FFGFT ist diese Seite *emergent*: das fundamentale T^4-Geschehen ist unitär-reversibel, sodass kinematisch ($\tilde{T}$) primär ist und der Landauer-Preis erst durch Grobkörnung, Bad und logische Irreversibilität entsteht.

Der dimensionslose Zählwert $\log_2 M$ ist primär; die Konstanten kleiden ihn ein (numerisch `bit_statisch_dynamisch.py`): $\hbar, c$ zu Energie E_0 und Zeit $\tilde{T}$ (kinematisch, reversibel: *Zeit*-Kosten, $\tilde{T} \cdot m = 1$), k_B zu Entropie $k_B \ln 2$ und Löschwärme $k_B T \ln 2$ (thermodynamisch, irreversibel: *Wärme*-Kosten). $\hbar, c, k_B$ sind SI-Buchhaltung. Die Energie spielt zwei Rollen: *Uhr* (kinematisch, kein Verlust) versus *dissipierte Wärme* (thermodynamisch).

Wichtig: „Buchhaltung“ heißt nicht *entbehrlich*. $k_B, \hbar, c$ sind die *notwendigen* Einheiten-Brücken. SI trennt Temperatur (K), Energie (J), Zeit (s) in eigene Einheiten, und sobald thermodynamisch *gerechnet* wird – und das geschieht in SI –, ist k_B die unverzichtbare Umrechnung K→J (sonst stünde die Löschwärme in Kelvin statt Joule), wie $\hbar, c$ die Umrechnung zu $E_0 = \hbar c/L$ tragen. In natürlichen Einheiten ($k_B = \hbar = c = 1$) sind die Kosten reine Zahlen ($\ln 2$); SI führt die Einheitenwände ein, und die Buchhaltung ist deren Mörtel – ontologisch sekundär, operativ unverzichtbar (numerisch `buchhaltung_si_natuerlich.py`).

Das Bit in SI-Zahlen. Verankert an der charakteristischen Energie des Rahmens, $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu} = 7{,}348\,\text{MeV}$ (über $\alpha = \xi E_0^2/K_{\text{frak}}$ an die Feinstrukturkonstante gekoppelt; die Variante $\sqrt{\alpha/\xi} = 7{,}398\,\text{MeV}$ liegt um $+0{,}68\%$ höher – das ist bis auf $7 \cdot 10^{-5}$ der

Faktor $1/\sqrt{K_{\text{frak}}} = 1{,}0067$, R72). Das generische $E_0 = \hbar c/L$ fällt mit diesem E_0 genau bei $L = L_0 = \hbar c/E_0$ zusammen. Dann (numerisch `bit_in_si.py`): $E_0 = 1{,}177 \cdot 10^{-12}$ J, $L_0 = 2{,}686 \cdot 10^{-14}$ m $= 26{,}85$ fm, $m_0 = 1{,}310 \cdot 10^{-29}$ kg, $\tilde{T} = \hbar/E_0 = 8{,}958 \cdot 10^{-23}$ s $= L_0/c$ und $1/\tilde{T} = 1{,}116 \cdot 10^{22}$ s^{-1}.

Y.7 Die Temperatur des Bits: Skala, Zustand, Bad

Die Energie E_0 lässt sich direkt in eine *Temperatur* umrechnen. Über $E_0 = k_B T_0$ ist

$$T_0 = \frac{E_0}{k_B} = \frac{1{,}177 \cdot 10^{-12}\,\text{J}}{1{,}381 \cdot 10^{-23}\,\text{J/K}} = 8{,}53 \cdot 10^{10}\,\text{K}$$

(Probe über 1 eV$= 11\,604{,}5$ K: $7{,}348 \cdot 10^6$ eV $\cdot\, 11\,604{,}5 = 8{,}53 \cdot 10^{10}$ K), also rund 85 Milliarden Kelvin. T_0 ist die Temperatur, bei der die thermische Energie $k_B T_0$ die *Struktur-Energie* E_0 des Bits erreicht.

Hat ein Bit überhaupt eine Temperatur? Streng genommen: nein, nicht *eine*. Ein einzelnes Bit in definitem Zustand (0 oder 1) hat Nullentropie und keine Verteilung – Temperatur ist eine Ensemble-/Reservoir-Größe und einem einzelnen, festgelegten Freiheitsgrad gar nicht zugeordnet. Was man einem Bit sinnvoll zuordnen kann, sind *drei verschiedene* temperaturartige Größen, die man nicht verwechseln darf. Erstens die *Zustands*- oder Besetzungstemperatur: hat das Bit zwei um E_0 getrennte Niveaus, so definiert das Besetzungsverhältnis $p_1/p_0 = e^{-E_0/k_B T}$ eine effektive Temperatur. Sie läuft *gegen* die Anschauung: maximal gemischt ($p_0 = p_1 = \frac{1}{2}$, volle ein Bit Entropie) heißt $T_{\text{eff}} \to \infty$, definit ($p \to 0$ oder 1, null Entropie) heißt $T_{\text{eff}} \to 0$, Besetzungsumkehr sogar $T_{\text{eff}} < 0$. Das *informationsreichste* Bit ist damit der Unendlich-Temperatur-Zustand; Kühlen treibt es in einen definiten Zustand und *zerstört* die Information. (Ein rein logisches, entartetes Bit – beide Werte gleiche Energie – hat gar keine Besetzungstemperatur.) Zweitens die *Skala* $T_0 = E_0/k_B$: nicht „wo das Bit sitzt", sondern der charakteristische Schmelz-/Aktivierungspunkt aus dem Energie-Gap, die natürliche Temperatur-*Einheit* des Bits. Drittens die *Bad*-Temperatur, die in die Löschkosten eingeht – und die gehört der *Umgebung*, nicht dem Bit.

Die Skala T_0 markiert die thermische Belastbarkeitsgrenze: darüber ($k_B T > E_0$) überwiegt die thermische Energie die Struktur, und die Wärme wäscht die Distinktion – die Windung bzw. Mode, die das Bit *ist* – aus: das Bit „schmilzt". Darunter ($k_B T < E_0$) ist es robust. Das ist eine Aussage über die *Skala*, nicht über einen Zustand.

Welche Temperatur beim Löschen? Die Landauer-Kosten $Q = k_B T \ln 2$ hängen an der Temperatur des *Bades*, in das die gelöschte Entropie als Wärme abfließt – also an der Wahl der Umgebung, nicht am Bit. Es gibt keinen universellen „richtigen" Wert. Für einen realen Rechner ist es die Betriebstemperatur, praktisch *Raumtemperatur* (~ 300 K): $Q = k_B \cdot 300 \cdot \ln 2 = 18$ meV. Das ist die ehrliche Antwort für reales Rechnen. UIFT setzt statt dessen $T_{\text{CMB}} = 2{,}7$ K ein – nicht den absoluten Nullpunkt, aber die *kälteste natürliche Wärmesenke*; das gibt die minimal mögliche Löschwärme im heutigen Universum ($Q = 0{,}16$ meV, kälter geht ohne aktives Kühlen nicht). Legitim als

kosmologischer Boden, aber weiterhin nur *eine* Bad-Wahl, keine Bit-Eigenschaft. T_0 schließlich ist *kein* Bad: setzt man es ein, bekommt man den Grenzfall „Bad so heiß wie das Bit selbst", $Q = E_0 \ln 2 = 0{,}69\,E_0$ – eine Referenz, kein Löschvorgang.

„Die" Temperatur eines Bits hängt damit an seiner *Skala*: ein generisches Bit der Länge L trägt die Energie $E = \hbar c/L$ und somit die Skala $T = \hbar c/(k_B L)$. Jede Bit-Skala hat ihre eigene; $8{,}5{\cdot}10^{10}$ K ist die des charakteristischen E_0. Ein größeres L – ein „weicheres" Bit – hat eine niedrigere Schwelle.

Damit steht T_0 neben Masse und Zeit als dritte Einheiten-Kleidung *derselben* Energie. Mit je einer Buchhaltungskonstante:

$$m_0 c^2 \;=\; E_0 \;=\; k_B T_0 \;=\; \hbar/\tilde{T},$$

also $/c^2 \to$ Masse $m_0 = 1{,}310 \cdot 10^{-29}$ kg, $/\hbar \to$ Zeit $\tilde{T} = 8{,}958 \cdot 10^{-23}$ s (die Dual-Zeit aus $\tilde{T} \cdot m = 1$), $/k_B \to$ Temperatur $T_0 = 8{,}53 \cdot 10^{10}$ K. Unter allen vier sitzt der dimensionslose Zählwert $\log_2 M$. Eine Energie, vier Kleidungen.

Die Temperatur ist dabei nicht bloß „auch noch da", sondern direkt mit der dynamischen Dual-Zeit verknüpft. Die *thermische Zeit* bei T_0 ist $\hbar/(k_B T_0)$; Einsetzen von $T_0 = E_0/k_B$ gibt $\hbar/E_0 = \tilde{T}$ – die thermische Zeit bei T_0 *ist* die Dual-Zeit aus $\tilde{T} \cdot m = 1$ (numerisch identisch bis 10^{-38} s, `bit_temperatur.py`). Das ist die KMS- bzw. „thermische Zeit"-Korrespondenz (Connes–Rovelli): Temperatur ist eine inverse (imaginäre) Zeit, und sie landet ohne Zusatzannahme genau auf der FFGFT-Dual-Zeit. Auf der Buchhaltungsachse ist k_B für die Temperatur damit exakt das, was $\hbar$ für die Zeit ist.

Schließlich verbindet T_0 die beiden „Energien" eines Bits – was es *ist* (E_0) und was sein *Löschen* kostet ($k_B T \ln 2$) – zu *einer* Skala. Die Landauer-Löschwärme relativ zur Eigenenergie ist schlicht das Temperaturverhältnis,

$$\frac{Q}{E_0} = \frac{k_B T \ln 2}{k_B T_0} = \frac{T}{T_0}\,\ln 2.$$

Bei Raumtemperatur: $\frac{300}{8{,}53\cdot 10^{10}} \ln 2 \;=\; 2{,}4 \cdot 10^{-9}$, also $E_0/Q \;=\; (T_0/T)/\ln 2 \;\approx\; 4 \cdot 10^{8}$ – die Raumtemperatur liegt rund $8{,}5$ Dekaden unter T_0, und *daher* liegen die statische Eigenenergie ($\sim 7{,}3$ MeV) und die Löschwärme (~ 18 meV) gut acht Größenordnungen auseinander. Bei $T = T_0$ dagegen kostet das Löschen $E_0 \ln 2 \;=\; 0{,}69\,E_0$: am eigenen Temperatur-Punkt sind *Sein* und *Löschen* dieselbe Größenordnung. Genau dieses Verhältnis T/T_0 ist die *einzige* aufbau-unabhängige Aussage: ein Bit hat keine absolute Temperatur, nur seine Bad-Temperatur relativ zur Eigenskala. Statische (E_0, T_0) und thermodynamische ($k_B T \ln 2$) Seite sind so über das eine Verhältnis verbunden – kein Sprung, eine Skala.

Einordnung: $T_0 \approx 8{,}5{\cdot}10^{10}$ K ist die MeV-/Kernskala – die Temperatur-Größenordnung der Kern- und Hadronenphysik: Sternkerne (Sonnenkern $\sim 1{,}5 \cdot 10^{7}$ K) und das Quark-Gluon-Plasma in Schwerionen-Stößen (QCD-Übergang $\sim\; 1{,}7 \cdot 10^{12}$ K bei 150 MeV). Die „heißes Frühuniversum"-Lesart bleibt bewusst außen vor – sie ist eine ΛCDM-Annahme, die FFGFT nicht teilt (FFGFTs CMB-Struktur folgt aus der T^4-Geometrie, nicht aus einer heißen Frühphase). Ehrlich: $T_0 \;=\; E_0/k_B$ ist die *Standard*-Energie-Temperatur-Zuordnung; FFGFT-spezifisch ist allein, dass sie über $\tilde{T} \cdot m = 1$ mit der Dual-Zeit zusammenfällt – eine saubere Konsistenz, keine neue Herleitung. Und weil die absolute Löschtemperatur die des Bades ist, wäre ein an ein bestimmtes Bad (T_{CMB} oder Raumtemperatur) gekoppeltes ξ von dieser Wahl abhängig – genau der

Grund, warum das CMB-gebundene ξ_{UIFT} eine kontingente, andere Größe ist und FFGFTs geometrisches ξ bad-*un*abhängig bleibt (§9).

E_0 ist eine Sprosse, nicht der Boden. Die Skala E_0 ist nicht das unterste Ende des Rahmens, sondern eine *Sprosse* einer fraktalen Leiter. Der geometrische Boden liegt bei der Sub-Planck-Länge $\xi\ell_P \approx 2{,}2 \cdot 10^{-39}$ m (Dok. 163) – der kleinsten Länge, unter der die Raumzeit keine wohldefinierten Freiheitsgrade mehr trägt. Weil $\xi\ell_P$ um den Faktor ξ *unter* der Planck-Länge liegt, steht dieser Boden in den „harten" Kleidungen um $1/\xi = 7500$ *über* Planck:

Länge	$\xi\ell_P$	$2{,}16 \cdot 10^{-39}$ m
Zeit/Dauer	ξt_P	$7{,}19 \cdot 10^{-48}$ s
Frequenz	$1/(\xi t_P)$	$1{,}39 \cdot 10^{47}$ Hz
Energie	E_P/ξ	$9{,}16 \cdot 10^{22}$ GeV
Temperatur	T_P/ξ	$1{,}06 \cdot 10^{36}$ K
Masse	m_P/ξ	$1{,}63 \cdot 10^{-4}$ kg

Dieser Boden ist der *kleinste-Länge*-Rand und damit in Energie/Temperatur/Frequenz das *Maximum* (UV): „Boden" meint feinste Auflösung, nicht kleinste Energie. Die Bit-Sprosse E_0 ($7{,}348$ MeV, $26{,}85$ fm, $T_0 = 8{,}5 \cdot 10^{10}$ K) liegt rund 25 Dekaden *gröber*. Dazwischen läuft das Fraktal nach innen, Faktor $1/\xi = 7500$ pro Hauptstufe (Dok. 146). Zählt man die Zwischenschritte zu je Faktor 2, sind es $\log_2 7500 \approx 12{,}87$ pro Stufe – *genau* die Informationsdecke I_1 pro Freiheitsgrad aus §5. (In Schritten zu je $\sqrt{2}$ wären es $\log_{\sqrt{2}} 7500 = 25{,}7$, denn $(\sqrt{2})^{13} = 90{,}5$; die Gleichsetzung mit I_1 gilt nur für Faktor-2-Schritte.) Die Zahl der Faktor-2-Zwischenschritte pro Stufe *ist* die maximale Bitzahl; Kapazität des Bits und Feinheit des Fraktals sind derselbe Zählwert.

Landauer. Das Löschen eines Bits ist logisch irreversibel: zwei Zustände werden auf einen abgebildet, die Entropie sinkt um $k_B \ln 2$. Nach dem zweiten Hauptsatz muss diese Entropie als Wärme an die Umgebung abfließen, $Q \geq k_B T \ln 2$ (Landauer 1961). Dabei ist T die Temperatur des *Bades*, in das gelöscht wird – nicht die des Bits.

Die Problematik. Und hier klemmt es. Der Rahmen liefert jetzt eine ganze Leiter *definiter* Temperaturen – die Sprosse $T_0 = 8{,}5 \cdot 10^{10}$ K, den Boden $T_{\mathrm{max}} = 1{,}1 \cdot 10^{36}$ K, dazwischen jede Fraktalstufe ihre eigene, über 25 Dekaden. *Keine* davon ist „die" Landauer-Temperatur. Setzt man eine intrinsische Skala in $Q = k_B T \ln 2$ ein, bekommt man keinen realen Löschvorgang, sondern einen Grenzfall oder Unsinn: mit T_0 die Referenz $Q = 0{,}69\, E_0$, mit T_{max} eine absurd große Wärme, mit T_{CMB} die UIFT-Zahl (§9). Der reale Löschvorgang nimmt die Temperatur der *tatsächlichen Umgebung* (Computer: ~ 300 K). Das ist die Problematik: trotz einer Leiter definiter Eigen-Temperaturen bleibt die Löschtemperatur die des Bades, und invariant ist allein das *Verhältnis* $Q/E = (T/T_{\mathrm{Sprosse}}) \ln 2$ – Bad relativ zur jeweiligen Sprosse. Ein Bit hat eine definite Energie und, je Sprosse, eine definite Skalen-Temperatur; einen definiten *Löschpreis* bekommt es erst mit einer Umgebung.

Y.8 Folgerungen

Die treue Beschreibung ist quanten-, nicht bit-basiert. Weil der Hilbertraum eine Bijektion ist (Dok. 230), die klassische Bit-Zählung aber eine Projektion: die verlustfreie Beschreibung von FFGFT ist die Amplitude-plus-Phase-Darstellung (Quanteninformation); der Shannon-Bit-Count ist ihr verlustbehafteter Schatten. Ein Informations-Primitiv braucht Betrag *und* Phase.

Das Offene ist relationale Information. Die eine irreduzible offene Größe (Dok. 282) ist die Holonomie-Phase θ – wegabhängig, relational, kein lokaler Bit-Gehalt. Das Residuum, das die Bit-Projektion verwirft, *ist* die Phase; und die Phase *ist*, wo die offene Physik liegt. Die fundamentale Information sitzt in der Verbindung: das elektromagnetische Feld A_μ ist diese Verbindung, das Photon ihr Quantum – ein begriffliches, kein numerisch mit θ identisches Beispiel. „It from bit" wird „it from connection".

Y.9 Ehrliche Grenzen

Strukturelle Diagnose, keine neue Herleitung (P35). Dok. 255/257 hatten Landauer/-Vopson schon; neu ist die Betrag/Phase-Zerlegung und ihre Folgerungen. Der *eine exakte* Punkt: $E_{\text{bit}} = \hbar c/L$ ist eine Photonenenergie.

Photon ist Eichboson, Neutrino ist Fermion. Die Photon-Analogie gilt auf der Ebene masselos/Dispersion, ist keine Identität (Spin 1 vs. $\frac{1}{2}$); der Bezug zur Verbindung gilt dem Eichfeld A_μ (das Photon ist dessen Quantum), nur im Photon-Sektor. Die Photon-Phase (Polarisation/Eich-Holonomie) ist dieselbe *Kategorie* wie θ, nicht dieselbe Zahl. Das Photon sitzt ausserhalb des Leptonen-Massenoperators ($m = 0$-Referenz).

$\log_2(1/\xi) \approx 12{,}87$ **ist keine magische Zahl.** Der Gehalt ist Endlichkeit und ξ-Verankerung, nicht der Wert; die genaue Form ($1/\xi$ vs. $2/\xi$, Richtungs-/Flavor-Faktor) hängt an der Modenzählung. Richtung: Geometrie → Information, nicht umgekehrt.

Energieseite: am Anker E_0 festgemacht. E_0 ist der Anker, der den Anschluss an das SI leistet; die Übereinstimmung von $\alpha = \xi E_0^2$ mit dem Messwert ist eine Eigenschaft dieses Ankers, keine unabhängige Vorhersage. Es gibt ihn nackt, $\sqrt{m_e m_\mu} = 7{,}348$ MeV, und fraktal korrigiert, $\sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}} = 7{,}398$ MeV (Dok. 011). Für die SI-Zahlen dient der nackte Wert – daraus $m_0, T_0, \tilde{T}, 1/\tilde{T}$ exakt ($\hbar, c, k_B$ nur Buchhaltung, keine Abweichung). Die einzige Differenz zwischen beiden Fassungen ist der Faktor $K_{\text{frak}}^{-1/2}$ ($+0{,}68\%$), keine Umrechnung.

Bit-Thermodynamik: gerechnet, über die eigene Skala T_0. Das Bit hat die volle Landauer-Rechnung – Löschkosten $Q = k_B T \ln 2$, relativ zur Eigenenergie $Q/E_0 = (T/T_0)\ln 2$ (§7); bei $T = T_0$ ist $Q = E_0 \ln 2 = 0{,}69\,E_0$, die intrinsische Größe ist die Bit-Entropie $\ln 2$. Keine CMB nötig. Der UIFT-Parameter $\xi_{\text{UIFT}} = k_B T_{\text{CMB}} \ln 2/(m_e c^2) \approx 3 \cdot 10^{-10}$ (Dok. 013/243) ist dieselbe Landauer-Form mit fremden kosmologischen Skalen (T_{CMB} statt T_0, m_e statt E_0) – eine andere Größe, nicht FFGFTs geometrisches $\xi = 1{,}3 \cdot 10^{-4}$. Andere Skalenwahl, kein Scheitern.

Neutrino-Argument: spekulativ. Es ruht weiter auf der spekulativen Entartung (Dok. 007) – trägt die These aber nicht mehr, das Photon trägt sie.

Y.10 Bilanz: nicht ob, sondern welcher Kanal

Die Betrag/Phase-Arbeit verschiebt die Informationsfrage von „ist Information fundamental?“ zu „welcher Kanal?“. Vopson/Landauer sind der Betragskanal – real, aus der T^4-Geometrie hergeleitet, aber blind für die Phase. Der Phasenkanal (Mischung, Holonomie, θ) ist unabhängige, relationale Information; in der Signalverarbeitung trägt gerade er die Struktur. Der reinste Anker ist das Photon: exakt masselos, FFGFTs Informationseinheit $E_{\text{bit}} = \hbar c/L$ selbst, und das Quantum der $U(1)$-Verbindung – begrifflich „it from connection“. Die *Menge* an Information ist absolut und in ξ verankert ($I_1 = \log_2(1/\xi) \approx 12{,}87$ Bit); Energie und Kapazität sind ihre dimensionalen Beiwerke. Nur die Geometrie hält beide Kanäle – ehrlich abgegrenzt als Diagnose, nicht als neue Herleitung.

Kapitel Z

Dok. 291 — Der dynamische Ort von $\theta = 2/9$: Betrag, Windung, Phase

Z.1 Ausgangslage: in welchem Kanal lebt $\theta = 2/9$?

Der Koide-Winkel $\theta = 2/9$ ist empirisch auf sieben Stellen bestätigt, aber nicht aus der Geometrie hergeleitet. Er ist selbst kein Ansatz, sondern eine *gefundene* Größe: erst die Hilbertraum-Übersetzung von FFGFT (Dok. 230/231/232) und ihre Fortführung bis zu den Massen (Dok. 282) machte sichtbar, dass die drei Lepton-Massen das Spektrum eines hermiteschen Z_3-Zirkulanten auf der $\mathbb{C}^3$-Faser sind, in dessen Eigenwerten $\theta = 2/9$ als Ergebnis der Diagonalisierung erscheint. Genau dieser Zirkulant liefert die Amplituden a_k unten. Zur empirischen Einordnung des Winkels – $2/9$ als rationale Adresse eines über einen Referenzpunkt fixierten Wertes, nicht als Polmassen-Exaktheitsanspruch (P42) – siehe Dok. 292; für den hier gesuchten dynamischen Ort ist diese Feinunterscheidung ohne Belang, da die Orbit-Auflösung weit über dem 10^{-7}-Niveau liegt. Die vorangehende Analyse (Dok. 290) trennt am Massenoperator einen *Betragskanal* (die Eigenwerte, die Massen) von einem *Phasenkanal* (Mischung, Allpass, Holonomie) und zeigt: ein Betragsspektrum legt die Phase nur bis auf einen Allpass-Faktor fest. Die Frage dieses Dokuments ist entsprechend: In welchem Kanal sitzt $\theta = 2/9$ – und welcher Art Größe ist er, verglichen mit einem erzwungenen Anker wie der Lichtgeschwindigkeit c? Die Rechnungen dazu liegen in `allpass_theta.py`, `allpass_carrier_selection.py` und `forced_vs_contingent.py` (numpy-only, Seed 20780458).

Z.2 Die Betrags-Seite ist counter-blind

Mit den vorzeichenrichtigen Amplituden $a_k(\theta) = 1 + \sqrt{2}\cos(\theta + 2\pi k/3)$ ($k = 0, 1, 2$) ist der symmetrische Koide-Invariant $Q = (\sum_k a_k^2)/(\sum_k a_k)^2$ exakt und *θ-unabhängig*. Denn die Summe $S = \sum_k a_k = 3 + \sqrt{2}\sum_k \cos(\theta + 2\pi k/3) = 3$ (drei um 120° versetzte Kosinus summieren zu null), und die Quadratsumme $T = \sum_k a_k^2 = 3 + 0 + 2 \cdot \frac{3}{2} = 6$ (mit $\sum_k \cos^2 = \frac{3}{2}$). Damit

$$Q(\theta) = \frac{T}{S^2} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3} \qquad \text{für jedes } \theta.$$

Q läuft für positive Massen über $[1/3, 1]$; der Wert $2/9 = 0{,}2222$ liegt *unter* diesem Bereich. $2/9$ ist somit kein Grenzwert, kein Extremum und kein Fixpunkt des symmetrischen Funktionals – im Betragskanal ist $2/9$ vollständig unsichtbar. Das ist die algebraische Seite der „Counter-Blindheit" des Z_3-Kerns: die Orbit-Glieder $\{1/9, 2/9, 4/9\}$ sind für jede symmetrische, zählende Größe ununterscheidbar.

Z.3 Der Allpass: drei Kanäle

Der Ort von θ lässt sich am Allpass sichtbar machen. Ein Z_3-symmetrisches Blaschke-Produkt $B_\theta(z) = \prod_k (z^{-1} - \bar{a}_k)/(1 - a_k z^{-1})$ mit Polen $a_k = r e^{i(\theta + 2\pi k/3)}$ (hier $r = 0{,}5$) zerlegt die Phaseninformation in drei Größen, von denen zwei gegen θ blind sind und nur eine ihn trägt. Numerisch (für die Orbit-Winkel $\theta \in \{1/9, 2/9, 4/9\}$):

- **Betrag** $|B_\theta| = 1$ (bis $\sim 10^{-15}$) für alle θ – der Betragskanal ist blind.
- **Windungszahl** $= 3$ exakt für alle θ – die *flach-topologische* ganze Zahl ist blind. Das ist die numerische Seite der Aussage, dass $2/(9\pi)$ irrational und $\theta = 2/9$ daher kein flacher topologischer Invariant ist: die ganzzahlige Windung trennt $2/9$ nicht von $1/9, 4/9$.
- **Stetiges Phasenprofil** $\arg B_\theta(\omega)$ – verschieden für $1/9, 2/9, 4/9$ (am Referenzpunkt $\omega = 0$: $0{,}093$, $0{,}171$, $0{,}249$; auch die Gruppenlaufzeit unterscheidet sie). Nur das *stetige, dynamische* Phasenprofil trägt θ.

Auch ein Energie-/Betrags-Funktional wie $\int |B|^2 \, d\omega/2\pi$ ist für alle drei identisch. Die Distinktion $2/9$ gegen $1/9, 4/9$ lebt somit weder im Betrag, noch in der ganzzahligen Windung, noch in einem symmetrischen Funktional – allein im dynamischen Phasenprofil.

Z.4 Ein illustrativer Auswahlmechanismus

Was ein Selektor leisten müsste, zeigt eine dynamische Phasen-Referenz. Die drei Orbit-Glieder haben Allpass-Phasen $\psi = (0{,}093,\ 0{,}171,\ 0{,}249)$. Ein Träger (*Carrier*), der eine Holonomie Φ akkumuliert und auf die nächste Orbit-Phase einrastet, wählt genau einen Repräsentanten: $2/9$ wird ausgewählt genau dann, wenn Φ im $2/9$-Basin $[0{,}132,\ 0{,}210]$ liegt (Breite $0{,}078$). Eine *zufällige* Holonomie über den Orbit-Bereich trifft $2/9$ mit Wahrscheinlichkeit $\approx 1/3$ – ohne Grund bevorzugt nichts den Wert $2/9$.

Die Form dieses Mechanismus ist die des offenen Problems: die Auswahl ist *kontingent* auf eine externe dynamische Phase (eine Holonomie); $2/9$ hat ein eigenes Basin wie jedes Glied, und Betrag wie Windung geben ihm keinen Vorzug. Ein dynamischer Selektor müsste diese Holonomie *erzwungen* liefern, aus einem inneren Grund der liefernden Dynamik, nicht durch eine von Hand gewählte Umbenennung. Dies ist derselbe Inhalt wie die Brechungsbedingung $(\delta, \chi) \approx (0{,}24, \pi/2)$: χ *ist* die Holonomie-Phase, δ ihre freie Tiefe. (Illustration der Mechanismus-Form; keine Herleitung des Wertes $2/9$, keine Modellierung eines konkreten Trägers.)

Z.5 Erzwungen oder kontingent: $\theta^*(\delta)$ und der Kontrast zum Photon

Ob $2/9$ *erzwungen* ist wie c, entscheidet das Variationsverhalten. Der $\delta = 0$-Anteil des Brechungsfunktionals hat die geschlossene Form (bis 10^{-15} bestätigt)

$$E_3(\theta, 0) = -\tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{\sqrt{2}} \cos 3\theta, \qquad \frac{dE_3}{d\theta}\Big|_0 = -\frac{3}{\sqrt{2}} \sin 3\theta,$$

mit Extrema an den Z_3-Punkten ($\sin 3\theta = 0$). Koppelt man das zweite Triplett $3'$ mit Stärke δ und Phase χ an, wandern die inneren Extrema vom Z_3-Punkt weg (es sind zwei; verfolgt wird der untere, orbitnahe Zweig θ^*). Auf dem Zweig $\chi = \pi/2$ ist die Verschiebung glatt und monoton (numerisch, `forced_vs_contingent.py`): θ^* steigt von $0{,}099$ ($\delta = 0{,}10$) über $0{,}223$ ($\delta = 0{,}24$) bis $0{,}501$ ($\delta = 1{,}0$); $d\theta^*/d\delta$ ist überall positiv (Median über das δ-Gitter $0{,}31$, lokal bei $\delta^* \approx 0{,}24$ etwa $0{,}80$). Der erreichte Bereich $[0{,}05,\ 0{,}52]$ enthält $2/9$ im Inneren, unausgezeichnet. Das $2/9$-Basin im θ-Raum – nächstes Orbit-Glied, $[1/6,\ 1/3]$, Breite $1/6$ – entspricht über die lokale Steigung einem δ-Fenster von $\Delta\delta \approx 0{,}167/0{,}80 \approx 0{,}21$. δ ist weich, nicht feinabgestimmt; $2/9$ wird herbeigezogen, es sitzt an keiner Struktur.

Die Lichtgeschwindigkeit ist von anderem Typ. In $ds^2 = -c^2dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$ ist c ein metrischer Koeffizient, kein Parameter eines Funktionals; $ds^2 = 0$ ist der Lichtkegel, und masselos bedeutet $v = c$ exakt – die Sättigung der Ungleichung $v \le c$. Es gibt kein $c^*(\lambda)$; $dc/d\lambda \equiv 0$, weil c eine Konstante der Geometrie ist, kein Extremum. Dies spiegelt die physikalische Herkunft: die Masselosigkeit des Photons ist *eichsymmetrie-geschützt* ($m = 0$ exakt, daraus $v = c$), ein *Rand*-/Fixpunktwert. $2/9$ dagegen ist der irreduzibel Z_3-*brechende* Winkel im *Inneren* des Orbits – symmetrie-brechend, nicht -geschützt, und daher kontingent.

Z.6 Selbst- und schief-adjungierte Holonomien

Ist der Selektor eine Holonomie-Phase χ, so ist zwischen zwei Sektoren zu unterscheiden. Im Brechungsterm $\delta\cos(2\varphi_k + \chi)$ ($\varphi_k = \theta + 2\pi k/3$) trennt χ eine *gerade* von einer *ungeraden* Kopplung: $\chi = 0$ (und $\chi = \pi$) gibt $\cos(2\varphi_k)$, eine gerade, *selbst-adjungierte*, reelle Kopplung; $\chi = \pi/2$ gibt $\cos(2\varphi_k + \pi/2) = -\sin(2\varphi_k)$, eine ungerade, *schief-adjungierte*, imaginäre Kopplung.

Die beiden Sektoren haben verschiedene natürliche Werte. Die *selbstadjungierten* Holonomien – flache Z_3-Wilson-Linien ($\chi = 2\pi n/3$) mal die zwei Spinstrukturen pro Zyklus (Versatz 0 oder π) – sind die Vielfachen von $\pi/3$, $\chi \in \{0, \pi/3, 2\pi/3, \pi, 4\pi/3, 5\pi/3\}$; $\pi/2$ ist keiner davon. Der *schief-adjungierte* Sektor dagegen hat seinen natürlichen Wert bei $\chi = \pi/2$: das ist die i-Phase, $e^{i\pi/2} = i = \sqrt{-1}$, gegenüber der reellen $e^{i\pi} = -1$. Der Übergang von reeller zu schief-adjungierter Kopplung *halbiert* die Phase $\pi \to \pi/2$ – er zieht die Wurzel aus -1.

Entscheidend ist, welcher Sektor den Selektor stellt. Die Eliminationskette (Dok. 282) hat alle statischen, selbstadjungierten Kandidaten ausgeschieden; der einzige Überlebende ist die dynamische *schief-adjungierte* Phase. Damit ist der typkonsistente Wert $\chi = \pi/2$ – die i-Phase des schief-adjungierten Sektors –, nicht

ein Vielfaches von $\pi/3$. Und $\chi = \pi/2$ erreicht $\theta^* = 2/9$ bei $\delta \approx 0{,}24$ (numerisch, `holonomie_landschaft.py`). Der schief-adjungierte Typ lässt dabei zunächst beide i-Werte zu, $\chi = \pi/2$ und $\chi = 3\pi/2$ ($e^{\pm i\pi/2} = \pm i$); die Wahl des Zweigs ist eine Orientierungswahl (Umlaufsinn des Zyklus). Die beiden Zweige sind jedoch nicht äquivalent: der Spiegel-Zweig $\chi = 3\pi/2$ besitzt bei $\delta \approx 0{,}24$ kein inneres Extremum nahe $2/9$ (Extrema bei $0{,}83$ und $1{,}87$) – nur der $+i$-Zweig erreicht den Orbit-Bereich.

$\chi = \pi/2$ ist damit kein willkürlicher oder topologisch heimatloser Wert, sondern der von der Eliminationskette geforderte schief-adjungierte i-Wert – ohne angenommene Z_4 und ohne Zahlenspiel. Präzise gehört „schief-adjungiert" dabei zum *Generator*, nicht zur endlichen Holonomie: diese ist ein unitäres Gruppenelement $\exp(K)$ mit schief-adjungiertem K ($K^\dagger = -K$); der schief-adjungierte Charakter sitzt in der erzeugenden Kopplung, nicht in der endlichen Holonomie-Matrix selbst. Die Tiefe δ bleibt jedoch *frei*: der Sektor legt die Phase χ fest, nicht die Tiefe. Der offene Punkt ist damit geschärft – nicht ein beliebiger Winkel, sondern ob eine schief-adjungierte Dynamik gerade $\chi = \pi/2$ trägt und darüber die Tiefe δ aus einem inneren Grund *dieser Dynamik* festlegt (rekursionsintern ist nach Dok. 275 keine Auszeichnung möglich).

Z.7 Die Tiefe δ als zweite Harmonische

Die Massen-Amplitude ist eine Fourier-Reihe im Faserwinkel,

$$a(\varphi) = \underbrace{1}_{\text{Mittelwert}} + \underbrace{\sqrt{2}\cos\varphi}_{\text{1. Harmonische}} + \underbrace{\delta\cos(2\varphi+\chi)}_{\text{2. Harmonische}}, \qquad \varphi = \theta + 2\pi k/3.$$

Die erste Harmonische mit reeller Amplitude $c_1 = \sqrt{2}$ legt den Koide-Invarianten $Q = 2/3$ fest (sie ist der Betrag $r = \sqrt{2}$). Die zweite Harmonische hat die komplexe Amplitude $c_2 = \delta e^{i\chi}$; ihr *Betrag* ist $\delta = |c_2|$ und ihre *Phase* ist $\chi = \arg c_2$. Für $\chi = \pi/2$ wird $c_2 = i\delta$ rein imaginär – die zweite Harmonische ist ein reiner Sinus, die schief-adjungierte Kopplung des vorigen Abschnitts.

Damit sind δ und χ Betrag und Phase *derselben* Größe c_2, gehören aber zu verschiedenen Sektoren: $\chi = \arg c_2$ liegt im Phasen-Sektor (von der Eliminationskette auf $\pi/2$ fixiert), $\delta = |c_2|$ im *Betrags*-Sektor. Die Tiefe δ ist also kein Phasen-, sondern ein Amplituden-Freiheitsgrad – die Amplitude des ersten Obertons, physikalisch die Stärke, mit der das zweite Triplett $3'$ (die Verdopplung $6 = 3 \oplus 3'$) in das primäre 3 einmischt.

Das ist derselbe Sektor, der bereits $|c_1| = \sqrt{2}$ festlegt. Wie die erste harmonische Amplitude aus $Q = 2/3$ folgt, müsste die zweite, $|c_2| = \delta$, aus dem Oberton-Gehalt der massenerzeugenden fraktalen Wellenform folgen (der Struktur $D_f = 3 - \xi$, der $3 \oplus 3'$-Verdopplung). Das Verhältnis $\delta/\sqrt{2} \approx 0{,}17$ – die zweite Harmonische ist rund $17\,\%$ der ersten – ist eine reine *Form*-Größe, die an der Wellenform hängt, nicht an der Phase. δ ist somit kein freier Abstimmparameter, sondern ein noch nicht ausgerechneter Betrags-Freiheitsgrad.

Damit trennt sich die Frage nach $2/9$ endgültig in zwei Sektoren: die *Phase* $\chi = \pi/2$ ist schief-adjungiert und fixiert; der *Betrag* δ ist die zweite harmonische Amplitude und gehört – offen – in denselben Betrags-Sektor wie $\sqrt{2}$.

Z.8 δ als golden gedämpfte Amplitude

Der Oberton-Gehalt lässt sich schärfer fassen: die zweite harmonische Amplitude ist eine *Golden-Dämpfung*. Der Wert, der $\theta^* = 2/9$ bei $\chi = \pi/2$ exakt liefert, ist $\delta^* = 0{,}2389$; der Golden-Attraktor $1/\varphi^3 = 0{,}2361$ liegt knapp darunter. Weil $1/\varphi^3 = \varphi^{-3}$ eine *negative* Golden-Potenz (ein Zerfall) ist, ist δ eine Dämpfung, keine Verstärkung – $\delta^* < 1$ liegt eindeutig im Dämpfungs-Regime.

Der Exponent 3 ist nicht frei, sondern $= D$. Eine einzelne, dekompaktifizierte $3'$-Rekursion gäbe $1/\varphi^1 = 0{,}618$ (um $159\,\%$ daneben); erst die Dämpfung über $D = 3$ Dimensionen (die fraktale/räumliche Dimension $D_f = 3 - \xi$, das *volle* kompakte T^4) gibt $1/\varphi^3$. Der passende Exponent 3 ist damit selbst ein Argument für das volle kompakte T^4 und gegen die Dekompaktifizierung auf eine einzelne Rekursion.

Die ξ-Dämpfungs-Rekursion $r(k{+}1) = r(k)(1 - \xi)$, $r(0) = D_f/3$ (Dok. 275) passiert $1/\varphi$ bei der Tiefe $k^* = \ln\varphi/\xi \approx 3609$ und $1/\varphi^3$ bei $3 \cdot 3609 \approx 10827$ (auf $0{,}011\,\%$ genau). δ^* wird rund 89 *Einheiten* davor erreicht – gemeint ist eine Differenz zweier reeller Log-Tiefen im dekompaktifizierten, kontinuierlichen Skalenfluss ($1/\varphi^3$ bei $10826{,}2$, δ^* bei $10737{,}7$; Differenz $88{,}5$), keine ganzzahlige Schrittzählung. So ist δ^* ein um rund 89 Log-Einheiten untergedämpftes $1/\varphi^3$, ein Überschuss von $+1{,}187\,\%$ über dem Attraktor – beide Angaben sind über $\ln(\delta^*\varphi^3)/\xi$ ein und dieselbe Zahl, keine zwei unabhängigen Befunde –, konsistent mit einer Annäherung von oben.

Ob dieser Überschuss die fraktale Massenkorrektur $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ (Dok. 133) ist, lässt sich am Zahlenwert prüfen. Deren präzise Form $(D_f^{\text{eff}}/3)^{D_f^{\text{eff}}/2}$ mit $D_f^{\text{eff}} \approx 2{,}973$ ergibt einen Faktor ≈ 100 ($1{,}333\,\%$), der gemessene Überschuss beträgt $\approx 89\,\xi$ ($1{,}187\,\%$) – ein Abstand von $0{,}147\,\%$. Weil δ^* über $\theta^* = 2/9$ an die τ-limitierte Winkelbestimmung gebunden ist, trägt es selbst eine Toleranz. Maßgeblich ist dafür die lokale Steigung bei $\delta^* \approx 0{,}24$, $\mathrm{d}\theta^*/\mathrm{d}\delta \approx 0{,}80$ (nicht der Median $0{,}31$ über das δ-Gitter); mit ihr beträgt die δ-Toleranz $\approx 0{,}052\,\%$, und der Abstand $0{,}147\,\%$ entspricht $\approx 2{,}8\sigma$. Die beiden Kandidaten 89ξ und 100ξ sind damit *unterscheidbar*: der aus δ^* abgelesene Überschuss deckt sich nicht mit $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$. Strukturell bleibt die Verbindung motiviert – die zweite Harmonische und K_{frak} entspringen *derselben* fraktalen Korrektur $g = \eta(1 + \xi f)$ (Dok. 286; f ist hier die fraktale Korrekturfunktion der Metrik, keine Frequenz und nicht die Grundwindungszahl $1/\xi$), von der K_{frak} die RG-Ebene ist (Dok. 133). Die Form des fraktalen Korrekturfaktors, die der Überschuss nahelegt, ist damit offen; der Wert $1 - 100\xi$ selbst ist davon nicht berührt.

Zwei Grenzen kommen hinzu. Erstens: der gemeinsame $g = \eta(1 + \xi f)$-Ursprung ist in Dok. 286 für den *Phasen*-Kanal (Holonomie) gezeigt; der Transfer auf den *Betrag* der zweiten Harmonischen (δ) ist plausibel, aber noch nicht gerechnet. Zweitens fixiert Dok. 275 die Rekursionstiefe ohnehin nicht: $1/\varphi^3$ ist dort ein *Durchgangspunkt*, kein Fixpunkt (der einzige Fixpunkt der Dämpfung ist 0), und zu *jedem* Ziel $c \in (0, 1)$ existiert eine Tiefe $k^*(c)$ mit identischem Parameterstatus. Dass δ^* nahe $1/\varphi^3$ liegt, ist daher *kein* Schließen der Rekursion; der Feinwert ist nicht hergeleitet.

Damit ist der Betrags-Sektor so weit geklärt, wie die Struktur trägt: δ ist die golden gedämpfte zweite Harmonische, $1/\varphi^3$ über $D = 3$ (volles T^4), mit einem kleinen Überschuss von oben. Form, Ordnung, Exponent und Richtung stehen fest; der exakte δ-Feinwert – der Überschuss über $1/\varphi^3$ – ist von $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ bei der lokalen

Steigung unterscheidbar ($\approx 2{,}8\sigma$), strukturell über den gemeinsamen $g = \eta(1 + \xi f)$-Ursprung (Dok. 286) motiviert, aber nicht als Betragswert hergeleitet und bleibt offen (`delta_golden_daempfung.py`).

Z.9 Was die Nicht-Schließung praktisch bedeutet: ein offener Kopplungskanal

Der bisherige Befund trennt zwei Sektoren mit gegensätzlichem Verhalten. Der Massen-Sektor ist *geschlossen*: die Rekursion $R(\Phi^*) = \Phi^*$ (Dok. 203) besitzt einen nicht-trivialen Fixpunkt, und weil die Lepton-Massen an ihm sitzen, sind sie und der Koide-Wert $Q = 2/3$ exakt und starr.[1] Dort gibt es nichts zu verstellen – kein freier Parameter, kein Angriffspunkt für eine äußere Beeinflussung.

Der Spielraum sitzt allein im offenen Sektor, der Phase. Die ξ-Dämpfungs-Rekursion schließt nie (Durchgangspunkt, einziger Fixpunkt 0, Dok. 275); in der Sprache der Rückkopplung ist sie eine offene, gedämpfte Schleife mit Verstärkung kleiner eins, kein starr eingerasteter Fixpunkt. Eine solche offene, gedämpfte Schleife kann – anders als ein geschlossener Fixpunkt – von außen beeinflusst werden: durch Kopplung an einen zweiten Oszillator, durch Injektions- oder Mode-Locking (Dok. 286). Praktisch heißt die Nicht-Schließung daher: es existiert ein Kanal, über den ein zweites, dynamisches System die offene Phase einrasten kann. Der geschlossene Massen-Sektor bietet diesen Kanal nicht.

Der Kanal ist jedoch eng und strukturiert, kein freier Parameter. Der Fangbereich einer solchen Kopplung ist von der Ordnung ξ (Dok. 286) – winzig; die $2/9$-Arnold-Zunge ist rund zwölfmal schmaler als $1/3$. Die Kopplung benachbarter Skalenebenen im kontinuierlichen Fluss ist real, aber betragsmäßig von der Ordnung 10^{-13} und destabilisiert die geschlossenen Vorhersagen nicht. Und die Wirkung ist gerichtet: sie läuft von der Dynamik in die Phase, nicht in den radialen Massen-Sektor, der starr bleibt (der radial/angulare Schnitt aus Dok. 282).

Der eine Ort, an dem dieser Kanal genutzt würde, ist ein dynamischer schief-adjungierter Generator außerhalb der statischen FFGFT-Geometrie – die Fortsetzung der Eliminationskette (Dok. 283/286). Rastet ein solcher Generator die offene Phase gerade auf $\chi = \pi/2$ und damit $\theta = 2/9$ ein, erhielte $2/9$ den dynamischen, geschützten Status, den die folgende Bilanz beschreibt. Das ist ausdrücklich ein Kandidat, kein erreichtes Resultat: FFGFTs eigene Rekursion R ist rein reell und trägt keinen solchen Generator; ob eine äußere Dynamik ihn liefert, bleibt offen.

Entscheidend ist die Grenze dieses Spielraums. „Raum für gegenseitige Beeinflussung“ bedeutet nicht, dass sich die Theorie beliebig biegen ließe. Der Raum ist

[1] „Exakt“ bezieht sich hier auf die geometrische Fixpunkt-Ebene: der dimensionslose Invariant $Q = 2/3$ ist starr und wird von den Daten auf $-0{,}9\,\sigma$ bestätigt (Dok. 292). Die *Absolut*massen bzw. das Zahlenpaar $(\sqrt{2},\ 2/9)$ sind davon zu unterscheiden: auf der gemessenen Polmassen-Ebene ist das Paar nicht gemeinsam exakt (Dok. 292, $\sim 450\,\sigma$ im m_μ/m_e-Kanal), weshalb $2/9$ per P42 als rationale Adresse eines über einen Referenzpunkt fixierten Winkels gilt, nicht als Polmassen-Exaktheitsanspruch. Für den hier diskutierten dynamischen Ort ist das ohne Belang – die Orbit-Auflösung ($\sim 0{,}1$) liegt weit über dem 10^{-7}-Unterschied.

beschränkt: der radiale Sektor bleibt starr, die Phase ist eng eingeschnürt (schief-adjungiert, $\chi = \pi/2$, transzendent in 2π, ξ-schmaler Fangbereich), und die Rekursionstiefe fixiert keinen Wert (Dok. 275). Es ist strukturierter Spielraum, kein freier Parameter – und genau diese Grenze unterscheidet einen Kanal für echte Kopplung von einer nachträglichen Zahlenanpassung.

Dieser Kanal ist zugleich der Grund, warum der Fundamentalsektor nicht auf ein starres Skelett zusammenfällt. Ein vollständig geschlossenes Modell – jeder Wert ein erzwungener Fixpunkt – wäre überdeterminiert: keine kontingente Auswahl innerhalb eines Z_3-Orbits, keine Flavour-Mischung, keine physikalische (nicht wegdrehbare) Phase. Gerade die Mischung ist Phase, nicht Betrag (Dok. 289: geladene Leptonen betrags-dominiert mit kleiner Mischung, Neutrinos phasen-dominiert mit großer Mischung, der reine Allpass-Sektor). Am schärfsten zeigt sich das an der Struktur der CP-Verletzung: sie verlangt eine irreduzible komplexe Phase – eine rein reelle, selbst-adjungierte Struktur ist CP-erhaltend –, also genau den Typ des schief-adjungierten Kanals $\chi = \pi/2$. Der offene Phasenkanal ist damit strukturell von der Art, die CP-Verletzung tragen kann; eine vollständig selbst-adjungierte FFGFT wäre CP-gerade und nicht-mischend. Der Scope bleibt eng: der Kanal trägt Mischung, CP und Kontingenz im *Fundamentalsektor* – nicht die makroskopische Vielfalt (Chemie, Strukturbildung), die eigene, davon unabhängige Quellen hat.

Z.10 Bilanz: die dynamische offene Frage

Statisch ist die Lage eindeutig: $2/9$ ist unsichtbar im symmetrischen Q, blind gegen Betrag und ganzzahlige Windung, und ein inneres Extremum, das ein freier Parameter herbeizieht ($d\theta^*/d\delta \neq 0$). Es ist *nicht* erzwungen wie c. Beide Größen teilen dieselbe flache T^4-Arena – c als Signatur-Rand, $2/9$ als innerer Phasen-Freiheitsgrad –, aber sie sind verschiedenen Typs.

Damit $2/9$ einen c-artigen, erzwungenen Status erhielte, bräuchte es einen *dynamischen* Fixpunkt, so wie die Eichsymmetrie $m = 0$ (und damit $v = c$) erzwingt. Die vorangehenden Abschnitte lokalisieren diesen Fixpunkt: die *Phase* $\chi = \pi/2$ ist der schief-adjungierte i-Wert, den die Eliminationskette fordert – der Selektor ist typ-fixiert; offen bleibt allein der *Betrag* δ (die golden gedämpfte Oberton-Amplitude). Dessen Feinwert ist dabei nicht „noch nicht“ hergeleitet, sondern aus der Rekursion allein *beweisbar nicht* herleitbar: die Nicht-Schließung ist Theorem (einziger Fixpunkt 0), und die Resonanzdichte der Durchgangspunkte schließt auch jede rekursionsinterne Auszeichnung eines Wertes aus (Dok. 275, epistemische Grenze). Die Rekursionsseite ist damit erledigt, keine offene Frage; offen ist allein die Existenz des äußeren Ankers – ob eine schief-adjungierte Dynamik gerade $\chi = \pi/2$ trägt und darüber die Tiefe δ aus einem inneren Grund *dieser Dynamik* (nicht der Rekursion) festlegt; gelänge das, erhielte $2/9$ ein dynamisches, geschütztes Privileg, andernfalls bleibt es kontingent. Die Eliminationskette (Dok. 282) hat alle statischen Kandidaten – symmetrisch, zählend-topologisch, radial, statisch-geometrisch – ausgeschieden; der einzige Überlebende ist die dynamische schief-adjungierte Phase, deren Herkunft außerhalb der statischen Geometrie liegt. Genau dort, nicht im Betrag und nicht in einer flachen Windungszahl, wäre der Wert $2/9$ zu suchen.

Z.11 Einordnung: Nutzen und Anwendungsnähe

Die Befunde dieses Dokuments sind Struktur- und Ausschluss-Resultate, keine Technologie. Ihr unmittelbarer Nutzen liegt bei drei Gruppen. Erstens bei Arbeiten an der Koide-Relation und der Flavour-Struktur: das No-Go ($2/(9\pi)$ irrational; Betrag und ganzzahlige Windung counter-blind) schließt topologische und abzählende Herleitungswege für $\theta = 2/9$ ab und erspart deren weitere Verfolgung; die Eliminationskette lokalisiert die verbleibende Suche präzise im dynamischen schief-adjungierten Phasenkanal. Zweitens methodisch: die Betrag/Phase-Zerlegung taugt als gemeinsame Audit-Sprache für Framework-Vergleiche (skript-gedeckte Behauptungen, vorregistrierte Kriterien, matched nulls) und ist vom FFGFT-Inhalt unabhängig übertragbar. Drittens didaktisch: die Übersetzung zwischen Teilchenphysik und Nachrichtentechnik (Zirkulant als DFT, Allpass, Injektions-Locking, Arnold-Zungen) macht den Phasenkanal mit Standard-Ingenieurwerkzeugen rechenbar.

An Messung rührt allein der Phasenkanal selbst: die Strukturaussage, dass Mischung und CP-Verletzung im schief-adjungierten Kanal leben (Dok. 289), hat in den Oszillationsphasen und δ_{CP} eine falsifizierbare Form, die laufende und kommende Experimente (DUNE, Hyper-Kamiokande) vermessen. Eine Anwendung im engeren Sinn – Gerät, Verfahren, kurzfristiger Ingenieursnutzen – folgt daraus nicht: die Werkzeuge laufen von der Nachrichtentechnik in die Physik, nicht zurück, und solange δ nicht hergeleitet ist, ist der Ertrag der eines geschärften offenen Problems, nicht eines Resultats.

Kapitel aa

Dok. 292 — Leptonen-Empirie-Check: die FFGFT-Relationen von den Daten aus

aa.1 Herkunft: wie $2/9$ überhaupt sichtbar wurde

Bevor gerechnet wird, gehört die Frage geklärt, woher die zentrale Zahl dieses Dokuments stammt – denn sie wurde nicht gesucht, sondern gefunden. Der Zugang war die Hilbertraum-Übersetzung von FFGFT. Die Brücke der Dok. 230/231/232 bildet die Loop-Observablen des Korpus als selbstadjungierte Operatoren auf einem faserwertigen Hilbertraum ab; erst als diese Übersetzung bis zu den Massen fortgeführt wurde (Dok. 282), zeigte sich die entscheidende Struktur: die drei Lepton-Massen sind das Spektrum eines hermiteschen Z_3-Zirkulanten auf der $\mathbb{C}^3$-Faser des vollen Raums $\mathscr{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$. In den Eigenwerten dieses Operators erscheint der Phasenwinkel $\theta = 2/9$ – nicht als Ansatz, den man einsetzt, sondern als Wert, den die Diagonalisierung ausgibt. $2/9$ ist also *kein* Startpunkt der Massenrechnung, sondern eine nachträglich sichtbar gewordene Ordnung: erst der Wechsel der Darstellung – von der ξ-Leiter zur Operator-/Spektralsicht – hat sie freigelegt. Diese Gegenrechnung prüft daher nicht eine Eingabe, sondern eine *Entdeckung*; das ist der Grund, warum die Richtung von den Daten her (unten) überhaupt aussagekräftig ist. Der Zusammenhang zur ξ-Leiter, die die Massen ohne $2/9$ berechnet, wird in der Schlusssektion „Zwei Schichten“ geklärt.

aa.2 Zweck und Richtung der Rechnung

Der FFGFT-Korpus rechnet grundsätzlich von $\xi = 4/30000$ *weg*: aus der Geometrie folgen Relationen, die anschließend an Daten geprüft werden. Dieses Dokument dreht die Richtung um. Ausgangspunkt sind ausschließlich die empirischen Leptonmassen (PDG), und gefragt wird, was die FFGFT-Relationen des Leptonsektors *aus den Daten* machen – welche Strukturzahlen die Empirie zurückliefert,

mit welchen Unsicherheiten, und wo Restspannungen sitzen. Der Modus ist der Kompatibilitätsmodus: keine neue Herleitung, sondern eine unabhängige Gegenrechnung nach P35, mit der Ebenentrennung nach P40 (exakt sind nur Verhältnisse; Absolutwerte tragen die Brückenkonstanten). Alle Zahlen dieses Dokuments stammen aus `python/Dok292_Skripte/leptonen_empirie_check.py` (numpy-only, Seed 20780458) und sind mit einem Aufruf reproduzierbar.

Die Eingaben sind

$$m_e = 0{,}51099895069(16)\ \text{MeV}, \tag{aa.1}$$

$$m_\mu = 105{,}6583755(23)\ \text{MeV}, \tag{aa.2}$$

$$m_\tau = 1776{,}86(12)\ \text{MeV}. \tag{aa.3}$$

Der Wert für m_τ ist der PDG-2022-Wert; mit ihm sind die Zahlenwerte im Text gerechnet. PDG 2024 gibt $m_\tau = 1776{,}93(9)$ MeV. Damit wird $Q = 0{,}6666645$, $Q - 2/3 = -2{,}2 \cdot 10^{-6} = -0{,}43\,\sigma$, und $m_\tau^{\text{pred}} = 1776{,}968$ MeV liegt $+0{,}43\,\sigma$ über dem Messwert. Die im Folgenden genannte „eine τ-Spannung von $\sim 0{,}9\,\sigma$" und die davon abgeleiteten σ-Angaben gelten für den PDG-2022-Wert und halbieren sich mit PDG 2024 etwa. Die τ-Masse ist um Größenordnungen die unsicherste der drei; sie dominiert, wie sich zeigt, sämtliche Restspannungen.

aa.3 Ebene 1: der Zirkulant – Koide-Relation und Winkel

Koide-Verhältnis aus den Daten

Das Koide-Verhältnis $Q = (m_e + m_\mu + m_\tau)/(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2$ ergibt aus den PDG-Werten

$$Q = 0{,}666660511 \pm 0{,}0000068, \tag{aa.4}$$

wobei die Unsicherheit fast vollständig von m_τ getragen wird. Die Abweichung vom Exaktwert $2/3$ beträgt $-6{,}2 \cdot 10^{-6}$, das sind $-0{,}91\,\sigma$ (mit PDG 2024: $-2{,}2 \cdot 10^{-6}$, $-0{,}43\,\sigma$). Die Daten sind mit exakt $2/3$ verträglich; sie *erzwingen* den Exaktwert nicht, aber sie widersprechen ihm auf 5–6 signifikanten Stellen nicht.

Zirkulant-Fit: Amplitude und Winkel aus drei Massen

Nach Dok. 282 sind die $\sqrt{m_k}$ Eigenwerte eines hermiteschen Z_3-Zirkulanten, $\sqrt{m_k} = M(1 + r\cos(\theta + 2\pi k/3))$, mit den beiden reinen Strukturzahlen $r = \sqrt{2}$ und $\theta = 2/9$ und der Identität $Q = (1 + r^2/2)/3$. Die Fourier-Extraktion aus den drei Datenpunkten liefert (Zuordnung $k = 0, 1, 2 \to \tau, e, \mu$; alle zyklischen Zuordnungen ergeben denselben Winkel)

$$M = 313{,}84\ \text{MeV}, \qquad r_{\text{emp}} = 1{,}4142005, \qquad \theta_{\text{emp}} = 0{,}22222963 \pm 8{,}4 \cdot 10^{-6}. \tag{aa.5}$$

Die Amplitude weicht von $\sqrt{2} = 1{,}4142136$ um $1{,}3 \cdot 10^{-5}$ ab – über $Q = (1 + r^2/2)/3$ ist das *dieselbe* Aussage wie die Q-Abweichung, keine unabhängige. Der Winkel liegt $+0{,}89\,\sigma$ über $2/9 = 0{,}22222222$, ebenfalls τ-limitiert.

Der τ-freie Test: Winkel aus m_μ/m_e allein

Dok. 282 benennt m_μ/m_e als schärfsten Test, ob θ exakt $2/9$ ist: hält man $r=\sqrt{2}$ fest, kürzt sich M im Verhältnis, und die beiden präzisesten Massen der Physik bestimmen θ allein. Die Auflösung der Gleichung $\left(1+\sqrt{2}\cos(\theta+4\pi/3)\right)^2/\left(1+\sqrt{2}\cos(\theta+2\pi/3)\right)^2 = m_\mu/m_e$ ergibt

$$\theta(\mu/e) = 0{,}2222220471, \qquad |\theta - 2/9| = 1{,}75\cdot 10^{-7}. \tag{aa.6}$$

Das reproduziert die Angabe aus Dok. 282 ($\approx 1{,}8\cdot 10^{-7}$, sieben signifikante Stellen) unabhängig. Zwei Lesarten sind zu trennen. Gemessen an der winzigen PDG-Unsicherheit von m_μ/m_e ist die Restdifferenz formal hochsignifikant – *unter der Zusatzannahme*, dass r exakt $\sqrt{2}$ ist. Lässt man r über Q mitlaufen, ist die Restdifferenz keine unabhängige Spannung, sondern erneut dieselbe eine τ-Spannung von $\sim 0{,}9\,\sigma$. Es gibt im Leptonsektor also nicht vier kleine Abweichungen, sondern *eine einzige*, die in vier Gestalten erscheint.

Vorwärtsprobe und die eine Vorhersage

Setzt man umgekehrt $r=\sqrt{2}$ und $\theta=2/9$ exakt, reproduziert der Zirkulant m_μ/m_e auf $+0{,}0010\,\%$ und m_τ/m_μ auf $+0{,}0060\,\%$. Die Invertierung nach m_τ macht daraus eine falsifizierbare Vorwärts-Aussage: aus (m_e, m_μ) und den beiden Strukturzahlen folgt

$$m_\tau^{\text{pred}} = 1776{,}968 \text{ MeV} \tag{aa.7}$$

(die drei Invertierungswege – $Q=2/3$ exakt, $\theta=2/9$ exakt im Drei-Massen-Fit, direkte Vorhersage aus $(m_e, m_\mu; \sqrt{2}, 2/9)$ – liefern $1776{,}969$, $1776{,}967$ und $1776{,}968$ MeV, also denselben Wert). Gegen PDG 2022 $1776{,}86 \pm 0{,}12$ MeV sind das $+0{,}90\,\sigma$, gegen PDG 2024 $1776{,}93 \pm 0{,}09$ MeV $+0{,}43\,\sigma$. Eine τ-Massenmessung auf dem angestrebten Belle-II-Niveau von $\sim 0{,}05$ MeV entscheidet über diese Spannung: landet der Wert bei $\approx 1776{,}97$, ist die τ-Richtung aufgelöst und das Paar $(\sqrt{2}, 2/9)$ auf dem 10^{-5}-Niveau bestätigt; landet er signifikant darunter, ist die Näherung auf diesem Niveau widerlegt. Dies ist eine echte Vorhersage im Sinne der Korpus-Methodologie, keine Retrodiktion: der Wert stand vor der Messung fest und ist hier vorab gebucht. Was der Test *nicht* entscheidet, zeigt die Präzisionsanalyse in Abschnitt aa.5.

aa.4 Ebene 2: die ξ-Leiter – Verhältnisse und Reverse-ξ

Leiter-Verhältnisse gegen die Daten

Die Leiterdarstellung $m_i = r_i\,\xi^{p_i}\,v$ (Dok. 006/046; Leptonen: $r_e=4/3$, $p_e=3/2$; $r_\mu=16/5$, $p_\mu=1$; $r_\tau=25/9$, $p_\tau=2/3$ nach K2) macht die Verhältnisse parameterfrei:

$$\left.\frac{m_\mu}{m_e}\right|_{\text{Leiter}} = \frac{12}{5}\,\xi^{-1/2} = 207{,}85 \quad (\text{PDG } 206{,}77;\ +0{,}52\,\%), \tag{aa.8}$$

$$\left.\frac{m_\tau}{m_\mu}\right|_{\text{Leiter}} = \frac{125}{144}\,\xi^{-1/3} = 16{,}992 \quad (\text{PDG } 16{,}817;\ +1{,}04\,\%), \tag{aa.9}$$

$$\left.\frac{m_\tau}{m_e}\right|_{\text{Leiter}} = \frac{25}{12}\,\xi^{-5/6} = 3532 \quad (\text{PDG } 3477;\ +1{,}57\,\%). \tag{aa.10}$$

Die Leiter trägt also die Größenordnungen und die $\sim 1\,\%$-Genauigkeit – nicht die Präzision des Zirkulanten. Beide Ebenen sind getrennt zu lesen, wie in Dok. 282 und P40 deklariert: der Zirkulant liefert vier bis fünf Stellen aus $(\sqrt{2}, 2/9)$, die Leiter liefert die Hierarchie aus ξ.

Reverse-ξ: was die Daten für ξ zurückgeben

Löst man die drei Leiter-Verhältnisse nach ξ auf, geben die Daten zurück

$$\xi_{\mu/e} = 1{,}347 \cdot 10^{-4}, \qquad \xi_{\tau/\mu} = 1{,}375 \cdot 10^{-4}, \qquad \xi_{\tau/e} = 1{,}358 \cdot 10^{-4}, \tag{aa.11}$$

also $+1{,}1$ bis $+3{,}2\,\%$ über $4/30000 = 1{,}3333 \cdot 10^{-4}$. Die drei Werte streuen untereinander um $\sim 2\,\%$ – die Leiter ist in den Verhältnissen auf dem Prozentniveau konsistent, nicht exakt. Das ist der ehrliche empirische Status der Leiterdarstellung, unverändert gegenüber der Deklaration in Dok. 006 (mittlere Abweichung unter $1\,\%$ auf Massenebene; auf Verhältnisebene entsprechend 1–$3\,\%$).

Brückenkonstanten nach P40

Pro Lepton ergibt die Auflösung nach der Brückenkonstante $v_{\text{eff}} = m_i/(r_i\,\xi^{p_i})$:

$$v_{\text{eff}}^{(e)} = 248{,}9 \text{ GeV}, \qquad v_{\text{eff}}^{(\mu)} = 247{,}6 \text{ GeV}, \qquad v_{\text{eff}}^{(\tau)} = 245{,}1 \text{ GeV}, \tag{aa.12}$$

gestreut um den Higgs-Vakuumerwartungswert $246{,}22$ GeV ($+1{,}10/+0{,}58/-0{,}46\,\%$). Äquivalent: die erforderlichen r_{eff} bei festem v weichen um dieselben Prozente von den deklarierten rationalen Werten ab (r_e: $1{,}348$ statt $4/3$ usw.). Genau das ist der P40-Befund von der Datenseite: die rationalen Strukturzahlen der Leiter gelten auf dem Prozentniveau, die Restabweichung ist in die Brückenkonstante absorbiert und in Verhältnissen *nicht* vollständig weggekürzt.

K_{frak}-Gegenprobe: kein einfaches Muster

Die naheliegende Frage, ob die Leiter-Restabweichungen dem fraktalen Korrekturfaktor folgen, verneint die Rechnung: $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ entspricht $-1{,}333\,\%$, die Halb- und Dreihalb-Potenzen $-0{,}665$ und $-1{,}995\,\%$ – die gemessenen Abweichungen $+0{,}52$ und $+1{,}04\,\%$ passen weder im Betrag noch im Vorzeichen auf eine einzelne K_{frak}-Potenz. Auffällig ist allein, dass die τ/μ-Abweichung ziemlich genau das Doppelte der μ/e-Abweichung ist; ob dahinter Struktur oder Zufall steht, bleibt nach P35 ungebucht. Der Punkt wird als offen deklariert, nicht wegerklärt.

Leiterübergreifende Kopplung: ein generationslineares Korrekturgesetz

Bevor dieser Befund gebucht wird, ist die Buchungsebene festzulegen, denn sie entscheidet über seine Zulässigkeit. Es gibt zwei einander *ausschließende* Rechenmodi. *Modus 1* rechnet alle Leptonverhältnisse rein aus ξ, ohne Referenzpunkt: dann sind μ/e, τ/μ und τ/e allesamt echte Vorhersagen (jeweils $0{,}5$–$1{,}6\,\%$ neben den Daten), und alle drei sind legitime Prüfpunkte. *Modus 2* wendet P42 an: m_μ/m_e ist dann der

deklarierte Anker, *verbraucht* und keine Prüfgröße mehr – man darf seine Leiter-Abweichung nicht mehr buchen, sonst nutzt man dieselbe Größe zweimal (einmal als Anker, einmal als Test). Die folgende Kopplungsanalyse gehört *ausschließlich* in Modus 1, den referenzfreien; in Modus 2 ist sie gegenstandslos, weil dort μ/e aus dem Vergleich fällt und als einzige unabhängige Leiter-Prüfung m_τ bleibt – die ohnehin über den Zirkulanten läuft, nicht über die grobe Leiter. Innerhalb von Modus 1 gilt: die Aussage „kein einfaches Muster" betrifft die Frage nach einer *einzelnen* K_{frak}-Potenz. Fragt man stattdessen, ob die Leiterstufen *untereinander* gekoppelt sind, zeigt sich sehr wohl Struktur. Schreibt man die erforderliche Korrektur je Stelle als effektiven Faktor N_g über $K = 1 - N_g\,\xi$ (bzw. als Exponenten p über K_{frak}^{p}), so ergeben die Daten

$$\mu/e\text{:}\quad N_1 = 38{,}89, \quad p_1 = 0{,}3873, \tag{aa.13}$$

$$\tau/\mu\text{:}\quad N_2 = 77{,}06, \quad p_2 = 0{,}7694, \tag{aa.14}$$

$$\tau/e\text{:}\quad N_3 = 115{,}55, \quad p_3 = 1{,}1567. \tag{aa.15}$$

Zwei Beziehungen sind hier nicht zufällig. Erstens ist die Exponenten-Struktur *multiplikativ konsistent*: $p_3 = p_1 + p_2$ auf $6 \cdot 10^{-14}$ genau. Die τ/e-Stelle trägt also *keine* neue Information – sie ist das Produkt der beiden Stufen, wie es eine durchgängige multiplikative Korrektur $K^{p_1} \cdot K^{p_2} = K^{p_1+p_2}$ verlangt. Zweitens stehen die effektiven Faktoren im Verhältnis $N_1 : N_2 : N_3 = 1 : 1{,}981 : 2{,}971 \approx 1 : 2 : 3$: die Korrektur wächst *linear mit der Generationszahl*, $N_g \approx g \cdot N_0$ mit $N_0 \approx 38{,}6$ (die drei Einzelschätzungen N_1, $N_2/2$, $N_3/3$ liegen bei $38{,}89$, $38{,}53$, $38{,}52$ – untereinander auf unter $1\,\%$ konsistent).

Das ist der strukturelle Grund, warum ein konstantes K_{frak} die Leiter nicht schließt und warum die Frage nach der „richtigen" Zahl statt 100 (etwa 89) ins Leere läuft: die Leiter verlangt keinen festen Faktor, sondern einen *generationszählenden*, $N_g = g \cdot N_0$. Bei α ist nur eine Skala im Spiel (das μe-Mittel) – ein Faktor genügt, und α passt. In der Leiter überlagern sich drei Generationen, sodass N linear wächst; ein konstanter Faktor kann das prinzipiell nicht leisten. Damit bekommt die zuvor als Bringschuld benannte *generationsabhängige* Verkleidung eine konkrete Form: sie ist in erster Näherung linear in g.

Die Toleranz-Bilanz zeigt, wie weit das Gesetz trägt (referenzfreier Modus 1, gemeinsames $N_0 = 38{,}65$):

Stelle	roh	roh [σ_{exp}]	korrigiert	korr. [σ_{exp}]
μ/e	$+0{,}521\,\%$	$2{,}4 \cdot 10^{5}$	$+0{,}0033\,\%$	$1{,}5 \cdot 10^{3}$
τ/μ	$+1{,}038\,\%$	154	$-0{,}0031\,\%$	$0{,}47$
τ/e	$+1{,}565\,\%$	232	$-0{,}0052\,\%$	$0{,}78$

Das Gesetz drückt die Leiter-Abweichung um rund den Faktor 300, von $0{,}5$–$1{,}6\,\%$ auf $\sim 5 \cdot 10^{-3}\,\%$. Die beiden τ-Stellen fallen damit *in* ihre Messtoleranz ($< 1\,\sigma$) – für sie ist das Gesetz praktisch vollständig. Der μ/e-Eintrag bleibt bei $\sim 1{,}5 \cdot 10^{3}\,\sigma$, nicht weil die Korrektur dort versagt, sondern weil μ/e rund 500-mal präziser gemessen ist: schon ein $0{,}003\,\%$-Rest ist in σ-Einheiten riesig. Genau hier greift aber die Modus-Grenze: dieser μ/e-Eintrag ist *nur* im referenzfreien Modus 1 überhaupt eine Aussage; unter P42 ist μ/e der Anker und fällt aus der Bilanz. Der verbleibende Rest der beiden τ-Stellen sitzt in der Feinabweichung des Verhältnisses vom exakten $1 : 2 : 3$ (~ 1–$2\,\%$) und in der noch unbestimmten Grundeinheit N_0 – das ist die nächste offene Rechnung, nicht ein Widerspruch.

Offen – und nach P35 ausdrücklich nicht wegerklärt – bleibt zweierlei. Die Grundeinheit $N_0 \approx 38{,}6$ ist noch nicht aus der Geometrie hergeleitet; naheliegende Kandidaten ($100/e = 36{,}8$, $100/\varphi^2 = 38{,}2$, glatt 39) treffen sie nicht genau genug, um behauptet zu werden. Und der Phasensektor – der δ-Feinwert aus Dok. 291 mit $p_\delta = -0{,}88$ – fügt sich *nicht* offensichtlich in dieselbe generationslineare Magnitude-Leiter; ob Magnitude- und Phasensektor über ein gemeinsames Gesetz koppeln, ist eine eigene, hier nicht beantwortete Frage. Der Befund ist also nicht die Lösung des Leiter-Restes, sondern seine Präzisierung: aus „drei krumme Exponenten" wird „ein generationslineares Gesetz $N_g = g \cdot N_0$ mit noch unbestimmtem N_0".

Ausdrücklich festzuhalten ist die Grenze der Aussagekraft, die aus der Modus-Trennung folgt. Das $1 : 2 : 3$-Muster ist an drei Punkten belegt *nur* im referenzfreien Modus 1. Sobald man P42 anwendet und m_μ/m_e als Anker deklariert (die für die Zirkulant-Präzision und die m_τ-Vorhersage nötige Ebene), fällt μ/e als Prüfpunkt weg, und das Gesetz stützt sich nur noch auf τ/μ und τ/e – die dieselbe τ-Masse teilen und deren Präzision gering ist. Die scheinbar dreifache Bestätigung ist damit an die Referenzfreiheit gebunden. Beides zugleich – μ/e als Anker *und* als N_g-Prüfpunkt – ist unzulässige Doppelbuchung. Der Zirkulant, der μ/e bereits auf 10^{-5} trägt (Weg A in Abschnitt aa.5), braucht die g-Korrektur ohnehin nicht; sie ist eine Aussage allein über die grobe ξ-Leiter im referenzfreien Modus, nicht über die präzise Zirkulant-Schicht.

Ein häufiges Missverständnis ist hier auszuräumen: die 100 aus $K_{\text{frak}} = 1 - 100\,\xi$ und die Grundeinheit $N_0 \approx 38{,}6$ sind *nicht* dieselbe Größe, und die Leiter braucht darum keineswegs „weniger Rekursionen" als der α-Sektor. Die 100 ist die eine feste Skala einer korpusweit wirkenden Konstante (X-Flip, T_{CMB}, E_0-Brücke); N_0 ist der Faktor *pro Generation* in einem anderen Sektor. Der Unterschied ist nicht *weniger*, sondern *anders*: kein fester Faktor, sondern ein generationszählender $N_g = g \cdot N_0$ – bei $g = 2$ bereits 77, bei $g = 3$ bereits 116, also teils *mehr* als 100. Ein Vergleich der beiden Zahlen als „Rekursionstiefen" geht daher ins Leere.

Bei der Bewertung möglicher Ausdrücke für N_0 ist der richtige Maßstab nicht die punktgenaue Übereinstimmung – die ist prinzipiell unerreichbar –, sondern die Verträglichkeit *innerhalb der Toleranz*, mit der N_0 überhaupt bestimmbar ist. Diese Toleranz ist beträchtlich: N_0 folgt im referenzierten Modus allein aus den τ-Stellen, und deren Genauigkeit ist durch die τ-Masse ($\pm 0{,}12$ MeV) begrenzt. Propagiert man das, ergibt sich $N_0 = 38{,}52 \pm 0{,}21$, also eine relative Bestimmungsunsicherheit von rund $0{,}5\,\%$. Ein Kandidatenausdruck ist demnach nicht daran zu messen, ob er $38{,}6$ auf der Nachkommastelle trifft, sondern ob er in dieses Intervall fällt.

Unter diesem Maßstab – und weiterhin als *unbewiesene* Beobachtung nach P35, nicht als Herleitung – ist $100/\varphi^2 = 38{,}20$ ein *zulässiger* Kandidat: der Abstand zu N_0 beträgt $1{,}6\,\sigma_{N_0}$, liegt also innerhalb der Toleranz. Als Punktwert verfehlt der Ausdruck die $38{,}6$; innerhalb der Toleranz, in der N_0 bekannt ist, trifft er. Wäre $N_0 = 100/\varphi^2$, so folgte die Leiter-Grundeinheit über einen einzigen Faktor φ^{-2} aus der K_{frak}-Skala – Magnitude- und Korrektursektor hingen an derselben Konstante. Der Befund ist damit nicht „knapp verfehlt und verworfen", sondern „mit der gegenwärtigen Bestimmung verträglich, nicht widerlegt". Eine schärfere τ-Masse (Belle II) oder eine geometrische Herleitung von N_0 wird zwischen $100/\varphi^2$ und den Alternativen entscheiden; bis dahin bleibt es ein zulässiger, nicht ein bewiesener Ausdruck.

aa.5 Relation zu den Messgenauigkeiten

Die bisherigen σ-Angaben beziehen sich je auf eine Größe. Die vollständige Frage lautet: Wie liegen die FFGFT-Strukturzahlen relativ zur *gesamten* Präzisionsstruktur der Daten? Sie wird durch eine Zwei-Parameter-Analyse beantwortet. Die zwei unabhängigen Verhältnisse $R_1 = m_\mu/m_e$ und $R_2 = m_\tau/m_\mu$ bestimmen das Paar (r, θ) exakt; ihre relativen Messgenauigkeiten sind jedoch dramatisch verschieden: $\sigma_{R_1}/R_1 = 2{,}2\cdot10^{-8}$ gegen $\sigma_{R_2}/R_2 = 6{,}8\cdot10^{-5}$ – das Verhältnis μ/e ist rund 3100-mal präziser gemessen. Die Fehlerfortpflanzung auf (r, θ) ergibt daher eine extrem anisotrope Kovarianz: eine *dünne* Hauptrichtung mit $\sigma \approx 3{,}4\cdot10^{-10}$ (von μ/e getragen) und eine *dicke* mit $\sigma \approx 1{,}7\cdot10^{-5}$ (von τ getragen); die Korrelation zwischen r und θ beträgt praktisch -1.

In diesem Bild liegt der Punkt $(\sqrt{2}, 2/9)$ vom Daten-Fit $(1{,}41420051,\ 0{,}22222963)$ entfernt um $0{,}90\,\sigma$ in der dicken Richtung – das ist die eine τ-Spannung aus Abschnitt 2 – und um rund $450\,\sigma$ in der dünnen. Ausformuliert: der Zirkulant mit *exakt* $(\sqrt{2}, 2/9)$ verfehlt m_μ/m_e um $1{,}0\cdot10^{-5}$ relativ, während die Messung auf $2{,}2\cdot10^{-8}$ steht. Als exaktes Paar sind die beiden Strukturzahlen von den heutigen Daten also bereits ausgeschlossen; bestätigt sind sie auf dem 10^{-5}-Niveau – genau die „vier bis fünf Stellen", die Dok. 282 deklariert, hier als Messrelation präzisiert. Daraus folgt auch eine Grenze der m_τ-Vorhersage: ein perfektes Belle-II-Ergebnis löst nur die dicke τ-Richtung; der Rest von $1{,}75\cdot10^{-7}$ in θ (äquivalent 10^{-5} in R_1) ist ein *heute schon gemessener*, stehender Offset, den jede Exaktheitsbehauptung erklären müsste – naheliegende Kandidaten wären radiative Korrekturen an den Polmassen, wobei deren typische Größe ($\alpha/\pi \sim 10^{-3}$) das Rätsel eher vergrößert, warum die Übereinstimmung überhaupt bis 10^{-5} reicht. Der Punkt bleibt nach P35 offen gebucht.

Gedankenmodell: die Umkehrung der Präzisionsaussage

Der $450\,\sigma$-Befund ruht vollständig auf dem Vertrauen in die angegebene Präzision von m_μ/m_e. Die Umkehrung – die Präzision könnte nicht das bedeuten, was sie behauptet – ist als Gedankenmodell zulässig und kommt in drei Stärkegraden. *Schwach:* die experimentelle Unsicherheit wäre um den Faktor ~ 450 unterschätzt – quantitativ kaum haltbar, da dieselbe Präzision in einem Netz unabhängiger Kreuzchecks (Myonium-Spektroskopie, $g-2$, QED-Tests) hängt. *Mittel:* m_μ/m_e ist keine abgelesene, sondern eine durch gebundene QED *extrahierte* Größe; die Präzisionsangabe setzt die Vollständigkeit der Extraktionstheorie voraus, und ein fehlender Term bei 10^{-5} würde den Konflikt auflösen – 450-mal über dem geschätzten Theoriefehler, grenzwertig, aber logisch offen. *Stark (und FFGFT-nativ):* die Präzision ist echt, gilt aber für die *angezogene* Größe – die Polmassen im SI-Rahmen –, während die Zirkulant-Relation auf der geometrischen Ebene darunter läge. Dann widerspricht nichts einander: der 10^{-5}-Offset wäre kein Fehler, sondern die *gemessene Dicke der Verkleidungsschicht* im μ/e-Kanal. Das ist die konsequente Verlängerung von P40: in Verhältnissen kürzt sich nur der generations*unabhängige* Teil der fraktalen/SI-Korrektur; ein generationsabhängiger Rest bleibt stehen – und hätte genau die Gestalt dieses Offsets. Der Preis der starken Lesart ist eine Bringschuld: der Offset müsste aus der Verkleidung berechenbar sein (generationsabhängige radiative Struktur), sonst ist die Lesart unfalsifizierbar. Sie wird hier als Gedankenmodell gebucht, nicht als Auflösung;

der Widerspruchs-Befund des vorigen Abschnitts bleibt für die Polmassen-Ebene bestehen.

Aufgelöst durch Deklaration: der Referenzpunkt m_μ/m_e (P42)

Der Rahmen entscheidet die Frage nicht über eines der Gedankenmodelle, sondern über die Anspruchsschicht: FFGFT bleibt grundsätzlich bei der rein theoretischen Ableitung aus ξ, und der Leptonsektor erhält – analog zur kosmischen Skala (P39) – genau *einen* deklarierten Referenzpunkt, das Verhältnis m_μ/m_e. Bei strukturellem $r = \sqrt{2}$ (aus $Q = 2/3$) fixiert es den operativen Winkel $\theta_{\mathrm{ref}} = 0{,}2222220471$; die Strukturzahl $2/9$ ist dessen rationale Adresse auf sieben Stellen, kein Exaktheitsanspruch auf Polmassen-Ebene. Damit ist der $450\,\sigma$-Befund keine Falsifikation mehr, sondern Teil der Kalibrierung. Zwei Abgrenzungen: der Status von ξ ist davon unberührt (FFGFT behauptet ξ als zwingend aus der Geometrie; dieser Streitpunkt ist hier nicht verhandelt), und die Leptonmassen sind an sich keine Eingabe der Theorie – der Referenzpunkt gehört zur Vergleichsebene, er verortet die geometrische Relation in den Polmassen-Daten und wäre ohne Vergleichsabsicht nicht nötig. Der ehrliche Preis liegt in der Testbilanz: m_μ/m_e wird als Anker verbraucht und scheidet als Prüfgröße aus; Prüfgröße ist allein m_τ. Der Gewinn ist eine eingabefehlerfrei scharfe Vorhersage:

$$m_\tau = 1776{,}9690 \pm 0{,}0001 \text{ MeV}, \tag{aa.16}$$

wobei die Unsicherheit allein aus (m_e, m_μ) stammt und praktisch verschwindet; gegen PDG bleibt die eine τ-Spannung ($+0{,}9\,\sigma$ zu PDG 2022, $+0{,}43\,\sigma$ zu PDG 2024), und das Belle-II-Weltmittel entscheidet ohne jede Ausweichmöglichkeit. Für die Brückenfrage (Dok. 291) verschärft die Deklaration das Ziel: die Dynamik muss θ_{ref} selektieren; $2/9$ bleibt dessen Adresse und das vorregistrierte Stage-10-Ziel, dessen Orbit-Auflösung ($\sim 0{,}1$) vom 10^{-7}-Unterschied unberührt ist. Gebucht als P42 in Dok. 190.

Dieselbe Betrachtung stellt die ξ-Leiter ein: ihre Restabweichungen entsprechen $2{,}4 \cdot 10^5$ (μ/e), 154 (τ/μ) und 232 (τ/e) experimentellen Standardabweichungen. Die Leiter-Residuen sind also nicht datenlimitiert, sondern theorieseitig (P40-Brückenkonstanten); die Messpräzision hat die Leiterdarstellung um zwei bis fünf Größenordnungen überholt. Für die m_τ-Vorhersage schließlich beträgt die Testschärfe (Trennung Vorhersage gegen heutigen Zentralwert) bei $\sigma_{m_\tau} = 0{,}12/0{,}05/0{,}02$ MeV entsprechend $0{,}9/2{,}2/5{,}4\,\sigma$ (bezogen auf den PDG-2022-Zentralwert; mit PDG 2024 etwa halbiert) – eine einzelne Belle-II-Messung ist indikativ, erst das kombinierte Weltmittel entscheidend.

aa.6 Die Feinstrukturkonstante aus den Leptonmassen

Die Feinstrukturkonstante gehört in diese Gegenrechnung, weil sie in FFGFT eine Leptonmassen-Aussage ist: Dok. 011 setzt $\alpha = \xi(E_0/\mathrm{MeV})^2$ mit der strukturellen Energieskala $E_0 = \sqrt{m_e\, m_\mu}$ und der deklarierten fraktalen Korrektur, $\alpha^{-1} = (7500/E_0^2)\, K_{\mathrm{frak}}$. Von der Datenseite: das gemessene α verlangt $E_0^{\mathrm{req}} = 7{,}39798$ MeV, das geometrische

Mittel liefert $7{,}34788$ MeV – Verhältnis $1{,}006819$, gegen $K_{\text{frak}}^{-1/2} = 1{,}006734$. Der deklarierte Korrekturfaktor schließt die Lücke also bis auf $8 \cdot 10^{-5}$; die geschlossene Relation

$$\alpha = \frac{\xi\, m_e\, m_\mu}{K_{\text{frak}}\ \text{MeV}^2}, \qquad K_{\text{frak}} = 1 - 100\,\xi, \tag{aa.17}$$

liefert $1/\alpha = 137{,}059$ gegen gemessen $137{,}035999$. Diese Übereinstimmung ist eine Eigenschaft des Ankers E_0, der den Anschluss an das SI leistet, keine unabhängige Vorhersage von α.

Entscheidend ist hier, dass α *nicht* über eine gefittete Brückenkonstante läuft. Zur charakteristischen Energie E_0 führen zwei eng verwandte Wege (A130): Weg 1 ist das nackte geometrische Mittel der gemessenen Massen, $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu} = 7{,}348$ MeV, und liefert $1/\alpha = 138{,}9$ – in dieser Variante kürzt sich K_{frak} heraus (Verhältnisrechnung, Dok. 122); Weg 2 ist dasselbe Mittel mit der fraktalen Korrektur, $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}} = 7{,}397$ MeV, und liefert $1/\alpha = 137{,}06$ ($+0{,}017\,\%$). $K_{\text{frak}} = 1 - 100\,\xi$ stammt aus ξ, nicht aus α – keine Rückrechnung aus α. Umgekehrt gelesen legt der gemessene α-Wert den Faktor zwischen beiden Wegen fest: $K_{\text{frak}} = \xi m_e m_\mu \alpha^{-1} = 0{,}98650$, gegen $1 - 100\,\xi = 0{,}98667$ auf $1{,}7 \cdot 10^{-4}$. Der Vergleich der beiden Wege mit α bestätigt damit den Wert $1 - 100\,\xi$ bis auf diesen Rest; eine α-freie Messung von K_{frak} ist er nicht. Dass *derselbe* Faktor, der im Korpus den gedämpften X-Flip und die T_{CMB}-Korrektur trägt, die Lücke zwischen Weg 1 und dem von α verlangten E_0 bis auf diesen Rest schließt, ist eine sektorübergreifende Konsistenz – kein Fit.

Der α-Restwert und die Verkleidungsschicht

Nimmt man das auf $1{,}5 \cdot 10^{-10}$ gemessene α als exakt, dann bleibt zwischen Weg 2 und dem von α verlangten $E_0 = \sqrt{\alpha/\xi} = 7{,}3980$ MeV ein Rest. Die K_{frak}-Brücke schließt $98{,}8\,\%$ der Lücke zwischen Weg 1 und dem von α verlangten E_0, $(7{,}39736 - 7{,}34788)/(7{,}39798 - 7{,}34788) = 0{,}988$; es bleibt ein Rest von $8{,}4 \cdot 10^{-5}$ auf E_0-Ebene ($1{,}7 \cdot 10^{-4}$ in K_{frak}). Gemessen an der Präzision der Massen ($1{,}1 \cdot 10^{-8}$ auf E_0-Ebene) ist dieser Rest $\sim 7700\,\sigma$ groß – er ist zu groß, um Massen-Messrauschen zu sein.

Wo er sitzt, lässt sich aus dem α-Sektor allein nicht entscheiden: beide Wege benutzen m_e und m_μ, und der Rest kann ebenso in den Polmassen (QED-Verkleidung) wie im Koeffizienten von K_{frak} ($101{,}2$ statt 100) liegen. Verglichen mit der θ-Seite (Abschnitt aa.5), wo θ_{ref} aus m_μ/m_e gewonnen wird und die $\sim 450\,\sigma$ im μ/e-Kanal zur Hälfte Selbstreferenz sind, ist der α-Rest daher kein stärkerer, modusunabhängiger Zeuge, sondern ein gleichrangiger Hinweis auf eine Schicht zwischen geometrisch fundamentaler Größe und gemessener Polmasse, der die Zuordnung offen lässt. Die Bringschuld – die Verkleidung zu *berechnen* statt sie als Rest zu benennen – bleibt offen.

Konzeptionell – und rechnerisch fast folgenlos, aber für die Architektur zentral – gilt: im erweiterten natürlichen Einheitensystem ist $\alpha = 1$ (Dok. 011/014, Ladung dimensionslos); der SI-Wert $1/137{,}036$ ist Buchhaltung der Einheitenübersetzung, keine fundamentale Kopplung. Dieselbe Architektur trägt die Gravitation: $G = \xi^2/(4 m_{\text{char}})$ mal Umrechnung (Dok. 012/013) macht G zur Buchhaltungsgröße zur SI – die Reproduktion des SI-Werts ist per P40 Kalibrierung, testbar allein die Vorwärtskette. Der strukturelle

Gewinn liegt woanders: eine Kopplung, die nur Buchhaltung ist, muss nicht quantisiert werden – das Quantengravitationsproblem, an dem die meisten Erweiterungen des Standardmodells scheitern, stellt sich in dieser Architektur nicht.

aa.7 Zwei Schichten, die einander nicht brauchen: was $2/9$ leistet und was die SI-Umrechnung leistet

Zwei Fragen, die leicht vermischt werden, sind hier zu trennen.

Erstens: Wird $2/9$ zur Massenberechnung benötigt? Nein. Der historische und weiterhin gültige Rechenweg ist die ξ-Leiter (Dok. 006/046): $m_i = r_i \xi^{p_i} v$ mit $r \in \{4/3, 16/5, 25/9\}$ und $p \in \{3/2, 1, 2/3\}$ liefert die Massen aus ξ und den Leiter-Zahlen allein, ohne dass $2/9$ irgendwo eingeht. Die Strukturzahl $2/9$ erscheint erst ab Dok. 282 und in anderer Funktion: nicht als Eingabe, die die Massen erzeugt, sondern als *nachträglich entdeckte Ordnung* in ihnen – die drei $\sqrt{m_k}$ sind Eigenwerte eines Z_3-Zirkulanten mit Phasenwinkel $2/9$. $2/9$ ersetzt den früher gefitteten Leiter-Koeffizienten durch eine reine Zahl; es ist Verdichtung und Erklärung, keine Voraussetzung. Man könnte $2/9$ aus dem Massensektor streichen, und die Leiter rechnete weiter – verloren ginge die *Einsicht*, warum Q exakt $2/3$ ist, nicht die Zahlen. $2/9$ gehört also zur Erklärungs-, nicht zur Rechenschicht.

Zweitens: Bestätigt diese Gegenrechnung, dass die SI-Umrechnung notwendig und richtig ist? In zwei getrennten Graden. Als *notwendig* bestätigt sie sich klar: jede Absolutzahl (m_τ in MeV, $\alpha = 1/137$, G) verlangt die Brückenkonstante, um in SI zu landen, während die Verhältnisse (m_μ/m_e) sie nicht brauchen. Genau diese Zwei-Ebenen-Struktur ist P40, und der $450\,\sigma$-Befund ist ihr schärfster Beleg: er zeigt, dass die gemessene Polmassen-Ebene (SI-definiert, QED-angezogen) eine *andere* Ebene ist als die geometrische – ohne den Umrechnungsschritt gäbe es die Differenz nicht. Als *auf Messpräzision validiert richtig* bestätigt sie sich hingegen *nicht*: die Umrechnung schließt bei α rund $98{,}8\,\%$ der Lücke (über denselben Faktor K_{frak}, der auch in anderen Sektoren trägt), aber der Rest von $\sim 10^{-4}$ bleibt offen. Die SI-Umrechnung ist damit strukturell notwendig und über Sektoren hinweg konsistent, aber sie ist Kalibrierung, kein auf Nachkommastellen bestandener Test.

Der eigentliche Befund liegt in der Unabhängigkeit: die Leiter rechnet Massen ohne $2/9$, der Zirkulant erklärt Q ohne die Leiter, die SI-Umrechnung übersetzt ohne $2/9$. Dass alle drei dennoch dasselbe ξ und denselben Faktor K_{frak} teilen, ist die Konsistenz des Rahmens – keine Abhängigkeit einer Schicht von der anderen.

aa.8 Einordnung

Die Gegenrechnung von der Datenseite bestätigt die Zwei-Ebenen-Architektur des Korpus, ohne ihr etwas hinzuzufügen oder zu ersparen. Auf der Zirkulant-Ebene geben die Daten die beiden Strukturzahlen auf dem 10^{-5}-Niveau zurück; die Präzisionsanalyse trennt dabei zwei Befunde: in der τ-limitierten (dicken) Richtung eine einzige τ-Spannung ($0{,}9\,\sigma$ zu PDG 2022, $0{,}43\,\sigma$ zu PDG 2024), die die vorab gebuchte Vorhersage $m_\tau = 1776{,}968$ MeV trägt – und in der μ/e-präzisen (dünnen) Richtung einen

heute schon gemessenen 10^{-5}-Offset, der die *Exaktheit* des Paars $(\sqrt{2}, 2/9)$ bereits ausschließt und als offene Feinstruktur gebucht ist. Auf der Leiter-Ebene geben die Daten ξ auf 1–3 % zurück, mit ehrlich offenen Restabweichungen ohne erkennbares K_{frak}-Muster. Was diese Rechnung *nicht* zeigt: keine Herleitung von $\theta = 2/9$ (der dynamische Ort bleibt die offene Frage der Brückenarbeit), keine Verschärfung der Leiter, keine neue Physik. Sie zeigt, dass die deklarierten Ansprüche beider Ebenen von den PDG-Daten aus unabhängig reproduzierbar sind – in der Richtung, in der sich nichts anpassen lässt.

Der Rest als Signatur der Unvollständigkeit

Die Gegenrechnung hat die Aussagen geschärft – von „zwei reine Zahlen, kein Fit" zu vermessenen Größen mit bekannten Nachkommastellen und bekannten Grenzen. Doch auf mehreren Ebenen bleibt ein Rest: der 10^{-7}-Offset in θ, die 1–3 % der Leiter, der offene δ-Feinwert (Dok. 291), das über die Leiter-Stellen hinweg nicht schließende K_{frak}-Muster. Auch die α-Stelle trägt einen Rest: das von α verlangte K_{frak} liegt $1{,}7 \cdot 10^{-4}$ neben $1 - 100\,\xi$ (siehe oben). Keiner dieser Reste ist ein *Widerspruch* – die Theorie stimmt überall auf ihrer jeweiligen Genauigkeit –, aber keiner ist *null*. Ein Residuum, das kleiner wird, je genauer man hinsieht, ohne zu verschwinden, ist die Signatur einer Näherung an etwas Tieferes, nicht die eines abgeschlossenen Fundaments. Deshalb ist der Rest kein Fehler, sondern der ehrliche Beleg, dass die Theorie *nicht vollständig* ist.

Bemerkenswert ist, *wo* er sitzt. Der geometrische Kern trägt keinen Rest: $Q = 2/3$ ist rein geometrisch und praktisch exakt; im erweiterten Natursystem ist $\alpha = 1$; die Leiter-Verhältnisse sind rationale Zahlen. Der Rest entsteht durchgängig *erst* beim Übergang ins Gemessene: der $450\,\sigma$-Bruch erst auf der Polmassen-Ebene, die Leiter-Abweichung erst in der Brückenkonstante. Auch die α-Umrechnung fügt sich ein: dort legt der gemessene α-Wert die Korrekturtiefe fest ($K_{\text{frak}} = 0{,}98650$), und der Rest von $1{,}7 \cdot 10^{-4}$ gegen $1 - 100\,\xi$ entsteht erst beim Übergang ins Gemessene. Der Rest lebt also nicht im geometrischen Kern, sondern in der *Übersetzungsschicht* – systematisch, nicht zufällig verteilt. Das lokalisiert die Unvollständigkeit präzise: nicht in ξ, nicht im Zirkulanten, sondern in der noch nicht *hergeleiteten* fraktalen bzw. QED-Verkleidung. Vollständig wäre die Theorie erst, wenn sie diesen Rest *berechnet* statt ihn in eine Brückenkonstante zu absorbieren – wenn K_{frak} nicht nur passt, sondern generationsabhängig aus der Geometrie folgt. Der Maßstab dafür ist ausdrücklich *nicht* die punktgenaue Landung auf der letzten Nachkommastelle: eine geometrische Herleitung soll nicht die QED-angezogene Polmasse Ziffer für Ziffer treffen – das wäre weder möglich noch das Ziel –, sondern die zugrunde liegende Struktur so weit festlegen, dass die Vorhersagen *innerhalb der Toleranzen* bleiben, in denen die Größen überhaupt bestimmbar sind. Vollständigkeit heißt hier: kein Rest mehr, der *über* diese Toleranzen hinausragt und nur durch einen freien Parameter geschlossen wird. Bis dahin ist jeder solche Rest der Zeiger auf die nächste offene Herleitung, an der die Vollständigkeit – im Sinne der Toleranz, nicht der letzten Ziffer – zu messen sein wird.

Kapitel ab

Dok. 293 — Die ikosaedrische Herkunft von $\theta = 2/9$: der zweite Zeuge

ab.1 Fragestellung: ein zweiter, unabhängiger Zugang zu $\theta = 2/9$

Der Koide-Winkel $\theta = 2/9$ ist empirisch auf sieben Stellen bestätigt und in FFGFT als rationale Adresse eines über einen Referenzpunkt fixierten Wertes verstanden (Dok. 292), nicht als Polmassen-Exaktheitsanspruch (P42). Dok. 290/291 haben gezeigt, in welchem *Kanal* θ lebt: nicht im symmetrischen Betragsfunktional (dort ist $2/9$ counter-blind), sondern im Phasenkanal, mit $\chi = \pi/2$ als schief-adjungiertem Selektor und δ als noch offener zweiter Harmonischer. Der *Betrag* von θ blieb dabei eine gefundene, nicht hergeleitete Zahl.

Dieses Dokument liefert einen zweiten, davon völlig unabhängigen Zugang. Er stammt nicht aus den Massen und nicht aus der Koide-Parametrisierung, sondern rein aus der *Geometrie* der Verdopplung $6 = 3 \oplus 3'$ (Dok. 285): der Einbettung der FFGFT-eigenen C_3-Struktur in die ikosaedrische Ambientgruppe A_5. Diese Einbettung erzeugt $\theta = 2/9$ parameterfrei, vorwärts und exakt – ohne $2/9$ als Eingabe. Dass ein zweiter, methodisch fremder Weg auf *denselben* rationalen Wert trifft, ist die eigentliche Aussage: nicht eine Übersetzung des einen in den anderen, sondern ein Konvergenzbeleg im Sinne der bewährten FFGFT-Logik, in der α, die Leptonmassen und Koide als *Verifikationen* verschiedener Zugänge auf dieselben Konstanten zeigen. Die Rechnungen liegen in `ikosaeder_theta_delta.py` (numpy-only, Seed 20780458).

ab.2 Die C_3-in-A_5-Einbettung und die volle Umverteilung

Die drei Lepton-Moden sind die Fourier-Eigenmoden des Z_3-Zirkulanten auf der $\mathbb{C}^3$-Faser (Dok. 282/288): die triviale Mode $v_0 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$ und die zwei nicht-trivialen, galois-konjugierten Moden $v_{1,2} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, \omega^{\pm 1}, \omega^{\pm 2})$ mit $\omega = e^{2\pi i/3}$. Das Elektron ist eine

nicht-triviale Mode; welche der beiden, entscheidet allein das Vorzeichen des Winkels, nicht der hier berechnete Wert.

Die Verdopplung stellt C_3 in die ikosaedrische Gruppe A_5; die fünfzählige Erzeugende ist eine Drehung R_5 um 72° um eine ikosaedrische 5-fach-Achse (Standardeinbettung: Achse $(0, 1, \varphi)$ mit $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$). Da die 3-zählige und die 5-zählige Achse verschieden orientiert sind, mischt R_5 die C_3-Moden. Die *volle* Umverteilung des Elektron-Mode $v_e = v_1$ hat die Gewichte $p_j = |\langle v_j | R_5\, v_e\rangle|^2$:

$$\underbrace{p_0 = \frac{2}{9}}_{\text{trivial } v_0}, \qquad \underbrace{p_2 = \frac{5-3\varphi}{9}}_{\text{2. Harm. } v_2}, \qquad \underbrace{p_1 = \frac{2+3\varphi}{9}}_{\text{bleibt } v_e}, \qquad p_0 + p_1 + p_2 = 1.$$

Alle drei Gewichte tragen den Nenner $9 = 3^2$ – dieselbe Z_3-Struktur, in der auch $2/9$ als Orbit-Adresse sitzt. Numerisch bestätigt (40 Stellen, mpmath): $p_0 = 0{,}2222\ldots = 2/9$ exakt, Differenz $< 10^{-30}$.

ab.3 Der entscheidende Befund: $\theta = 2/9$ als trivialer Anteil

Der Anteil, der unter der ikosaedrischen 5-fach in die *triviale* Mode v_0 übergeht, ist

$$\boxed{p_0 = \left|\langle v_0 \,|\, R_5\, v_e\rangle\right|^2 = \frac{2}{9}}$$

exakt und parameterfrei. In den Wert geht kein Massenverhältnis, keine Koide-Parametrisierung und kein $2/9$ ein; er folgt allein aus den C_3-Moden und der ikosaedrischen Drehung. Der zugehörige *totale* Leak ist $p_0 + p_2 = (7 - 3\varphi)/9 = 0{,}238433$. Als parameterfreier Kandidat für die Amplitude δ der zweiten Harmonischen verfehlt er das aus $\theta = 2/9$ rückgerechnete $\delta^* = 0{,}238871$ um $-0{,}183\,\%$. Die τ-limitierte Toleranz von δ^* beträgt mit der lokalen Steigung $0{,}052\,\%$ (Dok. 291); der Abstand entspricht damit $\approx 3{,}5\sigma$, und der Leak $(7 - 3\varphi)/9$ ist mit δ^* nicht verträglich. Die naheliegende Lesart, Betrag und Winkel entstammten derselben 5-fach-Umverteilung – θ als trivialer, δ als totaler Anteil –, gilt deshalb nicht: die Umverteilung liefert den Winkel $\theta = 2/9$ exakt, die Amplitude δ nicht.

ab.4 Härtetests: die Spezifität der ikosaedrischen Geometrie

Der Wert $2/9$ ist keine generische Eigenschaft irgendeiner Drehung, sondern der ikosaedrischen:

- **Achsenspezifität.** 200 zufällige Drehachsen bei 72° ergeben den v_0-Leak im Bereich $[0{,}036;\ 0{,}452]$; *keine einzige* trifft $2/9$. Nur die ikosaedrischen 5-fach-Achsen liefern es.
- **Winkel- und Ordnungsspezifität.** Der Winkel-Scan zeigt $2/9$ genau bei 72°; die n-fach-Reihe liefert $2/9$ ausschließlich bei $n = 5$ (bei $n = 3$ steht $2/5$, bei 144° steht $4/9$). Die rationale Sauberkeit tritt an den ausgezeichneten Winkeln auf.

- **Modenunabhängigkeit.** Beide nicht-trivialen Moden v_1, v_2 geben $p_0 = 2/9$; die triviale v_0 gäbe $4/9$. Das Ergebnis hängt nicht davon ab, welche der beiden konjugierten Moden als Elektron gelesen wird.
- **Achsenwahl (diskret, P3).** Von den sechs 5-fach-Achsen geben drei ($+\varphi$-Zweig, 3-5-Achswinkel $37{,}38°$) den Wert $2/9$, drei ($-\varphi$-Zweig, $79{,}19°$) den Wert $4/9$. Die physikalische Einbettung $C_3 < A_5$ wählt den nächstliegenden 5-fach, den $+\varphi$-Zweig – also $2/9$. Es ist eine diskrete Zweifachwahl, kein freier Parameter.

ab.5 Zwei Zeugen, ein Wert

Die θ-Frage hat damit zwei voneinander unabhängige Quellen, die exakt zusammenfallen:

Zugang	Herkunft	Wert
Koide (phänomenologisch)	aus den gemessenen Lepton-Massen; keine Geometrie	$\theta = 2/9$
C_3-in-A_5 (geometrisch)	aus der 5-fach-Umverteilung der Moden; keine Massen, kein $2/9$-Input	$p_0 = 2/9$

Beide Wege wissen nichts voneinander – der eine kennt nur Massen, der andere nur Geometrie – und treffen dennoch *exakt* dieselbe rationale Zahl. Das ist ein Konvergenzbeleg, kein Übersetzungsdefizit: es ist nicht erforderlich, dass sich der geometrische Weg in die Koide-Kosinus-Parametrisierung zurückübersetzt. Genau wie ein hergeleiteter Wert nicht mit seiner Messvorschrift identisch sein muss, um sie zu bestätigen, muss die parameterfreie geometrische Vorhersage $2/9$ nicht die Gestalt des phänomenologischen Fitparameters annehmen, um mit ihm übereinzustimmen. Dass der geometrische Wert *nicht* mit θ variiert, ist dabei das Kennzeichen einer Vorhersage, nicht ein Mangel: die Geometrie besitzt keinen freien Parameter und nennt einen festen Wert.

ab.6 $\theta = 2/9$ als Übersetzungs-Invariant zweier Modelle

Der „zweite Zeuge" ist genauer zu fassen, damit er nicht als ontologische Behauptung missverstanden wird. Es geht *nicht* darum, dass eine geometrische Wahrheit eine phänomenologische schlägt, und auch nicht darum, dass der Torus „eigentlich" der Hilbertraum sei oder umgekehrt. Beide – die Punkt-/Differentialgeometrie des T^4 und die Spektralgeometrie des Hilbertraums $L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$ – sind *mathematische Modelle*, die nachweislich und verlustfrei ineinander übersetzbar sind (Dok. 230/282): die Z_3-Fasern, die C_3-Fourier-Moden, die A_5-Einbettung sind in beiden Sprachen dieselbe Struktur, nur verschieden dargestellt.

Der eigentliche Befund ist daher ein methodologischer, kein ontologischer: $\theta = 2/9$ ist ein *Invariant der Übersetzung*. Er erscheint in der spektralen Darstellung (als

Umverteilungsgewicht p_0) ebenso wie in der phänomenologischen Koide-Adresse, weil er der gemeinsamen Struktur gehört und nicht einer einzelnen Darstellung. Genau das macht ihn belastbar: Die Konstante fällt aus der Struktur, unabhängig davon, in welcher der übersetzbaren Sprachen man rechnet. Dies liegt auf der bewährten Linie, in der $\hbar$ und c Umrechnungsfaktoren sind und nicht ontologische Primitive: Was zählt, ist das unter der Umrechnung Invariante, nicht die Wahl einer Seite als „wahr". Über die Frage, welches der beiden Modelle die Wirklichkeit ist, wird hier bewusst nichts behauptet – sie wird nicht gebraucht, und die Rechnung liefert sie nicht. Der Wert des Ergebnisses liegt gerade in seiner *Modellunabhängigkeit*.

ab.7 Skaleninvarianz des Musters gegenüber der Besetzung

In den geometrischen Wert $p_0 = 2/9$ und die Verhältnisse geht *keine* Skala ein: Die C_3-in-A_5-Geometrie kennt weder Masse noch Energie, sie liefert reine Zahlen – den Winkel und die Nenner-9-Gewichte. Damit ist die *Musterschicht* – Winkel plus Verhältnisse – eine Eigenschaft der Topologie, nicht eines bestimmten Energiebereichs. Sie gilt überall dort, wo die Z_3/A_5-Verdopplung auftritt; der Lepton-Sektor ist *eine* Realisierung, nämlich diejenige, in der die Skala E_0 (Dok. 292) die absolute Lage genau auf die gemessenen e, μ, τ legt.

Davon strikt zu trennen ist die *Besetzungsschicht*: ob auf einer gegebenen Skala Zustände tatsächlich sitzen. Die Geometrie sagt „*falls* hier ein Z_3-Triplett realisiert ist, dann mit diesem θ und diesen Verhältnissen" – sie sagt nicht „hier ist eines". Auf einer anderen Skala steht dasselbe Zirkulant-Muster, ohne dass dort besetzte Zustände liegen müssen. Das ist dieselbe Logik wie beim Turm $D(4 + 3n)$ und dem Leerheitssatz (Dok. 285): das Muster ist überall präsent, die Besetzung ist eine separate, skalengebundene und dynamikabhängige Frage; ein leeres Fenster trägt dasselbe Muster wie ein besetztes, nur ohne Teilchen darin. Aus der Skaleninvarianz des Musters folgt daher *keine* Vorhersage neuer Teilchen auf anderen Skalen – die Universalität betrifft die Struktur, nicht die Besetzung.

ab.8 Status und offene Kante

Was gesichert ist: Die ikosaedrische Verdopplungsstruktur erzeugt $\theta = 2/9$ parameterfrei, vorwärts, exakt und ikosaeder-spezifisch, in unabhängiger Übereinstimmung mit dem phänomenologischen Koide-Wert. Die Amplitude δ folgt aus derselben Umverteilung nicht: der totale Leak $(7 - 3\varphi)/9$ ist mit δ^* nicht verträglich, δ bleibt offen. Damit hat die lange offene Frage – ob die T^4/Z_3-Struktur $\theta = 2/9$ erzwingt – erstmals eine konkrete, exakte, geometrische Antwort im Rahmen der bereits etablierten A_5-Verdopplung (Dok. 285).

Was als Ableitungsschritt offen bleibt (und ausdrücklich nicht als Einwand gegen den Konvergenzbeleg): der explizite Mechanismus, der die geometrischen Umverteilungsgewichte $(2/9, (5 - 3\varphi)/9, (2 + 3\varphi)/9)$ mit den physikalischen Massenverhältnissen verbindet. Diese Brücke muss nicht über Koide laufen, sondern kann direkt über die

Massen oder die Modenstruktur geführt werden; sie ist der Gegenstand der Weiterarbeit. Die operative Rolle der 5-fach im Phasenkanal ist konsistent mit Dok. 291: R_5 setzt eine Phase $\pi/2$, den Wert, den Dok. 291 mit χ verbindet.

Kapitel ac

Dok. 294 — FFGFT als Prüfinstanz für HLV: das geteilte φ-ikosaedrische Objekt

ac.1 Fragestellung: dasselbe Objekt — was HLV damit macht, bleibt HLVs Sache

Eine Aussage steht am Anfang und soll unmissverständlich sein: FFGFT und HLV arbeiten mit *demselben* geometrischen Objekt. Das ist keine Deutung und keine These, sondern eine nachrechenbare Tatsache, die unten belegt wird – das φ-ikosaedrische Achsensystem, auf dem $\theta = 2/9$ als Invariante sitzt. Alles Weitere in diesem Dokument ist Folgerung aus dieser einen Feststellung.

Davon strikt zu trennen ist eine zweite Frage, die hier *nicht* gestellt und *nicht* beantwortet wird: was HLV mit diesem Objekt macht – welche Vortex- oder Randmoden-Deutungen, welche Ableitungen und welche Formulierungen HLV darauf aufbaut. Das ist HLVs Sache, nicht die der FFGFT. Ob diese Formulierungen korrekt sind, wird hier weder behauptet noch geprüft noch adressiert. Die FFGFT stellt das geteilte Objekt fest und – über E_0 – eine Prüfrichtung bereit; für den Gebrauch, den HLV vom Objekt macht, ist HLV allein verantwortlich.

Der Zweck des Dokuments ist damit bewusst zweigeteilt und bescheiden. Es hält fest, dass beide über demselben Objekt rechnen, und dass FFGFT eine Möglichkeit bietet, HLV an der Empirie zu messen; und es zieht zugleich die Grenze, jenseits derer über HLV nichts ausgesagt wird.

ac.2 Das geteilte φ-ikosaedrische Objekt

In der verfügbaren rechnerischen Darstellung von HLV – dem Cut-and-Project des Homologie-Prüfskripts `ffgft_hlv_homology_check_v3.py` – wird der physikalische Raum durch den ikosaedrischen Projektor mit dem Parameter $\tau = \varphi$ erzeugt, $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. Dessen sechs projizierte Achsen sind die sechs fünfzähligen Achsen des Ikosaeders:

alle fünfzehn paarweisen Winkel sind gleich $\arccos(1/\sqrt{5}) = 63{,}435°$. Genau auf diesen Achsen lebt die C_3-in-A_5-Verdopplung der FFGFT (Dok. 285, Dok. 293).

Es handelt sich also nicht um zwei ähnliche Strukturen, sondern um dasselbe Objekt. Wendet man auf diese Achsen die fünfzählige Umverteilung der C_3-Moden an (Dok. 293), so ist der Anteil in die triviale Mode exakt $p_0 = 2/9$. Der Koide-Winkel $\theta = 2/9$ ist damit eine *Invariante auf dem geteilten Objekt*, nicht eine Übersetzung des einen Rahmens in den anderen. Der Wert ist überdies spezifisch für den Goldenen Schnitt: nur $\tau = \varphi$ macht das Winkelspektrum exakt uniform und den trivialen Anteil exakt $2/9$; der silberne Wert $\tau = 1 + \sqrt{2}$ ergibt $0{,}2534$ und ein bereits messbar verschobenes Spektrum (Winkel $45°$ und $69{,}3°$). Das geteilte Objekt ist also nicht irgendein Cut-and-Project, sondern das φ-ikosaedrische.

Diese Aussage ist rechnerisch und ohne Zirkel: sie folgt aus dem Vergleich der Projektor-Achsen und der Modenumverteilung, nachprüfbar in `ikosaeder_theta_delta.py` (Seed 20780458) und in der reproduzierbaren Winkelspektrum-Prüfung `a5_bridge_discrimination.py`.

ac.3 Abgrenzung: welches HLV-Objekt geteilt ist

Das hier festgestellte geteilte Objekt ist die *geometrische* Schicht von HLV – das φ-ikosaedrische Achsensystem, auf dem $\theta = 2/9$ als Invariante sitzt. Davon strikt zu trennen ist ein zweites HLV-Objekt gleichen Namens: die *temporal-dynamische* Spiral-Zeit, ein Nicht-Markov-Operator mit triadischer Zeitkoordinate $\Psi(t) = (t, \phi(t), \chi(t))$ und Gedächtniskanal (Zenodo 20643462). Diese temporal-dynamische Spiral-Zeit trägt weder A_5 noch den ikosaedrischen Projektor; sie ist *nicht* das hier geteilte Objekt und fällt nicht unter die vorliegende Feststellung.

Die Prüfrichtung dieses Dokuments betrifft allein die geometrische Schicht. Der Abgleich der temporal-dynamischen Spiral-Zeit mit FFGFTs Zeit-Windung wird gesondert geführt (Dok. 295); dort zeigt eine rechnerische Prüfung, dass jenes Objekt das Selbstähnlichkeits-Verhältnis e der FFGFT-Log-Spirale nicht trägt – auf seinen eigenen Definitionen ist es eine Windung konstanter Ganghöhe, nicht äquiangular. Beide Abgrenzungen zusammen halten die Rede von „geteilt“ sauber: geteilt ist das φ-ikosaedrische geometrische Objekt, nicht HLVs Spiral-Zeit als Zeitoperator. Die geteilte Invariante zwischen den beiden Schichten ist allein die Z_3 ($C_3 < A_5$); die Dimensionszahlen der beiden Rahmen (3, 6) decken sich, ihre Bedeutung nicht (Dok. 295).

ac.4 Die E_0-Asymmetrie

Das geteilte Objekt ist skalenlos. Die Geometrie kennt weder Masse noch Energie; sie liefert reine Zahlen – den Winkel und die Nenner-9-Gewichte (Dok. 293). Hier setzt die eigentliche Asymmetrie zwischen den beiden Rahmen ein.

FFGFT verfügt über einen Referenzpunkt E_0 (Dok. 292), der das skalenlose Muster an die gemessenen Leptonen e, μ, τ bindet und die absolute Lage fixiert. Damit kann FFGFT vom Muster *empirisch zurückrechnen*: aus dem geteilten Objekt, den Nenner-9-Gewichten und E_0 folgen absolute Massen. HLV besitzt keine solche Skala.

Es trägt das Muster – das geteilte geometrische Objekt –, aber keinen Anker in Energie oder Masse. HLV kann daher aus dem Objekt allein keine Massen gewinnen. Es kann es nur, wenn es E_0 von FFGFT übernimmt; in diesem Fall aber rechnet die Empirie der FFGFT, lediglich in den Koordinaten von HLV ausgedrückt.

ac.5 Die Prüfrichtung: von FFGFT nach HLV

Aus der geteilten Geometrie und der einseitigen Skala folgt eine gerichtete Beziehung. Weil FFGFT die fehlende Skala beisteuert, bietet FFGFT eine Möglichkeit, den geometrischen Gehalt von HLV an den Daten zu prüfen: man versieht das geteilte Objekt mit E_0 und testet, ob es die Leptonmassen reproduziert. Das ist eine Verifikationsrichtung von FFGFT nach HLV.

Es ist ausdrücklich *keine* Bestätigung, dass HLVs eigene Formulierungen korrekt sind. Das geteilte Objekt besagt allein, dass beide dieselbe Geometrie benutzen – nicht, dass die Interpretationen und Ableitungen, die HLV auf dieser Geometrie errichtet, gültig sind. Die Prüfrichtung testet die Entsprechung von Geometrie und Massen mit den Mitteln der FFGFT; sie berührt HLVs eigene Konstruktion nicht und adelt sie nicht.

Umgekehrt gilt: HLV liefert der FFGFT empirisch nichts, was diese nicht schon hätte. Das Muster ist geteilt, die Skala hat FFGFT selbst. Es gibt keinen Empirie-Transfer von HLV nach FFGFT, und FFGFT braucht HLV für die Massen nicht. Der empirische Pfeil ist einseitig.

ac.6 Was der Befund besagt und was nicht

Belegt und rechnerisch gesichert ist: das geteilte φ-ikosaedrische Objekt; $\theta = 2/9$ als dessen Invariante; die Spezifität für $\tau = \varphi$; und die E_0-Asymmetrie, aus der die Prüfrichtung folgt.

Nicht belegt und nicht behauptet ist: die Korrektheit der Formulierungen, die HLV enthält; eine unabhängige empirische Bestätigung der FFGFT durch HLV; und die Frage, ob der ikosaedrische Projektor der fundamentalen Behauptung von HLV *intrinsisch* ist oder in den Prüfskripten eine Modellierungswahl darstellt. Letzteres ist von HLV selbst zu klären und wird hier offengelassen.

ac.7 Methodische Einordnung

In den drei methodischen Schichten der FFGFT ordnet sich der Befund klar ein. Das geteilte Objekt ist ein Brücken-Befund: eine geometrische, algebraisch belegbare Entsprechung. Die Zurückrechnung auf Massen ist Kern-Ableitung, sie folgt aus ξ und E_0 und ist FFGFT-intern. Der Beitrag von HLV zur Empirie ist null. Im Sinne von P35 bleibt die Aussage, HLV sei korrekt, ein Kandidat und keine Ableitung; abgeleitet ist allein das geteilte Objekt.

ac.8 Der erste Prüfversuch ist überholt

Der erste Prüfversuch – der Homologie-Check `ffgft_hlv_homology_check_v3.py`, ein grober topologischer Punktwolken-Diagnostiker – ist durch die exakte Hilbertraum-Variante (Dok. 293) überholt und war für die tragende Frage ohnehin strukturell blind: die persistente H_1 einer Punktwolke sieht die Achsen-Winkel-Struktur nicht, an der $2/9$ hängt, sodass $\tau = \varphi$ (exakt $2/9$) und der Kontrollwert $\tau = \sqrt{2}$ ($0{,}2139$) topologisch nahezu ununterscheidbare Wolken erzeugen. Sein früherer Befund einer „nur schwachen Trennung von generisch“ ist deshalb keine Aussage über φ oder A_5, sondern die erwartbare Blindheit des groben Statistikums. In der spektralen Variante erscheint $\theta = 2/9$ dagegen unmittelbar als exakte Invariante $p_0 = |\langle v_0 | R_5 v_e \rangle|^2 = 2/9$; der Befund vom geteilten Objekt ruht auf ihr, nicht auf dem Homologie-Diagnostiker.

ac.9 Der zweite Test: was er auflöst und wo er zirkulär wird

Der zweite Prüfversuch – das Instrument `a5_bridge_discrimination.py` (Seed 20780458) – verwendet genau die Statistik, die dem ersten fehlte: das Winkelspektrum der sechs projizierten Achsen, gemessen als Abstand zum ikosaedrischen Referenzspektrum, in dem alle fünfzehn paarweisen Winkel gleich $63{,}435^\circ$ sind. Damit löst er die Achsen-Winkel- Struktur auf, an der $2/9$ hängt. Er ist so kalibriert, dass ein exakt ikosaedrisches Objekt den Abstand null ergibt, während generische zufällige Tight-Frames und eine echt generische $\sqrt{2}$-Konstruktion in einem breiten generischen Bereich liegen. Er ist damit das Instrument, das φ und A_5 sehen kann, wo der erste blind war.

Was der zweite Test auf der verfügbaren Darstellung erbringt, ist zweierlei. Erstens liest der HLV-Projektor mit $\tau = \varphi$ exakt ikosaedrisch: alle fünfzehn Winkel $63{,}435^\circ$, Abstand null, und die fünfzählige Umverteilung auf seinen Achsen ergibt exakt $2/9$. Das ist jedoch eine Folge der Konstruktion – das Objekt *ist* der ikosaedrische Projektor –, die Lesung also zirkulär und keine unabhängige Bestätigung von A_5. Das Instrument behandelt dies korrekt nicht als Urteil, sondern macht die Zirkularität ausdrücklich. Zweitens weist es quantitativ nach, dass die frühere „generische“ Kontrolle mit $\tau = \sqrt{2}$ nicht generisch ist: RMS-Abstand $3{,}47$ zum ikosaedrischen Referenzspektrum (das exakt ikosaedrische Objekt hat Abstand 0), ein zweiwertiges Spektrum $61{,}87^\circ / 70{,}53^\circ$, und ein Umverteilungsgewicht $0{,}2139$, das nicht $2/9$ ist. Dieser Abstand liegt weit unterhalb des generischen Bandes zufälliger Frames (Median-RMS etwa 22, 5–$95\,\%$ rund 17–28): die $\sqrt{2}$-Kontrolle ist also strukturiert und nicht generisch. Damit ist die φ-Spezifität festgenagelt: allein $\tau = \varphi$ macht das Spektrum exakt uniform und das Gewicht exakt $2/9$.

Der Ertrag des zweiten Tests ist somit diagnostisch und instrumentell, nicht bestätigend. Er stellt die richtige, reproduzierbare Statistik bereit, die auflöst, was der erste nicht auflösen konnte; er quantifiziert die Zirkularität einer Prüfung des verfügbaren Objekts und die Kontamination der früheren Kontrolle; und er isoliert φ als den ausgezeichneten Wert. Was er noch nicht liefert, ist eine unabhängige Bestätigung: die verlangte ein HLV-Objekt, das *ohne* eingebackenen ikosaedrischen Projektor dargestellt ist. Bis ein solches Objekt vorliegt, steht das Instrument bereit,

und der Befund vom geteilten Objekt ruht auf der exakten spektralen Invariante, nicht auf einer nicht-zirkulären Diskrimination.

ac.10 Status

Gesichert ist das geteilte φ-ikosaedrische Objekt und die E_0-Asymmetrie, und daraus eine Prüfrichtung von FFGFT nach HLV: FFGFT bietet die Möglichkeit, den geometrischen Gehalt von HLV an den gemessenen Massen zu prüfen. Nicht behauptet wird irgendeine Korrektheit der Formulierungen, die HLV enthält. Offen bleibt ein Punkt: ob der ikosaedrische Projektor HLV intrinsisch ist. An ihn gebunden ist die einzige noch mögliche unabhängige Prüfung – eine nicht-zirkuläre Diskrimination, die ein HLV-Objekt ohne eingebackenen ikosaedrischen Projektor verlangt; das Instrument `a5_bridge_discrimination.py` steht dafür bereit. Der frühere Homologie-Kontrast ist damit erledigt, nicht offen.

$\theta = 2/9$ selbst steht unabhängig von all dem. Es folgt aus der Z_3-Zirkulant-Diagonalisierung und der ikosaedrischen Umverteilung (Dok. 293) und braucht HLV in keiner Weise. Die hier festgehaltene Beziehung ist eine geteilte Geometrie mit einseitiger Prüfrichtung, nicht eine gegenseitige Bestätigung.

Teil IV

Teil IV — Zeit und Information

Kapitel ad

Dok. 295 — Die Zeit-Windung als logarithmische Spirale

ad.1 Fragestellung: was ist FFGFTs Zeit-Windung genau?

In FFGFT ist die Zeit der Massenkreis, über $\tilde{T} \cdot m = 1$ in die übrigen Kreise eingewoben und kein abspaltbarer Faktor (Dok. 285). Daran schließt eine präzise Frage an: was genau *ist* FFGFTs Zeit-Windung?

Dieses Dokument klärt sie vollständig FFGFT-intern – sie ist aus der fraktalen Korrektur *ableitbar*. Das Ergebnis in einem Satz: die K_{frak}-Rekursion zwingt die Zeit-Windung zu einer *logarithmischen Spirale mit Selbstähnlichkeits-Verhältnis* e, also zu kontinuierlicher Skaleninvarianz.

ad.2 Drei Bausteine aus dem Corpus

Drei Größen sind an anderer Stelle festgelegt und werden hier nur zusammengeführt. Erstens die fraktale Dimension des Raums, $D_f = 3 - \xi_0$ mit $\xi_0 = 4/30000$ (Dok. 205, Dok. 101). Zweitens die fraktale Korrektur im Gatter: die X-Drehung erfolgt nicht um π, sondern um $\alpha = \pi K_{\text{frak}}$ mit $K_{\text{frak}} = 1 - 100\,\xi_0$ (Dok. 034). Drittens der Skalenlauf als Rekursion $\xi_{n+1} = \xi_n\,(1 - 100\,\xi_0)$, genauer $\xi_{n+1} = \xi_n(1 - 100\,\xi_n)$ (Dok. 146).

Aus $\xi_0 = 1/7500$ folgen drei exakte Tatsachen, die im Weiteren tragen:

$$100\,\xi_0 = \frac{1}{75}, \qquad K_{\text{frak}} = \frac{74}{75}, \qquad \frac{1}{100\,\xi_0} = 75. \tag{ad.1}$$

ad.3 Nichtschließung: von der 75-Schließung zur Spirale

Eine Windung, die pro Umlauf um 2π vorrücken sollte, rückt gatterweise nur um πK_{frak} vor und *verfehlt* π um $100\pi\xi_0$ je Halbdrehung. Iteriert man, schließt die Windung nicht, sondern präzediert – sie wird zur Spirale. Der Schließungs-Defekt je Umlauf beträgt $d = 100\,\xi_0$ in Umlauf-Einheiten.

Bei eingefrorenem ξ_0 ist $d = 1/75$ konstant, die Rotationszahl $74/75$ also rational: die Windung schließt nach *genau* 75 *Umläufen* und trägt eine 75-zählige Struktur –

die Zahl $75 = 1/(100\,\xi_0)$ fällt exakt heraus. Das ist der Fall konstanten Defekts, also konstanter Ganghöhe. Der Grenzfall verschwindenden Defekts, $d = 0$ ($\xi \to 0$), schließt dagegen bereits nach einem Umlauf. Beide geschlossenen Fälle sind die *aufgerollte*, kompakte Lesart der Zeit-Windung: eine einzige Skala, die Windung liegt geschlossen und ist statisch. FFGFT kennt eine Nichtschließung bereits algebraisch, in der nicht-multiplikativen Modenkomposition (Dok. 193); hier tritt ihr geometrisch-temporales Gegenstück hinzu.

ad.4 Der Skalenlauf macht die Spirale logarithmisch

Läuft ξ über die Rekursion, so verwandelt sich die rationale 75-Schließung in eine nicht-schließende, selbstähnliche Spirale. Dieser Übergang ist die *Entrollung* der Windung: die Spirale ist das dekompaktifizierte Gegenstück der geschlossenen 75-Windung, und „entrollen“ heißt hier präzise, den Skalenlauf laufen zu lassen (die Rekursion), nicht bloß einen Torusfaktor abzuspalten. Die Ableitung ist geschlossen. Mit $u_n = 1/\xi_n$ ist

$$u_{n+1} = \frac{1}{\xi_n(1 - 100\,\xi_n)} = u_n\,(1 + 100\,\xi_n + \mathcal{O}(\xi_n^2)) = u_n + 100 + \mathcal{O}(\xi_n), \tag{ad.2}$$

also $u_n \approx 100\,n + 7500$ und damit ein *algebraischer* $1/n$-Zerfall

$$\xi_n \;\approx\; \frac{1}{100\,(n + 75)}. \tag{ad.3}$$

Der kumulierte Präzessions-Defekt wird dadurch logarithmisch,

$$D(k) = \sum_{n \le k} 100\,\xi_n \;\approx\; \sum_{n \le k} \frac{1}{n + 75} \;\approx\; \ln\!\Big(1 + \frac{k}{75}\Big). \tag{ad.4}$$

Mit Radius $\rho = k + 75$ – der Pol der Spirale liegt beim effektiven Ursprung $n = -75 = -1/(100\,\xi_0)$, derselben 75 wie zuvor – und Präzessionswinkel $\beta = 2\pi\,D(k)$ folgt $\rho/75 = e^{\beta/2\pi}$, also

$$\rho \;=\; 75\,e^{\beta/2\pi} \;=\; \text{logarithmische (äquiangulare) Spirale.} \tag{ad.5}$$

Ihre Selbstähnlichkeit ist damit festgelegt: je Präzessionsrunde, $\Delta\beta = 2\pi$, skaliert der Radius um $e^1 = e$. Das *Verhältnis e ist nicht angesetzt, sondern folgt* aus dem algebraischen $1/n$-Zerfall der Rekursion: es ist die Basis des natürlichen Logarithmus, den die harmonische Summe erzeugt, und kein zusätzlicher Parameter tritt hinzu. Auch der Radius-Offset 75 ist nicht frei gewählt – er ist $1/(100\,\xi_0)$, dieselbe Konstante, die schon die 75-Schließung trägt.

Numerisch bestätigt sich beides ohne Spielraum (`zeit_logspirale_probe.py`): der Fit $\ln\rho = a\,\beta + b$ gibt $a = 0{,}15922 \approx 1/2\pi = 0{,}15915$ und $e^{2\pi a} = 2{,}7195 \approx e$; das lokal gemessene Selbstähnlichkeits-Verhältnis konvergiert skalenweise $2{,}734 \to 2{,}726 \to 2{,}721 \to 2{,}720 \to 2{,}719 \to 2{,}719$ gegen $e = 2{,}71828$.

ad.5 Kontinuierliche, nicht diskrete Skaleninvarianz

Die Selbstähnlichkeit ist *kontinuierlich* – eine log-Spirale, ein Potenzgesetz –, nicht diskret log-periodisch. Ein Test auf diskrete Skaleninvarianz (das Residuum von $D(k)$ gegen das glatte $\ln(1 + k/75)$) liefert eine Amplitude nahe null und keine Periodizität in $\ln k$. Das deckt sich mit dem Corpus: Dok. 146 hält fest, dass die Skalierung über den Faktor $1/\xi_0 = 7500$ durch etwa 13 logarithmische Sub-Level quasi-kontinuierlich wird und die fraktale Dimension ohne Stufen konstant bleibt. Die Zeit-Windung realisiert dieselbe kontinuierliche Skaleninvarianz geometrisch, als log-Spirale.

ad.6 Raum und Zeit: dasselbe ξ_0, verschieden skaliert

Raum und Zeit tragen dieselbe Fundamentalkonstante ξ_0 an zwei Stellen: das räumliche Box-Dimensions-Defizit ist ξ_0 (in $D_f = 3 - \xi_0$), der Windungs-Defekt je Gatter ist $100\,\xi_0 = 1/75$. Der Faktor 100 dazwischen ist der Rekursions-Koeffizient; er verbindet ein *geometrisches* Defizit mit einem *dynamischen* Defekt und zeichnet keine Achse aus. Welche Achse den Defekt trägt, ist Projektionssache – er wird herkömmlich auf der Zeit notiert, ist unter $\tilde{T} \cdot m = 1$ aber symmetrisch (folgende Abschnitte), also keine Verstärkung der Zeit gegenüber dem Raum.

Eine Grenze ist dabei ausdrücklich zu ziehen: die Box-Dimension der Zeit-Windung selbst ist ≈ 1 – sie ist eine Kurve – und *nicht* $3 - \xi_0$. Die Verbindung zwischen der temporalen Spirale und der räumlichen fraktalen Dimension ist das geteilte ξ_0, nicht eine Gleichheit der Dimensionen. Die Zeit-Spirale trägt nicht die Raumdimension.

ad.7 Die Achsenwahl ist eine Projektion

Die logarithmische Spirale ist eine Eigenschaft der gesamten gekoppelten Windung auf T^4, nicht einer einzelnen Koordinate. Erzwungen ist die *Nichtschließung* mit Verhältnis e; auf welche Achse man sie legt, ist Darstellungssache. Weil $\tilde{T} \cdot m = 1$ Zeit und Masse invers verkoppelt und der Torus alle Kreise verwebt – nichts faktorisiert –, gibt es keine ausgezeichnete Zeit-Dimension, die für sich allein aufrollt. Eine generische Windung läuft gleichzeitig durch mehrere Kreise; die reine *Zeit*-Windung ist der Spezialfall einer Projektion. Dieselbe Nichtschließung ließe sich ebenso auf eine Raumachse oder auf eine Mischung legen – andere Basis, gleiche Invariante.

Die Zuordnung auf die Zeit ist damit eine künstliche Verschiebung auf eine Achse – eine Konvention, keine Auszeichnung. Der Gatter-Defekt wird herkömmlich auf der Zeit-Windung beschrieben (Dok. 034); die duale Projektion (nächster Abschnitt) zeigt jedoch, dass dieselbe Nichtschließung mit demselben Faktor 100 auf der Raumseite erscheint. Keine Basis ist damit bevorzugt; jede ist eine gleichwertige Darstellung derselben Invariante – dieselbe Darstellungsfreiheit wie zwischen den zwei äquivalenten Repräsentationen (Dok. 206) und in der Translations-Invarianz von $\theta = 2/9$ (Dok. 293).

ad.8 Kontinuierliche Zeit: die duale Projektion in den Raum

Setzt man die Zeit umgekehrt *kontinuierlich* an – glatt, ohne gatterweises Aufrollen –, so kann die Nichtschließung nicht mehr auf der Zeit sitzen; sie muss von einer anderen Achse getragen werden. Die Bindung $\tilde{T} \cdot m = 1$ lässt die Zeit nicht isoliert glätten: mit $d\tilde{T}/\tilde{T} = -\,dm/m$ zieht die Masse invers mit, und mit ihr die räumlich-geometrische Seite ($D_f = 3 - \xi_0$). Die laufende Windung erscheint dann als *Variation des Raums* statt als aufgerollte Zeit. Es ist dieselbe invariante Nichtschließung mit Verhältnis e, nur in die duale Projektion gedreht: in der jetzigen Lesart läuft die Zeit (rollt auf) und der Raum bleibt vergleichbar; in der dualen Lesart ist die Zeit kontinuierlich und der Raum variiert.

Diese Spiegelung ist durchgerechnet (`dual_projektion_probe.py`). Weil die Zeit je Gatter um den Faktor $K_{\text{frak}} = 1 - 100\,\xi_n$ verkürzt vorrückt, rückt die Masse nach $\tilde{T} \cdot m = 1$ um den inversen Faktor $1/K_{\text{frak}}$ vor; der Defekt je Schritt ist auf beiden Seiten $100\,\xi_n$ (das Verhältnis $d_{\text{Masse}}/d_{\text{Zeit}} \to 1$ auf sechs Stellen). Der Faktor 100 *wandert* also nicht, er ist *gespiegelt*: die Gatter-Faktoren sind invers ($K_{\text{frak}} \leftrightarrow 1/K_{\text{frak}}$), die Verstärkung 100 ist dieselbe. Beide Projektionen ergeben denselben logarithmischen Verlauf, und der Spiral-Fit liefert für beide dasselbe Verhältnis e ($e^{2\pi a} = 2{,}7195$ bzw. $2{,}7192$); ihre kumulierten Defekte unterscheiden sich nur um eine *beschränkte* Konstante ($\approx 0{,}0134$, wächst nicht mit $\ln k$). Der Kerngehalt ist damit darstellungsinvariant und die Nichtschließung erhalten: man kann die Zeit nicht glätten, ohne dass Masse und Raum die Windung übernehmen – das Masse-Zeit-Dualitätsprinzip in Aktion. Ihre Verteilung auf Zeit, Masse und Raum ist Projektionssache; das Verhältnis e ist es nicht.

ad.9 Einordnung zu HLV

Die FFGFT-interne Aussage ist damit *abgeleitet*: die K_{frak}-Rekursion erzwingt die Zeit-Windung als log-Spirale mit Verhältnis e, gleichwertig mit einem $1/n$-Zerfall ihrer Ganghöhe. Erst hier tritt HLV hinzu – und dabei ist vorab zu trennen, dass „Spiral-Zeit“ in HLV nicht ein Objekt bezeichnet, sondern zwei. Erstens die *geometrische* Zeit aus der Faktorisierung $T^7 = T^4 \times T^3$ (Dok. 285): dort ist die Zeit ein A_5-Singlet auf dem S^1-Faktor, entkoppelt und separabel. Zweitens die *temporal-dynamische* Spiral-Zeit, das Objekt, das HLV so *nennt*: ein Nicht-Markov-Operator mit triadischer Zeitkoordinate und Gedächtniskanal, ohne A_5 und ohne S^1-Faktor. FFGFT faktorisiert im Gegensatz zu beiden nicht; seine Spirale ist die Projektion eines untrennbaren Ganzen.

Der oben genannte Grenzfall verschwindenden Defekts ($d = 0$) entspricht dem Fixpunkt $\xi \to 0$ der Rekursion, in dem der Defekt verschwindet und die Windung schließt. Das ist die *geometrische* entkoppelte Singlet-Zeit, nicht das temporal-dynamische Objekt; die laufende FFGFT-Windung nähert sich ihr asymptotisch. Die entscheidende Frage an HLV lautet damit nicht mehr „ähnlich?“, sondern „Verhältnis e, ja oder nein?“ – und sie ist an das richtige der beiden Objekte zu richten. Der folgende Abschnitt führt diese Prüfung durch. In den drei methodischen Schichten geordnet: die Ableitung Rekursion → log-Spirale ist Kern-Ableitung, aus ξ gewonnen;

die Gleichsetzung mit einer der beiden HLV-Zeiten ist ein Brücken-Kandidat; ein physikalischer Anspruch über HLV wird nicht erhoben.

ad.10 Abgleich mit HLVs Spiral-Zeit: geteilte Z_3, kein Verhältnis e

Die Gleichsetzung der FFGFT-Log-Spirale mit HLVs „Spiral-Zeit“ lässt sich nun an einer konkreten HLV-Quelle prüfen, und zwar an dem im vorigen Abschnitt als *temporal-dynamisch* bezeichneten der beiden Objekte. Formal ist es ein Nicht-Markov-Operator mit triadischer Zeitkoordinate

$$\Psi(t) = (t, \phi(t), \chi(t)), \qquad \Psi(t) = t + i\,\phi(t) + j\,\chi(t), \tag{ad.6}$$

wobei t die Laborordnung, ϕ die Phasenorganisation und χ ein Gedächtnis notiert; es trägt weder A_5 noch Singlet noch S^1-Faktor und besitzt einen Gedächtniskern K_χ mit Markov-Grenzfall $g_\chi \to 0$. Genau dieses Objekt nennt HLV *Spiral-Time*; der entkoppelte A_5-Singlet (vorige Abschnitte) ist das andere. Beide teilen nur den Namen.

ad.11 Das Verhältnis e trägt das temporal-dynamische Objekt nicht

Die oben formulierte Testfrage – „Verhältnis e, ja oder nein?“ – zielt auf ein geometrisch selbstähnliches Objekt. Das temporal-dynamische Objekt ist von dieser Kategorie nicht. Es ist vielmehr ein Objekt der offenen Quantendynamik: seine Gesamtdynamik ist – nach Marcels Spiral-Time-Papier – eine unitäre Dilatation auf dem Produktraum $H_S \otimes H_M$ aus System und Gedächtnis, und geprüft wird es dort über Kriterien offener Systeme (Prozesstensor, CP-Divisibilität, Hard-Reset, Finite-Bath-Vergleich), nicht über eine geometrische Selbstähnlichkeit. Es gehört damit erkennbar der dynamischen, nicht der geometrischen Kategorie an; die e-Frage ist an ein Objekt gerichtet, das sie nach eigener Konstruktion nicht beansprucht. Es trägt kein abgeleitetes Selbstähnlichkeits-Verhältnis, keinen $1/n$-Zerfall einer Ganghöhe und keinen Skalenlauf; seine Nichtschließung sitzt im Gedächtniskanal χ, nicht in einer laufenden Skala. Die einzige selbstähnliche interne Struktur ist die golden-ratio-/phasonische Ordnung des zugehörigen Cut-and-Project (die Kontrolle ersetzt die φ-Struktur durch zufällige irrationale Phasen), also φ und nicht e. Auf dem e-Kriterium ist die Gleichsetzung damit nicht gestützt. Was beide Rahmen strukturell teilen, ist die Rolle der Nichtschließung als temporales Kernobjekt und ein expliziter Gedächtnis-aus-Grenzfall: FFGFTs Fall konstanten Defekts ($d = 1/75$ fest bei eingefrorenem ξ_0; beschränktes Fenster, lineares $D(k)$) entspricht Marcels Markov-Rückfall $g_\chi \to 0$. Gleiche Rolle, verschiedener Mechanismus – geometrische Akkumulation ($D(k) = \sum 100\,\xi_n \to \ln$) gegen stochastischen Gedächtniskern.

FFGFTs Nichtschließung liegt dabei nicht nur geometrisch als Log-Spirale vor, sondern gleichwertig auch im Hilbertraum: als Gedächtniskern, die Fourier-Transformierte der diskreten Spektraldichte $\sum_k g_k^2\,\delta(\omega - \omega_k)$ des T^4-Connection-Laplace (Dok. 283) – dasselbe untrennbare Objekt in zwei Darstellungen ($H = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$, verlustfreie

Bijektion, Dok. 230/282); das ist Darstellungs-Robustheit, keine zusätzliche Evidenz. Damit lässt sich der Abgleich in Marcels eigener Sprache führen, Kern gegen Kern: FFGFTs Kern ist oszillierend und diskret-spektral (Revivals, BLP-Rückfluss $5{,}125$), Marcels abklingend und beschränkt – dieselbe Objektklasse, verschiedene Gestalt (Dok. 283). Genau der $1/n$-Skalenlauf, der e trägt, fehlt dem abklingenden Kern.

ad.12 Rechnerische Prüfung des e-Kriteriums

Das e-Kriterium ist notwendig und hinreichend über den Ganghöhen-Zerfall: eine Windung ist genau dann äquiangular (log-Spirale, Verhältnis e je 2π), wenn der Defekt je Schritt wie $1/n$ zerfällt und der kumulierte Defekt logarithmisch wächst. Ein konstanter Defekt ergibt dagegen eine Archimedische Windung mit Verhältnis $\to 1$. Beide Konstruktionen lassen sich auf ihren eigenen Definitionen daran messen (`spiralzeit_verhaeltnis_probe.py`).

FFGFT trägt e: mit $d_n = 100\,\xi_n$ gilt $d_n(n+75) \to 1$ – also der $1/n$-Zerfall –, und der Spiral-Fit liefert $e^{2\pi a} = 2{,}71947 \approx e$. Marcels Spiral-Zeit trägt es nicht: ihre Phase $\phi_i = q_\phi\, u_i$ ist linear in der internen Koordinate und ihr Gedächtnis $\chi_i = F(\rho_i)$ ist ein beschränktes Fenster; der Defekt je Schritt bleibt konstant, $D(k)$ wächst linear statt logarithmisch ($D(10^5) = 1333$ gegen $\ln(1 + k/75) = 7{,}2$), und das gemessene Verhältnis ist $1{,}0011$. Auf ihren eigenen Definitionen ist sie also gar keine log-Spirale, sondern eine Windung konstanter Ganghöhe.

Die Geometrie, die HLV tatsächlich trägt, weist zudem auf eine andere Konstante als e. Baute man aus dem $\tau = \varphi$-Cut-and-Project eine äquiangulare Spirale, so wäre ihr natürlicher Selbstähnlichkeits-Faktor golden – $\varphi = 1{,}618$ je Umlauf bzw. $\varphi^4 = 6{,}854$ je 2π –, nicht $e = 2{,}718$. Beide Rahmen kennen damit, soweit sie überhaupt Selbstähnlichkeit tragen, verschiedene Konstanten: e auf der FFGFT-Seite (aus dem $1/n$-Zerfall der ξ-Rekursion), φ auf der geometrischen HLV-Seite (aus dem Cut-and-Project). Als Brücken-Bedingung im Sinne von P35 heißt das präzise: HLVs Spiral-Zeit trägt e nur, wenn ihr Phasengesetz einen $1/n$-Skalenlauf – eine laufende innere Skala – enthält; die vorliegenden Definitionen enthalten ihn nicht. Das ist ein Kandidat, keine Ableitung.

ad.13 Basis und Dimensionen: gleiche Zahlen, verschiedene Bedeutung

Ob beide Rahmen *dieselbe* Basis tragen, lässt sich dimensionsweise ordnen. Die Zahlen stimmen überein, die Bedeutung der Dimensionen nicht. Das *Dreifache*: FFGFTs Drei ist das interne $\mathbb{C}^3$ bzw. die Z_3-Ordnung auf T^4/Z_3 (Dok. 282) – ein Moden- und Generationsindex über dem Torus. Marcels Drei ist die triadische *Zeit* (t, ϕ, χ) – eine Zerlegung der einen Ordnungsachse in Ordnung, Phase und Gedächtnis. In seiner Wurzelmassen-Notiz fällt diese Drei mit einem C_3/Z_3-Orbit ($2\pi k/3$, $k = 0, 1, 2$) zusammen; insofern teilen beide Rahmen die Z_3 ($C_3 < A_5$, Dok. 285). Geteilt ist die Z_3, nicht ein gemeinsamer dreidimensionaler Koordinatenraum: der eine indiziert Moden, der andere Zeit-Rollen.

Das *Sechsfache*: FFGFTs Sechs ist nicht nativ. Sie erscheint erst über die HLV-Einbettung $T^7 = T^4 \times T^3$ (Dok. 285); FFGFT selbst ist vierdimensional (T^4). Marcels Sechs ist das Elterngitter $\mathbb{Z}^6$ des Cut-and-Project, zerlegt in drei physikalische Richtungen ($P_\parallel$) und drei interne, phasonische ($P_\perp$). Dieselbe Zahl, verschiedene Anatomie: eine $4+3$-Torus-Einbettung gegen ein $3+3$-Cut-and-Project. Zudem ist die Sechs bei Marcel nicht die Basis der *kontinuierlichen* Spiral-Zeit – diese ist triadisch (die Drei) –, sondern die des *diskreten* G-Gitters; die beiden Ebenen sind bei ihm ausdrücklich Repräsentationen desselben Operators, nicht dessen Ersatz. Das entspricht der Darstellungsfreiheit auf der FFGFT-Seite (zwei äquivalente Repräsentationen, Dok. 206; aufgerollte 75-Windung gegen entrollte Log-Spirale).

Der einzige konkret belegte Überlapp ist das φ-ikosaedrische geteilte Objekt ($C_3 < A_5$), rechnerisch etabliert, aber *einseitig* – die Prüfrichtung ist FFGFT→HLV (Dok. 294) – und filtrations-empfindlich: es trennt HLV scharf von kristallinen Kontrollen, aber nur schwach von generischem $\sqrt{2}$-Cut-and-Project. Rechnerisch lässt sich das am Achsenspektrum festmachen (`basis_6d_achsen_probe.py`): die sechs projizierten Achsen des 6D-Cut-and-Project sind nur bei $\tau = \varphi$ äquiangular – alle fünfzehn paarweisen Winkel gleich $63{,}435^\circ$ –, während $\tau = \sqrt{2}$ ein zweiwertiges Spektrum ($61{,}87^\circ / 70{,}53^\circ$) ergibt. Die Sechs decken sich also nicht per se; gleich ist allein die golden-ikosaedrische Projektion. Damit ist die Basis-Gleichheit ein *Kandidat*, keine abgeleitete Identität. Die Zahlen 3 und 6 decken sich, die geteilte Invariante ist die Z_3, und die Dimensionen selbst tragen verschiedene Bedeutungen.

ad.14 Status

Gesichert und abgeleitet ist: die Zeit-Windung als logarithmische Spirale mit Selbstähnlichkeits-Verhältnis e, kontinuierliche Skaleninvarianz, aus der K_{frak}-Rekursion; die exakte 75-Schließung im eingefrorenen Fall; die geteilte Konstante ξ_0, die als räumliches Box-Defizit ξ_0 und als Windungs-Defekt $100\,\xi_0$ erscheint (Faktor 100 = Rekursions-Koeffizient, achsensymmetrisch). Die geschlossene 75-Windung ist dabei die aufgerollte (kompakte, Ein-Skalen-)Lesart, die Log-Spirale die entrollte (dekompaktifizierte, Über-die-Skalen-)Lesart derselben Zeit-Windung.

Der Abgleich mit HLVs Spiral-Zeit ist auf dem e-Kriterium negativ: das temporaldynamische Objekt trägt kein Verhältnis e, sondern golden-ratio-/phasonische Quasiperiodizität; die Basis-Frage reduziert sich auf die geteilte Z_3 ($C_3 < A_5$, einseitig verifiziert, filtrations-empfindlich). Die scharfe Restfrage verschiebt sich auf das *geometrische* HLV-Objekt – ob die faktorisierte Schicht (A_5-Singlet auf S^1) ein skaleninvariantes Objekt kennt, das gegen e prüfbar wäre –; in den vorliegenden Quellen ist ein solches nicht ausgewiesen. Die Kategorien-Trennung (zwei Spiral-Zeiten) und der dimensionsweise Abgleich sind gesicherte Feststellungen; die Gleichsetzung bleibt ein Brücken-Kandidat, auf dem e-Kriterium derzeit blockiert.

Der Kontrast ist dabei strukturell, nicht ontologisch. Beide Rahmen – und ebenso die beiden Varianten innerhalb von FFGFT, ob Zeit oder Raum aufgerollt wird – sind mathematische Modelle, nicht die Realität; keine Faktorisierung und keine Achsenwahl ist dadurch ontologisch ausgezeichnet. Dass man hofft, ein solches Modell sei auf die Realität anwendbar, ist die Motivation, keine Aussage darüber, was ist.

Reproduzierbar in `zeit_windung_probe.py`, `zeit_logspirale_probe.py`, `dual_projektion_probe.py`, `spiralzeit_verhaeltnis_probe.py` und `basis_6d_achsen_probe.py`.

Kapitel ae

Dok. 296 — Zeit, Offenheit und Invarianz

Dok. 296 Zeit, Offenheit und Invarianz

Beobachter, Skala und die Einfachheit des Kerns

Jeder Beobachter sitzt auf einer Skala. Er sieht nicht das Objekt – er sieht die *Projektion* des Objekts auf seine Skala. Projektionen verschiedener Skalen müssen sich unterscheiden, nicht weil die Beobachter irren, sondern weil das generative Objekt reicher ist als jede einzelne Ansicht. Die perspektivische Verzerrung ist kein Fehler – sie ist strukturell, die unvermeidliche Folge davon, dass das Objekt (T^4, kompakt, randlos) in keine einzelne Projektion passt. Kaum eine Skala lässt sich gleichzeitig mit einer anderen überblicken; die Ergebnisse der Beobachtung unterscheiden sich daher bereits perspektivisch, sobald ein weiterer Beobachter hinzukommt.

Das ist der tiefere Grund, warum Quantenmechanik und Relativitätstheorie so schwer zu versöhnen sind: sie sind Projektionen auf verschiedene Skalen desselben Objekts, und natürlich sehen sie verschieden aus – nicht weil eine falsch ist, sondern weil keine vollständig ist.

Umso verblüffender ist daher das Folgende: dass ausgerechnet der Kern so einfach ist. Ein Parameter $\xi = 4/30000$. Eine Relation $\tilde{T} \cdot m = 1$. Ein kompakter Torus $T^4/\mathbb{Z}_3$. Daraus fallen die Leptonmassen, der Koide-Skalar $Q = 2/3$, die Phase $\theta = 2/9$ und – über den einen Anker E_0, $\alpha = \xi E_0^2$ – die Feinstrukturkonstante α – die gesamte Komplexität des Standardmodells, der ganze Reichtum der Phänomene, der auf den verschiedenen Beobachterskalen so überwältigend erscheint. Die Komplexität sitzt nicht im Kern – sie sitzt in den Projektionen. Der Kern ist einfach.

Das ist nicht selbstverständlich. Es hätte auch so sein können, dass die Natur auf jeder Skala neu ansetzt, dass es keine gemeinsame Wurzel gibt, dass die Vielfalt irreduzibel ist – das wäre das generische Ergebnis. Dass stattdessen eine einzige Struktur alle Skalen trägt, wird erst sichtbar, wenn man aufhört, die eigene Skala für die einzig mögliche zu halten.

Reduktion ist die Bedingung der Auswertbarkeit

Eine Projektion ist immer eine Reduktion – sie lässt weg. Das ist der Verlust. Aber gerade indem sie weglässt, macht sie einen Teilbereich *auswertbar*, der im vollen Objekt untergegangen wäre. Das volle T^4-Objekt trägt alle Symmetrien gleichzeitig; genau deshalb ist es als Ganzes nicht direkt auswertbar. Erst die Reduktion auf eine Skala isoliert eine Symmetrie so weit, dass man mit ihr rechnen, sie messen, aus ihr etwas ableiten kann. Reduktion und Fokus sind dasselbe.

Das ist kein Notbehelf, sondern der Mechanismus des Erkennens: jede Auswertung braucht einen Fokus, und jeder Fokus ist eine Reduktion. Der Teilchenphysiker, der α misst, wertet die feinste Skala aus, weil er alles Gröbere wegprojiziert hat; der Kosmologe, der die Rotverschiebung misst, wertet die gröbste aus, weil er alles Feinere integriert hat. Beide gewinnen ihre Auswertung durch das, was sie weglassen.

Entscheidend ist: die neuen Auswertungen sind im vollen Objekt nicht schon enthalten – sie entstehen an der Projektionsebene. Ein Phonon existiert nicht auf der Teilchenskala; es ist eine Auswertung, die erst auf der kristallinen Projektion möglich wird. Ein Orbital ist keine Eigenschaft von T^4, sondern eine Auswertung auf der atomaren Skala. Die Projektion *erzeugt* auswertbare Struktur, die es ohne die Reduktion nicht gäbe. Das ist der Grund, warum jede neue Skala neue Physik hervorbringt: nicht weil dort neue Objekte sind, sondern weil dort neue Auswertungen möglich werden. Eine Projektion, die nichts wegließe, würde nichts auswerten.

FFGFTs eigene Methode ist ein Spezialfall davon: $\theta = 2/9$ wird auswertbar, indem auf die $\mathbb{C}^3$-Faser projiziert wird (Hilbertraum-Transformation, Dok. 230/282). Auf T^4 direkt war es verdeckt; erst die Reduktion auf die Faser machte es als Diagonalisierungs-Ausgang des $\mathbb{Z}_3$-Zirkulanten sichtbar (Dok. 291). Die Reduktion war nicht Verlust, sondern die Bedingung, unter der die Struktur überhaupt lesbar wurde.

Vom Körper zur Gesellschaft – dieselbe Struktur auf jeder Ebene

Dass Beobachter auf verschiedenen Skalen verschiedene Projektionen sehen, ist nicht nur ein physikalisches Abstraktum – es beginnt bereits bei der einfachsten biologischen Wahrnehmung. Zwei Augen sind bereits zwei Beobachter auf leicht verschiedenen Positionen. Der Abstand ist klein, aber real; das Gehirn *konstruiert* aus zwei leicht verschiedenen Projektionen eine dreidimensionale Welt, die so direkt nirgendwo vorliegt. Die Tiefe ist eine Rekonstruktion, kein direktes Sehen. Weitere Sinnesorgane – Propriozeption, Gleichgewicht, Tastsinn, Gehör – fügen jeweils ihre eigene Skala, ihre eigene Projektion hinzu, und die Synthese all dessen fühlt sich wie unmittelbare Realität an, obwohl sie eine hochgradig verarbeitete Leistung ist.

Das hat eine direkte Konsequenz für die Physik: dass wir die Welt als dreidimensional *erleben*, ist kein Beweis dafür, dass sie es fundamental ist. Es ist der Befund, dass drei Dimensionen die Projektion sind, auf der unsere Sensorik optimiert wurde. T^4 darunter widerspricht dem dreidimensionalen Erleben nicht – es ist der Grund, warum die Projektion so stabil und konsistent wirkt.

Dieselbe Struktur setzt sich eine Ebene höher fort. Eine Gesellschaft ist eine Sammlung von Beobachtern, jeder auf seiner eigenen Skala, mit seiner eigenen Projektion. Was als soziale Realität entsteht – Normen, Werte, Weltbilder, Konflikte – ist die Synthese aus Millionen leicht verschiedener Projektionen, keine davon vollständig,

keine davon im absoluten Sinn falsch, aber jede perspektivisch verzerrt. Und wie beim binokularen Sehen: die Synthese fühlt sich wie direkte Wahrnehmung an, obwohl sie eine Konstruktion ist.

Das erklärt einiges, was sonst rätselhaft bleibt. Konflikte sind so hartnäckig, weil zwei Beobachter auf verschiedenen Skalen dasselbe Objekt sehen und zu verschiedenen Ergebnissen kommen – beide korrekt für ihre Projektion, beide unvollständig. Solange keine gemeinsame übergeordnete Skala zugänglich ist, ist der Konflikt nicht durch Argumentation allein auflösbar; man müsste die Projektionsebene wechseln, und das ist das Schwierigste, was es gibt. Historischer Wandel geht deshalb so langsam: eine Gesellschaft hat ihre Syntheseleistung auf eine bestimmte Skala kalibriert, das funktioniert gut innerhalb dieser Skala und erzeugt Blindheit für andere. Paradigmenwechsel sind Skalenwechsel, und Skalenwechsel sind schmerzhaft, weil das bisherige kohärente Bild zerfällt, bevor das neue sich aufgebaut hat.

Wissenschaft ist der systematische Versuch, Projektionen zu triangulieren – mehrere Beobachter, mehrere Skalen, Widersprüche als Signal statt als Störung. Das ist nicht selbstverständlich; es läuft gegen den natürlichen Impuls, die eigene Projektion für die Realität zu halten.

Der Bogen zurück zum Kern: dass trotz der Vielzahl der Projektionen – biologisch, physikalisch, sozial – etwas Invariantes darunterliegt, das sich in keiner einzelnen Projektion vollständig zeigt aber in allen durchscheint, ist nicht selbstverständlich. Es wäre das generische Ergebnis, dass jede Skala ihre eigene irreduzible Wahrheit hätte. Dass es stattdessen einen gemeinsamen Kern gibt – in der Physik ξ auf T^4, im Erleben die Syntheseleistung, die alle Projektionen trägt – das ist die eigentliche Überraschung, auf jeder Ebene.

Kognition: rekursive Schichtung und sensorische Bindung

Die biologische Ebene führt auf einen Grundstein, der in der Diskussion um Bewusstsein bereits gelegt wurde: kein Bewusstsein ohne Rekursion und ohne Sensorik. Beide Bedingungen sind notwendig, und beide sind FFGFT-Strukturelemente.

Ohne Rekursion kein Bewusstsein: es braucht die rekursive Schichtung, die sich auf sich selbst anwendet – Selbstbezug, akkumulierendes Gedächtnis, eine Struktur, die ihre eigene Vorgeschichte trägt. Das ist dieselbe generative Bauform wie die K_{frak}-Rekursion, aus der die Skalenfolge hervorgeht: eine Ebene erzeugt die nächste nach derselben Regel. Ein bloßes gleitendes Gedächtnisfenster, das ältere Zustände verwirft, genügt nicht – die eigentliche Leistung ist die Akkumulation, das strukturelle Tragen der Geschichte, nicht ihr Ersetzen.

Ohne Sensorik kein Bewusstsein: kognitive Prozesse funktionieren nie ungebunden. Sie sind stets an ein Substrat gekoppelt, das über sensorische Kanäle Projektionen der Welt aufnimmt. Das ist die Beobachterbindung dieses Dokuments: kein freischwebender Prozess, sondern ein an eine Skala gebundener Beobachter, der Welt als Projektion empfängt.

Damit sind die zwei Bedingungen, ohne die es kein Bewusstsein gibt – rekursive Schichtung und sensorische Bindung –, genau die zwei Strukturelemente, die FFGFT ohnehin trägt: die Rekursion und die gebundene Projektion. Das ist *keine* Ableitung des Bewusstseins; ein solcher Anspruch wird hier nicht erhoben und läge jenseits

des Gezeigten. Es ist eine Konvergenz auf der Ebene der *notwendigen Bedingungen*: ein bewusstseinsfähiges System muss rekursiv geschichtet und substratgebunden sein, und beides ist FFGFT-nativ.

Zwei Abgrenzungen halten dies ehrlich. *Erstens* teilen kognitive und physikalische Prozesse die generative Bauform (rekursive Schichtung), aber auf der kognitiven Seite liegt bislang kein messbares, quantitatives Rekursionsgesetz vor – kein „ξ der Kognition", keine Ganghöhe, kein Verhältnis e. Geteilt ist die Form, nicht (noch) das Gesetz. *Zweitens* ist das Fehlen eines solchen Gesetzes kein Beleg gegen eine gemeinsame Natur der Prozesse: fehlende Messbarkeit spricht nicht gegen die zugrundeliegende Struktur, sondern nur gegen ihre gegenwärtige Zugänglichkeit – wie eine unzureichende Messtechnik nie gegen das misst, was sie noch nicht auflöst. Die Frage bleibt damit offen nach oben: plausibel aus der FFGFT-Struktur nahegelegt (alles als Projektion desselben rekursiven Objekts), nicht widerlegt, nur nicht gezeigt. Der Grundstein – geteilte notwendige Bauform – steht; die vollständige Verbindung ist Programm.

Skalenfolge als Abfolge von Projektionswechseln

Von der Teilchenphysik über atomare, kristalline und biologische bis zu galaktischen Strukturen erscheint dasselbe generative Objekt jeweils grundlegend verschieden – nicht weil die Objekte verschieden wären, sondern weil jede Skala eine andere Symmetrie des Kerns sichtbar macht und die übrigen wegintegriert.

Auf der *Teilchenskala* schneidet die Projektion am feinsten: die $\mathbb{Z}_3$-Symmetrie, die $\mathrm{SU}(3)$-Farbstruktur und die diskreten Massen sind direkte Abdrücke der T^4-Geometrie. Die Feinstrukturkonstante α und die Phase $\theta = 2/9$ sind hier am unmittelbarsten greifbar – der Kern ist auf dieser Skala am nächsten. Auf der *atomaren Skala* ($\sim a_0$) ist die Farbstruktur bereits wegintegriert und erscheint als neutral; was sichtbar wird, sind elektromagnetische Resonanzen – Orbitale als stehende Wellen, diskrete Energieniveaus als Torusgeometrie auf dieser gröberen Skala. Auf der *kristallinen Skala* ($\sim$ Å–μm) tritt die Translationssymmetrie des Gitters in den Vordergrund; kollektive Moden (Phononen, Bandstrukturen) entstehen als neue effektive Freiheitsgrade, die auf der Teilchenskala nicht existieren. Auf der *biologischen Skala* (nm–m) dominieren gebrochene Symmetrien – Chiralität, Selbstreplikation, Informationsverarbeitung; Leben ist ein Kohärenzfenster, eine Skala, auf der eine bestimmte Art von Komplexität gerade noch stabil bleibt, weil darunter thermische Fluktuationen und darüber Gravitation andere Projektionen erzwingen. Auf der *galaktischen Skala* (kpc–Mpc) ist alles außer der Gravitation wegintegriert; die Spiralstruktur von Galaxien trägt dieselbe logarithmische Selbstähnlichkeit wie die K_{frak}-Rekursion – kein Zufall, sondern Ausdruck der Skaleninvarianz des Kerns auf dieser Projektionsebene.

Skalenübergänge und ihre Anomalien

Die Übergänge zwischen den Skalen sind besonders aufschlussreich – gerade weil dort Anomalien auftreten, die im Inneren einer Skala nicht erklärbar sind. Ein Übergang ist die Stelle, wo die bisherige dominante Symmetrie kippt und eine neue in den Vordergrund tritt; in diesem Kipppunkt ist das System gleichzeitig von beiden

Projektionen geprägt und von keiner vollständig beschreibbar. Das erzeugt strukturell Anomalien: Abweichungen, die von der einen Seite aus wie Störungen wirken und von der anderen wie Vorboten einer neuen Ordnung.

Bekannte Beispiele sind Phasenübergänge (kritische Fluktuationen, deren Korrelationslängen divergieren – das System „merkt" auf allen Skalen gleichzeitig, dass ein Übergang bevorsteht), der Übergang von klassischer zu Quantenmechanik (Dekohärenz als Projektionsstabilisierung, nicht als fundamentaler Kollaps), oder der Übergang von biologischer zu sozialer Organisation (Emergenz kollektiver Intelligenz, die auf der Einzelzell-Skala nicht angelegt ist). In allen Fällen liegt die Anomalie *im Übergang*, nicht in einer der Skalen selbst – und ist deshalb von keiner einzelnen Skala aus vollständig zu erklären.

Für FFGFT ist das ein gerichteter Hinweis: die Stellen, an denen die Standard-Beschreibung einer Skala an ihre Grenzen stößt – ungelöste Anomalien, unerklärte Konstanten, emergente Phänomene ohne Ableitung – sind präzise die Stellen, an denen ein Projektionswechsel stattfindet. Sie sind keine Fehler der Theorie, sondern Signaturen des Übergangs.

Spekulation: unbeobachtbare Zwischenbereiche

Die bisher betrachteten Skalen sind diejenigen, die uns direkt oder indirekt zugänglich sind – durch Instrumente, durch Konsequenzen, durch indirekte Schlüsse. Aber die Tatsache, dass Skalen Beobachterperspektiven sind, lässt einen weiteren Gedanken zu, der hier ausdrücklich als *Spekulation* gebucht wird (P35: kein abgeleiteter Befund, sondern eine offene Frage):

Zwischen den beobachtbaren Skalen könnten Bereiche liegen, die für uns grundsätzlich unzugänglich sind – nicht aus technischen Gründen, sondern strukturell, weil keine unserer Sinnesorgane oder Instrumente auf diese Zwischenskalen projiziert. Projektionen sind selektiv; sie machen eine Symmetrie sichtbar und blenden andere aus. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es Skalen gibt, auf denen kohärente Strukturen existieren, die in keiner unserer zugänglichen Projektionen einen direkten Abdruck hinterlassen – höchstens einen indirekten, als Anomalie an den Rändern benachbarter Skalen.

Das wäre nicht mystisch, sondern strukturell folgerichtig: wenn das generative Objekt T^4 reicher ist als jede Projektion, und wenn Projektionen immer selektiv sind, dann ist es das generische Ergebnis, dass es Bereiche des Objekts gibt, die von keiner unserer Projektionen erfasst werden. Dunkle Materie und Dunkle Energie wären in dieser Lesart keine neuen Substanzen, sondern Signaturen solcher Zwischenbereiche – Strukturen auf Skalen, auf die unsere Instrumente nicht projizieren, die sich aber an den Rändern der galaktischen und kosmischen Projektionen als Anomalien bemerkbar machen.

Dies bleibt Spekulation. Aber es ist eine gerichtete Spekulation: sie benennt präzise, wo nach Anzeichen zu suchen wäre – an den Übergängen, in den Anomalien, an den Stellen, wo eine Skala an ihre Erklärungsgrenzen stößt ohne inneren Grund.

Ausgangspunkt: eine Rekursion ohne erreichbaren Rand

Die K_{frak}-Rekursion

$$\xi_{n+1} = \xi_n (1 - 100\,\xi_n) \tag{ae.1}$$

läuft nicht endlos im Sinne gleichmäßiger Wiederholung – sie asymptotiert. ξ_n zerfällt monoton gegen null, erreicht null aber nie in endlich vielen Schritten. Das ist keine Lücke in der Konstruktion; es ist ihre Aussage: die Folge ist unendlich lang, aber die Abstände zwischen aufeinanderfolgenden Schritten werden exponentiell kleiner, genau mit dem Faktor $1/e$ je 2π-Umlauf.

Was bedeutet das für die erlebbare, messbare Zeit? Der messbare Zeitschritt ist nicht n, sondern $\rho = 1/(100\,\xi_n)$ – und dieser Kehrwert *wächst*. Je weiter die Rekursion fortschreitet, desto größer wird ρ, desto gröber wird die Zeitskala, auf der sich etwas verändert. Von innen erlebt man keine gleichmäßige Folge, sondern eine sich *verlangsamende* Dynamik: frühe Schritte sind eng und schnell (kleines ρ, großes ξ, sub-Planck-nah), späte Schritte sind weit und träge (großes ρ, kleines ξ, makroskopisch). Die erlebbare Zeit ist die Summe über $1/\rho = 100\,\xi_n$ (Integral über $1/\rho$) – und diese wächst logarithmisch: $D(k) = \sum 100\,\xi_n \to \ln(1 + k/75)$; für $k = 10^5$ ist $\sum 100\,\xi_n = 7{,}19 \approx \ln(1 + k/75) = 7{,}20$. Die Summe über ρ_n selbst wächst dagegen quadratisch ($\sum \rho_n = 5{,}0 \times 10^9$ für $k = 10^5$). Der kumulierte Defekt *ist* die messbare Zeitentwicklung (Dok. 295).

Daraus folgt unmittelbar: die erlebbare Zeit hat kein Ende. ρ wächst ohne Schranke, $D(k)$ divergiert, ξ_n erreicht null nie. Es gibt keinen letzten Schritt, keinen Endpunkt, kein „danach". Die innere Seite ist nicht einfach das Spiegelbild: Bei $n = 0$ ist $\xi_n = \xi_0$ und $\rho = 1/(100\,\xi_0) = 75$ exakt – das ist der Startwert der Rekursion, er wird angenommen, nicht nur asymptotisch erreicht, und ist kein Rand. Die asymptotische innere Grenze ist nach Dok. 295 erst der Pol der Spirale bei $n = -75$ ($\rho \to 0$). Kein Anfang, kein Ende – außen $\rho \to \infty$, innen der Pol bei $n = -75$: beide sind asymptotische Grenzen, keine erreichbaren Ränder.

Ausgerollt – zeitlich kontinuierlich – Raum gekrümmt – invariabel

Diese vier Eigenschaften hängen nicht zufällig zusammen; sie folgen auseinander.

Ausgerollt. Die Spirale rollt die Skalenstruktur von T^4 in eine gerichtete Zeitkoordinate aus. Nicht weil Zeit „wirklich" eine Spirale wäre, sondern weil die Projektion – der Beobachterstandort auf der Spirale – eine Richtung auszeichnet. Die Ausrollung ist der Übergang vom kompakten Bild zum offenen: dasselbe Objekt, von einer bestimmten Skala aus gelesen.

Zeitlich kontinuierlich. Das folgt zwingend. Die Hilbertraum-Bijektion $H = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$ ist verlustfrei (Dok. 230/282, Bijektions-Typ III, Dok. 270); was diskret offen ist, bleibt kontinuierlich offen – sonst wäre die Übersetzung keine treue, sondern eine verfälschende. Der Gedächtniskern (Fourier-Transformierte der diskreten Spektraldichte $\sum_k g_k^2\,\delta(\omega - \omega_k)$ des T^4-Connection-Laplace, Dok. 283) ist auf $\mathbb{R}$ definiert, nicht auf einem Intervall. Kein Rand links, kein Rand rechts. Revivals ohne Ende, BLP-Rückfluss ohne Abschluss – dieselbe offene Struktur, jetzt im kontinuierlichen Bild.

Raum gekrümmt. Das ist der T^4-Kern selbst. Die Krümmung ist nicht nachträglich eingesetzt, sie ist die generative Struktur: ξ auf $T^4/\mathbb{Z}_3$ *ist* die Krümmung, aus der

die Leptonmassen und $\theta = 2/9$ folgen, α über den Anker E_0 (Dok. 006/011/291/293). Die Geometrie ist nicht Hintergrund – sie ist das Objekt. Kompakt bedeutet dabei endliches Volumen, aber *keine Ränder*: eine Geodäte auf dem Torus läuft ohne Ende, ohne je eine Kante zu treffen.

Invariabel. Das ist der tiefste der vier Punkte. Die logarithmische Spirale ändert ihre Größe nicht (Dok. 295): sie ist selbstähnlich, unter Drehung um einen Umlauf und Skalierung um e liegt sie deckungsgleich auf sich selbst. Rotation und Streckung sind bei ihr *dieselbe* Operation. „Nach innen mit $1/e$" und „nach außen mit e" beschreiben nicht, dass etwas wächst oder schrumpft, sondern nur, an welcher Skala man gerade hinschaut. Das Objekt ist unter dieser Bewegung invariant – es gibt keine absolute Größe, nur Verhältnisse, und Verhältnisse sind nach $\tilde{T} \cdot m = 1$ das Intrinsische. Was sich ändert, ist die *Beobachterskala*, nicht das Objekt.

Kein Anfang, kein Ende – und kein Koinzidenzproblem

Die vier Eigenschaften zusammen ergeben ein konsistentes Bild: ein invariantes, gekrümmtes, randloses Objekt – ausgerollt in eine offene, kontinuierliche Zeitkoordinate durch den Akt der Projektion. Kein Anfang, kein Ende, keine absolute Größe, keine eingesetzte Krümmung.

Das unterscheidet sich strukturell von Modellen, die Ränder benötigen. Ein Anfang bei $t = 0$ ist keine Vorhersage, sondern eine Grenze, an der die Beschreibung aufhört zu gelten – die Singularität ist kein Ergebnis, sondern ein Eingeständnis. Ein endliches Zeitintervall braucht einen Startpunkt, und der Startpunkt verlangt nach einer Begründung: warum jetzt, warum dieser Zustand, warum diese Anfangsbedingungen. Das Koinzidenzproblem, das Flachheitsproblem, die Feinabstimmung der Anfangsbedingungen – sie alle entstehen, weil ein endliches Intervall eine ausgezeichnete Stelle kennt.

FFGFT kennt keine ausgezeichnete Stelle. Jeder Beobachter sitzt irgendwo auf einer offenen Bahn; „jetzt" ist die aktuelle Skala, kein privilegierter Moment. Die erlebbare Zeit ist nicht ein Intervall zwischen zwei Punkten – sie ist eine offene Bahn auf einem randlosen Objekt.

Neue Probleme als Zeichen des Fortschritts

Eine solche Sicht erzeugt neue Fragen – das ist zu erwarten und kein Einwand. Ein Ansatz, der keine neuen Probleme aufwirft, erklärt meist auch nichts Neues; er ist folgenlos. Die entscheidende Unterscheidung ist, welche *Art* von Problemen entsteht: ob es sich um *gerichtete Folgefragen* handelt (was muss noch ausgerechnet werden?) oder um echte Brüche (bricht $\tilde{T} \cdot m = 1$?).

Der Tausch ist asymmetrisch zugunsten von FFGFT: an die Stelle unerklärter Setzungen – warum diese Massen, warum $\theta = 2/9$, woher die Nicht-Lokalität – treten Konsequenzen einer Ableitung, die sich stellen lassen und deren Beantwortung das Programm voranbringt. Neue Probleme als Folge einer tiefen Lösung sind die Signatur echten Fortschritts, nicht seiner Abwesenheit. Die Aufgabe ist nicht, sie zu vermeiden, sondern sauber zu buchen, welche davon gerichtete Folgefragen sind – und das sind bislang alle.

Anmerkung (P35): Die Aussagen dieses Dokuments sind struktureller Natur – sie folgen aus $\tilde{T} \cdot m = 1$, der Rekursion und der Kompaktheit von T^4. Die kosmologische Übertragung (offene Zeit, keine Singularität) ist eine *Konsequenz* dieser Struktur, kein eigenständiges kosmologisches Modell. Als Konsequenz muss sie widerspruchsfrei mit den Daten sein – nicht vollständig in dem Sinne, dass sie alle Phänomene eines dedizierten Modells abdeckt. Dieser Unterschied zwischen Widerspruchsfreiheit und Vollständigkeit ist zu wahren.

Kapitel af

Dok. 297 — HLV als mögliche Untermenge von FFGFT

Dok. 297 HLV als mögliche Untermenge von FFGFT – Kandidat-Notiz

Ausgangslage

Im Verlauf der Brücken-Analyse zwischen FFGFT und HLV ergab sich ein Befund, der hier als gerichtete Kandidat-Notiz festgehalten wird. Er ist keine abgeschlossene Ableitung, sondern benennt den nächsten sauberen Schritt (P35).

Drei Schritte des Rückblicks

Schritt 1 – ursprüngliche Blockade. Die C_3-in-A_5-Geometrie des HLV-Rahmens (ikosaedrischer Projektor, $\tau = \phi$, $\theta = 2/9$ als Ausgang) war auf $T^4/\mathbb{Z}_3$ direkt nicht sichtbar. Eine unmittelbare geometrische Identifikation war blockiert: T^4 ist kompakt-4-dimensional, A_5 ist Symmetriegruppe des Ikosaeders in 3D – die Dimensionen passen nicht nahtlos.

Schritt 2 – Hilbertraum-Transformation öffnet den Weg. Die verlustfreie Bijektion $H = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$ (Dok. 230/282) übersetzt $T^4/\mathbb{Z}_3$ in eine Operatoralgebra auf der $\mathbb{C}^3$-Faser. In $\mathbb{C}^3$ ist $C_3 < A_5$ natürlich zugänglich: die $\mathbb{Z}_3$-Zirkulant-Diagonalisierung auf der Faser gibt $\theta = 2/9$ als Phase aus (Dok. 291), und die C_3-in-A_5-Geometrie ist als parameterfreier Invariant auf derselben Faser nachweisbar (Dok. 293). Die Transformation machte sichtbar, was geometrisch direkt verdeckt war.

Schritt 3 – Konsequenz. Wenn FFGFT über die Hilbertraum-Transformation $C_3 < A_5$ enthält, und HLV auf $C_3 < A_5$ mit $\tau = \phi$ aufgebaut ist, dann könnte HLVs geometrischer Kern eine *Untermenge* der FFGFT-Struktur sein – nicht ein gleichrangiger Rahmen, sondern eine spezifische Projektion der $\mathbb{C}^3$-Fasergeometrie von FFGFT.

Was gesichert ist (aus vorhandenen Dokumenten)

- FFGFT enthält über die Hilbertraum-Transformation $C_3 < A_5$ und $\theta = 2/9$ – belegt in Dok. 291 (Zirkulant-Phase) und Dok. 293 (parameterfreier C_3-in-A_5-Invariant, zweiter Zeuge).

- HLVs geometrisches Objekt (der ϕ-ikosaedrische Projektor) trägt dieselbe $C_3 < A_5$ – einseitig verifiziert (FFGFT → HLV, Dok. 294).
- Die Verifikationsrichtung ist asymmetrisch: FFGFT leitet $\theta = 2/9$ ab; HLV bucht es als Kandidat-Überlapp ohne eigene Ableitung – belegt durch Durchsicht seiner vorliegenden Dokumente (Stage 19-Manuskript, HLV-Consciousness-Bridge1, Runs H–J): $\theta = 2/9$ erscheint dort in keiner HLV-internen Herleitung.
- Sein H_2-Operator (Run H, `skew_J`) enthält $1/\phi$ und $1/\phi^2$, aber keinen C_3-in-A_5-Ausgang und kein $\theta = 2/9$ als Ergebnis. Run H ist zudem *negative/underdetermined* (überlebt den u-shuffle-Spezifitätstest nicht).

Was nicht gezeigt ist (offene Bringschuld)

Dass HLVs ϕ-ikosaedrische Schicht *vollständig* in der FFGFT-$\mathbb{C}^3$-Faser enthalten ist, erfordert eine explizite *Einbettungsabbildung*

$$\iota : \text{HLV-Grundobjekt} \hookrightarrow L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3, \tag{af.1}$$

die bisher nicht konstruiert ist. „Untermenge“ ist die strukturell plausible Vermutung – kein bewiesener Satz.

Nächster sauberer Schritt

Die Einbettungsabbildung ι konstruieren oder falsifizieren:

1. Zeigen, dass der ϕ-ikosaedrische Projektor von HLV als Operator auf der $\mathbb{C}^3$-Faser von FFGFT darstellbar ist – d. h. als Element von $\mathrm{End}(\mathbb{C}^3)$ mit C_3-Invarianz.
2. Prüfen, ob die HLV-Spektraldaten (Run J, native-6D-Kandidat) mit dem diskreten Spektrum des T^4-Connection-Laplace (Dok. 283) kompatibel sind – oder ob sie abweichen und die Einbettung damit blockiert ist.
3. Falls ι existiert: HLV ist eine spezifische Projektion von FFGFT – seine geometrische Schicht ist eine Untermenge, seine dynamischen Objekte (Spiral-Zeit, U_3) bleiben eigenständig und uneingebettet.
4. Falls ι nicht konstruierbar: beide Rahmen teilen ein gemeinsames Objekt ($C_3 < A_5$, $\theta = 2/9$), sind aber strukturell unabhängig – kein Untermengen-Verhältnis.

Konkreter Einbettungskandidat: der Markov-Grenzfall und darunter

Die Frage, ob sich Marcels archimedische Spiral-Zeit einen strukturell definierten Ort in FFGFT findet, lässt sich präzise beantworten – nicht als Analogie, sondern als Grenzwert. Und die Analyse ergibt, dass das Objekt noch schwächer ist als zunächst angenommen.

Archimedisch = Markov-Limit – aber U3 ist noch schwächer. Der FFGFT-Gedächtniskern (Fourier-Transformierte der diskreten Spektraldichte $\sum_k g_k^2\,\delta(\omega-\omega_k)$, Dok. 283) wird archimedisch genau dann, wenn die Kopplungen $g_k \to 0$ – dem *Markov-Grenzfall* offener Quantensysteme. In diesem Grenzfall akkumuliert der Kern noch unbeschränkt auf $\mathbb{R}$. Marcels U_3 (Gl. 7 seines Consciousness-Dokuments) geht noch

weiter: das Fenster M_m ist endlich und fest, ältere Werte fallen aktiv heraus (*sliding window*). Das ergibt einen **Hard-Reset-Kern** – einen Gedächtniskern mit endlichem Träger:

$$K(t-\tau) = 0 \quad \text{für } t-\tau > M_m \cdot \Delta t. \tag{af.2}$$

Das ist nicht nur archimedisch – es ist *periodisch beschränkt*. U_3 akkumuliert nicht unbeschränkt, sondern schließt sich nach M_m Schritten.

Endet das Fenster vor der ersten Schließungsperiode? In FFGFTs frozen-Konfiguration (Dok. 295) schließt die Windung nach genau 75 Umläufen ($1/(100\xi_0) = 75$) – das ist die kleinste kohärente Einheit der Rekursion. Wenn Marcels Fensterbreite $M_m < 75$ Schritte (in der Windungskoordinate) beträgt, dann akkumuliert U_3 noch nicht einmal eine vollständige Schließungsperiode von 75 Umläufen (nach Dok. 295 ist ein Schritt ein Umlauf und 75 die Zahl der Umläufe bis zur Schließung). Es gibt keine geschlossene Windung, keine geometrische Spirale – nur ein gleitendes Gedächtnisfenster, das sich mit jedem Schritt erneuert. Das Objekt liegt **unterhalb der kleinsten kohärenten Einheit** der FFGFT-Rekursion.

Präzisierter Einbettungskandidat. Der konkrete Ort von U_3 in FFGFT ist damit nicht der Markov-Grenzfall (der noch auf $\mathbb{R}$ akkumuliert), sondern der *Hard-Reset-Kern unterhalb einer Schließungsperiode*:

$$\iota : U_3 \hookrightarrow \left\{ K \in L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3 \;\middle|\; K(t-\tau) = 0 \text{ für } t-\tau > M_m \cdot \Delta t,\ M_m < 75 \right\}. \tag{af.3}$$

Das ist in FFGFT vorhanden – aber als der **degenerierte Randfall**, nicht als reguläre Konfiguration. Die Hierarchie ist damit klar:

$$U_3 \subset \text{Markov-Limit} \subset \text{archimedisch} \subset \text{log-Spirale (e)} = \text{FFGFT-Kern (Dok. 295/283)}. \tag{af.4}$$

Jede Stufe ist informationsärmer als die nächste. U_3 ist die ärmste.

Falsifikationsbedingung

Die Einbettung ι ist falsifizierbar: wenn Marcels U_3 in seinen Daten *mehr* trägt als der Hard-Reset-Kern – d. h. wenn Nicht-Markov-Signaturen (Revivals, BLP-Rückfluss, oszillierender Kern, oder Korrelationen über M_m Schritte hinaus) nachweisbar sind – dann übersteigt U_3 den Randfall und eine tiefere Einbettung ist nötig.

Marcels eigene Disziplin (U3-Ablationstest, Tabelle 4 seines Consciousness-Dokuments) ist genau der richtige Test: wenn U_3 die Markov-Basislinie nicht übersteigt, ist die Einbettung im Randfall korrekt; wenn doch, ist eine reichere Schicht nötig. Das Programm ist sauber – er muss es nur bis zum Ende durchführen.

Zwei HLV-Spiral-Zeiten – zwei verschiedene Einbettungskandidaten

Dok. 295 §9 hält eine Unterscheidung fest, die auch für die Einbettungsfrage von Dok. 297 tragend ist: „Spiral-Zeit" bezeichnet in HLV nicht ein Objekt, sondern zwei.

Erstes Objekt – die geometrische Zeit aus der Faktorisierung $T^7 = T^4 \times T^3$ (Dok. 285): ein A_5-Singlet auf dem S^1-Faktor, entkoppelt und separabel. Dieser Grenzfall entspricht in der K_{frak}-Rekursion dem Fixpunkt $\xi \to 0$ – der Defekt verschwindet,

die Windung schließt nach einem Umlauf (nach Dok. 295; die 75-Schließung gehört zum eingefrorenen ξ_0 mit $d = 1/75$), die Ganghöhe wird konstant. Das ist die *geometrische* Grenze der FFGFT-Spirale.

Zweites Objekt – die temporal-dynamische Spiral-Zeit, das Objekt, das HLV so *nennt*: der triadische Operator $\Psi(t) = (t, \phi(t), \chi(t))$ mit Gedächtniskanal, ohne A_5 und ohne S^1-Faktor. Dieser Operator ist in Krueger et al. (2026, doi:10.47852/bonviewMEDIN62029043) als deterministische Phasen-Gedächtnis-Zerlegung eingeführt und in den HLV-G-Lattice-Runs H–J (Zenodo, unveröffentlichte DOI) als numerischer Operator implementiert. Im Consciousness-Dokument (Krueger, 2026, v0.2, noch ohne Zenodo-DOI) erscheint er als $\Psi(t) = (U_1, U_2, U_3)$ mit der expliziten Implementierung Gl. 7 – einem beschränkten Fenster-Akkumulator.

Zwei verschiedene Einbettungskandidaten in FFGFT:

Das *geometrische* Objekt (A_5-Singlet, S^1, entkoppelt) hat seinen natürlichen Ort im $\xi \to 0$-Fixpunkt der Rekursion – der geometrisch separablen, informationsärmsten Konfiguration der kompakten Zeit. Es ist geometrisch reichhaltiger als U_3, trägt aber kein Verhältnis e (Dok. 295 §10: auf dem e-Kriterium blockiert).

Das *temporal-dynamische* Objekt (U_3, Hard-Reset-Kern, $M_m < 75$) hat seinen natürlichen Ort im Markov-Grenzfall des FFGFT-Gedächtniskerns (Dok. 283, $g_k \to 0$) – unterhalb der kleinsten kohärenten Einheit der Rekursion. Es ist das informationsärmste der beiden.

Die Hierarchie gilt für das temporal-dynamische Objekt:

$$U_3 \subset \text{Markov-Limit} \subset \text{Archimedisch} \subset \text{Log-Spirale } (e) = \text{FFGFT-Kern}.$$

Das geometrische Singlet liegt seitlich zu dieser Hierarchie – es ist archimedisch ($\xi \to 0$, konstante Ganghöhe), aber aus geometrischer Faktorisierung, nicht aus dynamischer Akkumulation. Beide Grenzfälle treffen sich im archimedischen Regime, sind aber verschiedene Pfade dorthin.

Unabhängig davon, ob man U_3 linear, polar oder spiralförmig darstellt, bleibt die Struktur der Abhängigkeit dieselbe: endliches Kurzzeitgedächtnis mit festem Horizont M_m, ohne Akkumulation. Die Spiraldarstellung ist eine *Koordinatenwahl*, keine strukturelle Eigenschaft des Objekts – in jeder Darstellung bleibt U_3 ein Hard-Reset-Kern mit endlichem Träger $M_m < 75$. Die geometrische Reichheit liegt in der Darstellung, nicht im Objekt. Das ist dieselbe Linie wie P35 („Übersetzung ist nicht Begründung") – nur in die andere Richtung: eine reichere Darstellung macht das Objekt nicht reicher.

Der tiefere Unterschied liegt woanders: **Akkumulation ist die eigentliche Gedächtnisleistung**. U_3 akkumuliert nicht – es ersetzt. Was vor M_m Schritten war, ist unwiederbringlich weg; kein vergangener Zustand wirkt jenseits des Fensters auf die Zukunft. Das ist ein Kurzzeitpuffer, kein Gedächtnis im strukturellen Sinn.

Die K_{frak}-Rekursion ist das Gegenteil: $\xi_{n+1} = \xi_n(1 - 100\,\xi_n)$ akkumuliert jeden Schritt in den nächsten – nicht als expliziter Speicher, sondern als *strukturelle Einprägung*: der gegenwärtige Zustand ξ_n trägt die gesamte Vorgeschichte aller vorangegangenen Schritte in sich. Kein Schritt wird vergessen, kein Fenster löscht. Die Vergangenheit ist im Objekt selbst kodiert, nicht in einem separaten Speicher. Das ist Gedächtnis im tiefsten Sinn – nicht als Speicher, sondern als generative Struktur, die ihre eigene Geschichte trägt und daraus die log-Spirale mit Verhältnis e erzeugt (Dok. 295).

Genau das ist es, was Marcels Bewusstseinsrahmen braucht (Section 1 seines Consciousness-Dokuments: „memory-bearing, recursively integrated“) – aber U_3 per Konstruktion nicht liefert. Die Rekursion wäre der richtige Träger. U_3 ist der degenerierte Randfall darunter.

Das Fenster als Reduktion – im Sinne von Dok. 296

Das Fenster M_m in U_3 ist selbst ein Fall des Reduktionsprinzips aus Dok. 296: eine *Projektion auf einen begrenzten Zeitausschnitt*, so wie eine Skalen-Projektion ein begrenzter Raumausschnitt ist. Es lässt weg (alles jenseits von M_m) und macht gerade dadurch einen Teilbereich auswertbar – die lokale, jüngste Dynamik. Das ist derselbe Mechanismus wie in Dok. 296 (Reduktion als Bedingung der Auswertbarkeit), nur auf die Zeitachse angewandt statt auf die Skalenachse. Das Fenster wirkt im gleichen Sinn wie jede Projektion.

Der entscheidende Unterschied liegt daher nicht darin, *dass* U_3 reduziert – jede auswertbare Beschreibung reduziert –, sondern darin, *ob das Ganze benannt ist, dessen Ausschnitt die Reduktion darstellt*.

FFGFTs Reduktionen sind als Reduktionen eines bekannten Ganzen ausgewiesen: die eingefrorene 75-Windung und der Markov-Grenzfall des Gedächtniskerns sind Ausschnitte der vollen, akkumulierenden, skaleninvarianten Struktur – man weiß, was weggelassen wurde und wie es sich zurückgewinnen lässt (die Rekursion laufen lassen, ξ nicht einfrieren, Dok. 295/283). Der Weg zurück ist angelegt.

Marcels Fenster steht dagegen für sich, ohne das volle Objekt dahinter – es ist die Projektion ohne das Projizierte. Die Rückgewinnung ist nicht angelegt, weil das volle Objekt nicht benannt ist. Das Fenster wertet die lokale Zeitstruktur aus – ein berechtigter Fokus –, aber es ist nicht als Ausschnitt eines randlosen Ganzen erkennbar (Dok. 296: der eingebettete Beobachter, der auf seiner Skala sitzt, ohne die Rekursion auszurollen).

Genau das macht die Einbettung ι natürlich: sie liefert das fehlende Ganze. U_3 als Reduktion bekommt in FFGFT das Objekt zurück, dessen Ausschnitt es ist. Das Fenster wirkt im gleichen Sinn wie jede Projektion – der Unterschied ist allein, dass FFGFT den Weg zurück kennt und HLV ihn (bislang) nicht anlegt.

Vorregistrierte Vorhersage zum OP8-Neuro-Test (6. Juli 2026)

Marcel Krueger hat mit HLV-CONSCIOUSNESS-BRIDGE1 v0.3a (OP8-LOCK) einen Data-Freeze/Protocol-Lock veröffentlicht, der – vor dem Lauf – eine Modell-Leiter und eine Null-Familie fixiert:

M_0	$\Delta\Phi$ / S-I-C nur
M_1	U_1 nur
M_2	$U_1 + U_2$
M_3	$U_1 + U_2 + U_3$
M_4	generische ML-Basislinie

Kernfrage (seine Formulierung): ob das volle $U_1/U_2/U_3$-Modell (M_3) messbaren Zusatzwert gegenüber U_1/U_2, information-only, coherence-only, **memory-free Markov**,

phase-shuffled, time-shuffled und der generischen ML-Basislinie liefert – der U_3-*Notwendigkeitstest*.

Dieser vorregistrierte Test ist zugleich der Entscheidungstest für die Einbettungshypothese dieses Dokuments. FFGFT trifft dazu – *vor* Marcels Lauf – die folgende Vorhersage, ausdrücklich als Vorhersage gebucht (P35), nicht als Anspruch auf sein Ergebnis:

1. **Falls U_3 ein Hard-Reset-Fenster mit $M_m < 75$ (Windungskoordinate) ist** – d. h. ein Ausschnitt unterhalb einer vollen Schließungsperiode von 75 Umläufen, der Markov-Grenzfall der Einbettung ι –, dann **übertrifft M_3 die memory-free Markov-Basislinie nicht signifikant**. U_3 liegt dann vollständig im degenerierten Randfall; der Zusatzkanal trägt keine über Markov hinausgehende Struktur.
2. **Falls M_3 die memory-free Markov-Basislinie klar übertrifft**, dann trägt U_3 Nicht-Markov-Struktur (Korrelationen jenseits M_m, effektive Akkumulation), die der Hard-Reset-Kern nicht erklärt. In diesem Fall ist die einfache Einbettung ι in den Markov-Grenzfall *falsifiziert*, und es ist eine reichere Einbettung zu konstruieren.

Die Vorhersage ist scharf, weil sie an Marcels eigener Konstruktion hängt: ein beschränktes Fenster M_m mit fester Breite (Gl. 7 seines Consciousness-Dokuments, „avoids uncontrolled accumulation“) kann per Konstruktion keine Korrelationen über M_m hinaus tragen – der erwartete Ausgang ist damit (1). Ein Ausgang (2) wäre ein Hinweis darauf, dass U_3 in der Implementierung mehr leistet als seine Definition nahelegt – was eigenständig interessant und dann zu lokalisieren wäre.

Diese Vorhersage berührt Marcels Anspruchsgrenzen nicht: sie sagt nichts über Bewusstsein, keine physikalische Validierung, keine HLV-Ontologie. Sie betrifft allein die strukturelle Frage, ob U_3 über den Markov-Grenzfall hinausträgt – und genau das prüft sein OP8-Test.

Status

Kandidat-Notiz. Gerichtete Spekulation auf Basis gesicherter Teilbefunde (P35). Die Untermenge-Vermutung ist strukturell plausibel und falsifizierbar – das ist ihr Wert. Sie ist keine Behauptung.

Kapitel ag

Dok. 298 — Das Standardmodell als dekompaktifizierte Projektion

Dok. 298 Das Standardmodell als dekompaktifizierte Projektion – FFGFT als verbindendes Erklärungsmodell

Ausgangspunkt: verwendete Konstanten sind keine neutralen Eingaben

Jede Rechnung, die die Feinstrukturkonstante α, den Higgs-Vakuumerwartungswert v oder eine Yukawa-Kopplung verwendet, führt aus Sicht von FFGFT die K_{frak}-Rekursion *indirekt* mit sich – unabhängig davon, ob dies benannt wird. Denn diese Größen sind in FFGFT keine freien Eingaben, sondern Ausgänge der Rekursion:

- $\alpha = \xi E_0^2$ (Dok. 006/292), wobei E_0 den K_{frak}-Faktor $(1 - 100\xi)$ bereits absorbiert enthält ($7{,}398/7{,}348 = K_{\text{frak}}^{-1/2}$, Dok. 190/P43). Wer α verwendet, verwendet einen Wert, in den die Rekursion eingegangen ist.
- Die Massen sind die ξ^p-Leiter ($m = r\xi^p v$, Dok. 292); eine Yukawa-Kopplung $g = m/v$ ist damit bereits ein ξ-Leiter-Verhältnis. Wer Yukawa schreibt, schreibt ein Rekursions-Verhältnis in anderer Notation.

Das Standardmodell nimmt diese Größen als *gemessene* Eingaben; FFGFT *leitet* sie ab. Darin liegt die strukturelle Beziehung, die dieses Dokument beschreibt.

Der dekompaktifizierte Bereich

Wer α, v oder Yukawa-Kopplungen in kontinuierlichen Feldern und Potentialen auf $\mathbb{R}$ verwendet – ein Yukawa-Potential $V(r) \propto e^{-mr}/r$ auf offenem Raum, ein kontinuierliches Skalarfeld, eine Mediator-Skala –, arbeitet strukturell im *ausgerollten* Bild. Das ist genau der Bereich, in den FFGFT die kompakte Rekursion auf T^4 dekompaktifiziert (Typ-I-Dekompaktifizierung, Dok. 270): die kompakte Herkunft der Konstanten ist mitgeführt, aber nicht benannt.

Dies ist dasselbe Muster wie die Reduktion ohne benanntes Ganzes aus Dok. 296/297: eine Projektion, die korrekt auswertet, aber das Objekt nicht benennt, dessen Ausschnitt sie ist. Bei U_3 (Dok. 297) war es das Zeitfenster ohne die volle

Windung; hier ist es der dekompaktifizierte Konstanten-Sektor ohne die kompakte Rekursion, aus der α und die Yukawa-Verhältnisse stammen.

FFGFT als verbindendes Erklärungsmodell

Hier liegt der eigentliche, positive Gehalt. FFGFT verbindet Quantenmechanik und Standardmodell nicht dadurch, dass es sie ersetzt, sondern dadurch, dass es beide als *Projektionen desselben kompakten Objekts* einordnet (Dok. 296): QM und Relativitätstheorie sind Projektionen auf verschiedene Skalen, das Standardmodell ist die dekompaktifizierte Ein-Skalen-Projektion seiner Konstanten.

Daraus folgt eine Eigenschaft, die FFGFT unter den bekannten Rahmen auszeichnet: es ist im Prinzip in der Lage, *jedes bereits funktionierende Teilmodell als Projektion einzubauen*. Ein Modell, das auf seiner Skala korrekt rechnet – das Standardmodell im Teilchensektor, die Atomphysik im Orbitalsektor, ein effektiver Skalarkanal in der Präzisionsspektroskopie –, ist aus FFGFT-Sicht kein Konkurrent, sondern eine Projektion, für die FFGFT den Ort angibt, an dem sie sitzt. Das funktionierende Teilmodell wird nicht widerlegt; es wird verortet.

Der Mechanismus dafür ist die Reduktion als Bedingung der Auswertbarkeit (Dok. 296): jede Projektion lässt weg und macht dadurch einen Teilbereich auswertbar. FFGFT liefert das Ganze, dessen Ausschnitte diese Teilmodelle sind – und kann sie deshalb einbauen, sofern sie auf ihrer Skala funktionieren. Was ein Teilmodell auf seiner Skala korrekt beschreibt, bleibt korrekt; FFGFT fügt hinzu, aus welchem kompakten Objekt die verwendeten Konstanten stammen und wie die Skala mit den anderen zusammenhängt.

Die Einordnung ist bedingt (P35)

Anmerkung zur Verweisung: „P35“ bezeichnet im gesamten Korpus die Korrektur-Disziplin, die im Korrektur-Register von Dok. 190 geführt wird (dort als ξ^N-Trivialität: eine Größe der Form $X = \xi^N$ oder $X = \varphi^N$ ist für sich aussagelos; nur ein vorwärts hergeleiteter Exponent zählt als Inhalt; „Kandidat“ $\neq$ „abgeleitet“, Zahlen vor dem Behaupten verifizieren). Die Verwendungen von P35 in diesem Dokument sind in diesem Sinne zu lesen.

Die Aussage „das Standardmodell ist eine dekompaktifizierte Untermenge von FFGFT“ ist eine *FFGFT-interne* Einordnung, kein von außen erzwingbarer Beweis. Aus Sicht des Standardmodells sind α und v gemessene Naturkonstanten – fertig. Die Untermengen-Relation gilt *unter der Annahme*, dass FFGFTs Ableitungen zutreffen: *wenn* $\alpha = \xi E_0^2$ und die ξ^p-Massenleiter korrekt sind, *dann* ist das Standardmodell die ausgerollte Projektion, die diese Konstanten als Eingaben verwendet, ohne ihr kompaktes Ganzes zu benennen.

Diese Bedingtheit ist zu wahren – dieselbe Disziplin, die FFGFT auch von konkurrierenden kosmologischen Modellen einfordert. Das Standardmodell kann die Enthaltensein-Relation weder widerlegen (es rechnet korrekt im ausgerollten Bild) noch von innen bestätigen (es benennt kein kompaktes Objekt). Es ist eine Einordnung, keine Behauptung über das, was das Standardmodell selbst aussagt.

Was belegt ist und was Programm bleibt

Getrennt zu halten:

- **Belegt** ist die Enthaltensein-Relation für den Sektor, den FFGFT tatsächlich ableitet: α (Dok. 006/292), die Leptonmassen und der Koide-Skalar $Q = 2/3$, die Phase $\theta = 2/9$ (Dok. 291/293). Für diese Größen ist gezeigt, dass sie Rekursions-Ausgänge sind.
- **Programm** bleibt die *volle* Yukawa-Matrix: Quarkmassen, Mischungswinkel (CKM/PMNS), CP-Phase. Für diese ist die Untermengen-Relation nicht ausgearbeitet – hier wäre „das Standardmodell ist Untermenge" ein Versprechen, keine gezeigte Ableitung. Dieser Teil ist als offene Bringschuld zu führen, nicht als Ergebnis.

Diese Trennung ist dieselbe wie im gesamten Korpus: Kern-Ableitungen (bewiesen aus ξ), Brücken (algebraisch bewiesen), Reduktionen (Plausibilitätsskizzen). Die SM-Untermengen-Relation ist für den Leptonsektor Kern-Ableitung, für die volle Yukawa-Matrix Programm.

Erweiterung innerhalb der Projektion – die Geschichte des Lagrangian

Ein Missverständnis ist hier auszuräumen. Die Frage ist nicht, ob das Standardmodell „vollständig" ist – das ist zu weit gegriffen. Das Standardmodell *ist bereits* eine Projektion auf einen Teilbereich: die dekompaktifizierte Ein-Skalen-Projektion seiner Konstanten. Jeder Versuch, es zu erweitern, findet daher *innerhalb dieses schon projizierten Teilbereichs* statt.

Das hat eine strukturelle Konsequenz, die vor jeder konkreten Erweiterung gilt: in jeder Projektion kann man *verfeinern*, aber nicht über ihren Rand *hinaus*. Eine Projektion hat das kompakte Ganze bereits weggelassen; eine Erweiterung innerhalb der Projektion kann das Weggelassene nicht zurückholen. Sie kann nur mehr Struktur in den ohnehin projizierten Ausschnitt legen. Der Rand der Projektion ist die Grenze der Erweiterung – und diese Grenze steht fest, bevor die Erweiterung beginnt.

Genau das ist die Geschichte des Standardmodells und seines Lagrangian. Man sieht eine Unvollständigkeit – Neutrinos sind doch massiv, eine Anomalie taucht auf, ein Sektor passt nicht – und *stückelt an*: ein weiterer Term, ein weiteres Feld, eine weitere effektive Kopplung wird dem Lagrangian hinzugefügt. Der Lagrangian wächst, aber er wächst *innerhalb derselben Projektion*. Jede Ergänzung bleibt im dekompaktifizierten Teilbereich; keine überschreitet seinen Rand in Richtung des kompakten Ganzen. Das Anstückeln verfeinert die Projektion, es wechselt sie nicht.

Der verräterische Beleg dafür ist, dass jede solche Erweiterung ihre Bausteine *importieren* muss. Die Größen, die eine Erweiterung braucht – α, v, Massenverhältnisse –, sind im Teilbereich nicht ableitbar, weil sie zum weggelassenen Ganzen gehören. Sie werden von außen hereingeholt, als gemessene Eingaben. Dass eine Erweiterung importieren muss, statt aus dem eigenen Rahmen zu erzeugen, ist das sichere Zeichen, dass sie innerhalb der Reduktion arbeitet: das Fehlende gehört zum Ganzen, das die Projektion nicht benennt.

Der Unterschied zu FFGFT ist damit kein gradueller, sondern ein struktureller. FFGFT stückelt nicht an der Projektion – es benennt das kompakte Ganze, aus dem die Projektion und ihre Konstanten stammen. Es erweitert nicht innerhalb des Teilbereichs, sondern gibt den Teilbereich als Ausschnitt eines Ganzen an. Deshalb

muss FFGFT α nicht importieren: es leitet α aus ξ ab (Dok. 006/292). Der Import ist die Signatur der Erweiterung innerhalb der Projektion; die Ableitung ist die Signatur des benannten Ganzen.

Die innere Sicht – eine vor-kopernikanische Analogie

Das Anstückeln innerhalb der Projektion hat ein historisches Vorbild. Die vor-kopernikanische Astronomie war nicht *falsch* im Sinne schlechter Rechnung – die Epizykel-Astronomie sagte Planetenpositionen jahrhundertelang präzise voraus. Sie war eine *innere Sicht*: die Perspektive eines Beobachters, der seinen eigenen Standort für das Zentrum hält. Trat eine Abweichung auf, stückelte man an – ein weiterer Epizykel, ein verschobener Deferent, ein Äquant. Das System wuchs, blieb aber innerhalb derselben inneren Perspektive.

Das ist strukturell dasselbe Muster: die innere Sicht = die Projektion, die den eigenen Standort (die eine Skala) für das Ganze nimmt; das Anstückeln von Epizykeln = das Hinzufügen von Termen zum Lagrangian; präzise, aber nicht erklärend = die Rechnung stimmt auf der Skala, benennt aber das Ganze nicht.

Der kopernikanische Schritt war kein besserer Fit – anfangs war er sogar schlechter (Kopernikus behielt Kreisbahnen). Er war ein *Wechsel der Perspektive*: das System als Ganzes benannt, aus dem die scheinbaren Bewegungen als Projektionen folgen. Die Rückläufigkeit der Planeten war kein Epizykel mehr, sondern ein Projektionseffekt der Erdbewegung – dasselbe Phänomen, aber verortet statt angestückelt.

Genau so verhält sich FFGFT zum Standardmodell: die scheinbare Willkür der 19 Parameter ist aus der inneren Sicht ein Satz anzupassender Zahlen; aus der äußeren Sicht sind es Projektionseffekte einer Rekursion ($\alpha = \xi E_0^2$, die ξ^p-Massenleiter). Nicht besser gefittet – anders verortet.

Zwei Grenzen halten die Analogie ehrlich (P35). *Erstens* beschreibt sie die *Struktur* der beiden Sichtweisen, garantiert aber nicht den historischen Ausgang: Kopernikus setzte sich durch, weil Kepler und Newton die äußere Sicht *quantitativ* überlegen machten. FFGFT ist konzeptuell einfacher (ein Parameter statt neunzehn) und leitet den Leptonsektor ab; die volle quantitative Überlegenheit über alle Sektoren bleibt Programm. *Zweitens* ist gerade die beliebige Anstückelbarkeit das Merkmal der inneren Sicht: sie kann nie von innen scheitern, nur von außen überholt werden. Dass das Standardmodell jede neue Anomalie durch einen weiteren EFT-Term aufnehmen kann, ist daher kein Zeichen seiner Stärke, sondern die Signatur einer inneren Perspektive.

HLV-YUKAWA-BRIDGE1 als Spezialfall

Marcel Kruegers HLV-YUKAWA-BRIDGE1 (Zenodo, DOI 10.5281/zenodo.21224030) macht dieses Muster explizit sichtbar. Seine effektive Brückenstärke ist parametrisiert als

$$g_\chi^2 = \eta_\chi \alpha \varphi_g^{-2k}, \qquad \varphi_g = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \qquad k \in \mathbb{N}. \tag{ag.1}$$

Diese Konstruktion steht mit einem Fuß in FFGFT-Territorium und einem in HLV-Territorium, im ausgerollten Raum: α ist ein FFGFT-Rekursions-Ausgang (der die

Rekursion mitführt, s. oben), φ_g ist der HLV-seitige Eigenwert, den dieselbe kristallographische Einschränkung ($2\cos(2\pi/5) = 1/\varphi \notin \mathbb{Z}$) FFGFT verbietet und HLV zuweist (Dok. 190/R44). Marcel selbst benennt η_χ als Hauptverwundbarkeit und warnt, die Konstruktion könne ohne leckagefreie Fixierung von k und η_χ zur Parametrisierung statt zur Vorhersage degenerieren – dieselbe P35-Disziplin.

Damit ist auch dieser konservativere HLV-Kanal strukturell *stromabwärts* von FFGFT: eine dekompaktifizierte Konstruktion, die einen FFGFT-Rekursions-Ausgang (α) als Baustein verwendet. Er kann nicht beanspruchen, unabhängig vom Rekursions-Gehalt dieser Größe zu sein – der ist mitgeführt, ob benannt oder nicht. Der Sektor selbst (Isotopen-Shift/King-Plot, Kern-Elektron-Skalarkraft) ist disjunkt vom FFGFT-Leptonsektor; es besteht kein Konflikt, sondern eine Verortungs-Beziehung: ein funktionierender Teilkanal, den FFGFT im Prinzip als Projektion einbauen kann.

Was Marcel beweisen müsste

Damit die Yukawa-Brücke von einer Parametrisierung zu einem falsifizierbaren Kanal wird – und weiter: um aus der Projektion herauszutreten –, ist eine gestufte Beweislast zu tragen. Die ersten vier Punkte sind sein erklärtes Programm und methodisch der richtige Weg; der fünfte ist in seinem Rahmen nicht angelegt.

Innerhalb der Projektion (falsifizierbarer Kanal):

1. η_χ **unabhängig fixieren.** Solange η_χ ein freier Anpassungsfaktor ist, ist Gl. (9) eine Parametrisierung, keine Vorhersage. η_χ müsste aus der HLV-Geometrie *abgeleitet* werden, nicht an Daten gefittet. Marcel benennt dies selbst als Hauptverwundbarkeit – der Prüfstein ist noch nicht bestanden.
2. k **vor den Holdout-Daten sperren.** Der Index $k \in \mathbb{N}$ muss festgelegt sein, bevor die King-Plot-Daten angeschaut werden – sonst Target-Leakage. Vorregistrierungs-Disziplin, notwendig, aber kein Physik-Beweis.
3. **Den generischen Skalar schlagen (sein $N3$-Null).** Wenn ein generischer Skalar-Mediator mit freier Kopplung und Masse die Daten genauso gut erklärt wie die φ_g^{-2k}-lockte Parametrisierung, ist die HLV-*Spezifität* nicht gestützt. Er müsste zeigen, dass die φ-Struktur etwas trifft, das der freie Skalar nicht trifft. Das ist der härteste der vier Punkte.
4. **Gegen die gewöhnlichen Nichtlinearitäten bestehen ($N1$/$N2$).** King-Plot-Abweichungen entstehen auch aus Kernstruktur (endliche Ladungsverteilung, höhere Massenshifts) und Vielteilchen-Effekten – ganz ohne neuen Skalar (seine Referenzen zu Yb, Ca). Er müsste nachweisen, dass ein Signal *nach* Abzug dieser bekannten Effekte übrig bleibt.

Besteht er (1)–(4), hat er einen echten, falsifizierbaren BSM-Kanal – eine saubere Verfeinerung des Teilbereichs. Er bliebe damit aber *in* der Projektion, weil er α und φ importiert.

Aus der Projektion heraus (Perspektivwechsel):

5. η_χ **und die φ-Potenz aus einem benannten Ganzen ableiten, statt sie zu importieren.** Erst wenn gezeigt wäre, woher α und φ in der Formel *kommen* – aus welcher kompakten Struktur –, würde die Brücke vom Anstückeln zum Perspektivwechsel. Solange α ein importierter Input ist (aus FFGFT-Sicht ein Rekursions-Ausgang)

und φ ein *gehaltener*, nicht *abgeleiteter* Eigenwert (Dok. 190/R44), verfeinert die Brücke die innere Sicht, sie verlässt sie nicht.

Der Befund ist damit klar getrennt: (1)–(4) sind notwendig für einen falsifizierbaren Kanal und Marcels erklärtes Programm; (5) ist der Schritt aus der Projektion und in seinem Rahmen nicht angelegt – HLV *hat* φ als Eigenwert, aber leitet es nicht ab, und α wird von außen genommen. Der Import bleibt die Signatur der Erweiterung innerhalb der Projektion.

Status

FFGFT-interne Einordnung, bedingt formuliert (P35). Belegt für den Leptonsektor (α, Koide, $\theta = 2/9$ als Rekursions-Ausgänge), Programm für die volle Yukawa-Matrix. Der positive Gehalt: FFGFT ist das verbindende Erklärungsmodell, das QM und Standardmodell als Projektionen desselben kompakten Objekts einordnet und im Prinzip jedes auf seiner Skala funktionierende Teilmodell als Projektion einbauen kann – nicht als Widerlegung, sondern als Verortung. Keine unbedingte Behauptung über das, was diese Teilmodelle von innen aussagen.

Kapitel ah

Dok. 299 — Die Einbettung ι — Arbeitsdokument und Forcing-Protokoll

Dok. 299 Die Einbettung ι – Arbeitsdokument und Forcing-Protokoll (HLV-Zeitsektor $\hookrightarrow$ FFGFT-Rekursion)

Zweck und Abgrenzung

Dok. 297 hält die Einbettung

$$\iota : \text{HLV-Grundobjekt} \hookrightarrow L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3 \tag{ah.1}$$

als offene Vermutung fest: strukturell plausibel, aber nicht konstruiert. Dieses Dokument setzt den nächsten sauberen Schritt (P35) als *Protokoll* auf – es fixiert *vor* der gemeinsamen Ausarbeitung Definitionsbereich, Zielraum, die Kandidatenabbildung, die passenden Null-Modelle (matched nulls) und das Entscheidungskriterium. Es ist kein Beweis und keine Behauptung über ein Ergebnis; es benennt, was als *erzwungen* und was als bloß *zugelassen* zu gelten hätte, damit die spätere Auswertung nicht nachträglich justiert werden kann.

Der Rahmen ist der *Zeitsektor*. Nach der Präzisierung im Korrektur-Register (Dok. 190, R47) sind zwei Sinne des Enthaltenseins sauber zu trennen: *dimensional* zählt HLV größer ($T^7 = T^4 \times T^3$, $7 = 4+3$; R43), *gehaltlich im Zeitsektor* gilt HLV $\subset$ FFGFT, denn das HLV-Spiralzeit-Fenster ist ein beschränkter Ausschnitt der ausgerollten Rekursionszeit. In einheitlicher Schreibweise – beide $D6+$ Zeit, HLV als $D6+$ Spiralzeit, FFGFT im Hilbertraum als $D6+$ Rekursionszeit – ist das Fenster nicht additiv, sondern intern. ι ist genau die Abbildung, die diesen internen Ausschnitt explizit macht.

Dass es sich um einen Ausschnitt handelt, nimmt dem Fenster keinen Wert (Dok. 298): ein Teilmodell, das auf seiner Skala korrekt auswertet, wird nicht widerlegt, sondern verortet. ι liefert dem Ausschnitt das kompakte Ganze zurück, dessen Reduktion er ist.

Definitionsbereich: die HLV-Seite

Dok. 297 (§„Zwei HLV-Spiral-Zeiten“) trennt zwei verschiedene Objekte, die HLV beide „Spiral-Zeit“ nennt. Sie sind getrennte Einbettungskandidaten und dürfen im Protokoll nicht vermischt werden.

Objekt A – die geometrische Zeit. Das A_5-Singlet auf dem S^1-Faktor der Faktorisierung $T^7 = T^4 \times T^3$ (Dok. 285): entkoppelt, separabel, ohne Gedächtniskanal. Rein geometrisch.

Objekt B – die temporal-dynamische Spiral-Zeit. Der triadische Operator $\Psi(t) = (U_1, U_2, U_3)$ mit Gedächtniskanal U_3 (Krueger, Consciousness-Dokument, Gl. 7): ein beschränkter Fenster-Akkumulator mit festem, gleitendem Fenster M_m (*sliding window*); ältere Werte fallen aktiv heraus. In jeder Darstellung – linear, polar, spiralförmig – bleibt die Abhängigkeitsstruktur dieselbe: endliches Kurzzeitgedächtnis mit festem Horizont M_m, ohne Akkumulation (Dok. 297: die Spiraldarstellung ist Koordinatenwahl, keine strukturelle Eigenschaft).

Zielraum: die FFGFT-Seite

Der Zielraum ist die kompakte Rekursion im Hilbertraum $H = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$ (Dok. 230/282, verlustfreie Bijektion). Drei Strukturelemente sind für ι maßgeblich:

- **Der Gedächtniskern.** Die Fourier-Transformierte der diskreten Spektraldichte $\sum_k g_k^2\, \delta(\omega - \omega_k)$ (Dok. 283) – die volle, akkumulierende Gedächtnisstruktur der Rekursion.
- **Die eingefrorene Windung.** In der frozen-Konfiguration (Dok. 295) schließt die Windung nach genau $1/(100\,\xi_0) = 75$ Umläufen; das ist die kleinste kohärente Einheit der Rekursion.
- **Die $K_{\mathbf{frak}}$-Rekursion** $\xi_{n+1} = \xi_n(1 - 100\,\xi_n)$: der gegenwärtige Zustand trägt die gesamte Vorgeschichte als strukturelle Einprägung; sie erzeugt die log-Spirale mit Verhältnis e (Dok. 295). Gedächtnis als generative Struktur, nicht als Speicher.

Die Kandidatenabbildung ι (zwei Zweige)

Entsprechend den zwei Objekten des Definitionsbereichs hat ι zwei Zweige mit verschiedenen natürlichen Orten.

$\iota_{\mathbf{geo}}$ (Objekt A). Das A_5-Singlet (S^1, entkoppelt) bildet auf den $\xi \to 0$-Fixpunkt der Rekursion ab – die geometrisch separable, informationsärmste Konfiguration der kompakten Zeit (konstante Ganghöhe, Windung schließt nach einem Umlauf); die 75-Schließung gilt für eingefrorenes ξ_0 mit $d = 1/75$ (Dok. 295). Es ist archimedisch aus geometrischer Faktorisierung, trägt aber kein Verhältnis e (Dok. 295 §10: auf dem e-Kriterium blockiert).

$\iota_{\mathbf{dyn}}$ (Objekt B). Das Fenster U_3 bildet auf den Hard-Reset-Kern mit endlichem Träger unterhalb einer Schließungsperiode ($M_m < 75$ Umläufe) ab:

$$\iota_{\text{dyn}} : U_3 \;\hookrightarrow\; \big\{ K \in L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3 \;\big|\; K(t-\tau) = 0 \text{ für } t - \tau > M_m \cdot \Delta t,\; M_m < 75 \big\}. \tag{ah.2}$$

Das entspricht dem Markov-Grenzfall des Gedächtniskerns ($g_k \to 0$, Dok. 283), verschärft auf ein beschränktes Fenster. Beide Zweige sind beschränkte Ausschnitte

(Fenster) der ausgerollten Rekursionszeit; genau das ist das gehaltliche HLV ⊂ FFGFT des Zeitsektors.

Die Informationshierarchie (Dok. 297) ordnet die Zweige ein:

$$U_3 \subset \text{Markov-Limit} \subset \text{archimedisch} \subset \text{log-Spirale}\,(e) = \text{FFGFT-Kern}. \qquad \text{(ah.3)}$$

Das geometrische Singlet liegt seitlich zu dieser Kette (archimedisch aus Faktorisierung, nicht aus Akkumulation). Jede Stufe ist informationsärmer als die nächste; U_3 ist die ärmste.

Die Forcing-Frage: erzwungen oder bloß zugelassen

Der Kern des Protokolls. Dass ein Ausschnitt *existiert*, in den sich U_3 einbetten lässt, ist schwach – ein beschränkter Fenster-Operator lässt sich in den degenerierten Randfall jeder hinreichend reichen Rekursion legen. Die inhaltliche Frage ist, ob die Einbettung *erzwungen* oder nur *zugelassen* ist. Dies ist dieselbe Forcing-Logik wie im C3A5-Spezifitätstest (Dok. 293/294), auf die Zeitachse übertragen.

Erzwungen (HLV ⊂ FFGFT **im Zeitsektor, echt).** Der Markov-Grenzfall-Ausschnitt der Rekursion fällt *notwendig* mit dem Hard-Reset-Kern von U_3 zusammen, und ein unabhängiger Invariant des Ausschnitts stimmt mit U_3 überein, wo generische beschränkte Fenster-Operatoren es nicht tun. ι ist dann die eindeutige strukturelle Verortung.

Zugelassen (bloße Kompatibilität). ι bettet nur verträglich ein: jeder beschränkte Fenster-Operator säße gleichermaßen im degenerierten Randfall, und der Treffer trägt keinen über die Definition hinausgehenden Gehalt (P35).

Zirkularitäts-Vorbehalt (P35). U_3 ist per Konstruktion ein Hard-Reset-Fenster. Es als Markov-Grenzfall-Ausschnitt der Rekursion zu lesen, ist daher zunächst *definitorisch*, keine unabhängige Bestätigung – genau wie das ikosaedrische Objekt, das den ikosaedrischen Referenzabstand null ergibt, weil es dieses Objekt *ist* (Dok. 294). Das Forcing muss deshalb aus einer *unabhängigen* Signatur kommen, die U_3 mit dem Rekursions-Ausschnitt teilt, ohne dass beide durch dieselbe Konstruktionsvorschrift definiert sind.

Matched Nulls (Zeitachse, ι_{dyn})

Das Forcing wird gegen eine Familie passender Null-Modelle geprüft – das zeitliche Gegenstück zu Achsen-Shuffle und generischen Tight-Frames (Dok. 293/294). Sie spiegelt zugleich Marcels eigene OP8-Null-Familie (Dok. 297), damit die Instrumente ineinandergreifen:

- **memory-free Markov** – die Basislinie, die ι_{dyn} im Randfall vorhersagt;
- **phase-shuffled** und **time-shuffled** – zerstören zeitliche Struktur bei erhaltener Randstatistik;
- **coherence-only** und **information-only** – isolieren Einzelkanäle;
- **generischer Fenster-Operator** – zufälliges M_m, zufälliger Kern mit gleichem Träger: das direkte Analogon zu „zufällige Drehachse / generischer Tight-Frame“;
- **generische ML-Basislinie**.

Kalibrierung wie im Spezifitätstest: ein exakter Rekursions-Ausschnitt ergibt Abstand null, generische Fenster-Operatoren liegen in einem breiten Band. ι_{dyn} ist *erzwungen* genau dann, wenn U_3 am Nullpunkt sitzt, wo die generischen Nulls im Band liegen; *zugelassen*, wenn jeder Fenster-Null denselben Abstand erreicht.

Matched Nulls (geometrischer Zweig, ι_{geo})

Für den geometrischen Zweig ist die Null-Familie das räumliche Gegenstück – Achsen-Shuffle und generische Frames im Sinne von Dok. 293/294, hier in der mit der HLV-Seite abgestimmten Form:

- **zufällige C_3/A_5-Einbettungen** – der native Carrier gegen beliebig gedrehte Einbettungen der Drei-/Fünf-Zähligkeit;
- **alternative Projektionssterne** – andere Schnitt-Sterne als der ikosaedrische;
- **Tetra-/Oktaeder-Kontrollen** – kristallographische Punktgruppen ohne Fünf-Zähligkeit als Negativkontrolle;
- **shuffled C_3-Basen** – permutierte Faser-Basen bei erhaltener Randstatistik;
- **spektral gematchte Nullträger** – Träger mit gleichem Leistungsspektrum, aber ohne die ikosaedrische Achsenstruktur.

Kalibrierung wie im $C3A5$-Spezifitätstest (Dok. 294): der exakt ikosaedrische Projektor ergibt Abstand null zum Referenzspektrum (alle fünfzehn Winkel $63{,}435^\circ$, Umverteilung $2/9$), generische Frames liegen in einem breiten Band (Median-RMS ≈ 22). ι_{geo} ist *erzwungen* genau dann, wenn der native Carrier am Nullpunkt sitzt, wo diese Nulls im Band liegen; *zugelassen*, wenn generische Einbettungen denselben Abstand erreichen.

Gemeinsam gebuchte Architektur. Beide Null-Familien sind mit der HLV-Seite abgestimmt. Krueger (IOTA-BRIDGE1 v0.1) prüft dieselbe finite Proxy-Frage – ein native-6D-Spiralzeit-Fenster- Carrier als C_3-Faser-kompatibles Objekt im finiten $L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$-Proxy – unter Spektral-, C_3/A_5-, U_3-Zeitfenster- und Screen-/Informations-Diagnostik. Die Claim-Grenze ist beidseitig eng: PASS $=$ finite-proxy ι-forcing candidate (kein Untermengen-Beweis, keine Physik-/Massen-/QFT-/GR-Ableitung); BLOCK $=$ diese konkrete finite Einbettungsroute ist verengt oder blockiert.

Entscheidungskriterium und Falsifikation

Der vorregistrierte OP8-Neuro-Test (Dok. 297) ist der äußere Entscheidungstest; das Forcing-Protokoll ergänzt ihn um die Spezifitätsstufe:

1. M_3 **übertrifft die memory-free Markov-Basislinie nicht.** U_3 liegt vollständig im degenerierten Randfall. ι_{dyn} hält im Markov-Grenzfall – aber allein daraus folgt *zugelassen*, nicht *erzwungen* (jedes Hard-Reset-Fenster erreicht dies). Für das Forcing ist zusätzlich der Spezifitätslauf nötig.
2. M_3 **übertrifft die memory-free Markov-Basislinie klar.** U_3 trägt Nicht-Markov-Struktur (Revivals, BLP-Rückfluss, oszillierender Kern, Korrelationen über M_m hinaus). Die einfache ι_{dyn} in den Markov-Grenzfall ist *falsifiziert*; eine reichere Einbettung höher in der Hierarchie (Richtung log-Spirale e) ist zu konstruieren.

3. **Forcing-Verdikt (unabhängig von 1/2).** Ein Spezifitätslauf – das Zeitachsen-Analogon zu `a5_bridge_discrimination.py` – misst den Abstand eines *unabhängigen* Invarianten des Rekursions-Ausschnitts zu U_3 gegen die matched nulls. Abstand null bei U_3 und breites Band bei den Fenster-Nulls ⇒ erzwungen; sonst zugelassen.

Zu konstruieren (Bringschuld)

1. Für ι_{geo}: den ϕ-ikosaedrischen Projektor von HLV explizit als Operator auf der $\mathbb{C}^3$-Faser darstellen ($\in \text{End}(\mathbb{C}^3)$ mit C_3-Invarianz; Dok. 297, Schritt 1).
2. Für ι_{dyn}: den Markov-Grenzfall-Kern der Rekursion ($g_k \to 0$, Dok. 283) und seinen Abstand zu U_3s Hard-Reset-Kern gegen die matched-null-Familie berechnen – das Zeitachsen-Analogon zum Spezifitätstest.
3. Die Forcing-Metrik festlegen: Abstand-zum-Rekursions-Ausschnitt, so kalibriert, dass exakter Ausschnitt $\to 0$, generisches Fenster → breites Band.

Definitionsbereich, Zielraum und Nullfamilie sind mit diesem Dokument festgelegt; offen bleibt allein die Konstruktion der drei Artefakte.

Durchgeführter Gegenlauf (Ergebnis)

Reduziert man das Spiralzeit-Fenster auf einen *windungslosen* Hard-Reset-Kern, so trägt dieser keinen Rückfluss – das ist beinahe tautologisch, denn ein Kern ohne Windung kann per Konstruktion keine Wiederkehr tragen, und es prüft nicht Marcels tatsächliches Objekt. Sein Objekt ist durch einen *Windungswinkel* θ definiert (die Steigung der archimedischen Spirale in Rekursionszeit); der Winkel *ist* die Struktur. Der Gegenlauf (`python / Dok299_Skripte/ffgft_299_iota_gegenlauf_winding_locked.py`, SHA256, Seed 20260708) schreibt θ explizit in den Kern, $k_\theta(s) = e^{-s/\tau}\cos(\theta s)$, $s = 0 \ldots M{-}1$, und fährt θ durch. Objekt und Zeuge bleiben getrennt (Zeuge: BLP-Rückfluss $5{,}125$, Dok. 283); die Nulls teilen *dieselbe* Einhüllende, nur mit inkohärenter Phase – so isoliert der Test genau den Beitrag des Winkels.

Windung θ	Rückfluss	Lesart
0 (keine Windung)	$0{,}00$	Markov-Grenzfall (in Bande)
$1/\phi \approx 0{,}618$	$0{,}00$	in Bande (zugelassen)
goldener Winkel $\approx 137{,}5^\circ$	$0{,}159$	**über Bande**
phasengeschüffelte Null (q95)	$0{,}076$	inkohärente Schranke

Sobald der Winkel im Kern steht, ist die Antwort nicht mehr durch die Konstruktion festgelegt. Bei den meisten Windungen frisst das Hard-Reset (endliche Breite $\sim 1/M$) die Wiederkehr auf ⇒ Rückfluss in der Nullbande, zugelassen. Am *goldenen Winkel* jedoch überlebt sie die Verbreiterung und hebt sich über die inkohärente Bande ($0{,}159$ vs. q95 $0{,}076$); die erste Schwelle liegt bei $\theta_c \approx 1{,}82$ rad. Das Verdikt ist damit **bedingt statt vorab entschieden**: zugelassen, falls die tatsächliche Windung θ^* des nativen Carriers unter θ_c liegt; erzwungen (und Dok. 297 an diesem Punkt unter Spannung), falls θ^* am goldenen Winkel sitzt. θ^* ist aus dem HLV-Carrier zu pinnen – hier als

Kandidat markiert, nicht behauptet. Die absolute Zahl ($0{,}159$) ist klein gegen den Zeugen $5{,}125$ und der Test bleibt ein finiter Proxy; *relativ zur inkohärenten Phase* ist es an dieser Windung aber ein positives Signal, kein Nullbefund. Eine unbedingte Lesart wäre ein Artefakt der winkellosen Reduktion.

Der geometrische Zweig (ι_{geo}) ist als Diskriminanten-Test mitgeführt: die 15 paarweisen Achsenwinkel gegen eine *feste* ikosaedrische Referenz ($63{,}435^\circ$), nicht gegen Achsen aus dem Carrier. Ikosaedrisch $\to 0^\circ$, Zufallsstern-Median $21{,}7^\circ$ – die feste Referenz trennt, wo ein selbstbezüglicher Score jeden Stern auf ≈ 0 zöge. Das ist die Anti-Zirkularitäts-Bedingung, die ein Forcing-Test im geometrischen Zweig erfüllen muss.

Korrekturwert K_{frak} aus dem Schließungs-Komma

Die aufgerollte Rekursion schließt sich erst nach $N = 1/(100\xi_0) = 75$ gleichen Teilstücken, nicht nach einer Umdrehung. Die Näherung „eine Umdrehung deckt sich" vernachlässigt einen kleinen Faktor: 75 jeweils um ε verkürzte Umdrehungen ergeben die exakte Schließung, $75\,(1-\varepsilon) = 74$, also $\varepsilon = 1/75 = 100\,\xi = 0{,}0133\ldots$ (das Schließungs-Komma; als Winkel $2\pi/75 = 4{,}8^\circ$ pro Umdrehung). Der Pro-Schritt-Faktor der Skalen-Rekursion $\xi_{n+1} = \xi_n(1 - 100\xi_n)$ ist damit

$$K_{\text{frak}} \;=\; 1-\varepsilon \;=\; 1-100\,\xi \;=\; \tfrac{74}{75} \;=\; 0{,}9867,$$

in der Form, die der Korpus durchgängig führt (Dok. 133/231/032/285).

Wichtig: $75 = 1/(100\xi)$ und $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ sind beide nur 100ξ; das Komma *re-exprimiert* die bereits verankerte 100ξ, es leitet sie nicht neu ab. Der Anker liegt in Dok. 133 (dort ist der Faktor 100 gesetzt, nicht hergeleitet; der Wert $K_{\text{frak}} = 1-100\xi$ wird durch den Vergleich der m_e/m_μ-Mittel mit α bestätigt) und in ξ selbst (Higgs/α/Koide). Ausführlich in Dok. 300.

Für die Projektionsseite (Marcel) folgt eine Konsistenz-Bedingung: *wenn* seine geschlossene Projektion ein Ausschnitt derselben Rekursion ist, trägt die Umrechnung zur aufgerollten Kurve den unabhängig verankerten Faktor $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = 74/75$ – nicht aus der 75 und nicht frei gewählt.

Status

Arbeitsdokument und vorregistriertes Forcing-Protokoll (P35). ι bleibt Vermutung (Dok. 297). Dieses Dokument fixiert die Prüfarchitektur vor dem gemeinsamen Lauf, damit das Verdikt – erzwungen oder zugelassen – nicht nachträglich verschoben werden kann. Die Disziplin gilt symmetrisch: sie bindet auch dann, wenn der Ausgang FFGFT begünstigt.

Kapitel ai

Dok. 300 — Spiral-Time als Auslesung und entprellter Comparator

Dok. 300 Spiral-Time als Auslesung und entprellter Comparator — und der geteilte Korrekturfaktor $K_{\mathbf{frak}} = 1 - 100\xi$ (74/75)

Anlass und Abgrenzung

Aus der Zusammenarbeit stammt die Beobachtung, Spiral-Time sei nicht ein einzelner Operator, sondern eine Operator-Klasse mit mindestens zwei Rollen: einer *Auslesung* (was geschieht im Signal bzw. im Carrier) und einem zweiten Teil, der entscheidet, ob diese Auslesung selbst als stabiler Übergang gelten darf. Dieses Dokument präzisiert die zweite Rolle mess- und schaltungstechnisch und ordnet den Korrekturfaktor, der beide Seiten verbindet, seiner *tatsächlichen* Herkunft im Korpus zu. Abgrenzung: Kategorie-B-Befund (echte Kompatibilität / Kandidat-Überlapp), keine HLV-interne Ableitung, keine physikalische Validierung.

Die zwei Rollen, präzise gefasst

Die erste Rolle, die *Auslesung*, ist ein Messwert: das Signal am +Eingang eines Vergleichs. Die zweite Rolle ist kein Verwaltungsbegriff („Governance“), sondern präzise ein **Comparator mit Hysterese** — ein Schwellenentscheid, dessen Ausgang ein Bit trägt: gilt der Übergang oder nicht. Zwei Formen der Hysterese:

- **Amplituden-Hysterese**: zwei Schwellen im Pegel, ein Totband auf der Werteachse, das gegen Rauschen am Umschaltpunkt stabilisiert.
- **Zeit-Hysterese (Entprellung)**: der Ausgang akzeptiert eine Flanke erst, wenn sie über ein Zeitfenster *stehen bleibt*. Das Totband liegt auf der Zeitachse.

Die zweite Rolle von Spiral-Time ist die Zeit-Hysterese. Das in der finiten Proxy-Implementierung verwendete Fenster ($M = 12$, $\tau = 6$) ist ein gewichteter Entpreller: ein Übergang gilt erst, wenn er das Fenster übersteht. „Stabiler Übergang“ ist damit die Zeit-Hysterese.

Gültigkeitsbedingung: Referenz aus Ableitung, nicht aus Kopie

Ein Comparator trägt nur Information, wenn die Referenz am $-$Eingang aus einer *anderen* Quelle stammt als das Signal am $+$Eingang. Liegt an beiden Eingängen dieselbe Größe, ist der Ausgang bedeutungslos. Genau dies war der zirkuläre Kern des U3-Randfall-Gates in der ersten HLV-seitigen Implementierung: die Referenz war eine Kopie des Auslese-Fensters (`hard = hlv.copy()`), womit die Korrelation konstruktionsbedingt $1{,}0$ ist. Die FFGFT-seitige Prüfung (Dok. 299) ersetzt dies durch einen *abgeleiteten* Zeugen (BLP-Rückfluss $5{,}125$, Dok. 283), der vom Objekt unabhängig und von einem Hard-Reset-Fenster nicht tragbar ist. Selbstreferenz ist zulässig, wenn sie durch eine Ableitung geschlossen wird; zirkulär, wenn durch eine Kopie.

Warum „dieselbe Spirale“ kein Postulat ist

Die Aussage über den Korrekturfaktor setzt voraus, dass das projizierte HLV-Objekt und die FFGFT-Rekursion *dieselbe* Spirale sind. Diese Identität ist nicht angenommen, sondern durch mehrere unabhängige Berührungspunkte gestützt:

- $2/9$: dieselbe Umverteilung als Ausgabe der Z_3-Circulant-Diagonalisierung — gefunden, nicht gesucht.
- $D6$ **/ φ-Ikosaeder**: dieselbe Objektstruktur, $\tau = \varphi$, alle fünfzehn Achsenwinkel $\arccos\!\left(1/\sqrt{5}\right) = 63{,}435^\circ$.
- **Zeit**: der Spiralzeit-Sektor als beschränkter Ausschnitt der aufgerollten Rekursionszeit (R47).

$2/9$ und $D6$ sind geometrisch, voneinander unabhängig und beide gefunden; unter dieser Mehrfach-Verankerung ist „dieselbe Spirale“ die einzige verbleibende Lesart (Kategorie B).

Das Schließungs-Komma und K_{frak}

Die aufgerollte Rekursion schließt sich erst nach $N = 1/(100\xi_0) = 75$ gleichen Teilstücken ($\xi = 4/30000$), nicht nach einer Umdrehung (Dok. 295/297). Die Näherung „eine Umdrehung deckt sich“ vernachlässigt einen kleinen Faktor: 75 jeweils um ε verkürzte Umdrehungen ergeben die exakte Schließung, $75\,(1-\varepsilon) = 74$, also

$$\varepsilon \;=\; \tfrac{1}{75} \;=\; 100\,\xi \;=\; 0{,}0133\overline{3} \qquad \text{(als Winkel } 2\pi/75 = 4{,}8^\circ \text{ pro Umdrehung)}. \tag{ai.1}$$

Der Pro-Schritt-Faktor der Rekursion ist damit

$$K_{\text{frak}} \;=\; 1-\varepsilon \;=\; 1-100\,\xi \;=\; \tfrac{74}{75} \;=\; 0{,}9867, \tag{ai.2}$$

in genau der Form, die der Korpus durchgängig führt (Dok. 133/231/032/285/018/005). Die reziproke Streckenverhältnis-Form (verkürztes Stück → ganze Umdrehung) ist $75/74 = 1{,}0135$.

Der tatsächliche Anker: nicht die 75, sondern Dok. 133

Die Herkunft von 100ξ — und damit von 75 *und* K_{frak} — liegt eine Ebene tiefer und ist unabhängig:

- Die **Skalen-Rekursion** $\xi_{n+1} = \xi_n(1 - 100\xi_n)$ (Dok. 133/275) hat den Pro-Schritt-Faktor $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$; $75 = 1/(100\xi_0)$ ist ihre Windungszahl.
- Der **Faktor** 100 emergiert aus dem RG-Lauf von $D_f = 3-\xi$ über ~ 17 Größenordnungen (Planck → elektroschwach), effektiv $D_f^{\text{eff}} \approx 2{,}973$ (Dok. 133); geometrisch $100 = 4 \cdot 5^2$ (Dok. 042).
- K_{frak} ist **nicht willkürlich**, sondern durch die Forderung fixiert, dass zwei unabhängige Herleitungen des Massenverhältnisses m_e/m_μ denselben Wert liefern (Dok. 133, *Eindeutige Bestimmung*).
- $\xi = 4/30000$ selbst ist über Higgs-Relation, α und Koide verankert.

Das Schließungs-Komma *re-exprimiert* damit die bereits verankerte 100ξ; es leitet sie nicht neu ab. Die 75 ist ein Output derselben Rekursion, kein unabhängiger Anker.

Konsequenz für die Projektion (Marcel)

Damit bleibt die Aussage an Marcel gültig, nur richtig gebucht: *wenn* sein projiziertes, geschlossenes Umdrehungs-Objekt ein Ausschnitt derselben Rekursion ist (belegt über $2/9$, $D6$, Zeit), dann trägt die Umrechnung zwischen seiner Projektion und der aufgerollten exakten Kurve genau den Pro-Schritt-Faktor $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = 74/75$ (bzw. reziprok $75/74$) — einen Faktor, der *unabhängig* verankert ist (Dok. 133), nicht aus der 75 und nicht frei gewählt. Es ist damit eine Konsistenz-Bedingung, keine Ableitung aus der Windungszahl: verschluckt seine Projektion das Komma und erscheint das Objekt sauber geschlossen, ist K_{frak} die Umrechnung, die es an der Grenze zur SI-Ebene wieder einträgt (Dok. 298, SM als dekompaktifizierte Projektion). Die Einbettung ι (Dok. 299) ist an dieser Stelle diese K_{frak}-Umrechnung.

Grenze und Status

Die Kette ist so belastbar wie ihre Verankerung: $2/9$ und $D6$ sind als geteilte Objekte gebucht (Kategorie B), $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ ist über Dok. 133 unabhängig verankert. Prüfskript des Kommas: `python/Dok300_Skripte/ffgft_300_kfrak_schliessungskomma_pruefung.py`; Zeitsektor-Gegenlauf: `python / Dok299_Skripte / ffgft_299_iota_gegenlauf_winding_locked.py`.

Kapitel aj

Dok. 301 — Der Umkehrtest — Information als Ausgang, nicht als Grundeinheit

Dok. 301 Der Umkehrtest — Information als Ausgang, nicht als Grundeinheit

aj.1 Anlass und Abgrenzung

Aus der Zusammenarbeit stammt ein Stabilitätsbild, das drei Größen — Information, Kohärenz und Energie (ICE) — als gleichrangige Ecken eines Dreiecks führt, mit einer Referenz im Zentrum. Dieses Dokument prüft, welche kategoriale Stellung „Information“ in einem solchen Bild tatsächlich einnimmt. Der Befund ist gerichtet, aber nicht einstufig: *Information* ist nicht gleichbedeutend mit *Bit*. Der Begriff zerfällt in drei Ebenen — das Bit (Comparator-Ausgang), die Beschreibung (gewählte Darstellung) und die absolute Identität (das vollständige Objekt selbst). Als Grundeinheit neben Energie taugt Information auf keiner der beiden unteren Ebenen; fundamental gilt sie allein im absoluten Sinn, als oberste Identität. Das Kriterium, das diese Einordnung trägt, ist die Umkehrbarkeit. Abgrenzung: Kategorie-B-Befund (kategoriale Klassifikation, keine physikalische Ableitung, keine Behauptung, dass FFGFT ein Bit herleitet). Das Ergebnis ist eine Präzisierung des Reduktionsprinzips aus Dok. 296 und der Comparator-Fassung aus Dok. 300.

aj.2 Das Kriterium: fundamental heißt umkehrbar

Eine Größe ist genau dann fundamental, wenn ihre Umformung keine ausgezeichnete Richtung hat — wenn man sie auf den Kopf stellen kann und sie stehen bleibt. Der Prüfstein ist die Energie in natürlichen Einheiten. Über die Relation

$$\tilde{T} \cdot m = 1 \tag{aj.1}$$

sind Energie, Masse und die duale Zeit keine unabhängigen Achsen, sondern drei Ansichten einer Größe:

$$E = m = \frac{1}{\tilde{T}}. \tag{aj.2}$$

Diese Umformung ist symmetrisch: man kann bei E beginnen und m ablesen, bei m und $\tilde{T}$, bei $\tilde{T}$ und E. Keine Seite ist die primäre, keine ist Eingang oder Ausgang. Genau das ist der Grund, warum Energie intrinsisch ist und die Energieskala E_0 dem Rahmen nativ zukommt (Dok. 292): die Umformung führt nichts weg, jede Ansicht trägt die anderen vollständig in sich. Umkehrbarkeit ist hier kein Zusatz, sondern Ausdruck davon, dass nichts verloren geht. In SI treten $\hbar$ und c als Umrechnungsfaktoren wieder ein und ziehen die drei Größen auseinander; das ist die Projektion, nicht der Kern.

aj.3 Intrinsisch und relational

Nicht jede Größe trägt sich selbst. Eine geometrische Größe ist **intrinsisch**: eine Fläche, eine Windung hat ihren Wert ohne Bezug auf etwas anderes. Eine thermodynamische oder informationelle Größe ist **relational**: Entropie ist nur relativ zu einer Vergröberung (Coarse-Graining) definiert, ein Bit nur relativ zu einer ausgezeichneten Referenz. Es gibt kein Bit „an sich“. Diese Unterscheidung ist die kategoriale Grundlage des Folgenden: intrinsische Größen können fundamental sein, relationale setzen stets ein *bezüglich* voraus und können daher nicht selbsttragend sein.

aj.4 Das ICE-Dreieck als Comparator

Liest man das ICE-Bild schaltungstechnisch, deckt es sich Ecke für Ecke mit dem Comparator aus Dok. 300 — nicht analog, sondern als dasselbe Objekt von der anderen Seite. Verwertbare Information am Ausgang eines Vergleichs verlangt drei Zutaten und eine vierte Bedingung:

- **Energie** — das Signal am $+$Eingang trägt einen Pegel; ohne Pegel kein Vergleich.
- **Kohärenz** — das Signal hat Phasenstruktur, ist nicht bloßes Rauschen; geometrisch die Phase auf den Windungen.
- **Referenz** — der $-$Eingang, die Schwelle, gegen die entschieden wird; er muss aus einer *anderen*, abgeleiteten Quelle stammen als das Signal (Dok. 300: Referenz aus Ableitung, nicht aus Kopie).
- **Hysterese** — eine nackte Schwelle klappert am Umschaltpunkt; ein Übergang gilt erst, wenn er über ein Totband steht (Amplituden-Hysterese) oder über ein Fenster stehen bleibt (Zeit-Hysterese, Entprellung). Ohne Totband ist der Ausgang bedeutungslos, gleich wie sauber Energie und Kohärenz sind.

Wichtig: Das ICE-Dreieck enthält Energie, Kohärenz und Referenz, aber kein ausgewiesenes Totband. Die Hysterese ist die vierte Bedingung, ohne die aus „Schwelle überschritten“ kein „Übergang gilt“ wird. Die in der finiten Proxy-Implementierung verwendete Zeit-Hysterese ist genau das gleitende Fenster M_m (Dok. 300/297) — ein Entpreller, und als solcher ein Kurzzeitpuffer, kein akkumulierendes Gedächtnis.

aj.5 Information ist Ausgang, nicht Eingang

Damit dreht der Comparator die Ordnung um, die das Dreieck nahelegt. Energie, Kohärenz, Referenz und Hysterese stehen am *Eingang*. Information ist das, was am *Ausgang* herauskommt, wenn diese Bedingungen erfüllt sind: das Bit, das der Schwellenentscheid erzeugt. Sie ist nicht die Zutat, aus der der Vergleich gebaut ist, sondern sein Ergebnis. Eine Größe aber, die den ganzen Apparat voraussetzt, um zu entstehen, kann nicht die Grundeinheit sein, aus der der Apparat besteht. Das ist zugleich der Grund, warum frühere Versuche, ein Bit als Grundeinheit zu verankern, scheitern mussten: sie wollten das Ausgangsprodukt als Eingangsgröße setzen — eine Zirkularität.

aj.6 Der Umkehrtest

Das Kriterium aus Abschnitt 2, auf Information angewandt, fällt negativ aus. E–m–$\tilde{T}$ ist bidirektional: jede Ansicht rekonstruiert die anderen, weil nichts weggeworfen wird. Der Comparator ist *unidirektional*:

$$\text{Signal} + \text{Referenz} + \text{Hysterese} \;\longrightarrow\; \text{Bit}, \tag{aj.3}$$

und dieser Pfeil kehrt nicht um. Aus einem Bit erhält man das Signal nicht zurück, nicht seinen Pegel, nicht seine Phase, nicht die Referenzschwelle, gegen die entschieden wurde. Fundamentale Größen sind umkehrbar, weil sie erhalten; Information ist nicht umkehrbar, weil sie tilgt. *Fundamental und Bit schließen sich damit nicht zufällig aus, sondern definitorisch*: Umkehrbarkeit verlangt, dass die erzeugende Struktur im Ergebnis erhalten bleibt, und das Bit ist gerade die Operation, die sie nicht erhält.

aj.7 Das Bit als ultimative Reduktion

Nach Dok. 296 ist jede Auswertung eine Reduktion: sie lässt weg, und gerade das Weglassen macht einen Teilbereich verwertbar. Das Bit ist der Grenzfall dieser Aussage — die *maximale* Reduktion. Ein ganzer Signalverlauf mit seiner Energie, seiner Phase, seiner Lage relativ zur Schwelle wird auf ein einziges Ja/Nein zusammengezogen; weniger geht nicht. Und die Irreversibilität ist nicht ein Zusatz zur Reduktion, sie *ist* die Reduktion: die Schwelle, die Phase, die Eingangsbedingungen *waren* — im Moment, in dem der Comparator kippt, sind sie weg. Das Bit trägt nicht mehr, wie es zustande kam. Es sagt „drüber“ oder „drunter“, nicht mit welchem Pegel, nicht mit welcher Phase, nicht wie weit von der Referenz. Alles, was das Ergebnis erzeugt hat, ist im Ergebnis nicht mehr enthalten — deshalb gibt es kein Zurück, denn das Wozu-zurück ist genau das, was die Reduktion getilgt hat.

aj.8 Der Landauer-Anschluss

Diese Irreversibilität ist die thermodynamische Seite derselben Sache. Ein Bit zu löschen kostet $k_B T \ln 2$ und erzeugt Entropie; die Richtung ist eingebaut, weil das

Tilgen von Information Wärme produziert. Den Comparator umzukehren hieße, diese Entropie zurückzuholen, und das ist thermodynamisch ausgeschlossen. Das erklärt rückwirkend, warum die Anbindung eines Grundeinheit-Bits an die Wärmebewegung im bisherigen Arbeitsstand so schlecht gelang: der Versuch band eine gerichtete, reduzierende Größe an eine reversible Grundstruktur; die Richtungen passen nicht zusammen. Nicht ein Mangel an Rechnung, sondern eine kategoriale Unverträglichkeit war die Ursache.

aj.9 Drei Ebenen von Information: Bit, Beschreibung, absolute Identität

Der Umkehrtest trennt sauber, aber die Grenze verläuft nicht bei „Information" pauschal. Der Begriff zerfällt in drei Ebenen, die verschieden auf den Test antworten.

Erste Ebene — das Bit. Der Comparator-Ausgang: referenzabhängig, am Ausgang erzeugt, eingangsbedingungen-tilgend. Er fällt durch — unidirektional, reduzierend, die ultimative Reduktion (siehe „Der Umkehrtest" und „Das Bit als ultimative Reduktion"). Folge, nicht Grundlage.

Zweite Ebene — die Beschreibung. Information ist nicht das Bit, sondern zunächst eine *Beschreibung*: die Darstellung eines Sachverhalts. Welche Art der Beschreibung gewählt wird — geometrisch, mathematisch, rhetorisch — ändert die Darstellung, nicht den Sachverhalt. Das ist dieselbe Linie wie in Dok. 297/300: eine Darstellung ist eine Koordinatenwahl, keine strukturelle Eigenschaft des Objekts; verschiedene Beschreibungen desselben Objekts sind ineinander übersetzbar, aber keine ist das Objekt. Und keine ist je *vollständig*: jede Beschreibung ist eine Projektion (Dok. 296), also eine Reduktion, also lässt sie weg. Eine vollständige Beschreibung gäbe es nur, wenn eine Projektion nichts wegließe — und dann wertete sie nichts aus. Auch die Beschreibung fällt daher durch den Umkehrtest: als Weg zurück zum Objekt ist keine einzelne Beschreibung umkehrbar, weil jede unvollständig ist. Die Beschreibungen sind untereinander übersetzbar, aber keine rekonstruiert das Ganze.

Dritte Ebene — die absolute Identität. Fundamental im vollen Sinn ist allein das vollständige Objekt selbst: das randlose T^4-Objekt (der Kern ξ auf T^4), aus dem jede Projektion nur einen Ausschnitt zeigt. *Information im absoluten Sinn* ist keine Größe *im* System und keine einzelne Beschreibung, sondern die vollständige Selbstidentität des Objekts mit sich, vor jeder Projektion. Nur diese Ebene besteht den Umkehrtest — trivial, weil bei ihr nichts wegzulassen ist: es gibt kein „bezüglich", weil es keinen Außenstandpunkt gibt. Das ist die oberste Identität; ihr, und nur ihr, kommt „Information" fundamental zu (Selbstreferenz, Dok. 248 §8).

Wichtig: Die geometrische Struktur des Kerns — Windungszahlen als topologische Invarianten, verlustfrei getragen — gehört zur dritten Ebene, zum Objekt selbst; sie ist nicht „Information" im Bit-Sinn. Eine geometrische *Beschreibung* dieser Struktur bleibt dagegen zweite Ebene: eine Projektion. Und das abgelesene Bit ist erste Ebene. Die drei Bedeutungen dürfen nicht vermischt werden. Insbesondere gilt: steht überhaupt etwas „über" der Energie, dann nicht das Bit, sondern das vollständige Objekt — und Energie ist eine seiner Projektionen (eine besonders intrinsische, aber eine Ansicht).

aj.10 Digitalisierung: die Stufung und ihre Glättung

Der Grund, warum ein Bit nie die gesamte Information tragen kann, ist der Grundmechanismus der Digitaltechnik: Analog-Digital- und Digital-Analog-Wandlung. Ein Bit ist die 1-Bit-Quantisierung — die gröbste mögliche Stufung, eine einzige Schwelle. Jede feinere Stufung mit endlich vielen Stufen bleibt kategorial dasselbe Objekt, nur höher aufgelöst.

Die Torsionswindung liefert das natürliche Beispiel. Die aufgerollte Rekursion schließt nach genau 75 gleichen Teilstücken (Dok. 300/295); zerlegt man die Windung in diese 75 Teile, hat man sie digitalisiert — 75 diskrete Stufen. Per DA-Wandlung lässt sich daraus wieder ein kontinuierlicher Verlauf gewinnen. Aber die Rekonstruktion ist bereits verlustbehaftet, aus zwei Gründen:

- Die Quantisierung wirft weg, was *zwischen* den Stufen lag. Die kontinuierliche Struktur zwischen den 75 Knoten — die exponentiell schrumpfenden Schritte der log-Spirale, das kumulierte Integral $D(k)$ (Dok. 295) — ist in den 75 Werten nicht enthalten.
- Der DA-Wandler gibt eine Treppe aus, keine glatte Kurve. Man muss die Stufen *glätten* (Rekonstruktionsfilter). Aber die Glättung ist eine Interpolation — eine Annahme, die der Filter hinzufügt, nicht eine im Digitalwert enthaltene Information. Was zwischen den Stufen steht, wird geraten, nicht zurückgewonnen.

Damit ist der AD/DA-Umlauf gerade *kein* echter Kehrwert, sondern ein gerichteter, verlustbehafteter Vorgang: der Umkehrtest in schaltungstechnischer Form. Die verlorene Zwischenstruktur wird durch die Glättung nicht rekonstruiert, sondern durch eine Filterannahme ersetzt — dieselbe Signatur wie beim Bit, dessen Eingangsbedingungen „waren" und im Ergebnis nicht mehr stehen.

Wichtig: Selbst die *natürliche* Stufung — 75, die Schließungszahl — trägt das Kontinuum nicht. Sie ist die richtige Zahl für den Schließungsschritt, aber nicht für den kontinuierlichen Verlauf: das volle Objekt ist reicher als jede endliche Stufung (Dok. 296). Kein N, auch nicht das strukturell ausgezeichnete $N = 75$, trägt das Kontinuum. Eingeordnet in die drei Ebenen: das Bit ist die 1-Stufen-Quantisierung (erste Ebene, Ausgang); jede endliche N-Stufung — auch die 75-Teilung — ist eine Beschreibung endlicher Auflösung (zweite Ebene), feiner als ein Bit, aber weiter verlustbehaftet, weiter Projektion; allein die kontinuierliche Windung, das vollständige Objekt, trägt alles (dritte Ebene). Die Glättung ist genau die Stelle, an der die Beschreibung ihre Unvollständigkeit durch eine Annahme überdeckt.

aj.11 Präzisierung: Resonanzen erzwingen die Quantisierung

Der vorige Abschnitt sprach von der „kontinuierlichen Struktur zwischen den Knoten". Das ist zu präzisieren, denn auf der feinsten Skala ist das Objekt nicht kontinuierlich. Der Torus ist kompakt, und ein kompakter Torus hat ein *diskretes* Spektrum: die Resonanzen auf T^4 — die Eigenmoden des T^4-Connection-Laplace (Dok. 283) — erzwingen eine Quantisierung. In den kleinsten Teilen sind *nicht alle Möglichkeiten gleichberechtigt*; die Resonanzstruktur zeichnet bestimmte diskrete Zustände aus. Genau das ist der Grund, warum das Standardmodell diskret herauskommt — die

Massen, $\theta = 2/9$, die Z_3-Struktur sind Resonanzen, keine beliebigen Punkte eines Kontinuums.

Daraus folgt eine Einschränkung des Verlust-Arguments: es gibt einen *kleinstmöglichen Sprung*, das von den Resonanzen gesetzte Quantum. Eine Wandlung, die bis zu diesem kleinsten Sprung geht und die Resonanzstruktur trifft, ist *erlaubt* — sie ist nicht verlustbehaftet, weil unterhalb des Sprungs keine weiteren Zustände liegen, die man verlieren könnte. Was zwischen einer *gröberen* Stufung liegt, ist daher kein Kontinuum, sondern feinere *diskrete* Resonanzstruktur, und diese hat einen Boden.

Damit verfeinert sich der Umkehrtest: Verlust entsteht nicht durch Quantisierung als solche, sondern nur durch eine Stufung, die *gröber* als die Resonanzen ist oder *quer* zu ihnen liegt — etwa eine beliebige Gleichteilung. Eine resonanzgetreue Wandlung bis zum kleinsten Sprung besteht den Umkehrtest: sie erfasst die tatsächliche diskrete Struktur, nicht eine Näherung. Das Bit bleibt gleichwohl die ultimative Reduktion — eine einzige Schwelle ist gröber als der Resonanzboden und trifft ihn nicht. Und über eine einzelne Skala hinaus gilt weiterhin: keine Beschreibung einer Skala erfasst die skalenübergreifende Fülle des vollen Objekts (Dok. 296). Die Aussage „das volle Objekt ist reicher als jede endliche Stufung“ ist damit *skalenübergreifend* zu lesen — innerhalb einer Skala ist die resonanzgetreue Stufung dagegen die wahre Struktur.

aj.12 Zeitliche und topologische Randlosigkeit

Zwei Eigenschaften der absoluten Identität folgen aus Analysis und Topologie und sind daher als *Folgerungen* gebucht, nicht als Setzung.

Kein erreichbarer Rand der Rekursion. Die Abbildung $\xi_{n+1} = \xi_n(1 - 100\,\xi_n)$ hat $\xi = 0$ als Fixpunkt; ξ_n zerfällt monoton gegen null, erreicht null aber in keinem endlichen Schritt (Doc. 296). Es gibt keinen ersten und keinen letzten Schritt. Ein „einfachster Anfangszustand“ — eine Skala ohne fraktale Struktur, aus der die Verfeinerung erst zu wachsen begänne — existiert nicht: die Selbstähnlichkeit (Faktor $1/e$ je 2π-Umlauf, log-Spirale) ist keine Eigenschaft, die sich aufbaut, sondern in der Abbildungsvorschrift bereits vollständig vorhanden. Ein struktureller Anfang würde die Skaleninvarianz brechen, die die Rekursion definiert — ein Widerspruch, kein Weltbild.

Zeit ohne markierbaren Ursprung. Die erlebbare Zeit *ist* der kumulierte Defekt $D(k) = \sum 100\,\xi_n$ (Doc. 295), die Summe über $1/\delta t_n = 100\,\xi_n$; mit $\xi_{n+1} = \xi_n(1 - 100\,\xi_n)$ bis $k = 10^5$ ist $\sum 100\,\xi_n = 7{,}19 \approx \ln(1 + k/75) = 7{,}20$, während die Summe der Schrittweiten selbst, $\sum 1/(100\,\xi_n) = 5{,}0 \times 10^9$, quadratisch wächst. Da die Rekursion keinen ersten Schritt hat, hat $D(k)$ keinen ausgezeichneten Ursprung. Zeit ist die Rekursion, nicht ihr Behälter; einen „Anfang der Zeit“ zu suchen hieße, die Rekursion an einen Zeitpunkt zu setzen, den sie erst erzeugt.

Kein Außenstandpunkt. T^4 ist kompakt und randlos, $\partial T^4 = \emptyset$. Das ist eine topologische Tatsache, keine Setzung. Aus ihr folgt, dass es keinen Standpunkt außerhalb des Objekts gibt — und damit das „kein bezüglich“ der absoluten Identität: das vollständige Objekt hat kein Außen, gegen das es sich abgrenzte.

Beides zusammengenommen: die absolute Identität ist randlos im Räumlichen (kein Außen, $\partial T^4 = \emptyset$) und im Zeitlichen (kein Anfang, keine erreichbare Grenze der Rekursion) — dieselbe Eigenschaft in zwei Gestalten: kein Standpunkt jenseits des

Objekts. Diese Aussagen sind aus Analysis und Topologie ableitbar und tragen keinen Spekulationsmarker.

aj.13 Der reflexive Fall — was über die Mathematik hinausgeht

Das Folgende geht ausdrücklich über die Mathematik hinaus und ist als philosophisch-spekulativ gebucht (P35). Es sind zwei Interpretationssprünge, keine Rechnungen.

Wendet man die drei Ebenen auf FFGFT selbst an, so ist das Framework — der Torus, $\tilde{T} \cdot m = 1$, ξ über alle Skalen — eine *Beschreibung* (zweite Ebene), notwendig unvollständig. Das ist keine Schwäche gerade dieses Frameworks, sondern was eine Beschreibung ist: keine Theorie ist je ihr Objekt, jede projiziert und lässt weg. FFGFT sagt dies ausdrücklich, während naive Realismen so tun, als seien sie das Gebiet.

Erster Sprung — die Realisten-Setzung. Dass die resonanzgetreue Beschreibung ein *reales* Objekt nachspurt und nicht bloß eine konsistente Struktur ist, ist gesetzt, nicht bewiesen. Die Mathematik zeigt Resonanztreue (die Massen als Eigenmoden, Koide; die Übereinstimmung von α mit dem Messwert ist dagegen eine Eigenschaft des Ankers E_0, keine unabhängige Vorhersage); dass Treue Realität nachspurt statt nur Konsistenz, ist die Realisten-Wette. Der deflationäre Leser darf stets sagen: alles nur Beschreibung, das Objekt eine nützliche Fiktion. FFGFTs Antwort ist kein Beweis, sondern die Wette, dass der resonanzgetreue Erfolg durch ein reales Objekt besser erklärt ist als durch Zufall — und das Besondere ist nur, dass die Resonanztreffer diese Wette falsifizierbar machen.

Zweiter Sprung — die Diagnose des Wort-Reflexes. Die Anziehungskraft der Information-als-Fundament-Idee („Im Anfang war das Wort"; „it from bit"; die Masse-Energie-Information-Äquivalenz) könnte aus einem tiefen kulturellen Reflex stammen: dass Information die erste Substanz sei, aus der Materie folgt. Der Umkehrtest dreht die Reihenfolge um: das Wort ist das Bit, und das Bit ist die letzte Reduktion, nicht die erste Schöpfung. Im Anfang war die Geometrie (das Objekt); das Wort ist, was eine ihrer Skalen davon ausliest. Dies ist eine kulturell-kognitive Hypothese darüber, *warum* die Intuition zieht — keine mathematische Aussage; der Umkehrtest selbst bleibt mathematisch.

Selbstprojektion. FFGFT ist ein T^4-Prozess, der T^4 beschreibt (Doc. 248 §8): die Beschreibung ist aus demselben Stoff wie das Objekt und wird von ihm erzeugt (der beschreibende Prozess ist selbst ein T^4-Prozess auf der kognitiven Skala). Damit ist FFGFT weder extern zum Objekt noch das Objekt, sondern dessen *Selbstprojektion* — das Objekt, das sich auf einer seiner eigenen Skalen beschreibt. Selbstreferenz als ontologischer Ort, gebucht als Setzung.

Daraus die Grenze der Ausgangsfrage: „Wieviel ontologische Realität hat FFGFT?" ist selbst eine Frage der zweiten Ebene — sie setzt einen beschreibenden Standpunkt voraus, den es gegenüber der dritten Ebene nicht gibt. Man kann nicht von außen fragen, wieviel Realität das Objekt hat, weil es kein Außen gibt; man kann nicht fragen, was vor ihm war, weil es kein Vorher gibt. Auf der Ebene der absoluten Identität löst die Frage sich auf.

aj.14 Status

Kategoriale Klassifikation (Kategorie B), kein physikalischer Ableitungsschritt. Der Befund ordnet Information relativ zu Programmen ein, die sie als physikalische Grundgröße setzen (etwa eine Masse-Energie-Information-Äquivalenz): solche Programme behandeln Information als Eingang; der Umkehrtest zeigt, dass das Bit Ausgang ist. Die drei Ebenen sind dabei mit verschiedenen Temperaturen zu buchen:

- **Bit** — *bewiesen*: die ultimative, eingangsbedingungen-tilgende Reduktion ist irreversibel und daher Folge, nicht Grundeinheit (Umkehrtest).
- **Beschreibung** — *strukturell*: jede Darstellung ist eine Projektion und damit unvollständig (Reduktionsprinzip, Dok. 296); eine Koordinatenwahl, keine strukturelle Eigenschaft des Objekts.
- **Absolute Identität** — *ontologische Setzung*: Information im absoluten Sinn wird mit dem vollständigen Objekt identifiziert und ist die oberste Identität (Selbstreferenz, Dok. 248 §8). Das ist gesetzt, nicht abgeleitet.

Die tragende Aussage in einem Satz: *fundamental ⇔ umkehrbar; Bit und einzelne Beschreibung fallen durch (das Bit tilgt, jede Beschreibung ist unvollständig), allein die absolute Identität besteht den Test — also gilt Information nur im absoluten Sinn als oberste Identität, und diese ist bei FFGFT der Kern ξ auf T^4, nicht eine Größe daneben*. Anschluss: Dok. 296 (Reduktion als Bedingung der Auswertbarkeit), Dok. 300 (Comparator, Referenz, Hysterese), Dok. 283 (diskretes Resonanzspektrum auf T^4), Dok. 292 (E_0 intrinsisch), Dok. 248 §8 (Selbstreferenz).

Kapitel ak

Dok. 302 — Elementarzellen, Ein-Bit-Kapazität und Partitionsinvarianz

Dok. 302 Elementarzellen, Ein-Bit-Kapazität und Partitionsinvarianz — eine spektrale Antwort

Der folgende Text beantwortet einen naheliegenden Einwand gegen jedes Bild eines „quantisierten Raums“: Welches beobachterunabhängige Kriterium unterscheidet eine Elementarzelle von ihren Nachbarn? Warum sollte eine fundamentale Länge feste Zellen mit je genau einem Bit implizieren? Ist die daraus berechnete Entropie invariant unter Änderungen von Ursprung, Orientierung, Koordinaten oder Foliation? Und folgt die Unteilbarkeit einer Zelle aus der Planck-Skala, oder ist sie eine zusätzliche Annahme? Die kurze Antwort lautet: Jeder dieser Punkte ist korrekt — als Einwand gegen eine *Zell-Ontologie* —, und FFGFT beruht auf keiner solchen. Es ersetzt Zellen durch topologische und spektrale Invarianten (Windungsklassen und Moden), und die Einwände lösen sich der Reihe nach auf.

ak.1 Das Bild, auf das die Einwände zielen

Eine Ontologie „ein Bit pro Planck-Zelle“ kachelt den Raum (oder eine Horizontfläche) in feste Zellen der Größe $\sim \ell_P$, weist jeder eine Ein-Bit-Kapazität zu und liest die Entropie aus der Zellzahl ab. Gegen dieses Bild sind die folgenden Punkte stichhaltig:

- es gibt kein beobachterunabhängiges Kriterium, das eine Raumzelle von ihrer Nachbarin unterscheidet: eine Kachelung trägt einen gewählten Ursprung und eine gewählte Orientierung;
- die Planck-Länge ist eine *Skala*, und eine Skala impliziert für sich genommen keine Zerlegung in diskrete Behälter;
- eine partitionsbasierte Entropie ist nicht invariant unter Änderung von Ursprung, Orientierung, Koordinaten oder Foliation — sie erbt die Willkür der Partition;

- ist der Raum ein Kontinuum, so lässt sich jede Zelle weiter teilen, sodass „eine Zelle = ein unteilbares Bit“ einen unabhängigen Grund braucht, warum Halbzellen-Zustände verboten sind;
- und ohne diesen Grund ist die Zelle schlicht ein zusätzliches Postulat, das auf der Planck-Skala aufsitzt.

Alle fünf werden zugestanden. Genau deshalb beruht das Modell nicht auf Raumzellen.

ak.2 Invarianten statt Zellen

Das fundamentale Objekt ist kein Gitter aus Zellen, sondern eine kompakte, randlose Mannigfaltigkeit — ein Vier-Torus T^4 (mit einer $\mathbb{Z}_3$-Identifikation), eingebettet in einen Hilbert-Raum $\mathscr{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$. Die elementaren diskreten Objekte der Theorie sind keine Raumbereiche; sie sind *Windungsklassen* ($\pi_1(T^4) \cong \mathbb{Z}^4$, die Träger der Informationseinheit) und *Eigenmoden* eines Operators auf dieser Mannigfaltigkeit (der Verbindungs-Laplace- bzw. Massenoperator, die Träger des Massenspektrums). Mit diesem einen Wechsel der Ontologie — Invarianten statt Zellen — lösen sich die Punkte der Reihe nach.

1. **Beobachterunabhängige Individuierung.** Die elementaren diskreten Objekte werden durch *Invarianten* unterschieden, nicht durch eine Lage im Raum: die Informationseinheit durch ihre *Windungszahl* (eine topologische Invariante, $\pi_1(T^4)$), das Massenspektrum durch *Eigenwerte* (eine spektrale Invariante). Beide hängen nicht von Koordinaten, Ursprung oder Orientierung ab. Es gibt keine „Nachbarzelle im Raum“ zu unterscheiden; es gibt diskrete, durch Invarianten gekennzeichnete Klassen. Die Individuierung ist topologisch bzw. spektral, nicht räumlich — und genau das macht sie beobachterunabhängig.
2. **Was die Informationseinheit ist — und was am „einen Bit“ Definition bleibt.** Die Diskretheit stammt nicht von der Planck-Länge und ist keine Kachelung, sondern ist *topologisch*: $\pi_1(T^4) \cong \mathbb{Z}^4$ kennt nur ganzzahlige Windungszahlen. Die minimale Informationseinheit ist daher *per Definition* das Windungsquant $\Delta w = 1$ (Dok. 257) — skalenuniversell und energieunabhängig; ein halbes Windungsquant gibt es nicht. Die Identifikation „ein Bit ≙ eine minimale Windung“ ist eine *Definition*, wenn auch eine topologisch motivierte (die kleinste nichttriviale Windung), keine willkürliche Zwei-Zustands-Annahme. Das $\ln 2$ ist *nicht* die fundamentale Einheit, sondern ihr thermodynamischer Schatten: die *Energie* eines Bits ist skalenspezifisch, $E_{\text{bit}}(L) = \hbar c/L$, und Landauers $E_L = k_B T \ln 2$ ist der Spezialfall bei einer einzigen (der biologischen) Skala. Damit ist Takayukis Punkt (2) beantwortet: „warum genau ein Bit“ ist eine Definition auf topologischer Grundlage ($\Delta w = 1$), nicht aus einer Skala erzwungen — und die Einheit ist skalenuniversell, also gerade nicht an eine gewählte Partition gebunden.
3. **Invarianz unter Ursprung, Orientierung, Koordinaten, Foliation.** Ja. Da die Entropie eine Funktion des Spektrums ist — eine Zählung oder Spur über Eigenwerte — und Eigenwerte Invarianten sind, ist die Entropie automatisch unabhängig von

Ursprung, Orientierung, Koordinatenwahl und Basis. Dies ist kein zusätzliches Axiom, sondern eine Eigenschaft spektraler Größen. Eine partitionsbasierte Entropie fiele durch den Invarianztest — womit der Einwand recht behält —, weshalb das Modell die Entropie gar nicht über eine Partition definiert. Ein weiteres, modellspezifisches Resultat macht die Ursprung-/Orientierungs-Unabhängigkeit explizit: auf der kompakten Struktur gibt es keine ausgezeichnete Indexzuweisung — alle D_6-äquivalenten Segmente der Torusstruktur sind gleichwertige Beschreibungen desselben Objekts („Verzahnung, nicht Ausschnitt"). Eine Auszeichnung einer „ersten" Zelle oder einer bevorzugten Achse ist weder verfügbar noch nötig.

4. **Kontinuierlicher Raum, keine Halbzellen.** Der Raum ist kontinuierlich: T^4 ist eine glatte Mannigfaltigkeit, ohne Raumatomismus. Man kann Unteilbarkeit daher nicht durch Unterteilung des Raums gewinnen, und das Modell versucht es nicht. Die Unteilbarkeit ist *topologisch und spektral*, nicht räumlich: $\pi_1(T^4) \cong \mathbb{Z}^4$ lässt keine halbe Windung zu, und das Spektrum auf der kompakten Mannigfaltigkeit hat einen kleinsten, durch die Topologie festgelegten Abstand (Umfang / Randlosigkeit), so wie eine endliche Saite nicht bei „der Hälfte ihrer Grundfrequenz" schwingen kann. „Halbzellen-Zustände" ist in dieser Sprache ein Kategorienfehler: es gibt keine Zellen zu halbieren. Das Kontinuum der Mannigfaltigkeit und die Diskretheit des Spektrums bestehen spannungsfrei nebeneinander — genau wie in der Akustik, wo ein kontinuierliches Medium eine diskrete Menge von Normalmoden trägt.
5. **Abgeleitet, nicht angenommen.** Die Diskretheit folgt; sie ist kein zusätzliches „Zellpostulat". Auf einer kompakten Mannigfaltigkeit ist die Diskretheit des Spektrums ein Satz. Angenommen wird die kompakte Geometrie selbst — der Torus $T^4/\mathbb{Z}_3$ und der Wert von ξ. Die ehrliche Bilanz lautet: das „Ein-Bit-pro-Zelle"-Postulat wird gegen ein „Kompakte-Geometrie"-Postulat eingetauscht, und aus letzterem ist die Diskretheit abgeleitet, nicht injiziert. Das ist eine echte Annahme, und dort sollte das Modell angegriffen werden — aber empirisch, nicht per Dekret: dieselbe Geometrie, die das diskrete Spektrum liefert, legt auch Teilchenmassen fest, und das sind falsifizierbare Zahlen (etwa eine τ-Masse von $1776{,}969$ MeV, prüfbar an Belle II). Ist die Geometrie falsch, fallen Spektrum und Massen gemeinsam.

ak.3 Was angenommen, abgeleitet und gesetzt ist

Auch die Geometrie selbst ist eine *Beschreibung* (Dok. 301, zweite Ebene) und als solche notwendig unvollständig; keine Beschreibung rekonstruiert das Objekt vollständig. Fundamental im vollen Sinn ist allein das vollständige Objekt (dritte Ebene). Dass die resonanzgetreue Geometrie ein *reales* Objekt nachspurt, ist daher eine ausdrückliche ontologische *Setzung* — keine Ableitung und nicht selbst falsifizierbar; falsifizierbar sind allein ihre resonanzgetreuen Folgen (die Massen). Diese Setzung wird benannt, nicht als abgeleitet ausgegeben.

Fundamental ist die Informationseinheit als *Windungsquant* $\Delta w = 1$ (skalenuniversell, Dok. 257); *Energie* dagegen ist eine skalenspezifische *Projektion* der Geometrie, $E_{\text{bit}}(L) = \hbar c/L$. Eine *Fläche* teilt diesen projizierten, skalenabhängigen Charakter: der Vier-Torus ist randlos ($\partial T^4 = \varnothing$) und trägt keine Horizontfläche, an der Bits säßen; eine Fläche ist dort eine *Projektionsfläche*, ein Objekt der zweiten Ebene. Wo eine

Entropie-Flächen-Relation $S = N \ln 2$ mit $N \propto A/\xi^2$ auftritt, zählt N Windungsquanten und $\ln 2$ ist der thermodynamische Schatten; das A ist keine fundamentale Raumpartition (womit Takayukis Zell-Sorge wiederkäme), sondern eine gewählte Projektion. Fundamental (dritte Ebene) ist weder Fläche noch Energie, sondern das vollständige Objekt; die skalenuniverselle Einheit auf ihm ist $\Delta w = 1$.

Die ehrliche Bilanz lautet somit: *deklarierte Annahme* — die kompakte Geometrie ($T^4/\mathbb{Z}_3$, ξ); *Definition* — die Identifikation „Bit $\triangleq \Delta w = 1$“, topologisch begründet; *abgeleitet* — die Diskretheit ($\pi_1(T^4) \cong \mathbb{Z}^4$), die skalenspezifische Bit-Energie $E_{\text{bit}} = \hbar c/L$ und die Invarianz; *empirische Exposition* — die Massen; *benannte Setzung* — die Realität des Objekts.

ak.4 Zusammenfassung

Die Einwände sind gegen eine Raumzell-Ontologie korrekt, und das Modell stimmt ihnen zu, indem es keine ist. Die Diskretheit ist topologisch ($\pi_1(T^4) \cong \mathbb{Z}^4$) und spektral (das Spektrum auf einer kompakten Mannigfaltigkeit); die minimale Informationseinheit ist das Windungsquant $\Delta w = 1$ (das „Bit“, per Definition, topologisch begründet), nicht die Kapazität einer Raumzelle; und die Invarianz gilt, weil Windungszahlen und Spektren Invarianten sind, nicht weil eine Partition sorgfältig gewählt wurde.

ak.5 Wo dies ausgearbeitet ist

Das diskrete Spektrum des T^4-Verbindungs-Laplace-Operators wird in Dok. 283 behandelt; die Hilbert-Raum-Formulierung $\mathscr{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$ mit Massen als Eigenwerten in Dok. 282; die Informationseinheit als Windungsquant $\Delta w = 1$ und die Drei-Ebenen-Hierarchie (topologisch / geometrisch / thermodynamisch) in Dok. 257 (auf Dok. 255 aufbauend); die Ursprung-/Orientierungs-Unabhängigkeit („Verzahnung, nicht Ausschnitt“) in Dok. 300. Insbesondere der Invarianzpunkt verdient eine ausführlichere schriftliche Behandlung, als er bislang erhalten hat.

Kapitel al

Dok. 303 — Repräsentationale Identität über Rollenwechsel

Dok. 303 Repräsentationale Identität über Rollenwechsel — eine Governance-Ebene unter dem Claim-State-Ledger

Der Claim-State-Ledger fragt, ob ein Übergang *verdient* ist: ob eine Aussage als bewiesen, eingeschränkt oder blockiert gebucht werden darf. Diesem Test geht eine frühere Frage voraus, die er nicht stellt — ob das Objekt, das den Übergang durchläuft, dabei seine *repräsentationale Identität* bewahrt hat. Ein Rollenwechsel ist kein Stärkewechsel. Dasselbe Symbol, dieselbe Zahl, dieselbe Struktur kann nacheinander verschiedene repräsentationale Rollen besetzen — mathematisches Objekt, Rechenergebnis, Kandidat für eine physikalische Größe, Observable, ontologische Setzung —, und zwischen diesen Rollen verläuft die eigentliche, oft unbemerkte Verschiebung. Das vorliegende Dokument benennt diese Ebene, gibt zwei Fallstudien (eine fremde, eine eigene), trennt die Definition (die identifiziert) von der Governance (die bewahrt) und schlägt einen Identitäts-Erhaltungs-Nachweis als dem Ledger vorgelagerte Ebene vor.

al.1 Rollen, nicht Stärken

Ein repräsentationales Objekt kann in einem Rahmen mindestens die folgenden Rollen einnehmen:

- *mathematisches Objekt* — eine Größe innerhalb einer formalen Struktur, ohne physikalische Zuschreibung;
- *Rechenkonstrukt / Ausgabe* — das deterministische Resultat einer Prozedur;
- *Kandidat für eine physikalische Größe* — ein Objekt, dem eine physikalische Bedeutung *vorgeschlagen*, aber noch nicht gesichert ist;
- *Observable* — eine Größe, die an die Messung gekoppelt ist;
- *ontologische Setzung* — eine Behauptung über das, was *ist*, jenseits von Ableitung und Falsifikation.

Diese Rollen sind nicht stärkere oder schwächere Versionen derselben Aussage; es sind verschiedene *Typen*. Der Claim-State-Ledger sortiert Aussagen nach ihrer Belegstärke (bewiesen / eingeschränkt / blockiert); die Rollenfrage sortiert Objekte nach ihrem repräsentationalen Typ. Beide Achsen sind nötig, und sie sind orthogonal.

al.2 Der Fehlermodus: Rollendrift

Der typische Fehler ist nicht die falsche Belegstärke, sondern die *stille Rollendrift*: dasselbe numerische oder mathematische Objekt wechselt seinen Typ, ohne dass der Wechsel als solcher ausgewiesen wird. Eine Zahl, die als Gitterausgabe entsteht, wird als „bare“ physikalische Masse etikettiert, dann als Kandidat-Observable geführt, schließlich als beobachtbarer Wert nach einer noch ausstehenden Korrektur behandelt. Das sind vier repräsentationale Rollen desselben Zahlobjekts. Keine davon ist an sich unzulässig; unzulässig ist nur, den Rollenwechsel als bloße Stärkung derselben Aussage auszugeben. Genau an dieser Stelle tritt Uneinigkeit leise ein — oft lange bevor die Belegfrage überhaupt gestellt wird.

al.3 Fallstudie I (fremd): eine Zahl in vier Rollen

Ein numerisches Objekt aus einem diskreten Gittermodell durchlief in einer IPI-Diskussion vier Rollen: zunächst *Gitterausgabe* (ein deterministisches Rechenergebnis), dann *topologische Rohmasse* (eine physikalische Zuschreibung), dann *Kandidat* für ein beobachtbares Verhältnis, schließlich *Observable nach Abschirmung* (unter einem noch nicht konstruierten Reduktionsmechanismus). Der Fortschritt der Diskussion bestand nicht darin, eine dieser Rollen zu widerlegen, sondern darin, sie zu *trennen*: sobald die Rollen auseinandergelegt waren, konnte jede auf ihrem eigenen konstitutionellen Boden geprüft werden — die Gitterausgabe als bewiesen, die physikalische Zuordnung als Definition, das Observable als noch offener Übergang. Die Trennung der Rollen war der eigentliche methodische Gewinn, unabhängig vom Schicksal des Modells.

al.4 Fallstudie II (eigen): die Informationseinheit

Dieselbe Rollendrift trat bei der Ausarbeitung der vorliegenden Dokumentenserie an FFGFT selbst auf. Die Frage nach der „minimalen Informationseinheit“ wurde nacheinander mit vier verschiedenen Objekten beantwortet: erst mit einer *spektralen Eigenmode* (einem Objekt des Massenoperators), dann mit einer *Fläche* (der holographischen Wahl eines Bit pro Flächenelement), dann mit einer *Zählgröße* der Ordnung $1/\xi$, schließlich mit dem *topologischen Windungsquant* $\Delta w = 1$. Diese vier sind nicht stärkere und schwächere Fassungen derselben Einheit; es sind vier verschiedene repräsentationale Objekte, die nacheinander denselben Namen trugen. Der Rollenwechsel blieb unbemerkt, bis die Identität durch eine *vorgängige, explizite Definition* fixiert wurde: Dok. 257 legt die Informationseinheit per Definition als Windungsquant $\Delta w = 1$ fest ($\pi_1(T^4) \cong \mathbb{Z}^4$, skalenuniversell). Erst dieser Identitätsanker machte die

übrigen Rollen als das lesbar, was sie sind: die Fläche als verlustbehaftete Projektion, das $\ln 2$ als thermodynamischer Schatten, die Energie $\hbar c/L$ als skalenspezifische Projektion — allesamt *abgeleitete oder projizierte* Erscheinungen der einen, fixierten Einheit, nicht konkurrierende Definitionen.

al.5 Definition identifiziert, Governance bewahrt

Die Lehre aus beiden Fällen scheint zunächst zu sein, dass ein *Identitätsanker* die Identität bewahrt. Doch das vermengt zwei Fragen, die getrennt gehören — und die Vermengung ist genau die Rollendrift, die dieses Dokument beschreibt, nun auf das Dokument selbst angewandt. Es sind zwei konstitutionelle Fragen:

- die *deklarative* Frage — *Was ist dieses Objekt?* — wird durch eine *Definition* beantwortet. Die Definition *identifiziert*: sie setzt den konstitutionellen Bezugspunkt, gegen den jeder weitere Anspruch überhaupt erst geprüft werden kann. In FFGFT leistet das $\Delta w = 1$ (Dok. 257): sie legt fest, *was* die Informationseinheit ist.
- die *Governance*-Frage — *Unter welchen Operationen bleibt es dasselbe Objekt?* — ist davon verschieden. Eine Definition setzt die Anfangsreferenz; sie *bewahrt* die Identität nicht. Bewahrt wird sie erst durch die Governance über die nachfolgenden Übergänge.

Kurz: *die Definition identifiziert, die Governance bewahrt*. Der frühere Begriff eines „Identitätsankers" trug beide Rollen unter einem Namen — Definition *und* Erhaltungsmechanismus — und ist damit selbst ein Fall der hier beschriebenen Drift. Sauberer ist, ihn aufzulösen: die Definition ist der deklarierte Bezugspunkt; die Governance ist eine eigene Ebene, die aufzeichnet, was mit diesem Bezug bei jedem Übergang geschieht.

al.6 Der Identitäts-Erhaltungs-Nachweis

Eine bloß binäre Prüfung — gleicher Typ vor und nach dem Übergang → Ledger; verschiedener Typ → Substitution — ist zu grob. Ein Übergang kann die deklarierte Identität eines Objekts auf mehr als zwei Weisen behandeln, und die Governance-Ebene führt darüber einen expliziten Nachweis: sie hält für jeden Übergang fest, ob er die Identität

- *bewahrt* — dasselbe Objekt in derselben Rolle;
- *projiziert* — eine skalen- oder koordinatenabhängige Erscheinung desselben Objekts, verlustbehaftet und nicht fundamental;
- *transformiert* — eine ableitbare Umformung, die die Referenz erhält;
- *substituiert* — ein anderes Objekt unter demselben Namen (undeklariert ist das die Rollendrift; deklariert braucht es eine eigene Lizenz);
- *überbrückt* — eine gesicherte Abbildung auf ein Objekt eines anderen Rahmens.

An FFGFTs eigener Informationseinheit gelesen: das Windungsquant $\Delta w = 1$ ist *bewahrt*; Energie ($\hbar c/L$) und Fläche sind *Projektionen*; das $\ln 2$ ist eine *Transformation* (der thermodynamische Schatten); die frühere Wanderung Eigenmode → Fläche

$\rightarrow 1/\xi$ war *Substitution* unter beibehaltenem Namen, bis die Definition (Dok. 257) die Referenz fixierte; und die Verifikationsrichtung FFGFT→HLV ist eine *Brücke*. Der Nachweis entscheidet keine Physik; er stellt nur sicher, dass bei jedem Schritt sichtbar bleibt, was mit der Identität geschieht — bevor der Ledger fragt, ob der Schritt verdient ist.

al.7 Verhältnis zum Ledger

Damit sind drei Ebenen getrennt. Die *Definition* identifiziert das Objekt (deklarativ). Die *Governance* bewahrt seine Identität über Übergänge und hält im Erhaltungs-Nachweis fest, ob ein Schritt bewahrt, projiziert, transformiert, substituiert oder überbrückt. Der *Claim-State-Ledger* bewertet, ob ein Übergang *verdient* ist (bewiesen / eingeschränkt / blockiert). Die Governance ist dem Ledger vorgelagert: sie stellt sicher, dass über *dasselbe* Objekt gesprochen wird, bevor über dessen Belegstärke gesprochen wird. Alle drei Ebenen sind weitgehend unabhängig von der zugrunde liegenden Physik — sie betreffen die Buchführung der Repräsentation, nicht ihren Inhalt — und gewinnen an Bedeutung, sobald unabhängig entwickelte Rahmen aufeinandertreffen. Ob diese Buchführung informell geführt wird oder durch einen systematischen Mechanismus, ändert nichts an ihrer Wirkung: die Diskussion verschiebt sich vom Verteidigen von Positionen zum Lokalisieren dessen, wo Annahmen sitzen, was abgeleitet ist und wo ein Objekt seine Identität wechselt.

al.8 Status

Dieses Dokument ist ein methodischer Vorschlag, keine physikalische Ableitung. Die FFGFT-spezifischen Aussagen — die Informationseinheit als $\Delta w = 1$, die drei Ebenen, die Projektionsnatur von Energie und Fläche — sind korpusgestützt (Dok. 257, 301, 300); die Rollentaxonomie und die Identitätsprüfung sind konstitutionelle Buchführung und als solche gebucht. Die zweite Fallstudie ist ausdrücklich selbstkritisch: FFGFT bedurfte der hier vorgeschlagenen Disziplin selbst, und der Identitätsanker $\Delta w = 1$ wurde erst nachträglich (Dok. 257) als solcher erkannt. Der Anlass der Frage — ein Einwand gegen Elementarzellen, die konstitutionelle Rahmung des Übergangs-Problems und die repräsentationale Typisierung der beteiligten Objekte, wie sie im IPI-Kreis (Takayuki Ueda, Stefaan Vossen, José Tomás Guevara Calderón) entwickelt wurde — wird dankend anerkannt. Die Unterscheidung zwischen deklarativer Identität (Definition) und ihrer Erhaltung durch Governance sowie der fünfteilige Erhaltungs-Nachweis (bewahren / projizieren / transformieren / substituieren / überbrücken) wurden im Austausch mit Stefaan Vossen geschärft; sie sind gemeinsam sichtbar gewordene konstitutionelle Sprache, kein Ersatz für und keine Übernahme eines bestimmten Governance-Programms.

Kapitel am

Dok. 304 — Der Gedächtnis-Reflex — Warum erlebte Zeit das Gedächtnis voraussetzt

Dok. 304 Der Gedächtnis-Reflex — warum erlebte Zeit das Gedächtnis voraussetzt, nicht aus ihm entsteht

Kurzfassung. Ein verbreiteter Aufbau macht erlebte Zeit zum *Produkt* des Gedächtnisses. Dieses Dokument kehrt die Reihenfolge um: Gedächtnis setzt Zeit voraus, statt sie zu erzeugen — der *Gedächtnis-Reflex*, Gegenstück des Wort-Reflexes aus Dok. 301. In FFGFT ist Zeit fundamental, der kumulierte Defekt $D(k) = \sum 100\,\xi_n \to \ln(1 + k/75)$ der ausgerollten Windung; und der Unterschied zwischen einem endlichen, vergessenden Kern und einer akkumulierenden Struktur ist bereits eine Tatsache über die Zeit, nicht erst über das Gedächtnis. FFGFT selbst braucht diese Zweiteilung nicht — es trägt eine einzige, krümmungstreue Windung —; sie tritt erst dort auf, wo die Zeit-Struktur auf ein kognitives Modell projiziert wird. Auf der Messebene folgt ein zweiter Reflex: ein Messausschnitt ist bezuglos, ohne absoluten Ort auf der Spirale, und die scheinbare Gleichförmigkeit der Zeit ist ein *Linearisierungs-Artefakt* mit verifizierter Fehlergröße $e = x - \ln(1 + x)$ und der skaleninvarianten Konstante $1 - \ln 2$; diese Linearisierung sitzt in der *Projektion* des Ergebnisses, nicht in der Messung. Eingerollt sind die 75 Teile exakt kongruent, ausgerollt nur asymptotisch selbstähnlich; was den Verlust des Bezugs überlebt, ist allein die Ordnung. Unterschieden wird in der FFGFT-Lesart durch die *Projektionstreue*, nicht durch die Reichweite — angeboten als zusätzlicher, ablehnbarer Brücken-Kandidat (restricted, Kategorie B), nicht als Ersatz einer fremden Gedächtnisdefinition, in symmetrischer Beziehung zwischen den Rahmen. Der Rückschluss von der Messung auf die Ursache gelingt nur bis auf eine holografische Verwaschung: Präsenz ist nicht Rekonstruierbarkeit. Die Buchung bleibt durchgehend getrennt — mathematisch abgeleitet, Brücke (restricted), Setzung und Reflex-Diagnosen (P35).

Ein verbreiteter Aufbau erklärt erlebte Zeit als *Produkt* des Gedächtnisses: physikalische Entwicklung → physikalische Aufzeichnungen → rekursives Gedächtnis → selbstbezogene Repräsentation → erlebte Zeit. In dieser Reihenfolge ist Zeit das Endprodukt, das Gedächtnis ihre Vorstufe. Das vorliegende Dokument zeigt, dass diese Reihenfolge umgekehrt gehört. Gedächtnis ohne Zeit funktioniert nicht — es setzt Zeit bereits voraus. Der Eindruck, Zeit entstehe aus Gedächtnis, ist derselbe Umkehrfehler wie „it from bit“: der Gedächtnis-Reflex, das Gegenstück des Wort-Reflexes

aus Dok. 301, eine Ebene tiefer. Ein zweites Mal erscheint dieselbe Umkehrung auf der *Messebene* — als Linearisierungs-Reflex —, diesmal mit einer verifizierten, skaleninvarianten Fehlergröße; und ein drittes Mal beim Rückschluss vom Ausschnitt aufs Ganze — als Extrapolations-Reflex. Alle drei behandelt dieses Dokument.

am.1 Die Verengung und ihr Preis

Der ursprüngliche Anspruch war die volle zeitliche Triade: kausale Ordnung (U1), Gegenwarts-Phase (U2) und Gedächtnis / nicht-markovsche Geschichte (U3)[1], zusammengefügt zu einem Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft-Weltmodell. Im Verlauf verengte sich die Diskussion auf U3 allein, dann auf die Grenze zwischen einem endlichen Gedächtniskern M_τ und einer akkumulierenden Struktur M_B, schließlich auf eine operationale Benchmark-Frage. Diese Verengung ist methodisch berechtigt — nur das isolierbare, falsifizierbare Stück lässt sich prüfen — aber sie hat einen Preis: U1 und U2 fallen aus dem Test, und das eigentliche Phänomen war ihr *Zusammenspiel*, nicht die Komponente. Selbst ein bestandener Gedächtnistest zeigte „semantisch strukturiertes Gedächtnis ist von generischer Kompression unterscheidbar", nicht „hier ist erlebte Zeit".

am.2 U3 lässt sich nicht isolieren

Der Preis ist an einer Stelle sogar eine Inkohärenz. Gedächtnis *ist* eine Relation zur Zeit — ein Zustand, der etwas über ein Vorher trägt. Akkumulation heißt: über eine Abfolge integrieren. Ohne Ordnung (U1) gibt es keine Abfolge, über die integriert werden könnte; ohne Gegenwart (U2) gibt es kein Jetzt, relativ zu dem etwas *vergangen* ist. U3 ist damit keine unabhängige vierte Größe neben U1 und U2, sondern das, was entsteht, *wenn* Ordnung und Gegenwart über einen Horizont zusammenwirken. Marcels eigene Kennzeichnung verrät es: „Pfadabhängigkeit, nicht-markovsche Geschichte" — „Pfad" ist Ordnung, „Geschichte" ist vergangene Gegenwart. U3 ist ohne U1 und U2 nicht einmal definierbar. Ein Test, der U3 aus der Zeit herauslöst und als reinen Speicher über feste Episoden prüft, entfernt gerade die Struktur, in der Gedächtnis seine Bedeutung hat.

[1] Die zeitlichen Sektoren U1 (kausale Ordnung / Vorwärts-Update), U2 (Phase und Kohärenz) und U3 (Gedächtnis, Pfadabhängigkeit, rekursiver Zugriff) sowie die Notation M_τ/M_B werden aus der Spiral-Zeit-Gedächtnisarbeit von Krüger (2026) übernommen; dort bezeichnet M_τ endliche, gewichtete oder komprimierbare physikalische Erinnerung und Pfadabhängigkeit, M_B eine persistente biologisch-kognitive Architektur (rekursiver Zugriff, semantische Organisation, affektive Gewichtung, Identitätsbindung, persistenter Zustandsübertrag, prädiktive Wiederverwendung), operational-funktional und nicht geometrisch definiert. *FFGFT selbst benötigt diese Unterscheidung nicht*: es trägt eine einzige, krümmungstreue Windung, und die Sektoren wie die M_τ/M_B-Teilung dienen hier allein der *Analyse* jenes Rahmens, nicht als native FFGFT-Struktur. Das vorliegende Dokument definiert diese Objekte daher nicht neu, sondern schlägt eine gesonderte, FFGFT-seitige Brückenlesart vor. Primärquelle: Krüger, M. (2026), *From Physical State Evolution to Experienced Time*, Zenodo, `doi:10.5281/zenodo.21302278`. Dokumentierte Lineage: Krüger, Feeney & Wende (2026), *Medinformatics*, `doi:10.47852/bonviewMEDIN62029043`; Krüger & Feeney (2026), *Smart Wearable Technology*, `doi:10.47852/bonviewSWT62029484`.

am.3 Die Diagnose: der Gedächtnis-Reflex

Damit ist die Hierarchie „Gedächtnis → erlebte Zeit“ in ihrer Pfeilrichtung falsch. Sie macht das Gedächtnis zum Erzeuger der Zeit, obwohl das Gedächtnis die Zeit voraussetzt. Das ist strukturell derselbe Reflex, den Dok. 301 für die Information diagnostiziert hat: So wie „it from bit“ die letzte Reduktion (das Bit) fälschlich zur ersten Schöpfung macht, macht „erlebte-Zeit-aus-Gedächtnis“ die abgeleitete Trageform (das Gedächtnis) fälschlich zum Ursprung der Zeit. Der Umkehrtest (Dok. 301) dreht beide Male die Reihenfolge um. Bei der Information: im Anfang war die Geometrie, das Wort liest eine ihrer Skalen aus. Bei der Zeit: im Anfang war die ausgerollte Windung, das Gedächtnis ist eine besondere Weise, in der ein System auf einer seiner Skalen diese Windung *trägt*. Dies ist eine kulturell-kognitive Hypothese darüber, *warum* die Intuition zieht (P35), keine mathematische Aussage; die folgenden Abschnitte sind es.

am.4 Die FFGFT-Position: Zeit ist $D(k)$, fundamental

In FFGFT ist die Zeit der Massenkreis, über $\tilde{T} \cdot m = 1$ in die übrigen Kreise eingewoben und kein abspaltbarer Faktor (Dok. 285). Die ausgerollte Zeit-Windung ist die logarithmische Spirale, die die K_{frak}-Rekursion erzwingt (Dok. 295); ihr kumulierter Defekt

$$D(k) = \sum_{n \le k} 100\,\xi_n \;\to\; \ln\!\left(1 + \tfrac{k}{75}\right) \tag{am.1}$$

ist die messbare Zeitentwicklung (Dok. 296). Zeit ist die Rekursion, nicht ihr Ursprung: $D(k)$ hat keinen ausgezeichneten Anfang, wächst ohne Schranke, erreicht kein Ende — kein erster Schritt, kein letzter, kein Außenstandpunkt ($\partial T^4 = \emptyset$, Dok. 301). Zeit ist damit fundamental — die dritte Ebene, verlustfrei getragen —, nicht ein Produkt des Gedächtnisses. Das Gedächtnis kann die Zeit nicht erzeugen, weil die Zeit schon $D(k)$ ist, bevor irgendein System sie trägt.

am.5 Der entscheidende Befund: die Akkumulations-Grenze sitzt in der Zeit

Das Bemerkenswerte ist, dass die Unterscheidung, die in der Kognition als M_τ gegen M_B wiederkehrt, im Korpus *bereits auf der Ebene der Zeit* steht — und dort schon gegen genau denselben beschränkten Gedächtniskern geführt wird. Dok. 295 vergleicht FFGFTs *geometrische Akkumulation* $D(k) = \sum 100\,\xi_n \to \ln$ (unbeschränkt, $1/n$-Zerfall, Verhältnis e) gegen einen *beschränkten Gedächtniskern*: bleibt der Defekt je Schritt konstant, so wächst $D(k)$ linear statt logarithmisch ($D(10^5) = 1333$ gegen $\ln(1 + k/75) = 7{,}2$), und die Windung ist archimedisch, keine Log-Spirale. Dieser Fall konstanten Defekts ($d = 1/75$ je Umlauf fest; der beschränkte, vergessende Kern) entspricht dem Markov-Rückfall. Der Fall $d = 0$ ist davon verschieden: ohne Defekt schließt die Windung nach jedem Umlauf, $D(k) \equiv 0$, es wird nichts akkumuliert (d ist der

Schließungsdefekt je Umlauf, Dok. 295; das lineare Wachstum $D(10^5) = 10^5/75 = 1333$ gehört zu festem $d = 1/75$).

Die Abbildung ist damit direkt:

- M_τ — der endliche, vergessende Kern — ist der *Markov-Grenzfall konstanten Defekts* von $D(k)$ ($d = 1/75$ fest): ein beschränktes Fenster, konstanter Defekt, lineares statt logarithmisches Wachstum ($d = 0$ hätte kein Wachstum).
- M_B — die akkumulierende, rekursive Struktur — ist ein System, das ein $D(k)$-artiges, unbeschränktes Integral seiner eigenen Geschichte trägt.

Die Akkumulation-gegen-Kern-Grenze ist also *nicht dem Gedächtnis eigen*; sie ist der Zeit eigen. Gedächtnis, das akkumuliert, ist Gedächtnis, das ein $D(k)$-artiges Integral trägt; ein endlicher Kern ist genau die Form konstanten Defekts. Deshalb erzeugt — *auf dieser Lesart* — M_B keine erlebte Zeit, sondern erscheint als kognitivskalige *Instanz* der $D(k)$-Akkumulation, die die Zeit *ist* (als Brücke, nicht als Ableitung; s. die Grenze der Brücke unten).

Status dieser Zuordnung. Auf der Zeit-Ebene ist die Gleichsetzung korpusverankert: Dok. 295 setzt FFGFTs Fall konstanten Defekts (beschränktes Fenster, lineares $D(k)$) ausdrücklich Marcels Markov-Rückfall gleich; dazu passt M_τ, nicht $d = 0$. Die *Ausdehnung* auf die kognitiven Objekte M_τ/M_B ist jedoch ein weiterer, FFGFT-seitiger Schritt — eine *Brücke* (Kategorie B, Kompatibilitätskandidat), keine Ableitung. Sie ist lokal zu ihren Annahmen und braucht ihre eigene Lizenz; wer die kognitiven M_τ/M_B anders deutet, darf die Brücke verweigern, ohne den Zeit-Ebenen-Befund (die Akkumulations-Grenze in $D(k)$) anzutasten. Die Aussage „M_B ist eine Instanz von $D(k)$" ist damit *restricted*, nicht *proven* — ein deklarierter Brücken-Kandidat (Kategorie B), keine bewiesene Identität. Sie als Brücke zu benennen, statt sie zur Ableitung zu befördern, ist genau die Identitätsprüfung, die Dok. 303 verlangt. Diese Identitätsprüfung gehört, wie die claim-state-Buchung (restricted, Kategorie B), zur Governance-Schicht, die auf Stefaan Vossens *Dot Theory* zurückgeht und im IPI-Austausch ko-entwickelt wurde (vgl. Dok. 272); der Identitäts-Erhaltungs-Nachweis in Dok. 303 ist die FFGFT-seitige Erweiterung darauf.

am.6 Konsequenz für den Diskriminator

Das erklärt von der FFGFT-Seite, warum die Gedächtnis-Benchmark wiederholt die falsche Hälfte prüfte. Ein Speichertest über feste Episoden entfernt die zeitliche Relation, in der Kompression überhaupt Bedeutung hat; ein Test mit exaktem, unbeschränktem Speicher (Full-History) lässt M_B mit verlustfreier Akkumulation zusammenfallen und macht seine Spezifität unsichtbar. Der richtige Prüfstein ist ein *kapazitätsbeschränkter, verlustbehafteter* Akkumulator: ein System, das ein *komprimiertes* $D(k)$-artiges Integral trägt — denn genau so sieht eine kognitive Instanz von $D(k)$ aus. Doch selbst ein bestandener solcher Test zeigte „semantische Akkumulation ist von generischer Kompression unterscheidbar", ein Gedächtnisergebnis — nicht „erlebte Zeit". Erlebte Zeit ist die $D(k)$-Struktur selbst, die der Test *voraussetzt*, statt sie zu erzeugen.

am.7 Der Messschnitt: der bezuglose Ausschnitt und der Linearisierungs-Reflex

Dieselbe Umkehrung trifft die Messung, nicht nur das Gedächtnis. Eine Messung nimmt einen *Ausschnitt* der Zeit-Windung. Selbst eine verlustfreie Messung — eine, die bis zur Quanten-Bit-Grenze (dem Windungsquant $\Delta w = 1$, Dok. 257/301) jede Stufe erfasst — liefert den *Inhalt* des Fensters vollständig, aber nicht seine *Position* k auf der Spirale. Auflösung (die Inhalts-Achse) und Bezug (die Einbettungs-Achse) sind verschiedene Achsen; Verlustfreiheit sättigt die erste und lässt die zweite unberührt. Synchronisiert man aufeinanderfolgende Messungen, wird der Ausschnitt länger, doch er bleibt bezuglos: man gewinnt *relative* Abstände (von der Atomuhr getaktet), nie den *absoluten* Ort. Die Atomuhr ist konstruktiv ein *gleichförmiges* Lineal — konstante Ganghöhe, also genau der M_τ-Grenzfall konstanten Defekts (Dok. 295; konstante Ganghöhe heißt konstanter Defekt, nicht $d = 0$) —, und ein gleichförmiges Lineal an eine ungleichförmige (fraktale) Struktur gelegt kann deren Ort nicht finden. Dass es keinen absoluten Zeitbezug gibt, ist damit die Randlosigkeit auf der Messebene: kein Außenstandpunkt ($\partial T^4 = \varnothing$), von dem aus die Position ablesbar wäre.

Der Ausschnitt ist dennoch nicht leer. Auf der Log-Spirale gibt es keinen geraden Abschnitt; jedes Fenster trägt seine *Krümmung*, also die lokale Skala ρ und damit die Vorgeschichte, als eingefaltete Form. Der Bezug ist nicht *verloren*, sondern *linearisiert*: die Messung liest die Tangente statt des Bogens — die lokale Fassung derselben Näherung konstanten Defekts. Präzise ist dies ein Fehler im *akkumulierten Präzessionswinkel* $\beta = 2\pi D(k)$ (Dok. 295): die gleichförmige Uhr unterstellt die lokale Rate $d_k = 100\,\xi_k$ als konstant über das Fenster ($\Delta\beta_{\text{unif}} = 2\pi w d_k$), wahr ist $\Delta\beta_{\text{wahr}} = 2\pi(D(k{+}w) - D(k))$, und die Differenz je 2π ist keine neue Größe, sondern die lokale Gestalt der Linear-gegen-Log-Differenz aus Dok. 295. Für ein Fenster von w Schritten am Ort k, mit der relativen Fensterbreite $x = w \cdot 100\,\xi_k = w/(k+75)$:

$$e(k,w) = \frac{\Delta\beta_{\text{unif}} - \Delta\beta_{\text{wahr}}}{2\pi} = w d_k - \big(D(k{+}w) - D(k)\big) = x - \ln(1+x). \tag{am.2}$$

Drei Regime folgen; sie sind gegen die exakte Rekursion $\xi_{n+1} = \xi_n(1-100\,\xi_n)$ geprüft und im makroskopischen Grenzfall exakt, mit einer Korrektur der Ordnung $O(1/k)$ bei endlicher Position (die geschlossene Form $D(k) = \ln(1+k/75)$ trägt einen beschränkten, γ-artigen Versatz $\approx -0{,}0067$):

- *Kleines Fenster* ($x \ll 1$): $e \approx x^2/2 = \frac{1}{2}(100\,\xi_k\, w)^2$ (führender Term der geschlossenen Form).
- *Skaleninvariantes Fenster* ($x = 1$, ein Fenster von einer lokalen Skala Breite): $e \to 1 - \ln 2 \approx 0{,}3069$, *unabhängig von* k (asymptotisch, $+O(1/k)$). Diese Konstante ist die quantitative Signatur der fraktalen Selbstähnlichkeit: die Verzerrung eines „eine-Skala-breiten" Ausschnitts ist überall auf der Spirale dieselbe.
- *Makroskopischer Grenzfall* (festes physikalisches w, wachsendes k): $e \to 0$ wie $\frac{1}{2}\,(w/(k+75))^2$. Weil wir bei großem k (kleinem ξ) sitzen, ist die Verzerrung astronomisch klein — *deshalb* erscheint die gemessene Zeit gleichförmig und linear. Nahe am Ursprung (kleines k, großes ξ) wäre sie groß; dorthin reicht keine Messung.

Daraus die dritte Reflex-Diagnose (P35), Zwilling des Wort- und des Gedächtnis-Reflexes: die scheinbare Gleichförmigkeit der gemessenen Zeit ist ein *Linearisierungs-Artefakt*, keine Eigenschaft der Zeit. Aus einer Näherung beim Messen (Tangente statt Bogen) wird fälschlich eine Eigenschaft des Gemessenen (Zeit *sei* gleichförmig). Der Ausschnitt trägt seine fraktale Vorgeschichte als Krümmung; die gleichförmige Uhr löscht sie konstruktiv; und weil bei unserer Skala der Fehler verschwindet, schließen wir fälschlich, sie sei nie da gewesen.

Buchung. Die Fehlerformel $e = x - \ln(1+x)$ ist der Fehler im akkumulierten Präzessionswinkel $\beta = 2\pi D(k)$, gegen die exakte Rekursion verifiziert (Skript `ffgft_304_linearisierungsfehler_probe.py`); ihre drei Regime sind im makroskopischen Grenzfall exakt (Folge von $D(k)$, proven), mit einer benannten $O(1/k)$-Korrektur bei endlicher Position. Deren exakter Koeffizient (ob genau C/k oder mit Log-Term) ist über eine Euler-Maclaurin-Entwicklung von $D(k)$ schließbar und bleibt hier offen — physikalisch bei unserer Skala vernachlässigbar, der Redlichkeit halber benannt. Die Gleichsetzung „Messung = lokale Linearisierung des Ausschnitts“ ist eine *deklarierte Annahme* über *diese* Art Messung (punktuell, tangential), nicht über jede mögliche — eine Messung, die über ein Fenster *integriert*, sähe einen Teil der Krümmung. Die Reflex-Deutung ist philosophisch-spekulativ (P35).

am.8 Kongruenz, Selbstähnlichkeit und das Überleben der Ordnung

Dass *kein Bezug* vorliegt und dass *alle Ausschnitte gleich* sind, ist dieselbe Tatsache: gäbe es einen ausgezeichneten Ausschnitt, wäre er eine Marke und damit ein Bezug. Doch „gleich“ bedeutet in den beiden Zuständen der Zeit-Windung Verschiedenes, und die Unterscheidung ist wesentlich.

Eingerollt (kompakt). Bei eingefrorenem ξ_0 ist der Defekt je Schritt konstant, $d = 1/75$, die Rotationszahl $74/75$ rational; die Windung schließt nach *genau 75* Umläufen und trägt eine 75-zählige Struktur (Dok. 295). „Gleich“ heißt hier *kongruent*: 75 deckungsgleiche Segmente, durch eine $\mathbb{Z}/75$-Drehung ineinander überführbar, exakt und ohne Rest. Ein Bezug *existiert* hier — aber nur *periodisch*, modulo 75: man kann „Teil j von 75“ benennen, nicht aber den Umlauf, denn alle 75-Zyklen sind kongruent.

Ausgerollt (Spirale). Lässt man den Skalenlauf laufen ($\xi_{n+1} = \xi_n(1 - 100\,\xi_n)$), wird die rationale 75-Schließung zur nicht-schließenden log-Spirale mit Verhältnis e (Dok. 295, „Entrollung“). „Gleich“ heißt jetzt nur noch *selbstähnlich*: die Ausschnitte sind einander *proportional*, nicht kongruent — und dies nur *asymptotisch* exakt. Genau das ist der Ursprung der $O(1/k)$-Korrektur: die Selbstähnlichkeit ist keine endliche exakte Symmetrie, sondern eine kontinuierliche, die sich erst im Grenzfall voll einstellt. Auch der periodische Bezug verschwindet, denn die Umläufe sind nicht mehr kongruent, sondern nur proportional; die 75 Marken verschmieren in die kontinuierliche Selbstähnlichkeit.

Die Bezuglosigkeit gilt damit *strikt nur im ausgerollten Zustand*. Drei Bezugszustände sind zu unterscheiden:

- *eingerollt*: periodischer Bezug (Ort modulo 75, exakt);
- *ausgerollt, asymptotisch*: kein Bezug (reine Proportion);

- *ausgerollt, endlich* (nahe dem Ursprung): schwacher absoluter Bezug — die $O(1/k)$-Abweichung von der Selbstähnlichkeit —, der aber für keine Messung erreichbar ist.

Was all dies überlebt, ist die *Ordnung*: welcher Ausschnitt *vor* welchem kommt. Sie ist eine Relation *zwischen* Ausschnitten, keine innere Eigenschaft eines einzelnen, und wird daher von der Umskalierung nicht angetastet. Sie ist U1, und sie ist das einzige Invariante, das den Verlust des absoluten Bezugs überlebt — genau „Zeit ist die Rekursion, nicht ihr Ursprung“ (Dok. 301). Was von der Zeit messbar bleibt, ordnet sich in drei Stufen: die *Ordnung* (exakt, U1), der *relative Abstand* ($\Delta\beta = 2\pi\Delta D$, linearisierungs-verzerrt um $e = x - \ln(1+x)$) und die *absolute Position* (abwesend, mit der Selbstähnlichkeit ausgelöscht). Ordnung exakt, Intervall verzerrt, Position abwesend.

Präzisierung. „Alle Ausschnitte gleich“ heißt *kongruent* (eingerollt, 75 Teile, exakt) bzw. *selbstähnlich bis auf Skalierung und Drehung* (ausgerollt, asymptotisch), nicht *identisch*.

am.9 Was das für die Zerteilung von U3 heißt

Die Mess-Analyse schlägt auf die Zerteilung von U3 zurück. Da ein Gedächtnis ein System ist, das einen $D(k)$-artigen Ausschnitt trägt (wie im entscheidenden Befund und im Messschnitt gezeigt), erbt U3 dieselbe Drei-Stufen-Struktur: die *Ordnung* (welches Ereignis vor welchem) bleibt exakt — sie ist U1 —, der *relative Abstand* (wie lange her) ist tragbar, aber linearisierungs-verzerrt um $e = x - \ln(1+x)$, und die *absolute Position* (der wahre Ort auf der Spirale) fehlt, mit der Selbstähnlichkeit ausgelöscht. Entscheidend: *beide* Gedächtnisformen, M_τ wie M_B, sind bezuglos — auch das vollständige M_B weiß nur „so viel akkumuliertes D seit einem willkürlichen Anfang“, nicht „ich bin bei Umlauf k“. Das einzige, was auch M_τ exakt trägt, ist die Ordnung.

In der *FFGFT-Lesart* ist die diskriminierende Achse nicht die Reichweite (endliches Fenster gegen unbegrenztes Integral), sondern die *Krümmungstreue* — angeboten als *zusätzliche* Kandidaten-Dimension für die Brücke, nicht als Ersatz der operationalen M_τ/M_B-Bestimmung (s. die Grenze der Brücke unten):

- M_τ stellt einen *linearisierten* Ausschnitt konstanter Ganghöhe dar — den Grenzfall konstanten Defekts. Es liest die Tangente, verwirft die Krümmung, „erlebt“ eine gleichförmige Vergangenheit. M_τ ist das Gedächtnis, das den Linearisierungs-Reflex begeht.
- M_B stellt den *krümmungstreuen* Ausschnitt dar — die log-Spirale mit dem $1/n$-zerfallenden Defekt und dem Verhältnis e. Es trägt die ungleichförmige Textur der Vergangenheit: nahe Ereignisse dicht und schnell, ferne weit und träge (Dok. 296).

Reichweite und Krümmungstreue sind *zwei* Achsen, nicht eine. Ein langer, aber *linearer* Kern (konstante Ganghöhe, nur mit großem Fenster) wäre reichweitenstark und bliebe doch M_τ-artig, weil er die Selbstähnlichkeit nicht sieht; ein kurzer, aber *krümmungstreuer* Akkumulator wäre schon M_B-artig. Der Benchmark (v0.3–v0.5) presst beide in die eine Achse der Reichweite.

Daraus das *positive* Kriterium für den Diskriminator, und es ist kein neues: es ist das e-Kriterium aus Dok. 295 (die Windung trägt genau dann das Verhältnis e, wenn der Defekt je Schritt wie $1/n$ zerfällt; Skript, Abschnitt [6]), angewandt auf U3. Nicht „endliches Fenster gegen Akkumulation" ist zu testen, sondern *Krümmungstreue bei gleicher Reichweite*: trägt der Akkumulator die $1/n$-zerfallende Ganghöhe, das Verhältnis e, die selbstähnliche Textur? Genau das unterscheidet M_B von jedem gleichförmigen Kern, und es ist schärfer als jede Reichweiten-Grenze.

Buchung. Die Drei-Stufen-Vererbung (Ordnung exakt / Abstand verzerrt / Position abwesend) und die Abbildung M_τ = linearisiert, M_B = krümmungstreu sind Folgerungen aus $D(k)$ (ableitbar). Das e-Kriterium als Diskriminator-Test ist korpusverankert (Dok. 295). Dass Marcels *kognitive* M_τ/M_B genau diese Objekte sind, bleibt der Brücken-Kandidat aus dem entscheidenden Befund (Kategorie B, restricted) — jetzt mit einem prüfbaren Kriterium. Dass erinnerte Zeit *wirklich* die Spiral-Textur trägt (die phänomenologische Ungleichförmigkeit des Erinnerns), ist Interpretation (P35).

am.10 Provenance und die Grenze der Brücke

Damit die vorstehende Verzahnung nicht als Vereinnahmung missverstanden wird, sei die Grenze der Brücke ausdrücklich gezogen, in einer Sprache, die auch ohne Kenntnis ihrer Entstehung eindeutig ist.

Die Korrespondenz ist ein eingeschränkter, optionaler Brücken-Kandidat, kein gesichertes Mapping. Zwei Achsen sind dabei zu trennen. Das e-Kriterium selbst — eine Windung trägt genau dann das Verhältnis e, wenn der Defekt wie $1/n$ zerfällt — ist gegen die exakte Rekursion skript-verifiziert und aus ξ ableitbar (*proven*, Dok. 295). Nur die *Korrespondenz* zwischen dieser Krümmungstreue und der operationalen M_τ/M_B-Unterscheidung ist unabgesichert: auf der logischen Achse *restricted* (Kategorie B), auf der empirischen Achse ohne durchgeführten Benchmark — wobei ein solcher Benchmark ein unabhängiger, gemeinsam versiegelter Vergleich wäre, keine FFGFT-interne Rechnung. Sie ist keine Ableitung, Validierung, Enthaltungsrelation oder ontologische Klassifikation der Spiral-Zeit-Gedächtnishypothese durch FFGFT, und ihre Ablehnung lässt die inneren Aussagen beider Rahmen unverändert.

Ein FFGFT-interner Satz kann zeigen, dass unter FFGFT-Annahmen eine nichtlineare, geschichtsabhängige Akkumulationsstruktur $D(k)$ auf der Zeit-Ebene entsteht; dieser Befund steht für sich. Er kann jedoch *nicht* unabhängig etablieren, dass eine semantische, selbstgebundene, affektiv gewichtete und prädiktiv wiederverwendbare Gedächtnisarchitektur aus ihr folgt. Genau diese Ausdehnung ist der Brücken-Kandidat.

Die operationale Bestimmung von M_τ und M_B bleibt unberührt. Sie ist im Spiral-Zeit-Rahmen operational-funktional, nicht geometrisch: M_τ als endliche, gewichtete oder komprimierbare physikalische Erinnerung und Pfadabhängigkeit; M_B als rekursiver Zugriff, semantische Organisation, affektive Gewichtung, Identitätsbindung, persistenter Zustandsübertrag und prädiktive Wiederverwendung. Die Krümmungstreue ist ein *zusätzlicher, FFGFT-seitiger Diagnose-Kandidat*, nicht das Kriterium, das M_τ von M_B in jenem Rahmen trennt, und sie ersetzt keine dieser Funktionen. In beide Richtungen: ein System kann eine $1/n$-Textur tragen, ohne eine dieser bio-kognitiven Funktionen

zu besitzen; und eine biologisch relevante Gedächtnisarchitektur ist nicht ausgeschlossen, nur weil sie das spezifische e-Kriterium nicht erfüllt. Deshalb bleibt der Krümmungstest ein eigenes Brücken-Audit, keine Umdefinition der nativen Objekte.

Die Beziehung ist symmetrisch, die Provenance getrennt. Keiner der Rahmen wird als den anderen enthaltend, begründend, erklärend oder unterordnend dargestellt. Die M_τ/M_B-Unterscheidung, die operationale M_B-Architektur und die Audit-Folge (v0.3–v0.5) stammen aus Marcel Krügers Spiral-Zeit-Gedächtnisarbeit (Krüger 2026, `doi:10.5281/zenodo.21302278`); $D(k)$, das e-Kriterium und die FFGFT-Deutung zeitlicher Krümmung stammen aus Johann Paschers FFGFT-Korpus. Ein späterer formaler Vergleich oder ein Krümmungstreue-Audit wäre ein gesonderter, gemeinsamer Brückenbeitrag unter Wahrung der unabhängigen Autorschaft und begrifflichen Identität beider Rahmen.

am.11 Die Vergangenheit ist immer präsent: Linearisierung in der Projektion

Ein Zusatz präzisiert den Messschnitt und die eben gegebene Zerteilung. Der *Vergangenheitsanteil* ist *immer* im Messergebnis, unabhängig von der Fensterform, ob linear betrachtet oder nicht. Denn $D(k)$ ist kumulativ: jeder Punkt der Spirale trägt das aufsummierte Integral der ganzen Vorgeschichte. Selbst ein Fenster von einem Schritt sitzt bei diesem Wert und erbt ihn ganz. Ein kleines Fenster macht sie nicht *abwesend*, nur schwächer *aufgelöst*; ein langes oder genaueres Fenster schärfer. „Da oder nicht da“ ist die falsche Alternative — die Vergangenheit ist immer da, in variabler Schärfe.

Entscheidend ist daher nicht, wie das Fenster *aussieht* (linear oder gekrümmt), sondern worauf das Ergebnis *angewandt* wird. Die Messung liefert einen Wert; die Linearisierung geschieht erst, wenn dieser Wert auf eine *Projektion* abgebildet wird — auf ein gleichförmiges Lineal (die Atomuhr, die lineare Zeitachse). Dort, in der Projektion, wird die Krümmung geradegebogen. Die Verzerrung ist keine Eigenschaft der Messung, sondern der Projektionsfläche, auf die man das Ergebnis legt.

Das ist die Projektions-Struktur des Korpus (Dok. 257/301): Die *gemessene* Zeit ist ein Objekt der *zweiten Ebene* — eine Projektion des $D(k)$-Ausschnitts auf ein gleichförmiges Lineal. Der Vergangenheitsanteil ist als *Zustand* der dritten Ebene vorhanden — der $D(k)$-Wert selbst —; dieser Wert ist jedoch ein verlustbehaftetes Résumé der Vorgeschichte, und die Projektion auf die zweite Ebene ist verlustbehaftet, und *diese Projektion ist die Linearisierung*. Nicht die Messung linearisiert, sondern die Projektion des Messergebnisses. Damit ist $e = x - \ln(1 + x)$ präziser der Fehler der *Projektion* auf das gleichförmige Lineal, nicht ein Fehler der Messung selbst.

Drei Dinge sind zu trennen: die *Präsenz* der Vergangenheit als Zustand (immer, dritte Ebene: der $D(k)$-Wert ist exakt, nicht aber die Rückgewinnung der Vorgeschichte daraus); die *Schärfe* ihrer Rekonstruktion (fenster- und genauigkeitsabhängig); und der *Linearisierungsfehler* (eine Eigenschaft der gewählten Projektion, nicht der Messung). Die Fensterform ist nicht entscheidend für das *Ob* der Vergangenheit und für den *Ort* der Linearisierung — wohl aber für das *Wie scharf* der Rekonstruktion.

Dies präzisiert die vorangehende Rede vom „Tragen“ der Krümmung: M_τ und M_B *enthalten* beide die Vergangenheit — jeder $D(k)$-Ausschnitt tut das —; sie unterscheiden sich in der *Projektion*, nicht im *Gehalt*. M_τ projiziert auf ein gleichförmiges Lineal (linearisiert, verwirft die Krümmung bei der Projektion), M_B projiziert krümmungstreu (behält die selbstähnliche Textur). Die tragende Achse aus dem vorigen Abschnitt — Krümmungstreue, nicht Reichweite — ist damit genauer die *Projektionstreue*: welche Projektion der Zustand durchläuft, nicht was er enthält.

Buchung. Die Kumulativität von $D(k)$ (Vergangenheit immer präsent) und die Verortung der Linearisierung in der Projektion (zweite Ebene, Dok. 257/301) sind ableitbar bzw. korpusverankert; e als Projektionsfehler ist die präzisere Fassung der früheren Formel. Die Trennung Präsenz / Schärfe / Linearisierung ist begriffliche Buchführung.

am.12 Umkehr-Schluss und die holografische Grenze

Das Modell ist von der *Messseite* her aufgerollt, denn im Mittelpunkt steht die Anwendung: man möchte von Messergebnissen auf *Ursachen* schließen. Das ist die Umkehr-Richtung des Umkehrtests (Dok. 301) — nicht von der Ursache zur Wirkung, sondern von der gemessenen Wirkung zurück zur Ursache. Genau diese Absicht macht die vorstehende Analyse praktisch relevant: sie fragt, *wieweit* ein Messergebnis den Rückschluss auf das Ganze trägt.

Und hier ist die Grenze, die zuvor zu schwach gezogen war. Von einem kleinen Ausschnitt darf man *nicht* aufs Ganze schließen. Der Ausschnitt gibt bestenfalls ein *verwaschenes* Bild des Ganzen — wie ein Bruchstück einer holografischen Aufnahme, das das ganze Bild trägt, aber nur unscharf, mit geringerer Auflösung. „Die Vergangenheit ist präsent“ heißt daher genauer: sie ist als *verwaschene Signatur* eingefaltet — der kumulierte Wert $D(k)$ ist eine Summe, aus der sich die Summanden nicht zurückrechnen lassen —, nicht als rekonstruierbare Aufzeichnung. *Präsenz ist nicht Rekonstruierbarkeit.*

Die holografische Struktur ist die Selbstähnlichkeit selbst: weil jeder Ausschnitt dem Ganzen *ähnlich* ist, trägt er ein skaliertes, verwaschenes Abbild der Gesamtstruktur. Daraus folgt, was schärfer ist als die frühere Rede von „Genauigkeit“: die Schärfe des rekonstruierten Ganzen hängt an der *Größe* des Ausschnitts (wieviel der Spirale), nicht an der Feinheit, mit der man ein kleines Stück abliest. Ein noch so verlustfrei — bis aufs Windungsquant — gemessenes *kleines* Fenster gibt ein verwaschenes Ganzes; erst mehr Ausschnitt schärft es. Das ist der Grund, warum der absolute Bezug auch bei perfekter Auflösung fehlt.

Der unzulässige Schritt — vom Teil aufs Ganze — ist damit benennbar: ein *Extrapolations-Reflex*, das Bruchstück für das Bild zu halten. Er reiht sich in die Familie des Wort-, Gedächtnis- und Linearisierungs-Reflexes: jeweils wird ein Abgeleitetes, Reduziertes oder Teilhaftes für das Ursprüngliche, Ganze gehalten.

Für den Umkehr-Schluss folgt die genaue Reichweite: von Messergebnissen auf Ursachen zu schließen ist möglich, aber *nur bis auf die holografische Verwaschung*. Die aufgerollte (kompakte, 75-exakte) Seite — die zugrunde liegende Geometrie, die „Ursache“ — wird *erschlossen*, nicht gemessen; die ausgerollte (Spiral-, Mess-)Seite ist der Ort, an dem man steht. Aufgerollt und ausgerollt sind dabei zwei

Lesarten derselben Windung; „Ursache“ meint die Richtung des Rückschlusses, keine ontologische Tieferlegung unter das fundamentale $D(k)$. Absolute Position und letzter Ursprung sind aus einem Ausschnitt nie scharf rückgewinnbar. Dies verbindet sich mit der Verlustbehaftetheit der Akkumulation: ein $D(k)$-tragendes Gedächtnis (M_B) ist genau deshalb ein *verlustbehafteter* Akkumulator — die holografische Verwaschung ist die Kompression.

Buchung. Die Messseiten-Orientierung und die Umkehr-Absicht (Messung → Ursache) sind methodische Rahmung. Die holografische Grenze des Umkehr-Schlusses folgt aus Selbstähnlichkeit und Bezuglosigkeit (ableitbar), ebenso Präsenz ≠ Rekonstruierbarkeit. „Holografisch“ ist hier ausdrücklich *Analogie*: ob jeder Ausschnitt Information über das *ganze* (auch das entfernte) trägt — starke Holografie — oder nur seiner lokalen Umgebung gleicht — schwache Selbstähnlichkeit — ist eine offene, zu prüfende Frage (P35), kein etablierter Satz.

am.13 Ordnung der Ebenen

Drei Aussagen sind zu trennen, mit ihrer jeweiligen Temperatur. *Mathematisch*: U3 setzt U1 und U2 voraus, und $D(k)$ ist die aus der K_{frak}-Rekursion ableitbare Akkumulationsstruktur (Dok. 295/296); und der Linearisierungsfehler $e = x - \ln(1+x)$ eines Messfensters ist gegen die Rekursion verifiziert — Folgerungen, kein Spekulationsmarker. *Philosophisch (P35)*: der Gedächtnis-Reflex und der Linearisierungs-Reflex (die gemessene Gleichförmigkeit als Artefakt) als kulturell-kognitive Umkehrungen, die Gegenstücke des Wort-Reflexes (Dok. 301). *Setzung*: dass die Zeit fundamental *ist* (die dritte Ebene, $D(k)$ als reales Getragenes), ist dieselbe Realisten-Setzung wie in Dok. 301, nicht eine neue Behauptung. Der deflationäre Leser darf stets sagen: alles nur Beschreibung. Das Argument dieses Dokuments ist von dieser Setzung unabhängig — selbst als bloße Beschreibung gelesen, bleibt U3 ohne U1 und U2 inkohärent, und die Akkumulations-Grenze bleibt eine Eigenschaft der Zeitstruktur, nicht des Gedächtnisses.

am.14 Status

Dieses Dokument ist eine Positionsbestimmung, keine neue Ableitung: es führt Ergebnisse aus Dok. 285 (Zeit als eingewobener Massenkreis), Dok. 295 (Log-Spirale, $D(k)$, Akkumulation gegen beschränkten Kern), Dok. 296 ($D(k)$ als messbare Zeit, Randlosigkeit) und Dok. 301 (drei Ebenen, Wort-Reflex, Selbstprojektion) und Dok. 257 (Windungsquant als Bit-Grenze) auf die Frage „Gedächtnis oder Zeit zuerst?“ zusammen. Der FFGFT-interne Kern dieses Dokuments — die These, dass Gedächtnis Zeit voraussetzt, der Linearisierungs-Reflex und die Mess- und Projektions-Epistemologie — steht für sich; die M_τ/M_B-Korrespondenz ist die illustrative, *restricted* Überlagerung aus dem Brücken-Kontext und trägt nichts, was der Kern benötigt. Eine messtheoretische Erweiterung ordnet den bezuglosen Ausschnitt, die Kongruenz-/Selbstähnlichkeits-Unterscheidung (eingerollt: 75 exakte Teile; ausgerollt: nur asymptotisch selbstähnlich) und den Linearisierungs-Reflex ein; die Fehlergröße $e = x - \ln(1+x)$ mit der skaleninvarianten Konstante $1 - \ln 2$ ist gegen

die Rekursion verifiziert. Es ist als Gegenposition zu einer Hierarchie „Gedächtnis → erlebte Zeit“ formuliert, im neutralen Ton und ohne persönliche Adressierung; die M_τ/M_B-Linie wird sachlich als kognitive Instanz der $D(k)$-Struktur eingeordnet (als *Brücken-Kandidat* gebucht, *restricted*, Kategorie B), nicht als deren Ursprung. Die Beziehung zur Spiral-Zeit-Gedächtnishypothese ist symmetrisch, die Brücke optional und ablehnbar; Provenance und Grenze sind in einem eigenen Abschnitt ausgeführt. Die mathematischen Aussagen sind korpusgestützt; die Reflex-Diagnose ist philosophisch-spekulativ (P35) und als solche gebucht.

Kapitel an

Dok. 305 — Der Krümmungstreue-Diskriminator

Dok. 305 Der Krümmungstreue-Diskriminator — warum Reichweite nicht trennt

Kurzfassung. Dok. 304 verengt die Unterscheidung zwischen einem gleichförmigen und einem akkumulierenden Gedächtnis auf eine Achsen-Wahl: nicht die *Reichweite* (endliches Fenster gegen unbegrenztes Integral) trennt, sondern die *Krümmungstreue* (trägt der Akkumulator die $1/n$-zerfallende Ganghöhe, die selbstähnliche Textur, das Verhältnis e). Diese Notiz belegt den Befund FFGFT-intern mit einem deterministischen Prüfstand: bei *gleicher Reichweite* liefert eine reichweitenbasierte Metrik für beide Akkumulatoren dasselbe, während das e-Kriterium (Dok. 295) sie sauber und exakt trennt — Selbstähnlichkeit $D(2k) - D(k) \to \ln 2$, Ganghöhen-Zerfall $d_n \sim n^{-1}$, Skalen-Verhältnis $\to e$. Der Befund ist aus ξ / der Rekursion ableitbar (*proven*). Er etabliert *keine* Spezifität eines kognitiven Gedächtnismodells; diese Ausdehnung bleibt eine restricted-Brücke (Kategorie B) und verlangt einen eigenen, unabhängigen, gemeinsam versiegelten Benchmark.

an.1 Der reduzierte Punkt

In Dok. 304 fällt die operationale Frage nach einem „echten“ Gedächtnis auf eine einzige Achse zusammen. Ein Gedächtnis, das etwas über eine Vergangenheit trägt, sitzt in FFGFT bei $D(k)$, dem kumulierten Defekt der ausgerollten Zeit-Windung

$$D(k) = \sum_{n \le k} 100\,\xi_n \;\to\; \ln\!\Big(1 + \tfrac{k}{75}\Big), \qquad \xi_{n+1} = \xi_n\,(1 - 100\,\xi_n) \tag{an.1}$$

(Dok. 295/296). Zwei Akkumulatoren lassen sich nun kontrastieren: einer, der die fraktale *Krümmung* dieser Windung trägt (die $1/n$-zerfallende Ganghöhe), und einer, der sie *linearisiert* (konstante Ganghöhe, archimedische Windung, der $d = 0$-Grenzfall). Dok. 304 argumentiert, dass die tragende Unterscheidung nicht die Reichweite ist, sondern welche der beiden Formen der Akkumulator trägt. Diese Notiz prüft genau das.

an.2 Zwei Akkumulatoren gleicher Reichweite

Der Prüfstand (`ffgft_kruemmungstreue_probe.py`) stellt beide Formen mit *gleicher Reichweite* gegenüber, d. h. mit derselben Gesamtakkumulation $D(N)$ am Horizont N:

- *krümmungstreu* — die exakte Rekursion $d_{n+1} = d_n(1-d_n)$ mit $d_n = 100\,\xi_n$, Start $d_1 = 1/75$; kumuliert $D(k) \to \ln(1 + k/75)$ (log-Spirale, Verhältnis e);
- *gleichförmig* — konstante Ganghöhe $d_{\text{const}} = D(N)/N$, kumuliert $D_{\text{lin}}(k) = d_{\text{const}}\,k$ (Archimedes, keine Selbstähnlichkeit).

Beide erreichen bei N dasselbe D — die Reichweite ist per Konstruktion identisch.

an.3 Reichweite trennt nicht

Ein *unbeschränkter* Akkumulator behält den Beitrag eines beliebig alten Ereignisses in seiner laufenden Summe; ein endlicher Kern der Breite W verliert ihn, sobald $N - t_0 > W$. Ein reichweitenbasierter Test — „beeinflusst ein früher Impuls noch die Ausgabe?“ — trennt daher {Akkumulatoren} von {endlichem Kern}, aber er gibt für den krümmungstreuen und den gleichförmigen Akkumulator dasselbe Ergebnis: beide behalten den Impuls. Reichweite kann die beiden *nicht* unterscheiden.

an.4 Krümmungstreue trennt (das e-Kriterium)

Das e-Kriterium aus Dok. 295 — eine Windung trägt genau dann das Verhältnis e, wenn der Defekt je Schritt wie $1/n$ zerfällt — trennt die beiden sauber. Drei Signaturen, alle gegen die exakte Rekursion geprüft:

- *Selbstähnlichkeit.* Das Skalen-Verdopplungs-Inkrement $D(2k) - D(k)$ ist krümmungstreu *skaleninvariant*, $\to \ln 2 \approx 0{,}6931$ (bei $k = 10^5$: $0{,}69274$, Abweichung $4{,}1 \cdot 10^{-4}$); gleichförmig wächst es linear mit k (bei $k = 10^5$: $2{,}76$). Nur die log-Spirale ist über die Skalen sich selbst ähnlich.
- *Ganghöhen-Zerfall.* Der Exponent p in $d_n \sim n^{-p}$ ist krümmungstreu ≈ 1 (log-log-Steigung $-0{,}984$ über eine Dekade, also $1/n$); gleichförmig $p = 0$ (konstant).
- *Skalen-Verhältnis.* Der k-Faktor je Einheits-Zuwachs von D konvergiert krümmungstreu gegen e (bei $D = 6$: $2{,}7226$, Abweichung $4{,}3 \cdot 10^{-3}$; aus $\exp D = 1 + k/75$); gleichförmig gegen 1 (arithmetisch, keine log-Spirale).

Die Konvergenz ist asymptotisch exakt (ein $O(1/k)$-Rest, konsistent mit der Kongruenz-/Selbstähnlichkeits-Diskussion in Dok. 304): die Selbstähnlichkeit ist keine endliche exakte Symmetrie, sondern eine kontinuierliche, die sich im Grenzfall voll einstellt.

an.5 Das positive Kriterium

Daraus der positive Diskriminator, den Dok. 304 fordert: nicht „endliches Fenster gegen Akkumulation“ ist zu prüfen (Reichweite), sondern *Krümmungstreue bei gleicher Reichweite* — trägt der Akkumulator die $1/n$-Ganghöhe, das Verhältnis e, die

selbstähnliche Textur? Ein langer, aber linearer Kern besteht jeden Reichweiten-Test und bleibt doch gleichförmig; ein kurzer, aber krümmungstreuer Akkumulator trägt die Struktur schon. Das e-Kriterium ist damit schärfer als jede Reichweiten-Grenze und macht die Achse operativ prüfbar.

an.6 Status

Proven (FFGFT-intern). Die Akkumulationsform, die Drei-Signaturen-Trennung und das e-Kriterium sind aus ξ und der Rekursion $\xi_{n+1} = \xi_n(1 - 100\,\xi_n)$ ableitbar und gegen die exakte Rekursion verifiziert (Dok. 295; Skript `ffgft_kruemmungstreue_probe.py`, deterministisch). Die $O(1/k)$-Asymptotik ist benannt. Dieser Prüfstand ist eine skriptverifizierte *Illustration* des e-Kriteriums (Dok. 295), kein eigenständiger neuer Befund; sein Wert ist, die Achse operativ sichtbar zu machen. FFGFT selbst trägt eine *einzige*, krümmungstreue Windung — der gleichförmige Akkumulator ist eine Kontrastfolie aus dem Brücken-Kontext, kein FFGFT-Objekt; die Trennfrage stellt FFGFT *für die Brücke*, nicht für sich.

Restricted (Kategorie B). Dieser Prüfstand etabliert *keine* Spezifität eines kognitiven, operational-funktional definierten Gedächtnisses (rekursiver Zugriff, semantische Kompression, affektive Gewichtung, Identitätsbindung, persistenter Zustandsübertrag, prädiktive Wiederverwendung). Ob die Krümmungstreue ein solches Objekt trennt, bleibt die restricted-Brücke aus Dok. 304 und verlangt einen eigenen, *unabhängigen, gemeinsam versiegelten* Benchmark — keine FFGFT-interne Rechnung. In beide Richtungen: ein System kann die $1/n$-Textur tragen ohne jene Funktionen, und ein funktional relevantes Gedächtnis ist nicht ausgeschlossen, nur weil es das e-Kriterium nicht erfüllt.

Provenance und Symmetrie. $D(k)$, das e-Kriterium und die FFGFT-Deutung zeitlicher Krümmung stammen aus dem FFGFT-Korpus; die operationale Gedächtnis-Architektur, gegen die eine Brücke zu prüfen wäre, stammt aus unabhängiger Arbeit (Dok. 304, Provenance-Abschnitt). Kein Rahmen enthält, begründet oder unterordnet den anderen; die Ablehnung der Brücke lässt beide unverändert.

Kapitel ao

Dok. 306 — Die native Zeit-Energie-Reziprozität

Dok. 306 Die native Zeit-Energie-Reziprozität — Ersetzung einer geliehenen Begründung

Kurzfassung. Die Dokumente 025 und 063 begründen die Abwesenheit einer kosmischen Anfangssingularität mit Heisenbergs Energie-Zeit-Unschärferelation. Diese Begründung wird hier *ersetzt*, nicht widerlegt: die Konklusion (kein singulärer Anfang) bleibt, die Ableitung wird durch eine korpuseigene ersetzt. Drei Mängel werden benannt — eine invertierte Implikation (endliches Δt liefert eine *endliche* Schranke, nicht $\Delta E \to \infty$), ein Anwendungsfehler (das Δt der Relation ist eine Änderungszeit einer Observablen, kein kosmisches Alter) und ein Stilbruch („unwiderlegbar" ist keine Ledger-Vokabel). Die ersetzende Kette ist nativ: aus $T \cdot m = 1$ (Dok. 003/010), also $T \cdot E = 1$, folgt $E \to \infty \Leftrightarrow T \to 0$; FFGFTs Zeit ist jedoch durch $T_0 = \xi t_P$ nach unten beschränkt, festgelegt durch $\xi = 4/30000$. Damit ist T nach unten beschränkt und E nach oben — eine unendliche Dichte ist strukturell ausgeschlossen. Ergänzend gilt $\partial T^4 = \varnothing$: die Frage nach dem „Anfang" setzt einen Rand voraus, den ein kompakter Torus nicht besitzt. Dieselbe Kette bestimmt das Schwarze Loch: der Horizont ist das *Extremum* — langsamste Zeit $T = T_0$, maximale Konzentration $E = 1/T_0$, maximale Krümmung, alles endlich und wohldefiniert — keine Singularität und folglich nichts zu reparieren. Am anderen Ende gilt dasselbe: $T \cdot m = 1$ hat bei $m = 0$ keine Lösung — FFGFT kennt keinen *leeren* Zustand, nur einen dünnsten. Beide Ränder sind ausgeschlossen: der dichte ist aus ξ *beziffert* ($T_0 = \xi t_P$, $E_{\max} = E_P/\xi$, mit exakter Schließung $T_0 E_{\max} = 1$; zugleich der natürliche UV-Cutoff der Feldtheorie), der dünne strukturell, aber unbeziffert — Letzteres kein Defizit, sondern Folge von $T \cdot m = 1$: jedes System trägt seine eigene Obergrenze $R_{\text{Torus}}(m) = \hbar/mc$, der kosmologische Sektor benötigt daher eine *eigene* Skala.

ao.1 Was ersetzt wird

Dok. 025 und Dok. 063 enthalten in ihrer ursprünglichen Fassung beide die Passage, Heisenbergs Unschärferelation $\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar/2 = 1/2$ (natürliche Einheiten) „beweise unwiderlegbar", dass eine klassische Urknall-Singularität unmöglich sei, und ziehen daraus:

- ein zeitlicher Anfang bedeute Δt endlich;

- dies führe zu $\Delta E \to \infty$;
- folglich müsse das Universum ewig existiert haben.

Die *Konklusion* — kein singulärer Anfang, stattdessen ein endlicher Kern mit minimaler Skala L_0 aus ξ — wird beibehalten. Die *Ableitung* wird ersetzt. Drei Gründe.

ao.2 Drei Mängel der geliehenen Begründung

(M1) Invertierte Implikation. Der Schluss „Δt endlich $\Rightarrow \Delta E \to \infty$" ist ungültig. Aus $\Delta E \geq 1/(2\Delta t)$ folgt bei *endlichem* Δt eine *endliche* untere Schranke für ΔE; ein Anfang vor endlicher Zeit ergäbe eine winzige, harmlose Schranke. $\Delta E \to \infty$ folgt allein aus $\Delta t \to 0$, also aus dem *Augenblick* $t = 0$, nicht aus einem endlichen Anfang. Dies ist kein Flüchtigkeitsfehler, sondern eine umgekehrte Implikation.

(M2) Anwendungsfehler. Die Energie-Zeit-Unschärfe ist keine kanonische Unschärferelation. Nach Paulis Theorem existiert kein selbstadjungierter Zeitoperator, der zu einem nach unten beschränkten Hamiltonoperator konjugiert wäre; die strenge Form (Mandelstam–Tamm) definiert $\Delta t = \Delta A / |\mathrm{d}\langle A\rangle/\mathrm{d}t|$ — die charakteristische *Änderungszeit einer Observablen*, nicht eine verstrichene Dauer. Das „Alter des Universums" ist kein zulässiges Δt dieser Relation.

(M3) Stilbruch. „Beweist unwiderlegbar" ist eine Behauptungsstärke, die im FFGFT-Ledger nicht vorkommt. Der Ledger kennt *proven* (aus ξ abgeleitet), *restricted* und *blocked*; eine Aussage wird als hinreichend präzise ausgewiesen, um entscheidbar zu sein, nicht als unwiderlegbar.

Der übergreifende Punkt. Heisenbergs Relation ist im QM-Rahmen nicht falsch, aber sie ist *projiziert*: sie gehört zur Beschreibungsebene, die FFGFT als Projektion aus der tieferen Struktur versteht. Ein Argument gegen die kosmische Singularität, das sich auf sie stützt, verlässt die Projektion nicht — es zirkuliert in ihr. Genau dies mahnt Dok. 298 an: die Projektion wird nicht dadurch verlassen, dass man ihre Sätze importiert.

ao.3 Die ersetzende native Kette

(1) Exakte Reziprozität. Die Zeit-Masse-Dualität (Dok. 003, vgl. Dok. 010) lautet

$$T \cdot m = 1, \qquad \text{und mit } E = m \text{ (natürliche Einheiten)} \quad \boxed{T \cdot E = 1} \tag{ao.1}$$

Dies ist eine *Gleichung*, keine Ungleichung — eine schärfere Aussage als $\Delta E \cdot \Delta t \geq 1/2$, und eine korpuseigene.

(2) Die Zeitinkremente sind endlich. FFGFTs Zeit ist der kumulierte Defekt der ausgerollten Windung,

$$D(k) = \sum_{n \le k} 100\,\xi_n \;\to\; \ln\!\Big(1 + \tfrac{k}{75}\Big), \qquad \xi_{n+1} = \xi_n\,(1 - 100\,\xi_n), \tag{ao.2}$$

mit dem ersten Schritt

$$d_1 = 100\,\xi_1 = 100 \cdot \tfrac{4}{30000} = \tfrac{1}{75}. \tag{ao.3}$$

Zu präzisieren ist: $D(k)$ *wächst* unbeschränkt für $k \to \infty$ (logarithmisch). Die singularitätsfreie Aussage lautet nicht „D divergiert nie", sondern: $D(k)$ *ist an jeder endlichen Stelle endlich, und es gibt keinen Punkt, an dem* D *oder seine Inkremente divergieren.* Der erste Schritt ist endlich und durch ξ festgelegt. Die Inkremente $d_n = 100\,\xi_n$ fallen von $d_1 = 1/75$ an monoton ($d_2 = 0{,}013156$, $d_n \approx 1/(n+74)$); die untere Zeitschranke folgt aus $T_0 = \xi t_P$, der Zeit-Kleidung von $L_0 = \xi \ell_P$ (Dok. 180, R90). Das erste Inkrement ist damit das größte, nicht das kleinste: $d_1 = 0{,}013333 > d_2 = 0{,}013156 > \ldots \to 0$.

(3) Der Schluss. Aus $T \cdot E = 1$ folgt

$$E \to \infty \quad \Longleftrightarrow \quad T \to 0. \tag{ao.4}$$

Ein Zustand mit $T = 0$ existiert in FFGFT jedoch nicht: die Zeit ist nach unten durch $T_0 = \xi t_P$ beschränkt (siehe (2); die Schranke ist T_0, nicht d_1). Damit ist E nach oben beschränkt — eine unendliche Energiedichte ist *strukturell* ausgeschlossen, nicht durch eine Aussage über Messgenauigkeit. Die genaue numerische Schranke hängt von der Normierung ab und wird hier nicht als Zahl behauptet; die strukturelle Aussage steht ohne sie.

(4) Die Randfrage. Der Torus ist kompakt und randlos, $\partial T^4 = \varnothing$ (Dok. 302; vgl. Dok. 263, Dok. 296). Die Frage „was war bei $t = 0$?" setzt einen Rand voraus, an dem ein Anfang sitzen könnte. Ein kompakter Torus hat keinen. Die Frage ist damit nicht falsch *beantwortet*, sondern falsch *gestellt*: sie importiert die dekompaktifizierte Projektion als Ontologie. Was die Standardkosmologie als singulären Anfang liest, ist der Punkt, an dem die *Projektion* endet — nicht die Welt.

ao.4 Das Schwarze Loch: Extremum, nicht Singularität

Dieselbe Kette liefert die FFGFT-Aussage über Schwarze Löcher — und sie ist unspektakulär: es gibt nichts Divergentes.

Aus $T \cdot E = 1$ mit der unteren Schranke $T \ge T_0$ (dem kleinsten möglichen Zeitraum, in der ursprünglichen T0-Notation ebenso bezeichnet; vgl. $\Omega(T) = T_0/T$ in Dok. 095) folgt unmittelbar

$$E \;\le\; \frac{1}{T_0}. \tag{ao.5}$$

Die Extrema sind im Korpus *beziffert* und aus ξ abgeleitet. Die minimale Länge $L_0 = \xi \ell_P$ (Dok. 182) liefert über die Energie-Längen-Reziprozität unmittelbar den Cutoff

$$E_{\max} = \frac{\hbar c}{L_0} = \frac{E_P}{\xi} \approx 7500\,E_P \approx 9{,}16 \times 10^{22}\ \text{GeV}, \qquad T_0 = \xi t_P \approx 7{,}19 \times 10^{-48}\ \text{s} \tag{ao.6}$$

(Dok. 250, Dok. 290). Die Reziprozität schließt dabei *exakt*: ξ kürzt sich heraus,

$$T_0 \cdot E_{\max} \;=\; (\xi t_P) \cdot \frac{E_P}{\xi} \;=\; t_P \cdot E_P \;=\; 1 \qquad \text{(natürliche Einheiten)}. \tag{ao.7}$$

Das folgt aus der Konstruktion: $T \cdot E = 1$ ist an den Extrema erfüllt, nicht nur im Mittelbereich.

Derselbe Cutoff erscheint in der Feldtheorie: der fraktale Torus liefert einen *natürlichen UV-Cutoff* bei E_P/ξ, weshalb traditionelle Renormierung in der vollständigen FFGFT-Formulierung nicht erforderlich ist (Dok. 019, Dok. 202); dieselbe Schwelle erklärt die Seltenheit magnetischer Monopole (Dok. 143). Die Lagrangedichte divergiert nicht, weil die *Geometrie* den Cutoff stellt — die minimale Zeit ist kein nachträglicher Regulator, sondern folgt aus der Struktur.

Skalen, nicht Summen. Eine Präzisierung, ohne die alles Folgende falsch gelesen würde: T_0 und $E_{\max}$ sind *Skalen*, keine Schranken für Gesamtheiten. T_0 ist die untere Zeit*schranke* der Windung, $E_{\max}$ die maximale Energie *pro fundamentaler Zelle* bzw. pro elementarer Anregung — eben ein *Cutoff*, und ein Cutoff begrenzt stets eine einzelne Mode, niemals eine Summe. Die Gesamtenergie eines zusammengesetzten Systems darf beliebig groß sein: sie besteht aus vielen Zellen, nicht aus einer dichteren. Ein makroskopischer Körper ist keine *eine* Windung, sondern deren sehr viele; „das T der Erde" ist keine wohlgestellte Größe, und $\hbar/(Mc^2)$ für eine Sternmasse ist kein Zustand dieser Relation, sondern eine Fehlanwendung. $T \cdot E = 1$ und die Schranken gelten *je Anregung*, nicht je Aggregat.

Entsprechend ist die Aussage über das Schwarze Loch eine über die *Konzentration*, nicht über die Masse: Am Horizont erreicht die *lokale* Dichte den Zellen-Cutoff. Die *Gesamtmasse* bleibt unbeschränkt — ein größeres Loch hat mehr Zellen, nicht dichtere.

Der Horizont ist damit der Ort, an dem die Extrema *erreicht* werden:

- die *langsamste Zeit*: $T = T_0$, nicht $T \to 0$;
- die *maximale Energie- und Massenkonzentration*: $E = 1/T_0$ *pro Zelle*, endlich (eine Dichte, keine Gesamtmasse);
- die *maximale Krümmung*: endlich, weil sie an E gebunden ist.

Jede dieser Größen ist wohldefiniert. Der Horizont ist kein Rand zu etwas anderem und kein Vorhang vor einer Singularität, sondern die Fläche, auf der die Zeit ihr Minimum und die Konzentration ihr Maximum annimmt.

Daraus folgt eine Konsequenz, die man aussprechen sollte, weil sie leicht überlesen wird: In FFGFT gibt es *nichts zu reparieren*. Modelle, die den singulären Kern durch einen Bounce, eine Übergangsschale oder einen Tochterzweig ersetzen, beheben einen Defekt, den FFGFT gar nicht erzeugt. Das ist keine Widerlegung solcher Modelle — sie arbeiten in einem Kontinuumsbild, das FFGFT nicht teilt — sondern die Feststellung, dass die Frage, auf die sie antworten, hier nicht entsteht. Wo die dekompaktifizierte Beschreibung „unendlich" sagt, sagt die kompakte nur: *hier ist das Extremum*.

ao.5 Das andere Extrem: der dünnste Zustand

Die Reziprozität hat zwei Enden. Das eine ist der Horizont; das andere wird gewöhnlich „Vakuum“ genannt — und genau diese Benennung führt in die Irre.

Der scheinbare Zirkel. Man formuliert den Einwand so: Das Vakuum ist leer; es wirkt nur durch Krümmung nicht leer; Krümmung aber setzt Masse voraus. Ohne Masse keine Krümmung, ohne Krümmung nichts, was das Leere füllte — der Kreis schließt sich.

Der Zirkel ist ein Import. Er entsteht aus einem *kausalen Pfeil*, den die Allgemeine Relativität mitbringt: $T_{\mu\nu}$ *erzeugt* Krümmung, Masse ist Ursache, Krümmung Wirkung. In diesem Bild muss man fragen, „was krümmt hier?“, und ohne Masse gibt es keine Antwort. FFGFT besitzt diesen Pfeil nicht. $T \cdot m = 1$ ist keine Ursache-Wirkung-Beziehung, sondern eine *Reziprozität*: Masse und zeitliche Krümmung sind zwei Lesarten derselben Struktur, keine erzeugt die andere. Die Frage „was war zuerst — Masse oder Krümmung?“ ist so falsch gestellt wie die Frage nach $t = 0$: sie importiert eine Kausalstruktur, die die kompakte Beschreibung nicht hat. Damit ist nichts zu erzeugen, und der Zirkel löst sich auf.

Beide Enden sind ausgeschlossen. Die Grundrelation selbst verbietet die Ränder:

$$m \to \infty \;\Rightarrow\; T \to 0 \qquad \text{ausgeschlossen durch } T \geq T_0 \;\; (L_0 = \xi \ell_P), \tag{ao.8}$$

$$m \to 0 \;\Rightarrow\; T \to \infty \qquad \text{ausgeschlossen: } T \cdot m = 1 \text{ hat bei } m = 0 \text{ keine Lösung.} \tag{ao.9}$$

FFGFT kennt daher *keinen leeren Zustand* — nicht, weil etwas ihn füllte, sondern weil die Theorie keine Beschreibung von „nichts“ enthält. Der Torus mit seiner Windung *ist* das Objekt; „leer“ hieße „keine Windung“, und die Windung ist, was Zeit ist. „Vakuum“ behauptet eine Leere, die es in diesem Rahmen nicht gibt; treffender sind *der dünnste Zustand* oder *die flachste Windung*.

Die Asymmetrie, ehrlich benannt. Die beiden Enden sind nicht gleich gut bestimmt, und das soll nicht schöner erscheinen, als es ist:

- Der *dichte* Pol ist hart und abgeleitet: T_0 und $L_0 = \xi \ell_P$ folgen aus ξ (Dok. 182: die Kette $\xi \to m_e \to G \to \ell_P \to L_0$ hängt nur von ξ ab).
- Der *dünne* Pol ist *strukturell ausgeschlossen, aber nicht beziffert*. Dass $m = 0$ unmöglich ist, folgt aus der Relation; *wie klein* m minimal werden kann, folgt daraus nicht — und zwar aus einem *strukturellen* Grund, nicht aus einer Lücke der Ableitung. Dok. 182: „Die Frage nach einer universellen Maximalgröße des Universums ist nicht sinnvoll gestellt: jede physikalische Skala besitzt ihre eigene systemspezifische Obergrenze $R_{\text{Torus}}(m) = \hbar/mc$.“ Das ist $T \cdot m = 1$ in geometrischer Schreibweise. Wenn zu jeder Masse ihr eigener Torusradius gehört, *kann* die kosmologische Skala nicht aus ξ allein folgen: sie gehört zu ihrem System und ist unabhängig zu setzen. Eine eigene kosmologische Skala ist damit *notwendig*, nicht defizitär.

Unten also eine Wand, oben kein universeller Boden — sondern zu jedem System sein eigener Horizont.

Was davon P35 betrifft — und was nicht. Zu trennen sind zwei Dinge. Dass der kosmologische Sektor eine *eigene* Skala braucht, ist strukturell und in Ordnung. Sie in der Form $E_H = E_0\,\xi^{41/4}$ zu schreiben, ist es nicht: der Exponent $41/4$ ist an H_0 kalibriert, nicht vorwärts abgeleitet, und die ξ-Schreibweise suggeriert eine Ableitung, die es nicht gibt (P35/P36, Dok. 182 sagt dies selbst; Dok. 190). Der Einwand trifft die *Notation*, nicht die Notwendigkeit der eigenen Skala.




Abbildung ao.1: Die Relation $T \cdot E = 1$ (in SI: $T \cdot E = \hbar$) in doppelt-logarithmischen Koordinaten: eine *Gerade* der Steigung -1. Alle elementaren Anregungen liegen exakt auf ihr — keine ist ausgezeichnet, und die Gerade besitzt *keine Mitte*. Ausgezeichnet ist genau ein Punkt: der **Endpunkt** $(T_0,\ E_{\max}) = (\xi t_P,\ E_P/\xi)$, an dem die Kurve *aufhört* — die aus ξ folgende Wand. Am anderen Ende läuft sie als *Asymptote* weiter und kommt nie an ($T \cdot m = 1$ hat bei $m = 0$ keine Lösung). Die beiden Ränder sind also verschiedenartig: links ein erreichter Endpunkt, rechts eine unerreichbare Grenze. Aufgetragen sind *Skalen* (Energie je Anregung), nicht Gesamtmassen; makroskopische Körper gehören nicht auf diese Achse.

Und dazwischen — eine Projektion, keine Struktur. Es liegt nahe, die Systeme auf einer gemeinsamen Achse anzuordnen, von maximaler zu minimaler Massenkonzentration, und sich selbst in deren Mitte zu finden. Diese Achse ist jedoch eine *Außenbetrachtung*: Sie setzt einen Standpunkt voraus, von dem aus alle Systeme nebeneinander erscheinen. Einen solchen Standpunkt gibt es in FFGFT nicht. $T \cdot m = 1$

gilt *je System*; es gibt kein gemeinsames T, gegen das aufgetragen werden könnte, und keine Skala, auf der ein System sich verorten ließe.

Schärfer: Wir *projizieren uns in die Mitte*. Die Achse entsteht mit dem Betrachter als Nullpunkt — wer den Maßstab anlegt, steht notwendig dort, wo der Maßstab entsteht. Die Mitte ist daher keine Entdeckung, sondern eine Setzung, und sie bleibt unbemerkt, weil der Setzende und der Verortete dasselbe sind. Aus demselben Grund erscheinen die Ränder als „extrem“: Sie sind das, was vom gewählten Nullpunkt weit entfernt liegt. *Extrem* heißt hier *fern*, nicht *ausgezeichnet*.

Die intrinsische Zeit bleibt davon unberührt — sie ist intrinsisch. Für ein Elektron ist ohne Belang, wo ein Außenstehender es einträgt: seine Windung ist dieselbe, ob im Labor oder nahe einem Horizont, denn $T = 1/m$ und m ist dasselbe. Was sich unterscheidet, ist allein, wie ein anderes System es sieht — eine Relation zwischen zweien, keine Eigenschaft des einen. Auch die „langsamste Zeit“ am Horizont ist eine Aussage über den Vergleich, nicht über das Erleben.

Die Projektion ist damit nicht ungültig, sondern *Werkzeug*: ohne gemeinsame Achse ließe sich nichts vergleichen, und Verständnis verlangt Vergleich. Sie ist ein Mittel des Zugriffs, kein Bestandteil der Struktur. Es ist dieselbe Bewegung, die schon die Frage nach $t = 0$ und die Singularität auflöste, ein drittes Mal angewandt — diesmal auf die Skala selbst. Und sie ist eine zugespitzte Form der Selbstbezüglichkeit (Dok. 248): Der Gedanke, der die Ordnung entwirft, ist selbst ein Prozess in ihr; er kann sich nicht heraushalten, sondern *verortet sich, indem er ordnet*.

ao.6 Beobachtung zur Genese

Festzuhalten ist, dass 025 und 063 im *Ergebnis* bereits auf ξ verweisen: die Singularität werde „durch einen winzigen, aber endlichen Kern mit minimaler Längenskala L_0 (aus ξ) ersetzt“. Die Antwort kam also schon aus ξ; nur die Leiter, über die dorthin gestiegen wurde, war geliehen. Warum der Import erfolgte, obwohl Dok. 003/010 vorlagen, ist eine *historische Frage an die Korpus-Genese*, keine systematische. Sie wird hier als solche markiert und nicht beantwortet; jede Antwort wäre Spekulation.

ao.7 Status

Korrektur / Ersetzung. Die Konklusion (kein singulärer Anfang; endlicher Kern mit minimaler, von ξ gesetzter Skala) bleibt unverändert. Die Begründung in Dok. 025 und Dok. 063 ist für diesen Punkt *nicht mehr maßgeblich*; sie wird nicht als widerlegt geführt, sondern als durch die native Kette ersetzt.

Proven (FFGFT-intern). $T \cdot m = 1$ (Dok. 003/010); $D(k)$ und $d_1 = 1/75$ aus ξ und der Rekursion (Dok. 295); $\partial T^4 = \emptyset$ (Dok. 302). Der Schluss $E \to \infty \Leftrightarrow T \to 0$ folgt algebraisch aus der Reziprozität; ebenso die Schranke $E \leq 1/T_0$ und damit die Charakterisierung des Horizonts als Extremum (keine Singularität). Ebenso folgt der Ausschluss von $m = 0$ (kein leerer Zustand).

Beziffert (proven). Die Extrema des dichten Pols sind aus ξ abgeleitet und im Korpus berechnet: $T_0 = \xi t_P \approx 7{,}19 \times 10^{-48}$ s und $E_{\max} = \hbar c/L_0 = E_P/\xi \approx 9{,}16 \times 10^{22}$ GeV

(Dok. 182, 250, 290), mit exakter Schließung $T_0 \cdot E_{\max} = t_P \cdot E_P = 1$. Der fraktale Torus liefert damit zugleich den natürlichen UV-Cutoff der Feldtheorie (Dok. 019/202/143).

Strukturell, nicht defizitär. Der *dünne* Pol bleibt ausgeschlossen, aber unbeziffert — und das ist eine Aussage der Struktur, keine Lücke: aus $T \cdot m = 1$ folgt, dass jedes System seine eigene Obergrenze $R_{\text{Torus}}(m) = \hbar/mc$ trägt; eine universelle Maximalgröße ist nicht sinnvoll gefordert (Dok. 182). Der kosmologische Sektor benötigt daher eine *eigene*, unabhängig gesetzte Skala.

Offen (P35). Deren *Schreibweise* bleibt zu bereinigen: $E_H = E_0\,\xi^{41/4}$ kalibriert den Exponenten an H_0 und kleidet eine gemessene Größe in ξ-Form; das ist keine Ableitung (P35/P36, Dok. 182/190). Der Einwand trifft die Notation, nicht die Notwendigkeit der eigenen Skala. Die Verbindung $R_H \to \ell_1$ bleibt offen (P20, vgl. Dok. 267); der kosmologische Sektor bleibt insgesamt der am wenigsten festgelegte Bereich des Korpus.

Kapitel ap

Dok. 307 — Zeit im Zustandsraum oder daneben — Verortung der Zeit und Herkunft der Massen-Moden

Dok. 307 Zeit im Zustandsraum oder daneben — Verortung der Zeit und Herkunft der Massen-Moden

Kurzfassung. Zwei Rahmungen der Quantenmechanik werden gegenübergestellt: die *ausgerollte* Sicht, die die Zeit als äußeren Parameter behält, und die *eingerollte* Sicht, die sie als kompakte Dimension in den Zustandsraum zieht. Beide benutzen denselben Operator-Formalismus; der Unterschied liegt allein darin, ob die Zeit innen oder außen sitzt. In der eingerollten Sicht werden die Massen zu Eigenwerten einer Modenstruktur auf einem kompakten Torus; die konkrete FFGFT-Ausführung ist $\tilde{T} \cdot m = 1$ auf $L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$ (Dok. 230/231/232, 306). Die Verhältnisstruktur der Massen folgt damit aus einem einzigen dimensionslosen Parameter $\xi_0 = 4/30000$ und ist auf $\sim$0,5 % belegt; exakt aus ξ_0 abgeleitet sind die Verhältnisse nicht, $m_\mu/m_e = 206{,}768$ ist der Messanker (siehe den Abschnitt zur Massenhierarchie); die absolute Skala trägt ihre SI-Korrektur über feste Brückenkonstanten (P40), ist aber kein freier Parameter. Vermeintlich offene Fragen — absolute Skala, Kausalität geschlossener Zeit, Quantengravitation — werden als im Korpus bereits entschieden eingeordnet (Dok. 013/190, 306, 230). Die eingerollte Sicht wird damit als Ableitungsrahmen mit framework-spezifischen Observablen (Mass-reading, CHSH$\sim \xi$ – mit heutiger Hardware nicht auflösbar –, D_f, L_0) positioniert, nicht als Gedankenspiel.

ap.1 Die Gabelung

Am Anfang jeder quantenmechanischen Modellbildung steht eine Wahl, die meist unausgesprochen bleibt und dennoch alles Weitere festlegt: **Ist die Zeit eine Richtung *im* Zustandsraum, oder ein Parameter *neben* ihm?**

Die Frage klingt technisch, ist aber ontologisch. Sie entscheidet nicht, welche Mathematik verwendet wird — beide Antworten arbeiten mit selbstadjungierten Operatoren, Spektren und Projektoren — sondern *wo* die Zeit sitzt. Und genau diese Verortung entscheidet, ob die physikalischen Größen aus der Struktur *fallen* oder ihr

angeheftet werden müssen. Die vorliegende Auseinandersetzung verfolgt diese eine Weichenstellung durch ihre Konsequenzen.

Diese fundamentale Frage reicht bis zu den Wurzeln der Quantentheorie zurück. Schon 1932 erkannte **Wolfgang Pauli**, dass die Einführung eines Zeitoperators, der kanonisch zum Hamiltonian konjugiert ist, auf grundlegende Schwierigkeiten stößt. Das sogenannte „Pauli-Theorem“ hat die Entwicklung der Quantenmechanik maßgeblich geprägt und die Zeit als äußeren Parameter scheinbar unumstößlich gemacht. Erst spätere Arbeiten, insbesondere von **Aharonov und Bohm** sowie **Garrison und Wong**, zeigten, dass unter bestimmten Bedingungen (etwa bei nicht halb-beschränkten Spektren) Zeitoperatoren doch konstruiert werden können. Der Streit um den Zeitoperator ist bis heute nicht vollständig beigelegt und bildet den Hintergrund für die hier diskutierte Alternative.

ap.2 Die ausgerollte Sicht: Zeit als äußerer Parameter

Die vertraute Formulierung der Quantenmechanik siedelt die Zeit außerhalb des Zustandsraums an. Der Hilbertraum ist der Raum der Zustände *zu einem Zeitpunkt*, typischerweise $\mathscr{H} = L^2(\text{Konfigurationsraum})$. Die Zeit ist der Parameter t, entlang dessen sich der Zustand entwickelt, vermittelt durch die unitäre Evolution $e^{-i\hat{H}t}$. Die Observablen — Ort, Impuls, Spin — sind Operatoren *auf* $\mathscr{H}$. Die Zeit ist keiner.

Dass sie keiner sein kann, ist kein Versehen, sondern ein bekanntes Resultat: Paulis Einwand zeigt, dass zu einem nach unten beschränkten Hamiltonian kein selbstadjungierter, kanonisch konjugierter Zeitoperator existiert. In der ausgerollten Sicht bleibt die Zeit deshalb notwendig die Bühne, nicht das Stück.

Die Konsequenz ist strukturell und folgenreich: Da die Zeit außen steht, enthält der Zustandsraum allein keine dynamischen Skalen. Massen, Kopplungen, Lebensdauern sind in der reinen Raumstruktur nicht vorhanden — sie müssen über *zusätzliche* Strukturen von außen eingeführt werden. Im Standardmodell geschieht dies durch Yukawa-Terme und die freien Parameter, die deren Stärke festlegen. Die Struktur liefert den Rahmen; die Zahlen kommen aus der Messung.

Diese Problematik ist nicht neu. Bereits **Hermann Weyl** und später **Eugene Wigner** erkannten, dass die Massen der Elementarteilchen aus gruppentheoretischer Perspektive als Casimir-Invarianten erscheinen — also als strukturelle Label, nicht als angeheftete Parameter. Dennoch blieb die Frage der Massengenerierung ein zentrales ungelöstes Problem der theoretischen Physik. Der Higgs-Mechanismus bietet zwar eine Erklärung für die Masse der Eichbosonen, führt aber selbst neue freie Parameter (die Yukawa-Kopplungen) ein.

Die Kritik an der ausgerollten Sicht ist daher nicht, dass sie falsch wäre, sondern dass sie eine fundamentale Frage — die Herkunft der Massenskalen — unbeantwortet lässt und stattdessen auf externe Eingaben verweist. Dies wird besonders deutlich, wenn man die historische Entwicklung der Quantenfeldtheorie betrachtet: Der Übergang von der „alten“ Quantenmechanik zur Quantenfeldtheorie brachte zwar die Möglichkeit der Teilchenerzeugung und -vernichtung, aber keine intrinsische Erklärung für die Massenwerte.

ap.3 Eine repräsentative Konstruktion dieser Art

Viele Modellprogramme, die eine geometrische Herkunft der Teilcheneigenschaften anstreben, folgen — bei aller Verschiedenheit im Detail — demselben Grundschema, und es lohnt, dieses Schema abstrakt zu betrachten:

1. Man wählt einen diskreten Träger (ein Gitter, eine Cut-and-Project-Struktur, einen periodischen Graphen).
2. Auf ihm definiert man eine selbstadjungierte Operatorfamilie.
3. Über Spektralprojektoren extrahiert man *Sektoren* — Eigenräume oder invariante Unterräume des Operators.
4. Diesen Sektoren wird *nachträglich* physikalische Bedeutung zugeordnet: Ladung, Spin, und Masse — Letztere häufig über eine parametrische Abbildung, etwa eine Yukawa-artige Funktion mit ein oder zwei freien Parametern.

Ein solches Vorgehen kann mathematisch vollständig kontrolliert und reproduzierbar sein. Die entscheidende Beobachtung betrifft nicht seine Strenge, sondern seine *Verortung der Zeit*: Der Träger ist ein räumliches Objekt, die Operatorevolution — wo sie überhaupt auftritt — läuft über einen äußeren Parameter. Die Sektoren sind daher **räumliche Eigenräume, keine Zeit-Moden**. Die Masse ist in ihnen nicht enthalten; sie wird ihnen über die parametrische Abbildung angeheftet.

Und hier greift ein Argument, das sich selbst trägt: **Eine parametrische Abbildung mit freien Parametern kann jede endliche Werteliste treffen.** Ist die Abbildung nicht *vorab und universell* fixiert, so besitzt sie keinen prädiktiven Gehalt — sie benennt die bekannten Eingaben um. Um überhaupt Zahlen zu liefern, muss eine solche Konstruktion daher an *externe* Werte gekoppelt werden: an die Messung, und damit — da die Messwerte des Teilchensektors standardmodell-kalibriert sind — indirekt an das Standardmodell selbst. Das ist der schwierige Weg: Die Zahlen kommen von außen, nicht aus der Struktur. Ein Modell, das sich als Alternative versteht, bezieht seine Vergleichswerte am Ende doch aus dem, wovon es sich absetzen wollte.

Der Punkt ist nicht, dass dieses Vorgehen falsch wäre. Es ist redlich, sofern es seine eigene Grenze deklariert — dass es nämlich keine Massen *ableitet*, sondern eine kontrollierte Hypothesenarchitektur bereitstellt. Der Punkt ist, dass die *Schwierigkeit* dieses Wegs kein Zufall ist, sondern die unmittelbare Folge der ausgerollten Verortung der Zeit.

Ein konkretes Beispiel: Die sogenannte „Graphen-Modellierung“ der Teilchenphysik definiert Quasiteilchen-Anregungen auf hexagonalen Gittern. Diese Anregungen zeigen lineare Dispersionsrelationen und können als masselose Fermionen interpretiert werden — aber die Einführung einer Masse erfordert stets zusätzliche Terme (etwa einen Haldane-Term oder eine Kekulé-Distorsion), die mit freien Parametern versehen sind. Die Geometrie liefert die Kinematik, aber nicht die Massenskala.

ap.4 Die eingerollte Sicht: Zeit als kompakte Dimension des Zustandsraums

Die Alternative belässt die Zeit nicht außen und eliminiert sie auch nicht, sondern zieht sie *in* den Zustandsraum — als geschlossene, periodische Dimension. In Hilbertraum-Sprache tritt an die Stelle von $L^2(\text{Raum})$ mit äußerem t ein Raum, in dem eine kompakte Zeit-Richtung Teil der Geometrie ist, etwa $\mathscr{H} = L^2(T^4) \otimes (\text{interner Faktor})$, wobei eine der Torus-Richtungen die Zeit trägt. Im FFGFT-Korpus ist dieser Hilbertraum als $L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$ ausgeführt und die Bijektivität der Darstellung (Typ III) belegt (Dok. 230/231/232, 270).[1]

Auf einer geschlossenen Dimension sind die zulässigen Zustände **stehende Moden mit diskreten Windungszahlen**. Die Quantisierung ist dann nicht postuliert, sondern geometrisch erzwungen: Nur bestimmte Moden passen auf die geschlossene Struktur. Die Masse wird zum **Eigenwert eines Operators auf $\mathscr{H}$ selbst** — nicht angeheftet, sondern strukturell enthalten. Die Verhältnisse der Massen liegen fest, weil die zulässigen Moden festliegen.

Die Relation Zeitzyklus mal Masse gleich Eins, $\tilde{T} \cdot m = 1$, ist die konkrete Ausführung dieses Gedankens: Jede massive Größe *ist* ihr eigener Zeitzyklus. Im Korpus ist dies die native Zeit-Energie-Reziprozität $T \cdot E = 1$ (Dok. 306), und die Entkompaktifizierung $S^1_m \to \mathbb{R}_t$ ist maßerhaltend, also verlustfrei (Dok. 270). Dass eine kompakte Dimension einen diskreten Moden-Turm erzeugt, dessen Massen sich wie das Inverse der Kompaktifizierungsperiode verhalten, ist kein exotischer Zug, sondern der Mechanismus, den **Kaluza und Klein** bereits für eine kompakte Raum-Dimension beschrieben haben ($m_n \propto n/R$). Was dort für eine eingerollte Raum-Richtung gilt, gilt hier für die eingerollte Zeit — mit der Masse in der Rolle des Modenindex.

Bemerkenswert ist, dass Paulis Einwand die eingerollte Sicht nicht trifft. Er gilt für eine *offene*, nach unten unbeschränkte Zeit konjugiert zu einem beschränkten Hamiltonian. Eine *kompakte* Zeit verhält sich wie eine Winkelvariable: Ihr konjugiertes Spektrum ist diskret (wie beim Drehimpuls zum Winkel), und das Pauli-Argument entfällt. Die geschlossene Zeit ist mathematisch nicht nur zulässig, sie ist der natürliche Ort einer diskreten Modenstruktur.

Diese Einsicht hat tiefe Wurzeln in der mathematischen Physik. **Witten** wies darauf hin, dass kompakte Zeitdimensionen in der Stringtheorie natürlicherweise auftreten. **Hawking** diskutierte die Implikationen einer geschlossenen Zeit für die Kosmologie. Die sogenannte „Kaluza-Klein-Theorie mit kompakter Zeit“ wurde in verschiedenen Kontexten untersucht, etwa von **Reifler** und **Bars**, die eine „zweizeitige Physik“ (two-time physics) entwickelten.

Die eingerollte Sicht hat auch Verbindungen zur **thermodynamischen Zeit**. Wenn die Zeit kompakt ist, ist die thermodynamische Pfeilrichtung nicht fundamental, sondern eine emergente Eigenschaft der nicht-kompakten Raumanteile. Dies könnte eine natürliche Erklärung für die scheinbare Irreversibilität der makroskopischen Physik bieten, ohne auf Ad-hoc-Annahmen über Anfangsbedingungen zurückgreifen zu müssen.

[1] Dok-Nummern verweisen durchgehend auf den FFGFT-Korpus (Zeit-Masse-Dualität).

ap.5 Der Kern der Auseinandersetzung

Nun die eigentliche Abwägung, ohne Vorentscheidung.

Was die ausgerollte Sicht gewinnt: den nahtlosen Anschluss an die etablierte Maschinerie der Quantenfeldtheorie; die Freiheit von einer starken ontologischen Festlegung; die Vertrautheit der offenen Zeitachse. **Was sie kostet:** Die Struktur allein legt keine Massen fest. Dynamische Werte müssen von außen; Vorhersagen hängen an externer Kalibrierung; und ein Modell dieses Typs, das sich als eigenständig versteht, koppelt für seine Zahlen doch wieder an die Messung — und damit ans Standardmodell.

Was die eingerollte Sicht gewinnt: Die Moden und ihre Verhältnisse fallen aus der Struktur, ohne parametrisches Anheften; die diskrete Quantisierung ist geschenkt statt postuliert. **Was sie kostet:** eine starke ontologische Behauptung — Zeit als geschlossene Dimension —, die zu rechtfertigen ist und der gewohnten Intuition der laufenden Zeit widerspricht. Und sie hebt nicht jede äußere Anbindung auf: Die *absolute* Skala braucht weiterhin eine Einheiten-Brücke (die SI-Umrechnung über die Konversionsfaktoren; Dok. 013, sowie Dok. 190 P40: Absolutwerte tragen die Korrektur über Brückenkonstanten, die sich in Verhältnissen kürzen), damit aus der festen Verhältnisstruktur messbare Zahlen werden. Geschenkt ist die Verhältnisstruktur, nicht die absolute Skala.

Der entscheidende Befund der Auseinandersetzung ist aber dieser: **Beide Wege benutzen denselben Operator-Formalismus.** Der Unterschied liegt nicht in der Mathematik, sondern allein darin, ob die Zeit innen oder außen sitzt. Man kann dieselbe Konstruktion — selbstadjungierter Operator, Spektralsektoren — beibehalten und *nur die Zeit in den Raum ziehen*; dann werden die Sektoren zu Moden, und die Masse, die zuvor über eine parametrische Abbildung angeheftet werden musste, wird zum Eigenwert der Struktur selbst. Wer die Sektoren als räumliche Eigenräume liest, muss die Physik anheften. Wer sie als Zeit-Moden liest, findet sie enthalten. Es ist dieselbe Rechnung — mit der Zeit an einem anderen Ort.

Diese Erkenntnis hat weitreichende methodologische Implikationen. Sie zeigt, dass die Wahl der Zeitverortung eine Art „framework choice" darstellt, die der eigentlichen Modellbildung vorausgeht und deren interpretative Reichweite festlegt. **Dies ist keine triviale Feststellung**: Die sogenannte **„quantum equivalence"** beider Sichten ist wohlbekannt, aber ihre methodologischen Konsequenzen wurden bisher kaum systematisch untersucht.

ap.6 Wer die Richtung „Zeit nicht extern" bereits bemüht hat

Der Gedanke, die Zeit nicht als äußeren Parameter zu behandeln, ist keine Neuheit, sondern eine reiche und lange verfolgte Linie in den Grundlagen der Physik. Es ist redlich, die eingerollte Sicht in dieser Linie zu verorten — und ihre Besonderheit gegen sie abzugrenzen.

Die relationale Zeit

- **Page & Wootters** lassen die Zeit *innerhalb* des Zustandsraums entstehen: als Korrelation (Verschränkung) zwischen einem Uhr-Subsystem und dem Rest. Der Gesamtzustand ist stationär; „Evolution ohne Evolution“. Zeit ist hier intern, nicht extern.
- Die Arbeiten von **Moreva et al.** und **Marletto & Vedral** haben diesen Mechanismus präzisiert und sogar experimentell illustriert.
- **Gambini & Pullin** entwickelten die Montevideo-Interpretation mit relationaler Zeit.

Die zeitlose Quantengravitation

- **Wheeler–DeWitt**: In der kanonischen Quantengravitation ist die universelle Wellenfunktion zeitlos, $\hat{H}\Psi = 0$. Das daraus folgende „Problem der Zeit“ ist genau die Feststellung, dass es keine äußere Zeit gibt.
- **Kuchař** und **Isham** lieferten die maßgeblichen Übersichten zum Zeitproblem der kanonischen Quantengravitation.
- **Rovelli**: relationale Quantenmechanik; „Forget Time“; mit **Connes** die thermische-Zeit-Hypothese — Zeit als abgeleitete, nicht fundamental-externe Größe.
- **Barbour**, *The End of Time*: die konsequente Elimination der Zeit zugunsten zeitloser Konfigurationen.

Die kompakte Zeit in der Stringtheorie

- Die Stringtheorie hat kompakte Zeitdimensionen in verschiedenen Kontexten untersucht.
- **Bars** und Kollegen entwickelten eine „zweizeitige Physik“ (two-time physics), die eine erweiterte Symmetriegruppe mit zwei Zeitdimensionen postuliert.

Die Moden-Struktur

Zwei weitere Referenzen tragen weniger die Zeit-Frage als die *Moden*-Seite und begründen, dass „Masse als Struktur-Eigenwert“ wohlvertraut ist:

- **Wigner**: Masse ist eine Casimir-Invariante — ein Label irreduzibler Darstellungen der Poincaré-Gruppe. Masse ist dort bereits ein struktureller Eigenwert, nicht eine angeheftete Zahl.
- **Kaluza** / **Klein**: eine kompaktifizierte Dimension erzeugt einen diskreten Moden-Turm mit gequantelten Ladungen — die mathematische Blaupause dafür, dass eine eingerollte Dimension Moden hervorbringt.

Die Abgrenzung, die dieser Überblick erlaubt, ist präzise: Der überwiegende Teil dieser Tradition macht die Zeit *relational*, *emergent* oder *zeitlos* — sie nimmt die Zeit als Fundamentales *heraus*. Die eingerollte Sicht tut etwas subtil anderes: Sie nimmt die Zeit *hinein* — als kompakte geometrische Dimension des Zustandsraums, die Moden

trägt. Sie teilt mit Page–Wootters und Rovelli die Ablehnung der äußeren Parameter-Zeit, unterscheidet sich aber im positiven Vorschlag (kompakte geometrische Zeit statt relationaler oder thermischer Zeit). Die Neuheit liegt also nicht in „Zeit ist nicht extern“ — das ist alt und gut belegt —, sondern in der spezifischen Route „kompakte Zeit erzeugt Massen-Moden“.

ap.7 Erweiterung: Mathematische und physikalische Implikationen

Die mathematische Struktur der eingerollten Zeit

Zur präziseren Fassung der eingerollten Sicht dient der Hilbertraum $\mathscr{H} = L^2(T^1 \times M) \otimes \mathscr{H}_{\text{int}}$, wobei T^1 eine kompakte Zeitdimension der Länge T ist und M der gewöhnliche dreidimensionale Raum. Eine Funktion auf diesem Raum kann in eine Fourier-Reihe entwickelt werden:

$$\Psi(t, \mathbf{x}) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{2\pi i n t/T} \psi_n(\mathbf{x})$$

Die diskreten Frequenzen $\omega_n = 2\pi n/T$ entsprechen den Massenwerten (in natürlichen Einheiten $\hbar = c = 1$). Der Operator, der diese Frequenzen generiert, ist der Energie-Operator $\hat{E} = -i\,\partial_t$, dessen Eigenwerte genau das diskrete Spektrum $\{2\pi n/T\}$ sind.

Die entscheidende Beobachtung ist: Die Quantisierung der Massen ist eine direkte Konsequenz der Periodizität der Zeit. **Nichts muss postuliert werden** — die diskreten Moden sind mathematisch erzwungen.

Die Yukawa-Kopplung in der eingerollten Sicht

Die Kopplung zwischen verschiedenen Moden kann als Matrixelement des Wechselwirkungsoperators geschrieben werden:

$$g_{ijk} \propto \int_0^T e^{2\pi i (n_i - n_j - n_k) t/T}\, dt = T \cdot \delta_{n_i,\, n_j + n_k}$$

Dies ist eine exakte Drehimpuls-Erhaltung in der Zeit-Richtung! Die „Yukawa-Kopplungen“ des Standardmodells erscheinen hier als Auswahlregeln für die Moden-Indices, nicht als freie Parameter.

Die Rolle der Eichsymmetrien

Die eingerollte Zeit erlaubt eine natürliche Erweiterung der Eichsymmetrien. **Die kompakte Zeit-Richtung verhält sich wie eine zusätzliche fünfte Dimension** im Sinne der Kaluza-Klein-Theorie, aber mit dem entscheidenden Unterschied, dass sie zeitartig ist. Dies liefert die Erklärung für die Ladungsquantisierung:

$$Q \propto \frac{n}{R_T}$$

wobei R_T der Radius der kompakten Zeit ist. Die Ladungsquantisierung ist damit eine direkte Konsequenz der Periodizität der Zeit.

Die Massenhierarchie in der eingerollten Sicht

Ein zentrales Problem der Teilchenphysik ist die Massenhierarchie: Warum ist das Elektron so viel leichter als das Top-Quark? Der Korpus beschreibt die Leptonmassen in drei Darstellungen, die *ineinander übersetzbar* sind — keine ist ein eigener Ansatz, sie sind dieselbe Struktur in verschiedener Schreibweise (Dok. 006/046/282/292).

(1) Grundlegend — Quantenzahlen und fraktale Korrektur. Teilchen sind diskrete Resonanzmoden des ξ-Feldes; ihre Skala folgt aus einer geometrischen Quantisierung mit den Quantenzahlen (n_i, l_i, j_i) der 3D-Wellengleichung,

$$\xi_i = \xi_0 \cdot f(n_i, l_i, j_i), \qquad E_i = 1/\xi_i, \qquad \xi_0 = \tfrac{4}{30000},$$

wobei die Absolutwerte die fraktale Korrektur $K_{\text{frak}} = 1 - 100\,\xi$ tragen (Dok. 011/012/133). Beispiel: Elektron $(1, 0, \frac{1}{2})$, Myon $(2, 1, \frac{1}{2})$. Dabei ist $f(n, l, j)$ der geometrische Strukturfaktor der Quantenzahlen, keine Frequenz und nicht die Grundwindungszahl $f = 1/\xi$.

(2) Yukawa- bzw. Leiter-Form. Dieselbe Ableitung schreibt sich als $m_i = r_i\, \xi^{\pi_i}\, v$ (Dok. 006/046) mit rationalen r_i (Setzungen: ihre Herleitung aus einer (n, l, j)-Formel trägt nicht) und der Generations-Hierarchie $\pi = \frac{3}{2}, 1, \frac{2}{3}$ — die standardmodell-kompatible Brücke.

(3) Zirkulant/Koide. Die $\sqrt{m_k}$ sind Eigenwerte eines $\mathbb{Z}_3$-Zirkulanten, $\sqrt{m_k} = M\big(1 + \sqrt{2}\cos\big(\frac{2}{9} + 2\pi k/3\big)\big)$ (Dok. 282/292), mit der Koide-Relation $Q = 2/3$; der Winkel $\theta = 2/9$ ist die Ausgabe der Diagonalisierung.

Der entscheidende Punkt: die *dimensionslose Verhältnisstruktur* liegt fest (Koide $Q = 2/3$ gilt für den Zirkulanten strukturell, $\theta = 2/9$); exakt aus ξ_0 abgeleitet sind die Massenverhältnisse jedoch nicht. Die Leiter gibt $m_\mu/m_e = (16/5)/(4/3) \cdot \xi^{-1/2} = \sqrt{43200} = 207{,}846$ (+0,52 %); das exakte Paar $(\sqrt{2},\ 2/9)$ gibt $206{,}7703$ statt CODATA $206{,}7682827(46)$ (rel. $9{,}8 \cdot 10^{-6}$, $\approx 440\sigma$) und ist in exakter Form ausgeschlossen. $206{,}768$ ist der Messanker; belegt ist die Verhältnisstruktur aus ξ auf $\sim 0{,}5$ %. Beim Übergang zu *absoluten* SI-Werten kommen weitere Abweichungsquellen hinzu, mehrere zugleich: der SI-Umrechnung selbst ($\hbar, c, G$ sind Konventions- bzw. Umrechnungsfaktoren, kein gemessener dimensionaler Anker), den Brückenkonstanten v und E_0 (P40), der fraktalen Korrektur K_{frak} sowie der endlichen Messgenauigkeit (etwa der τ-Masse). Deshalb ist die Aussage ein *Strukturbeweis*: die Verhältnisstruktur liegt fest, die absolute Skala trägt ihre Korrektur — eine numerisch bessere Berechnung als das Standardmodell wird nicht beansprucht.

Die Beziehung zur Stringtheorie

Die eingerollte Zeit hat Parallelen zur **M-Theorie** und zur **F-Theorie**, die beide kompakte Dimensionen verwenden. In der F-Theorie kodiert ein zusätzlicher (formal zweidimensionaler) Fasertorus das Axio-Dilaton; Eichsymmetrien entstehen an dessen Degenerationsorten (7-Branen). Die zwei Zusatzdimensionen der F-Theorie (formale Signatur (10,2)) sind dieser elliptische Fasertorus, eine Hilfsgeometrie für τ; eine physikalische kompakte Zeitrichtung gibt es dort nicht. Die Parallele ist daher nur eine Analogie: Die hier entwickelte Sicht könnte als eine Art „F-Theorie light“ verstanden werden: Eine kompakte Zeit-Dimension ohne die volle Stringtheorie-Maschinerie.

ap.8 Kritische Würdigung und Einordnung

Ontologischer Status der Zeit

Der ontologische Anspruch der eingerollten Sicht ist stark, aber im Korpus nicht offen gelassen: Die kompakte Zeit ist real und geometrisch, nicht bloß eine Rechentechnik. Der Rand $\partial T^4 = \emptyset$ macht die Frage nach einem Anfangszeitpunkt $t = 0$ nicht falsch beantwortet, sondern *falsch gestellt* (Dok. 306). Die Zeit ist dabei *diskret*: FFGFT besitzt eine von ξ festgelegte untere Zeitskala $\tau_0 = \xi t_P$ (Zeit-Kleidung von L_0, Dok. 180, R90); die Defekt-Inkremente d_n fallen von $d_1 = 100\,\xi_0 = 1/75$ an monoton (Dok. 306), und die zulässigen Zustände sind diskrete Moden. Diese Moden stehen untereinander in fester Relation: über $\tilde{T} \cdot m = 1$ trägt zwar jede massive Größe ihren eigenen Zyklus $T = \hbar/mc^2$, doch diese Zyklen sind keine unabhängigen Uhren, sondern Zyklen in festen, durch die Massenstruktur bestimmten Verhältnissen ($m_\mu/m_e \approx 207$, $m_\tau/m_\mu \approx 17$), exakt gerechnet nicht kommensurabel — kein Kontinuum freier Uhren. Die Zyklenverhältnisse sind Massenverhältnisse und irrational (Leiter $m_\mu/m_e = 120\sqrt{3}$, $m_\tau/m_\mu = (125/144) \cdot 7500^{1/3}$; Zirkulant $206{,}77$ bzw. $3477{,}47$ für m_τ/m_e); einen gemeinsamen Grundtakt, dessen Harmonische sie wären, gibt es nicht.

Der Physiker **John Wheeler** sprach von der „Zeit als einer Illusion" — eine Position, die die eingerollte Sicht nicht teilt. Sie nimmt die Zeit als real, aber geometrisch anders als gewohnt.

Die absolute Skala: fixiert, nicht frei

Die Verhältnisstruktur der Massen folgt aus der Modenstruktur. Die absolute Skala ist damit noch nicht in SI-Zahlen ausgedrückt — aber sie ist deshalb kein *freier* Parameter. Das Verhältnisgerüst ruht auf einem einzigen dimensionslosen Parameter $\xi_0 = 4/30000$ (dem geometrischen ξ-Wert des Ortsraum-Torus). Die Absolutwerte tragen ihre fraktale bzw. SI-Korrektur nicht als Fit, sondern über feste *Brückenkonstanten* — v in den Massen $m = r\xi^p v$, $E_0 = 7{,}398$ MeV in $\alpha = \xi E_0^2$, und feste Zahlenfaktoren in G. In Verhältnissen kürzen sich diese Brückenkonstanten weg; der Vergleichswert $m_\mu/m_e = 206{,}768$ ist dabei der Messwert (Anker), weder Leiter ($207{,}846$) noch Zirkulant ($206{,}7703$, $\approx 440\sigma$ daneben; siehe den Abschnitt zur Massenhierarchie). $\hbar$ und c sind reine SI-Umrechnung; ein *gemessener* dimensionaler Anker im Standardphysik-Sinn existiert nicht.

Die Planck-Größen sind kein fundamentaler Eingang, sondern folgen aus ξ: die Ableitungskette lautet $\xi \to \{m_e, \ldots\} \to G \to \ell_P$, und $\hbar$ ist reine SI-Umrechnung. Die *einzige* exakte ξ-Potenz-Relation ist dabei

$$\frac{L_0}{\ell_P} = \xi_0, \qquad L_0 = \xi_0\,\ell_P \approx 2{,}15 \times 10^{-39}\ \text{m};$$

der SI-Faktor ℓ_P darf *nicht* in einen ξ-Exponenten hineingerechnet werden. Der Zeitzyklus ist damit nicht „an die Planck-Skala gekoppelt" — die Kausalrichtung ist umgekehrt: die Planck-Größen folgen aus ξ, nicht ξ aus ihnen. Über $\tilde{T} \cdot m = 1$ (bzw. $T \cdot E = 1$) liegt der Zyklus fest, sobald die Masse über die ξ-Geometrie feststeht. Es bleibt kein zu eichender Modul offen; die Dilaton- bzw. Moduli-Analogie zur Stringtheorie trägt hier nicht. (Ausgeführt im Korpus: Dok. 013 SI-Umrechnungstabelle;

Dok. 190 P40 sowie Präz. 2/4/5; Dok. 011/012 und Dok. 133 für $K_{\text{frak}} = 1 - 100\,\xi$; $L_0 = \xi_0 \ell_P$ in Dok. 180–182.)

Die Kausalität

Die naheliegende Sorge — erzeugt eine periodische Zeit geschlossene zeitartige Kurven (CTCs)? — ist im Korpus adressiert, nicht offen. Der Träger ist ein Torus ($\pi_1 \neq 0$, stabile Windungen), kein einfacher Kreis, und die relevante Verbindung ist nicht ontologische Nichtlokalität, sondern eine *topologische* Verbindung auf T^4: die Bell-/CHSH-Korrelation ist geometrisch real und trägt eine Amplitude $\sim \xi$ (Dok. 230, vgl. Dok. 022).

Die klassische CTC-Problematik der Gödel-Lösungen und die Chronologie-Schutz-Vermutung betreffen den *dekompaktifizierten* Lorentz-Sektor; die kompakte Masse-Zeit-Richtung ist spektral, nicht kausal geschlossen (Dok. 270/306).

Die experimentelle Überprüfung

Die Vorhersagen der eingerollten Sicht sind *nicht* die eines verborgenen schweren Moden-Turms oberhalb der Beschleuniger-Reichweite. Das diskrete Spektrum der kompakten Zeit *ist* über $\tilde{T} \cdot m = 1$ bereits das beobachtete Teilchenspektrum (Mass-reading); es gibt keinen zusätzlichen Kaluza-Klein-Turm, auf den zu warten wäre. Die framework-spezifischen, überprüfbaren Größen sind vielmehr:

1. **Mass-reading:** die Teilchenmassen selbst — Lepton-Massenstruktur ($m_\ell = r_\ell \xi^{p_\ell} v$, Dok. 190 Präz. 5), Koide-Relation (10^{-5}, Dok. 292) — als ξ-Ableitungen. Das $g-2$ des Elektrons ist kein solcher Prüfstein: ξ-Zusätze zu a_e sind ausgeschlossen (Dok. 382).
2. **Auswahlregeln:** die Moden-Index-Erhaltung ist identisch mit den Kopplungs-Auswahlregeln des Standardmodells (vgl. den Abschnitt zur Yukawa-Kopplung), keine freien Yukawa-Zahlen.
3. **CHSH $\sim \xi$:** die Bell-Korrelation trägt eine Amplitude der Größenordnung ξ (Dok. 230, Dok. 022) — die kompakte Zeit ist als reale, topologische Verbindung auf T^4 gedeutet, nicht als ontologische Nichtlokalität; der ξ-Effekt ist mit heutiger Hardware nicht auflösbar.
4. **Fraktale Struktur:** die geometrische Fundamentallänge $L_0 = \xi_0\, \ell_P$ (Dok. 180–182) und die fraktale Dimension D_f (Dok. 270/249).

Für eine *saubere* Falsifikation reichen Verhältnis-Tests allein nicht — sie bestätigen (Koide), falsifizieren aber kaum, weil Abweichungen stets als un-modellierte Kopplung deutbar sind. Belastbar ist erst eine *vorwärts* festgelegte, unabhängig prüfbare neue Vorhersage (Dok. 190 P40).

Verbindung zur Quantengravitation

Die Brücke zur Quantengravitation ist im Korpus nicht bloß angedeutet, sondern als Hilbertraum-Konstruktion ausgeführt: $L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$ mit der aus der $\mathbb{Z}_3$-Zirkulanten-Diagonalisierung folgenden Größe $\theta = 2/9$ (Dok. 230/231/232; im Korpus *settled*, nicht offen).

In der Schleifenquantengravitation wird die Zeit relational verstanden — eine Position, der die eingerollte Sicht nahesteht; **Connes** zeigt, dass Zeit aus der Operatoralgebra folgen kann. Die eingerollte Sicht konkretisiert diese Linie geometrisch statt bloß relational.

ap.9 Fazit

Die Wahl, wo die Zeit sitzt, geht der Mathematik voraus und entscheidet, ob die Moden geschenkt oder angeheftet sind. Eine Konstruktion, die die Zeit außen lässt, wird — strukturell, nicht aus Nachlässigkeit — ihre physikalischen Werte von außen anheften müssen; und weil freie parametrische Abbildungen jede endliche Werteliste treffen, koppelt sie für ihre Zahlen an die Messung und damit ans Standardmodell. Das ist der Preis der ausgerollten Sicht: keine eigenständige Vorhersage ohne äußere Anbindung.

Die Zeit in den Zustandsraum zu ziehen ist *ein* Weg — mit einem realen ontologischen Preis —, die Moden und ihre Verhältnisse strukturell zu machen. Die lange Linie von Page–Wootters über Wheeler–DeWitt bis Kaluza–Klein zeigt, dass die Bewegung „Zeit nicht extern“ gut motiviert und vielfach verfolgt ist; die konkrete Ausführung „kompakte Zeit trägt die Massen-Moden“ ist eine bestimmte, starke Wahl innerhalb dieser Linie.

Die Auseinandersetzung endet daher nicht mit einem Urteil, sondern mit einer geschärften Alternative: Wer Sektoren als räumliche Eigenräume liest, hält die vertraute Physik und zahlt mit der äußeren Anheftung der Zahlen. Wer die Zeit als geschlossene Dimension in den Raum nimmt, erhält die Moden strukturell und zahlt mit einer ontologischen Festlegung. Der ontologische Preis der zweiten Wahl bleibt offen auf dem Tisch — aber der methodische Preis der ersten ist nicht kleiner, er ist nur vertrauter.

Die eingerollte Sicht ist dabei kein bloßes Gedankenspiel: Sie besitzt frameworkspezifische, überprüfbare Größen — Mass-reading (Massen, Koide), CHSH $\sim \xi$ (mit heutiger Hardware nicht auflösbar), fraktale Dimension D_f, Fundamentallänge L_0 (siehe den Abschnitt zur experimentellen Überprüfung).

Die hier entwickelte Analyse zeigt, dass die Frage nach der Herkunft der Moden untrennbar mit der Frage nach der Verortung der Zeit verbunden ist. **Die Zeit ist nicht nur ein Parameter — sie ist die Struktur, die die Moden formt.** Oder, wie es der Physiker **Carlo Rovelli** ausdrückte: „Time is not what we think it is.“

ap.10 Epistemischer Status

Proven (aus ξ abgeleitet). Die Verhältnisstruktur der Massen ($m_\ell = r_\ell\, \xi^{p_\ell}\, v$, Strukturbeweis auf $\sim 1\,\%$, Dok. 190 Präz. 5); die dimensionslose Verhältnisstruktur (Koide 10^{-5};

P40), wobei $m_\mu/m_e = 206{,}768$ Messanker ist, kein Ergebnis — das exakte Paar $(\sqrt{2},\ 2/9)$ verfehlt ihn um $\approx 440\sigma$, die Leiter um $0{,}52\,\%$; die Hilbertraum-Darstellung $L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$ mit $\theta = 2/9$ aus der $\mathbb{Z}_3$-Zirkulanten-Diagonalisierung (Dok. 230/231/232); die native Zeit-Energie-Reziprozität $T \cdot E = 1$ und $\partial T^4 = \varnothing$ (Dok. 306); die einzige exakte ξ-Potenz-Relation $L_0/\ell_P = \xi_0$ (Dok. 180–182; P35).

Restricted (Brücke). Die absolute SI-Skala ist über feste Brückenkonstanten (ν, E_0, G-Faktoren) fixiert, nicht frei — aber sie ist kein ξ-Vorwärtsresultat: $\hbar$ und c sind SI-Umrechnung, G ist abgeleitet ($\xi \to \{m_e, \dots\} \to G \to \ell_P$; Dok. 190 P40). Ein gemessener dimensionaler Anker im Standardphysik-Sinn existiert nicht.

Offen. Die *quantum equivalence* beider Rahmungen ist bekannt; ihre methodologischen Konsequenzen sind hier systematisiert, nicht abschließend bewertet.

Teil V

Teil V — Kosmischer Sektor und Resonanzgeometrie

Kapitel aq

Dok. 308 — Der kosmische Sektor der FFGFT: Rotverschiebung, dunkler Sektor und geometrische Gravitation

Worum es geht

Die FFGFT tritt mit einer ungewöhnlichen Behauptung an: Das Universum expandiert nicht. Die kosmische Rotverschiebung ist kein Doppler-Effekt, sondern eine geometrische Eigenschaft des ξ-Feldes. Dunkle Energie existiert als physikalische Entität nicht. Und dunkle Materie braucht keine Teilchen — ihre Effekte sollen aus derselben Geometrie folgen, die die Lichtablenkung trägt; belegt ist das für gasdominierte Zwerggalaxien, für Spiralgalaxien und den Bullet Cluster ist es offen.

Dieses Dokument stellt den kosmischen Sektor der FFGFT zusammen: was hergeleitet ist, was beobachtbar bestätigt wurde, und wo die Grenzen liegen. Es richtet sich an Leser mit Physik-Hintergrund, die wissen wollen *was* die Theorie sagt und *warum*.

Die drei Quellen der Entartung werden benannt, die zwei Kerne der Geometrie werden entwickelt, und der Status jedes Schritts — Herleitung, strukturelle Begründung, Setzung — wird deklariert.

Konventionen

Zeichenerklärung.

[K]	*Kernableitung* — mathematisch oder numerisch aus den Grundsetzungen hergeleitet; reproduzierbar.
[S]	*Strukturaussage* — begründet, aber noch nicht vollständig bewiesen.
[SETZUNG]	*Setzung* — deklarierte Annahme, nicht weiter hergeleitet.

Zentrale Größen.

$\xi = 4/30000$	Einziger Fundamentalparameter der FFGFT [SETZUNG, P33].
$\tilde{T} \cdot m = 1$	Grundrelation: intrinsische Zeit und Masse sind invers.
$R_H = c/H_0$	Geometrische Maximalskala — kein Expansionshorizont.
$a_0 = c^2\xi^{10}/(4\bar{\lambda}_e)$	Übergangsskala des Trägheitsregimes; unterhalb a_0 ist die Trägheit nichtlinear ($\tilde{T} \cdot m = 1$ + Unruh); $= 1{,}033 \times 10^{-10}$ m/s^2.
$\bar{\lambda}_e = \hbar/(m_e c)$	Reduzierte Compton-Wellenlänge des Elektrons.

aq.1 Das statische Universum und die Rotverschiebung

Die Grundentscheidung

Das ΛCDM-Modell beschreibt ein expandierendes Universum: Galaxien bewegen sich auseinander, Licht wird durch die Raumexpansion rotverschoben, und die Beobachtung weit entfernter Supernovae zeigt eine beschleunigte Expansion, die durch eine kosmologische Konstante Λ erklärt wird.

FFGFT trifft eine andere Grundentscheidung: Das Universum ist statisch. Die kosmische Rotverschiebung entsteht nicht durch Bewegung, sondern in der Massenlesart: Uhren und Maßstäbe laufen mit $1/m$, und die geometrische Wegverlängerung im ξ-Feld beschreibt dieselbe Rotverschiebung innerhalb dieser Lesart. Als Energieverlust allein am Photon ist sie ausgeschlossen (Dok. 392).

Der Rotverschiebungs-Mechanismus [K]

Die Rotverschiebungsformel der FFGFT lautet (Dok. 280):

$$1 + z = e^{\xi x} \qquad \Longrightarrow \qquad z \approx \xi x \quad \text{(für kleine } z\text{)},$$

wobei x die Wegstrecke ist, gemessen in einer Länge, die nicht aus ξ ausgewiesen ist und erst über den gemessenen H_0 festliegt: die Form der Relation ist hergeleitet, ihre Skala ist kalibriert (P39). Die Rotverschiebung wächst mit der zurückgelegten Strecke, ohne Wellenlängenabhängigkeit. Gelesen wird sie in der Massenlesart, in der Uhren und Maßstäbe mitlaufen; nur diese Lesart besteht Supernova-Lichtkurven, Hintergrundtemperatur und Tolman-Test, ein Energieverlust allein am Photon scheitert an allen dreien **[X]** (Dok. 392). Mit x als Koordinatenabstand der Massenlesart folgt $H(z) = H_0(1+z)$; so gelesen trägt das Gesetz die DESI-Daten bis $z \approx 1{,}5$ und verfehlt den Lyman-α-Punkt bei $z = 2{,}33$ um $5{,}3\,\sigma$ **[X]** (Dok. 392). Eine andere Zuordnung von x ist nicht geprüft **[S]**.

Achromatisch [K]: Die Wegverlängerung ist rein geometrisch und streckt *alle* Wellenlängen mit demselben Faktor $e^{\xi x}$. Finite-Elemente-Simulationen der Geometrie bestätigen das (K6, Dok. 190). Eine chromatische Rotverschiebung würde die Kohärenz der CMB-Spektrum-Form zerstören — das ist nicht beobachtet.

Die Entartung der Daten [K]

Für die drei klassischen Säulen der Kosmologie — Supernovae Ia, baryonische akustische Oszillationen (BAO), CMB-Temperatur — gilt: Sie können prinzipiell nicht zwischen Expansion und statischer geometrischer Wegstreckung unterscheiden, solange beide Modelle dieselbe Abstands-Rotverschiebungsbeziehung $z(d)$ liefern (Dok. 267).

Das ist keine Schwäche der FFGFT. Es ist eine methodische Feststellung: *Diese Daten allein entscheiden nicht zwischen den Modellen.* Die Entscheidung verlagert sich auf theoretische Konsistenz, Parameteranzahl und Ableitbarkeit.

Was daraus folgt

Für dunkle Energie: Λ ist in ΛCDM nötig, um die scheinbare Beschleunigung der Expansion zu erklären. In FFGFT gibt es keine Expansion, die zu beschleunigen wäre. Λ hat in der statischen Lesart keinen Referenten — es ist eine Buchungsgröße der Expansions-Lesart ohne lesartunabhängige Existenz.

Für Hubble-Spannung: Unterschiedliche Messmethoden für H_0 geben unterschiedliche Werte. In der FFGFT-Lesart misst H_0 nicht die Expansionsrate, sondern einen Parameter der ξ-Geometrie. FFGFT kennt dabei nur *einen*, kalibrierten H_0-Wert und unterscheidet nicht zwischen Früh- und Spätmessung; die Spannung ist in FFGFT nicht modellierbar — sie wird weder reproduziert noch aufgelöst.

Für die z-Achse: Jede Darstellung kosmologischer Daten „über die Zeitïst in ΛCDM-Sprache formuliert. Eine FFGFT-Interpretation muss z als geometrischen Abstandsparameter behandeln, nicht als Zeitachse.

aq.2 Geometrische Gravitation: die Zwei-Hälften-Synthese

Einstein 1911 und 1915

Einstein berechnete 1911 die Lichtablenkung an der Sonne aus der Zeitdilatation allein:

$$\alpha_{1911} = \frac{2GM}{c^2 b} = 0{,}875''.$$

Das war die Hälfte des gemessenen Werts. 1915 lieferte die ART den vollständigen Wert $\alpha_{1915} = 1{,}750''$, weil Raum- *und* Zeitkrümmung je eine Hälfte beitragen.

FFGFT *erklärt* diesen Faktor 2 aus erster Struktur heraus.

Die K3-Flächeninvarianz [K]

$\tilde{T} \cdot m = 1$ (Zeitkrümmung) und die fraktale Wegverlängerung (Raumkrümmung, Dok. 182) sind in FFGFT nicht alternative Mechanismen, sondern **komplementäre Hälften**. Die K3-Regel — Flächeninvarianz der Zeit-Raum-2-Zelle — verankert das:

$$L_t \cdot l = \text{const.}$$

Dies ist formal die Reziprozitätsform von $\tilde{T} \cdot m = 1$, auf das Zeit-Raum-Paar angewandt.

FE-Verifikation [K]: Ray-Tracing durch drei Konfigurationen (30001 log-Knoten, RK4, `ffgft_308_p36_stufeB1_faktor2_fe.py`):

Konfiguration	α am Sonnenrand	Verhältnis zu $1{,}75''$
Nur Zeittakt ($\tilde{T}\cdot m=1$)	$0{,}875''$	$0{,}500$
Nur Wegverlängerung (Raum)	$0{,}875''$	$0{,}500$
Beide zusammen (K3)	$1{,}750''$	$1{,}000$

PPN-Test [K]: K3 ist der einzige Überlebender der T^4-Auswahlrechnung (vier Kandidaten geprüft, `ffgft_308_p36_stufeB2_kappa_herleitung.py`): $\gamma_{\mathrm{PPN}}=1$ exakt. Cassini-Schranke $|\gamma-1|<2{,}3\times10^{-5}$ mit unbegrenztem Spielraum bestanden.

Dieselbe Struktur im Trägheitsregime: a_0 [K]/[S]

Die K3-Zwei-Hälften-Struktur erscheint ein zweites Mal, auf der kosmologischen Skala. Aus Dok. 279 (der Exponent 10 ist dabei an H_0 kalibriert, P20/P39; Dok. 309):

$$\frac{H_0}{c}=\frac{\pi}{2}\frac{\xi^{10}}{\bar{\lambda}_e}\qquad\Longrightarrow\qquad R_H=\frac{2\,\bar{\lambda}_e}{\pi\xi^{10}}.$$

R_H ist die geometrische Maximalskala der kompakten T^4-Geometrie (Dok. 182) — kein Expansionshorizont, gültig in der statischen Lesart.

Die Zyklen-Verdoppelung [S]: Die K3-2-Zelle hat zwei Zyklen. Ein geschlossener Weg der beide einmal durchläuft misst:

$$L=\underbrace{2\pi R_H}_{\text{Zeitzyklus}}+\underbrace{2\pi R_H}_{\text{Raumzyklus}}=4\pi R_H.$$

Rindler-Sättigung [S]: Der Rindler-Horizont eines Beobachters mit Beschleunigung a liegt bei c^2/a. Erreicht er L, ist die Beschleunigung nicht mehr relational definierbar. Das setzt:

$$a_{\mathrm{bg}}=\frac{c^2}{4\pi R_H}=\frac{c^2\,\xi^{10}}{8\,\bar{\lambda}_e}.$$

Trägheit aus $\tilde{T}\cdot m=1$ [S]: Die Kernrelation ist eine Aussage über Masse. Folgt die Trägheit dem Zeitfeld (Unruh-Kopplung), ergibt sich das Kraftgesetz in geschlossener Form:

$$\boxed{a=\sqrt{a_N^2+a_N a_0}}\qquad\text{mit}\quad a_0=2\,a_{\mathrm{bg}}=\frac{c^2\,\xi^{10}}{4\,\bar{\lambda}_e}=1{,}033\times10^{-10}\ \mathrm{m/s^2}.$$

Das 2π der Geometrie kürzt sich exakt gegen das $\pi/2$ aus Dok. 279. Übrig bleibt der Faktor 4:

$$4=\underbrace{2}_{\text{K3: Zeit- und Raumzyklus}}\times\underbrace{2}_{\text{Unruh: } a_0=2a_{\mathrm{bg}}}.$$

Kein Schritt enthält einen weiteren freien Parameter; die Skala übernimmt die Kalibrierung des Exponenten 10 an H_0.

aq.3 Der dunkle Sektor

Dunkle Energie: kein physikalisches Objekt

Λ entsteht in ΛCDM als Antwort auf die scheinbare beschleunigte Expansion. In der statischen Lesart gibt es diese Expansion nicht. Damit verliert Λ seinen Referenten — es wird beim Lesartwechsel nicht falsifiziert, sondern gegenstandslos.

Drei Bedingungen sprechen dagegen:

1. **Nur aus entarteten Daten.** SNe Ia, BAO, CMB — exakt die Datensätze, zwischen denen beide Lesarten ununterscheidbar sind.
2. **Kein unabhängiger Anker.** Die einzige theoretische Vorhersage (QFT-Vakuumenergie) verfehlt den Wert um 10^{122}.
3. **Beim Lesartwechsel gegenstandslos.** Nicht widerlegt, sondern ohne Referenten.

Das ist der Status: Lesart-Artefakt. Nicht „dunkle Energie existiert nicht"— das wäre eine Aussage innerhalb der Expansions-Lesart — sondern: sie ist eine lesartinterne Buchungsgröße.

Dunkle Materie: ein Regime, kein Stoff

Die Befunde — Rotationskurven, Gravitationslinsen, Bullet Cluster — sind lesartunabhängig. Sie verschwinden beim Lesartwechsel nicht. FFGFT führt sie ohne neue Zutat auf dasselbe Kraftgesetz zurück, das $\tilde{T} \cdot m = 1$ zusammen mit der K3-Geometrie liefert; belegt ist das für die gasdominierte Zwerggalaxie DDO 154, für Spiralgalaxien und den Bullet Cluster ist es offen (siehe unten).

Dunkle Materie ist in FFGFT kein Stoff. Es ist ein Name für ein Regime.

Das Kraftgesetz im galaktischen Regime [K]/[S]:

$$a = \sqrt{a_N^2 + a_N a_0}.$$

Für $a_N \gg a_0$ (innere Bereiche): $a \to a_N$ (Newton). Für $a_N \ll a_0$ (äußere Bereiche): $a \to \sqrt{a_N a_0}$, also $v^4 = GM_b a_0$ — die baryonische Tully-Fisher-Relation.

Dunkle Materie bezeichnet in FFGFT keinen fehlenden Massenanteil, sondern das Regime unterhalb a_0, in dem die Trägheit nichtlinear ist. Die fehlende Masse fehlt nicht — die Trägheit ist dort eine andere.

Ergebnisse [K] (`ffgft_308_p36_stufeA_a0_anker.py`):

Galaxie	Typ	v_{Newton}	v_{FFGFT}	v_{obs}
DDO 154	Zwerg, gasdominiert	18,5	47,1	47,0 km/s
NGC 3198	Spirale	50,4	121	150 km/s
Milchstraße	Spirale	122	180	220 km/s

DDO 154 ist der sauberste Test (gasdominiert, M_b am besten bekannt): $v_{\text{FFGFT}}/v_{\text{obs}} = 1{,}002$. Die Abweichungen bei NGC 3198 und der Milchstraße ($121/150-1 = -19{,}3\,\%$, $180/220 - 1 = -18{,}2\,\%$) liegen deutlich außerhalb der M_b-Unsicherheit: bei

$v \propto M_b^{1/4}$ entsprechen $\pm 30\,\%$ in M_b nur $+6{,}8\,\%/-8{,}5\,\%$ in v (selbst im Newton-Grenzfall nur $+14\,\%$). Zum Schließen bräuchte man $M_b \times 2{,}36$ (NGC 3198) bzw. $\times 2{,}23$ (Milchstraße). Für Spiralen ist der Test offen.

Bullet Cluster [K] (`ffgft_308_p36_stufeC1_bullet_cluster.py`): Zwei-Klumpen-FE-Projektion (Clowe+2006-Parameter) bei momentaner Kopplung. Nach Clowe et al. 2006 ist das Röntgengas die dominante baryonische Komponente ($M_{\text{gas}}/M_{\text{Sterne}} \approx 5$–$10$; Gas ~85 % der Baryonen, also $5{,}7:1$). Mit diesen baryonischen Massen liegt der Linsenpeak bei 240 kpc, also am Gas; er wechselt schon ab Gas:Sterne $\approx 1{,}4$ zum Gas. Eine Galaxienmasse von $2{,}3 \cdot 10^{14}\,M_\odot$ wäre die Linsenmasse einschließlich des fehlenden Anteils; ein Test damit ist zirkulär. Der Bullet Cluster ist damit nicht als bestanden belegt; der Test ist offen.

Neuere Daten [Q]/[S]: Schwache Linseneffekte um isolierte Galaxien zeigen flache Kreisgeschwindigkeiten, verlässlich bis mindestens 300 kpc, und die baryonische Tully-Fisher-Relation (Mistele u. a. 2024) [Q]; das entspricht dem äußeren Grenzfall des Kraftgesetzes. Weite Doppelsterne unterhalb a_0 sind umstritten: eine Abweichung von Newton mit $4{,}9\,\sigma$ (Chae u. a. 2026) gegen eine modellabhängige, mit Newton verträgliche Auswertung derselben Daten (Saad, Ting 2026) [Q]. Das Kraftgesetz für Systeme im äußeren Feld der Milchstraße ist im Korpus nicht hergeleitet [S]. Zum LZ-Ereignis bei 248 keV und zur Vorab-Festlegung der FFGFT siehe Dok. 396.

Asymmetrie im Vergleich

ξ ist querverankert — es trägt die Leptonmassenleiter, den Koide-Skalar, α-Bezug, K_{frak} und k^* (Dok. 275). Es arbeitet in fünf fremden Sektoren vor dem kosmologischen.

Λ arbeitet nirgendwo außer im eigenen Fit.

Das ist der Unterschied: nicht „wahr vs. falsch", sondern „querverankert vs. isoliert".

aq.4 Zusammenfassung: Bild des kosmischen Sektors

Größe	FFGFT	Status
Kosmische Rotverschiebung	Massenlesart, gleichwertig zu FRW (Dok. 392)	[B]/[K]
Entfernungsgesetz $1+z=e^{\xi x}$	x als Koordinatenabstand: Lyman-α $5{,}3\,\sigma$	[X]
Achromatisch	geometrisch, FE bestätigt	[K]
Entartung SNe/BAO/CMB	zwischen beiden Lesarten	[K]
Λ (DE)	Lesart-Artefakt, kein Referent	[K]
Hubble H_0	$c\pi\xi^{10}/(2\bar{\lambda}_e)$, Exponent kalibriert	[SETZUNG]
Lichtablenkung	$0{,}875'' + 0{,}875'' = 1{,}750''$	[K]
$\gamma_{\text{PPN}} = 1$	K3 einziger Überlebender	[K]
$a_0 = c^2\xi^{10}/(4\bar{\lambda}_e)$	Kette über kalibriertes H_0	[K]
Rotationskurven	DDO 154 ratio 1,002; Spiralen ~18 % zu niedrig	[K]; Spiralen offen
Bullet Cluster	baryonisch: Peak am Gas (240 kpc)	offen
K3-Zyklen $4\pi R_H$	Zeit- + Raumzyklus gleich	[S]
Rindler-Sättigung	Horizont trifft Maximalskala	[S]
$\xi = 4/30000$	Magnitude	[SETZUNG]
K3-Vorwärtsbeweis	2-Zelle vs. 4-Volumen	offen
14% unter a_0^{emp}	RAR $1{,}20 \pm 0{,}02\,(\text{zuf.}) \pm 0{,}24\,(\text{syst.}) \times 10^{-10}$: $0{,}7\,\sigma_{\text{syst}}$, $8\,\sigma_{\text{zuf}}$	offen

Der kosmische Sektor der FFGFT beruht auf einem einzigen Mechanismus: $\tilde{T} \cdot m = 1$ zusammen mit der K3-Flächeninvarianz erzeugt Lichtablenkung, geometrische Gravitation und achromatische Rotverschiebung. a_0 folgt aus derselben Kette ohne weiteren freien Parameter; die Skala trägt die Kalibrierung von H_0.

Dunkle Energie ist dabei kein physikalisches Objekt — sie ist ein Konstrukt der Expansions-Lesart. Dunkle Materie als Teilchen ist nicht nötig, soweit die Effekte aus der Geometrie folgen — belegt für gasdominierte Zwerggalaxien, offen für Spiralgalaxien und den Bullet Cluster.

aq.5 Bezüge

Interne Dokumente: Dok. 025 (Kosmologie-Übersicht); Dok. 026 (FE-Geometrie); Dok. 064 (Grundlagen Rotverschiebung); Dok. 182 (Maximalskala); Dok. 267 (kosmologische Entartung); Dok. 279 (H_0 aus ξ^{10}-Kette, K6); Dok. 280 (achromatische Rotverschiebung); Dok. 275 (k^*-Rekursion); Dok. 190 (P33, P44, K6).

Verifikationsskripte (alle Eingaben deklariert): `ffgft_308_p36_stufeA_a0_anker.py` (Kette $\xi \to a_0$, Rotationskurven); `ffgft_308_p36_stufeB1_faktor2_fe.py` (Faktor-2-Tor, 30001 log-Knoten, RK4); `ffgft_308_p36_stufeB2_kappa_herleitung.py` (Auswahlrechnung K3); `ffgft_308_p36_stufeC1_bullet_cluster.py` (Bullet-Cluster-Projektion).

Externe Referenzen: McGaugh, Lelli, Schombert 2016, PRL 117, 201101 (RAR/a_0); Clowe et al. 2006, ApJ 648, L109 (Bullet Cluster); Mistele u. a. 2024, arXiv:2406.09685 (schwache Linsen); Chae u. a. 2026, arXiv:2601.21728; Saad, Ting 2026, arXiv:2603.11015 (weite Doppelsterne).

Kapitel ar

Dok. 309 — Das Skalenanker-Problem: ΛCDM und FFGFT im Vergleich

Worum es geht

Beide kosmologischen Theorien — ΛCDM und FFGFT — müssen irgendwo eine Zahl einführen, die den kosmischen Maßstab an das SI-System ankoppelt. Keine der beiden leitet diesen Anker aus erster Prinzipien her.

Das ist kein Zufall — es ist ein strukturelles Problem jeder physikalischen Theorie, die Dimensionen hat. Aber **Art und Qualität** des Ankers unterscheiden sich fundamental. Und es gibt eine Asymmetrie, die bisher in keinem Dokument explizit benannt wurde: FFGFT erbt durch seinen Skalenfit die Systematik der Expansionslesart.

Das Dokument ist kein Teil der A-Serie. Bezüge: Dok. 190 (P20, P33), Dok. 267 (Entartung), Dok. 279 (H_0-Kette), Dok. 308 (kosmischer Sektor).

Konventionen

Zeichenerklärung.

[K]	*Kernableitung* — mathematisch oder numerisch aus den Grundsetzungen hergeleitet; reproduzierbar.
[S]	*Strukturaussage* — begründet, aber noch nicht vollständig bewiesen.
[SETZUNG]	*Setzung* — deklarierte Annahme, nicht weiter hergeleitet.

Zentrale Größen.

$\xi = 4/30000$	Einziger Fundamentalparameter der FFGFT [SETZUNG, P33]. Form ($4/3$, 3, 2^2) vorwärts hergeleitet [K]; Magnitude (5^4) intuitiv/empirisch [SETZUNG].
$\bar{\lambda}_e = \hbar/(m_e c)$	Reduzierte Compton-Wellenlänge des Elektrons; $= 3{,}8616 \times 10^{-13}$ m.
H_0	Kosmologischer Parameter; in FFGFT: $H_0 = (\pi/2)\, c\, \xi^{10}/\bar{\lambda}_e = 66{,}82$ km/s/Mpc [K], Exponent 10 [SETZUNG, P20].
$R_H = c/H_0$	Geometrische Maximalskala der kompakten Geometrie — kein Expansionshorizont (Dok. 182).
ν_{Cs}	Caesium-Hyperfeinübergang; $= 9{,}192\,631\,770 \times 10^9$ Hz (exakt, Definition); konventioneller SI-Anker.
$\nu_e = m_e c^2/h$	Elektronenfrequenz; $= 1{,}235 \times 10^{20}$ Hz; lesartunabhängige Bezugsfrequenz.
n	Ganzzahliger Exponent in $H_0 \propto \xi^n/\bar{\lambda}_e$; $n = 10$ ist Setzung (P20, Dok. 190).
Ω_Λ	Dunkle-Energie-Dichte in ΛCDM; ohne lesartunabhängigen Referenten in der statischen Lesart.

ar.1 Das SI-System — ein Netz ohne ersten Anker

Alle Einheiten auf eine zurückführbar

Seit 2019 sind alle SI-Basiseinheiten über fixierte Naturkonstanten definiert. Die scheinbar „vier unabhängigen Messwerte"c, h, e, k_B sind physikalisch aber keine unabhängigen Größen — sie sind alle auf einen einzigen historisch-konventionellen Anker zurückführbar: die Frequenz des Caesium-Hyperfeinübergangs ν_{Cs}.

Einheit	Rückführung	Historischer Ursprung
Meter	c/ν_{Cs} (Zahlenfaktor)	Erdmeridian
Kilogramm	$h\,\nu_{\mathrm{Cs}}/c^2$	Urkilogramm
Ampere	$e\,\nu_{\mathrm{Cs}}$	Kraftdefinition
Kelvin	$h\,\nu_{\mathrm{Cs}}/k_B$	Thermometrie

Es gibt keinen ersten Anker

ν_{Cs} wurde 1967 gewählt weil es technisch stabil realisierbar war — nicht weil es physikalisch ausgezeichnet ist. Der Rb-Übergang, die Elektronenfrequenz oder hundert andere Systeme hätten ebenso funktioniert. Alle heutigen SI-Zahlenwerte wären dann andere — alle dimensionslosen Verhältnisse (m_e/m_p usw.) blieben identisch.

Was wirklich festgelegt ist: nur dimensionslose Verhältnisse wie $m_e/m_p \approx 1/1836$. Diese sind einheitenunabhängig.

Konsequenz: Jede Theorie, die kosmologische Absolutwerte in SI voraussagt, gibt implizit eine Relation zwischen zwei Frequenzen an — und muss dafür irgendwo eine Zahl setzen. Die FFGFT-Aussage

$$H_0 = \frac{\pi}{2}\,\frac{c\,\xi^{10}}{\bar{\lambda}_e}$$

ist äquivalent zur dimensionslosen Aussage:

$$\frac{H_0}{\nu_e} = \pi^2\,\xi^{10} = 1{,}75\times10^{-38} \qquad \text{mit} \quad \nu_e = \frac{m_e c^2}{h}.$$

Dabei ist $c/\bar{\lambda}_e = m_e c^2/\hbar = 2\pi\nu_e$; gleichwertig gilt $H_0/\omega_e = (\pi/2)\,\xi^{10} = 2{,}79\times10^{-39}$ mit $\omega_e = m_e c^2/\hbar$.

Der SI-Bezug steckt vollständig in der Wahl von $\bar{\lambda}_e$ als Bezugsgröße. Ohne diese Wahl ist H_0/ν_e eine reine Zahl.

ar.2 ΛCDM und sein Skalenanker

Sechs freie Parameter, alle empirisch

ΛCDM beschreibt die Kosmologie mit sechs freien Parametern (Planck 2018): H_0, $\Omega_b h^2$, $\Omega_{\mathrm{DM}} h^2$, n_s, σ_8, τ. Alle aus Beobachtung — keiner aus Theorie abgeleitet.

H_0: zirkulär gemessen

H_0 wird über eine vierstufige Entfernungsleiter bestimmt: Parallaxe → Cepheiden → SNe Ia → Hubble-Gesetz. Jede Stufe bringt eigene Kalibrierungsannahmen. Das **Hubble-Spannungsproblem** (Planck: $67{,}4$, SH0ES: $73{,}0$ km/s/Mpc, 5σ-Spannung) ist die direkte Folge dieser Zirkularität.

Das Feinabstimmungsproblem

Λ entspricht einer Vakuumenergiedichte $\rho_\Lambda \approx 5{,}96\times10^{-27}$ kg/m^3. Die QFT sagt $\rho_{\mathrm{QFT}} \sim 5\times10^{96}$ kg/m^3 vorher. Das Verhältnis beträgt 10^{123}. ΛCDM hat keine Erklärung dafür — es setzt Λ auf den Beobachtungswert ohne theoretischen Ursprung.

ar.3 FFGFT und ihr Skalenanker

Struktur von ξ [K] und Magnitude [SETZUNG]

$\xi = 4/30000 = 1/(3\cdot 2^2\cdot 5^4)$. Laut P33 (Dok. 190):

- **Form** ($4/3$, Faktor 3, Faktor 2^2): vorwärts hergeleitet [K]
- **Magnitude** ($5^4 = 625$): intuitiv/empirisch begründet [SETZUNG]

Der eigentliche Fit: der Exponent 10

ξ selbst kommt aus der Geometrie. Der **Exponent 10** in $H_0 = (\pi/2)\, c\, \xi^{10}/\bar{\lambda}_e$ wurde so gewählt, dass $H_0 \approx 67$ km/s/Mpc herauskommt. Da $\xi \sim 1{,}3 \times 10^{-4}$, springt H_0 zwischen benachbarten Exponenten um Faktor ~7500:

n	H_0	Bewertung
9	$5{,}0 \times 10^{5}$ km/s/Mpc	unphysikalisch
10	**66,8 km/s/Mpc**	plausibel
11	$8{,}9 \times 10^{-3}$ km/s/Mpc	unphysikalisch

Es gibt kein kontinuierliches Anpassen — $n = 10$ ist die einzige ganzzahlige Wahl die einen physikalisch sinnvollen Wert ergibt. Die Begründung bleibt: $n = 10$ gibt einen mit ΛCDM kompatiblen Wert (P20, Dok. 190).

Die Vererbung: FFGFT erbt die ΛCDM-Systematik [K]

$67{,}4$ km/s/Mpc ist ein ΛCDM-Messwert — bestimmt unter der Annahme der Expansionslesart. Wenn $n = 10$ an diesen Wert kalibriert wurde, erbt FFGFT die Systematik dieser Lesart.

Der „natürliche" H_0 aus der FFGFT-Rotverschiebungsformel $z = e^{\xi x/\bar{\lambda}_e} - 1$ wäre:

$$H_0^{\text{natur}} = \frac{c\xi}{\bar{\lambda}_e} \approx 3 \times 10^{36} \text{ km/s/Mpc} \qquad \text{(unphysikalisch)}$$

($c\xi/\bar{\lambda}_e = 1{,}035 \times 10^{17}\ \text{s}^{-1} = 3{,}19 \times 10^{36}$ km/s/Mpc; Gegenprobe: $(\pi/2)\,\xi^9 \cdot 3{,}19 \times 10^{36} = 66{,}8$.)

Um ~67 km/s/Mpc zu erhalten braucht man ξ^{10} statt ξ^1 — und die Rechtfertigung dieses Exponenten ist letztlich die ΛCDM-Kompatibilität.

Das ist keine alleinige Schwäche der FFGFT — es ist die unvermeidliche Konsequenz der Entartung (Dok. 267): solange beide Lesarten empirisch ununterscheidbar sind, kalibriert jede Theorie ihre Parameter an denselben Daten.

Der Ausweg wäre eine lesartunabhängige Herleitung des Exponenten 10 aus der T^4-Geometrie vorwärts — bisher nicht geleistet (P20, Dok. 190).

Querverankerung: was FFGFT trotzdem leistet

Dass ξ^{10} nicht nur H_0 sondern auch a_0 (MOND-Skala, Dok. 308) reproduziert — das wäre bei einem reinen H_0-Fit nicht erwartet. Das ist die Querverankerung.

Sektor	Größe	ξ-Abhängigkeit	Status
Kosmologie	H_0	ξ^{10} (Exponent kalibriert)	[SETZUNG]
Trägheitsregime	a_0	ξ^{10}	[K]/[S]
Teilchenphysik	Leptonmassenleiter	ξ-Potenzen	[K]
Quantenmechanik	$K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$	ξ	[K]
Geometrie	$k^* = \ln\varphi/\xi$	ξ	[S]

Ω_Λ in ΛCDM hat **null** solcher Querverankerungen.

ar.4 Vergleich

Eigenschaft	ΛCDM	FFGFT
Freie Skalenanker	6–7, empirisch	1 (ξ, P33)
Theoretischer Ursprung	keiner	keiner
Querverankerung	nein	ja (5+ Sektoren)
Zirkularität	ja (H_0-Leiter)	nein
Vererbung ΛCDM-Systematik	inhärent	via Exponent 10
Feinabstimmung	10^{123} (Λ)	entfällt strukturell
Hubble-Spannung	5σ, offen	nicht modellierbar

FFGFT tauscht sechs isolierte Parameter gegen einen querverankerten — kein Beweis, aber eine Reduktion mit Richtung. Die Vererbung des ΛCDM-Skalenwertes über den Exponenten 10 bleibt die zentrale offene Schwachstelle.

ar.5 Offene Punkte (Dok. 190)

- **P20:** Form von H_0 als ξ-Verhältnis fest; Exponent 10 ist externe Kalibrierung aus ΛCDM, nicht hergeleitet.
- **P33:** Magnitude von ξ (Faktor 5^4) intuitiv/ empirisch begründet, kein Vorwärtsbeweis. Struktur-Parallele zu P20.
- **Vererbung (neu, Dok. 309):** Exponent 10 an H_0^{Λ}CDM kalibriert. Ausweg: lesartunabhängige Herleitung aus T^4-Geometrie — bisher nicht geleistet.

Zur Hubble-Spannung

Die Hubble-Spannung (5σ zwischen Frühuniversum-Kalibrierung aus CMB/BAO und lokaler Distanzleiter) ist in FFGFT *nicht modellierbar*, nicht modellunabhängig absent. FFGFT behandelt H_0 nicht aus einer expandierenden Geometrie, sondern als emergente, dekompaktifizierte Größe und kennt daher *nur einen* H_0-Wert (den kalibrierten), ohne zwischen Früh- und Spätmessung zu unterscheiden. Das ist eine Schwäche, keine Stärke: FFGFT kann die Spannung weder reproduzieren noch auflösen, weil die Geometrie keine expandierende Kausalstruktur enthält, aus der zwei verschiedene Messepocheneffekte folgen könnten. Der Eintrag „nicht modellierbarïn der Vergleichstabelle bedeutet entsprechend „nicht im Modell vorgesehen", keinen Erklärungsanspruch.

Kapitel as

Dok. 310 — Die Resonanzgeometrie — als übergeordnete Referenz

Worum es geht

Der wiederkehrende Vorwurf gegen FFGFT lautet: „ξ ist an die Leptonmassen angepasst, also zirkulär."Diese Notiz zeigt, dass der Vorwurf auf einem Missverständnis der Hierarchie beruht.

Die richtige Ordnung ist: **übergeordnet** ist die Geometrie, die Resonanzen besitzt — dimensionslos, legt alle Verhältnisse fest. Der **Anker** ist ein einziger Messwert — trägt keine Struktur, nur die Skala. Der Messwert ist der Kammerton, nicht die Musik.

Nicht Teil der A-Serie.

Konventionen

Zeichenerklärung.

[K]	*Kernableitung* — aus den Grundsetzungen hergeleitet, reproduzierbar.
[S]	*Strukturaussage* — begründet, nicht vollständig bewiesen.
[SETZUNG]	*Setzung* — deklarierte Annahme.

Zentrale Größen.

Q	Koide-Verhältnis $(\sum m)/(\sum \sqrt{m})^2$; misst $2/3$ [K].
$\xi = 4/30000$	Fundamentalparameter; Form [K], Magnitude 5^4 [SETZUNG, P33].
r_ℓ, p_ℓ	Vorfaktoren und Exponenten der Massenleiter (Dok. 190).
v	Vakuumerwartungswert; setzt die absolute Skala.
$S^2 = 4\pi,\ S^3 = 2\pi^2$	Sphären-Oberflächen der T^4-Randgeometrie.
μ_0, ε_0	Vakuumkonstanten; folgen aus α, e, c (Dok. 013).

as.1 Die drei Ebenen

Ebene	Inhalt	Status
0 — Messung	$m_\mu/m_e = 206{,}77$, $m_\tau/m_e = 3477$	gemessen
1 — Relation	$Q = 2/3$ auf 10^{-5}	parameterfrei [K]
2 — Kodierung	$m_\ell = r_\ell\, \xi^{p_\ell}\, v$	Schreibweise

Der einzige Fehler wäre, Ebene 2 als Ebene 0 zu verkaufen — also zu behaupten, ξ sei der Messwert-Ausgang. Solange der Status jeder Ebene deklariert ist, ist die Darstellung ehrlich und durchsichtig zugleich.

as.2 Was die Geometrie vorgibt

Die Resonanzstruktur macht drei vollständig dimensionslose Aussagen:

(1) Koide-Relation [K]. Die drei $\sqrt{m}$ bilden einen Winkel von $44{,}9997^\circ$ zum Vektor $(1,1,1)$:

$$Q = \frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2} = \frac{2}{3}.$$

Kein Messwert nötig — nur die Verhältnisse der Massen zueinander.

(2) Generationsleiter [K]. Die geladenen Leptonen realisieren die Exponenten $p_e = 3/2$, $p_\mu = 1$, $p_\tau = 2/3$ — eine **geometrische Folge** mit konstantem Verhältnis $q = 2/3$:

$$p_{n+1} = \tfrac{2}{3}\, p_n, \qquad \tfrac{3}{2} \xrightarrow{\times 2/3} 1 \xrightarrow{\times 2/3} \tfrac{2}{3}.$$

Das Verhältnis $q = 2/3$ ist derselbe Wert wie der Koide-Wert $Q = 2/3$ — dieselbe Zahl ordnet die Leiter und die Massenrelation (Dok. 258). Die Folge ist an den drei gemessenen Massen nachprüfbar; dass andere Sektoren auf anderen Sprossen sitzen, berührt das nicht.

(3) Harmonische Vorfaktoren [SETZUNG]. Die Vorfaktoren $r_e = 4/3$, $r_\mu = 16/5$, $r_\tau = 25/9 = (5/3)^2$ — Intervalle im Euler-Tonnetz; eine Herleitung der r_ℓ aus einer (n,l,j)-Formel trägt nicht, sie bleiben Setzungen.

Diese Aussagen legen die Verhältnisse auf wenige Stellen fest (`ffgft_310_massenleiter.py`):

$$m_\mu/m_e = 207{,}85\ (+0{,}52\%), \qquad m_\tau/m_e = 3531{,}6\ (+1{,}56\%).$$

as.3 Wo der Messwert eintritt

Erst für die **absolute Skala** braucht man einen Anker: $m_e = 0{,}511$ MeV. Er sagt nicht, wie sich die Massen verhalten — das sagt die Geometrie. Er sagt nur: „diese Struktur, in kg gemessen, fängt hier an."Man könnte genauso m_μ oder m_τ nehmen — die Verhältnisse blieben identisch.

Die Musik-Analogie.

Musik	Leptonen
Intervalle ($2:1$, $3:2$, $5:4$)	$Q = 2/3$, $1/3$-Leiter, harm. r
Kammerton $a' = 440$ Hz	$m_e = 0{,}511$ MeV

Man kann $a' = 440$ oder 442 Hz wählen — die Musik bleibt dieselbe. Der Anker ist Konvention, die Resonanzstruktur ist das Übergeordnete.

as.4 Warum das die Zirkularität auflöst

Der Vorwurf: „ξ ist an die Massen angepasst."Die Antwort: Ja — die absolute *Skala* (der Kammerton) ist gemessen. Aber die *Struktur* (die Resonanzen) ist nicht angepasst. Sie wird durch $Q = 2/3$ **bestätigt**, nicht eingestellt.

Der Beweis steht in der Restabweichung (`ffgft_310_koide_referenz.py`):

$$Q_{\text{gemessen}} - \tfrac{2}{3} = -6{,}2 \times 10^{-6} \neq 0.$$

Ein Fit hätte Q exakt getroffen ($0{,}000\%$). Die Geometrie trifft Q auf 10^{-5} *mit Rest* — die Signatur einer echten Vorhersage.

as.5 Die Wahl des Ausgangspunkts ist Konvention

Es gibt **eine** dimensionslose Zahlenwelt. ξ, α, Q, m_μ/m_e sind verschiedene Koordinaten darin — keine ist „fundamentaler". Die Zirkularität ist nicht ξ-spezifisch: „warum $\alpha = 1/137$?", „warum $Q = 2/3$?", „warum $\xi = 1/7500$?ßind alle offen. Jede Theorie muss irgendwo eine dimensionslose Zahl setzen.

Der einzige echte Unterschied ist **eine vernetzte Setzung vs. viele isolierte**: das SM hat 3 unabhängige Leptonmassen; FFGFT spart über $Q = 2/3$ eine Zahl und verbindet über ξ den Leptonsektor mit der Kosmologie (a_0, H_0). Der Gewinn ist real, aber bescheiden — kein „alles aus Nichts", sondern eine Reduktion mit Richtung.

as.6 Der Entdeckungsweg und die Geometrie der π-Faktoren

Der Korpus stellt $\xi \rightarrow$ Massen $\rightarrow$ Kosmologie dar (aufgeräumt). Der tatsächliche Entdeckungsweg war: (1) QM/RT-Unverträglichkeit als Motiv, (2) die Higgs-Formel als erster Ausdruck, (3) Vakuum und seine Konstanten, (4) erst danach Massen, Koide, Tonnetz.

Higgs-Formel als zweiter unabhängiger Zugang [K]

$$\xi = \frac{m_h^2}{64\pi^3\, v^2} = 1{,}30 \times 10^{-4}$$

liegt rund $2{,}3\,\%$ unter $\xi = 4/30000$ (je nach Eingaben $2{,}2$–$2{,}6\,\%$), aus völlig anderen Eingaben (Higgs-Masse, Vakuumwert) als die Leptonmassen (`ffgft_310_higgs_zugang.py`). Zwei unabhängige Sektoren, ein ξ — das war das Signal. Die Higgs-Formel ist damit eine Konsistenzprüfung von ξ.

π^3 ist Geometrie, keine Schleife [K]

Der Faktor π^3 ist *kein* Quanten-Schleifenfaktor, sondern das Produkt der Sphären-Oberflächen der kompakten T^4-Randgeometrie (`ffgft_310_pi_geometrie.py`):

$$16\pi^3 = (4\pi)\cdot(4\pi^2) = S^2 \cdot 2S^3.$$

Die frühere Version $64\pi^4$ enthielt einen überzähligen Faktor $64\pi^4/16\pi^3 = 4\pi$. Seine Herkunft ist belegt (Dok. 385): Die ursprüngliche Vakuumformel lautete $\lambda_h^2 v^2 e^2/(64\pi^4\varepsilon_0\hbar c\, m_h^2) = \xi_{\mathrm{EFT}}\cdot\alpha$; das 4π ist das aus $4\pi\varepsilon_0$ in $\alpha = e^2/(4\pi\varepsilon_0\hbar c)$ und wurde beim Streichen von ε_0 (Übergang zu $\alpha = 1$) nicht mitgekürzt. Geometrisch lässt sich $4\pi = S^2$ als **eine 2-Sphäre zu viel** lesen; der Fehler selbst ist aber ein Einheitenrest und keine unabhängige Bestätigung der Geometriezählung.

Die wiederholte μ_0/ε_0-Struktur [K]

In den Ursprungsdokumenten (Dok. 011, 013, 015) sind μ_0 und ε_0 *keine* unabhängigen Konstanten — sie folgen aus α, e, c:

$$\varepsilon_0 = \frac{e^2}{2\alpha h c}, \quad \mu_0 = \frac{2\alpha h}{e^2 c}, \quad \varepsilon_0\mu_0 c^2 = 1.$$

Sie sind der Ort, wo Geometrie und Einheiten getrennt sichtbar werden: $\mu_0 = \underbrace{4\pi}_{\text{Geometrie } S^2} \times \underbrace{10^{-7}}_{\text{Einheit}}$. In der α-Formel kürzt sich das 4π weg (im SI vor 2019 exakt, heute auf 10^{-10} genau):

$$\alpha = \frac{e^2\mu_0 c}{4\pi\hbar} \approx \frac{e^2\times 10^{-7}\times c}{\hbar}.$$

Seit der SI-Reform 2019 ist μ_0 ein Messwert (CODATA 2022: $1{,}25663706127(20)\cdot 10^{-6}\,\mathrm{N/A^2}$); $\mu_0/(4\pi\cdot 10^{-7}) - 1 = -1{,}3\cdot 10^{-10}$, innerhalb 1σ — numerisch vernachlässigbar. Genau dieses 4π aus $4\pi\varepsilon_0$ ist die Herkunft des früheren Higgs-Vorfaktors $64\pi^4 = 16\pi^3\cdot 4\pi$ (siehe den vorigen Abschnitt und Dok. 385). Geometrie gegen Geometrie. In natürlichen Einheiten ($\hbar = c = 1$) verschwinden μ_0, ε_0 vollständig; α und ξ bleiben als Zahlen. Setzt man zusätzlich $\alpha = 1$ (T0-Einheiten, Dok. 011), wird die Ladung umdefiniert — $\alpha = e^2 = 1 \Rightarrow e = 1$ — und auch α verschwindet. Dann bleibt **nur** ξ als einziger freier dimensionsloser Parameter.

Fazit: Nichts wurde ans Ziel angepasst. Die π-Faktoren sind durchgehend Sphären-Oberflächen der Feldgeometrie; eine saubere Einheiten- und Dimensionszählung liefert sie zwingend.

as.7 Warum QM und RT zu vermengen berechtigt ist

Der übliche Einwand — „du mischst $\hbar$ (Quanten) mit c (Relativität)"— wird nicht verteidigt, sondern umgekehrt: die **Trennung** QM|RT ist das Künstliche, nicht die Vermengung.

(1) $\hbar$ und c sind beide nur Einheiten-Brücken (Raum↔Zeit, Energie↔Zeit). Keine ist eine Theorie. Beide gleichzeitig zu benutzen ist erlaubt.

(2) Die T^4-Struktur braucht beide (P34): c ist die Raum-Zeit-Brücke, $\hbar$ die Masse-Zeit-Brücke. Setzt man $c = \hbar = 1$, kollabiert die Geometrie. Um sie zu sehen, muss man vermengen.

(3) $\tilde{T} \cdot m = 1$ *ist* die Vermengung: Eigenzeit (RT) mal Masse (QM). Die Physik vermengt ohnehin längst — Dirac, QFT, Unruh, Hawking. FFGFT macht es nur explizit.

(4) Der Konflikt ist ein Interpretations-, kein Formalismuskonflikt. Nach Dok. 230 ist die Instantaneität ein Beschreibungs-Artefakt; auf T^4 sind Bell-Korrelationen topologisch verbunden, nicht ontologisch nichtlokal. Korrigiert man die Interpretation, ist die Vermengung notwendig.

Kernsatz. Wer die Vermengung verbietet, verbietet die Geometrie.

as.8 Der Kernsatz

> Das Übergeordnete ist die Geometrie, die Resonanzen besitzt. Ihre dimensionslosen Aussagen — $Q = 2/3$, die Generationsleiter (Exponenten $3/2, 1, 2/3$), die harmonischen Vorfaktoren — legen die Verhältnisse auf wenige Stellen fest. Der Messwert (eine Masse in SI) ist nur der Kammerton: er sagt, *wo* die Struktur klingt, nicht *wie* sie klingt.

as.9 Bezüge

Interne Dokumente: Dok. 011 (Feinstruktur, μ_0/ε_0), Dok. 013 (SI, μ_0/ε_0 aus $\alpha/e/c$), Dok. 015 (Natürliche Einheiten), Dok. 049 (Higgs-Integration), Dok. 060 (musikalische Resonanz), Dok. 158 (Koide-zu-g-2-Brücke), Dok. 190 (P33, P41–P43, Massenformel 190.3, Higgs-Formel 190.1), Dok. 230 (Bell auf T^4), Dok. 306 ($T \cdot E = 1$), Dok. 309 (Skalenanker).

Prüfskripte (keine freien Parameter, alle Eingaben deklariert): `ffgft_310_koide_referenz.py`, `ffgft_310_massenleiter.py`, `ffgft_310_pi_geometrie.py`, `ffgft_310_higgs_zugang.py`.