

Analyse der FFGF (Fundamental Fractal-Geometric Field Theory) und t_0 -Theorie

Inhaltsverzeichnis

.1	Einleitung	1
.2	Grundlegende Postulate und fraktale Raumzeit	2
	Fraktale Dimension der Raumzeit	2
	Der fraktale Korrekturfaktor K_{frak}	2
	Zeit-Masse-Dualität und die Planck-Skala	2
	Klärung: Effektive Planck-Skala vs. fundamentale T_0-Skala	2
	Modifikation elektromagnetischer Gesetze im fraktalen Raum	3
	Schlüsselkonzepte im Dokument	3
.3	Mathematische Konzepte	3
	1. Die fraktale Dimension $D_f = 3 - \xi$	3
	2. Der Faktor $\frac{4}{3}$ – Geometrische Interpretation	4
	3. Zeit-Masse-Dualität – Tiefere Mathematik	4
	4. Die Planck-Skala als effektive Grenze	5
	5. Vakuum-Energie und der Cutoff durch ξ	5
	6. Gravitationsbeziehung (implizit im Dokument)	6
.4	Die Mathematik der Torus-Geometrie (die im Dokument erwähnt wird) genauer betrachten	6
	Warum der Torus?	6
	Mathematische Beschreibung des Torus	6
	Krümmung des Torus	7
	Energiefluss im Torus (FFGF-Modell)	7
	Verbindung zu $D_f = 3 - \xi$	7
	Masse aus Torus-Geometrie	8
	Skalierung: Vom Proton zur Galaxie	8
	Warum ist der Torus stabil?	9
	Verbindung zur Schwarzschild-Metrik	9
.5	Verbindung zwischen Torus-Topologie und Quantenzahlen (Spin, Ladung)	9
	Topologische Quantenzahlen aus der Torus-Geometrie – Detaillierte Herleitung	9
	1. Spin – Die Wicklungszahl $w = n_\phi/n_\theta$	10
	2. Elektrische Ladung – Quantisierter elektrischer Fluss durch den Torus	10
	3. Farbladung – Topologische Verschlingung dreier Flussfäden	11
	Parallele zum toroidalen Photon-Modell (Williamson & van der Mark, 1997)	11
	Kernparallelen zur FFGF-Torus-Struktur	12
	Unterschiede und Ergänzung durch die FFGF	12
	Fazit	13
	Torus-Geometrie im Quantencomputing	13
.6	Torus-Geometrie in der Kosmologie – Skalierungsinvariante torsionale Strukturen	14
	Skalenübergreifende torsionale Entsprechungen	14
	Kernprinzip: Skaleninvarianz und fraktale Selbstähnlichkeit	15
	Kosmologische Implikationen – ohne Dunkle Materie und ohne Expansion	15
	Zwei-Dipol-Modell im Detail	15
	Einführung und Motivation	16
	Modellbeschreibung	16

	Mathematischer Rahmen	16
	Kosmologische Implikationen	17
	Kritische Analyse	17
.7	Elektromagnetische Felder in der Torus-Geometrie	17
	Maxwell-Gleichungen auf dem Torus	17
	Magnetfeldkonfiguration im Torus	18
	Stabilitätsbedingung (Kruskal-Shafranov)	18
	Entstehung des magnetischen Moments	18
	Elektromagnetische Selbstenergie	18
	Verbindung zu ξ und D_f	19
.8	Strömungsdynamik im Torus (Navier-Stokes auf gekrümmten Räumen)	19
	Navier-Stokes in gekrümmten Koordinaten	19
	Metrischer Tensor für den Torus	20
	Geschwindigkeitsfeld im rotierenden Torus	20
	Wirbelstärke (Vorticity)	20
	Energieerhaltung im Torus-Fluss	20
	Turbulenz und Stabilität	21
	Helmholtz-Zerlegung	21
	Casimir-Effekt im Torus	21
	Verbindung zur Zeit-Masse-Dualität	22
	Klärung: Effektive Planck-Skala vs. fundamentale T_0 -Skala	22
	Fraktale Turbulenz	23
.9	Gesamtsynthese: Die drei Aspekte zusammen	23

Hinweis zur Rechenprüfung (29. Sept. 2026). Einzelne Angaben:

- Die Casimir-Formel $P = -\pi^2 \hbar c / (240 d^4)$ ist die Literaturformel für ideale Platten; ihr negatives Vorzeichen bedeutet Anziehung. Sie wirkt in Richtung Kollaps, nicht stabilisierend. Die exakte Auswertung auf dem Torus T^4 und auf T^4/Z_3 (R131) bestätigt das Vorzeichen; eine Stabilisierung bräuchte einen Gegenterm.
- $\eta \propto \hbar / (\ell_P^3 \xi)$ ist wegen ξ im Nenner groß, nicht „sehr gering“.
- Die eigene Formel gibt für den geometrischen Dipol etwa 51 mK, nicht 0,1 mK, und $3,35 \oplus 0,1$ mK bei 48° ergibt 3,42, nicht 3,36 mK.
- Der Sonderfall $D_f = 2$ „am Beginn des Universums“ widerspricht dem statischen Bild ohne Anfang (Dok. 313).

Der übrige Text ist unverändert; Einordnung im Korrekturregister Dok. 190, R136.

.1 Einleitung

Hinweis zur Fassung. Die deutsche und die englische Fassung dieses Dokuments weichen in Aufbau und Umfang voneinander ab; bei früheren Überarbeitungen wurden in beiden Fassungen Teile gekürzt, ergänzt oder anders gefasst. Bei Abweichungen gilt die umfangreichere deutsche Fassung; Abschnitte, die nur die englische Fassung enthält, gelten als Ergänzung.

Hinweis zum Korpusstand: variable Lichtgeschwindigkeit. Die Vorstellung einer veränderlichen Lichtgeschwindigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, wurde im weiteren Korpus durch die *fraktale Wegverlängerung* ersetzt: die geometrische Streckung des Ausbreitungswegs im ξ -Feld (Dok. 026, 149, 182; achromatisch nach K6 in Dok. 190). Aussagen, die auf einer variablen Lichtgeschwindigkeit beruhen, sind in diesem Sinn zu lesen.

Diese Analyse beschreibt den mathematischen Rahmen der Fundamental Fractal-Geometric Field Theory (FFGF) und der t_0 -Theorie. Der Fokus liegt auf der Darstellung der internen mathematischen Konsistenz und Struktur.

Statusmarker. Aussagen mit **[S]** sind *spekulativ*: ein Hinweis oder eine Vermutung, die im Korpus noch nicht hergeleitet oder numerisch geprüft ist. Das betrifft hier insbesondere die Sonderfälle zum frühen Universum ($D_f = 2$), die Deutungen zu Dunkler Materie und Dunkler Energie sowie die Torus-Kosmologie und das Zwei-Dipol-Modell: Der heutige Korpus klammert den kosmischen Sektor bewusst aus, weil auch das Standardmodell ihn nicht herleitet (P39).

.2 Grundlegende Postulate und fraktale Raumzeit

Fraktale Dimension der Raumzeit

Der zentrale Ausgangspunkt der Theorie ist die Beschreibung der Raumzeit durch eine fraktale Dimension D_f , die leicht unter der topologischen Dimension 3 liegt:

$$D_f = 3 - \xi, \quad \text{mit} \quad \xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}. \quad (1)$$

Der Parameter ξ quantifiziert das fraktale Dimensionsdefizit und ist fundamental für alle folgenden Skalierungen und Korrekturen (siehe T0_xi_ursprung.pdf).

Der fraktale Korrekturfaktor K_{frak}

Über viele Skalierungsordnungen führt ξ zu einem akkumulierten geometrischen Korrekturfaktor:

$$K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi \approx 0.9867. \quad (2)$$

Dieser Faktor modifiziert grundlegende geometrische und physikalische Größen (siehe 133_Fraktale_Korrektur_Herleitung_En.pdf).

Zeit-Masse-Dualität und die Planck-Skala

Aus der Gleichsetzung der Planck-Beziehung $E = hf$ mit der Einstein-Beziehung $E = mc^2$ und der Substitution $f = 1/T$ folgt eine fundamentale Dualität:

$$m = \frac{h}{c^2 T}. \quad (3)$$

Klärung: Effektive Planck-Skala vs. fundamentale T_0 -Skala

In dieser Analyse wird die ****effektive Grenze**** der kontinuierlichen Physik durch die ****Planck-Zeit t_P **** und ****Planck-Länge ℓ_P **** beschrieben (siehe Abschnitt "Die Planck-Skala als Grenze" unten). Unterhalb dieser Skala bricht der klassische Begriff von Raum und Zeit zusammen.

Die ****fundamentale T_0 -Skala**** der Theorie liegt jedoch ****sub-Planck**** und beschreibt die innere Granulation des fraktalen Feldes:

- Sub-Planck-Länge: $\Lambda_0 = \xi \cdot \ell_P \approx 1.333 \times 10^{-4} \cdot \ell_P \approx 2.15 \times 10^{-39} \text{ m}$
- Charakteristische T_0 -Längen und -Zeiten: $r_0 = 2GE$, $t_0 = 2GE$ (siehe Zeit_En.pdf und 010_T0_Energie_De.pdf)

Die Planck-Skala (ℓ_P, t_P) ist somit die **äußere Referenzgrenze** der effektiven Theorie, während t_0 die **sub-Planck-Granulation** darstellt, auf der die fraktale Struktur wirklich operiert.

Als Ergänzung stehen im Verzeichnis 2/html zwei interaktive Visualisierungen zur Verfügung (GitHub Pages, im Browser öffnen):

- [torus_geometry_ffgf.html](#) – animierte Torus-Geometrie mit Energiefluss und wählbarer Skala (Proton, Planet, Galaxie).
- [t0_subplanck_structure.html](#) – Gegenüberstellung der effektiven Planck-Grenze und der fundamentalen T_0 -Sub-Planck-Skala (Λ_0, τ_0).

Modifikation elektromagnetischer Gesetze im fraktalen Raum

In einem Raum mit fraktaler Dimension D_f lautet das allgemeine Coulomb-Gesetz:

$$F_{\text{Coulomb}} \propto \frac{1}{r^{D_f-1}}. \quad (4)$$

Für das heutige Universum mit $D_f = 3 - \xi$ ergibt sich die winzige, aber prinzipiell messbare Modifikation:

$$F_{\text{Coulomb}} \propto \frac{1}{r^{2-\xi}}. \quad (5)$$

[S] Sonderfall frühes Universum ($t \rightarrow t_{\min}, D_f \rightarrow 2$): Am Beginn des Universums, wenn die dritte Raumdimension noch nicht vollständig emergiert ist, gilt $D_f = 2$. Dann vereinfacht sich das Coulomb-Gesetz zu einem linearen Potential:

$$F_{\text{Coulomb}}|_{D_f=2} \propto \frac{1}{r^1} = \frac{1}{r}. \quad (6)$$

Dies entspricht dem aus der 2D-Physik bekannten logarithmischen Einschlusspotential und hat direkte Konsequenzen für die Struktur von Ladungsverteilungen in der Planck-Ära.

Analog wird in der FFGF die Lichtgeschwindigkeit c nicht als fundamentale, sondern als vom Medium abgeleitete Größe aufgefasst: $c = \ell_P/t_P$, mit einer effektiven, fraktal modifizierten Geschwindigkeit $c_{\text{eff}} \approx c \cdot (1 + \xi/2)$.

Schlüsselkonzepte im Dokument

- Die Raumzeit hat eine fraktale Struktur mit der Dimension $D_f = 3 - \xi$, wobei $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$.
- Masse und Zeit werden als duale Aspekte desselben Phänomens vorgeschlagen.
- Dunkle Materie und dunkle Energie werden als geometrische Effekte uminterpretiert, nicht als tatsächliche Substanzen **[S]**.
- Das Vakuum hat eine fraktale Struktur, die Unendlichkeiten verhindert.

.3 Mathematische Konzepte

1. Die fraktale Dimension $D_f = 3 - \xi$

Gegeben: $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \approx 0.0001333 \dots$

Daher: $D_f \approx 2.9998666 \dots$

Mathematische Bedeutung: In der klassischen Fraktalgeometrie beschreibt die Hausdorff-Dimension, wie ein Objekt den Raum "füllt":

- Ein Punkt: $D = 0$

- Eine Linie: $D = 1$
 - Eine Fläche: $D = 2$
 - Ein Volumen: $D = 3$
 - Koch-Schneeflocke: $D \approx 1.26$ (mehr als Linie, weniger als Fläche)
Die Bedeutung von $D_f < 3$: Wenn der Raum eine Dimension von 2,9998666 hat statt exakt 3, bedeutet das mathematisch:
 - Der Raum ist nicht "vollständig gefüllt".
 - Es gibt eine Art "Porosität" oder Lückenhaftigkeit.
 - Diese Lücken machen 0,0001333 der Dimensionalität aus.
- Skalierungsverhalten: Bei echten Fraktalen gilt: Wenn man die Auflösung um Faktor r erhöht, steigt die Anzahl der sichtbaren Strukturen um r^D . Allgemein:

$$N(r) \propto r^{D_f}$$

Heutiges Universum ($D_f = 3 - \xi$):

$$N(r) \propto r^{(3-\xi)}$$

[S] Sonderfall frühes Universum ($t \rightarrow t_{\min}$, $D_f = 2$):

$$N(r)|_{D_f=2} \propto r^2$$

Die Raumstruktur ist flächenartig – die Anzahl sichtbarer Strukturen wächst nur quadratisch mit der Auflösung.

2. Der Faktor $\frac{4}{3}$ – Geometrische Interpretation

Kugelpackung: Der Faktor $\frac{4}{3}$ taucht in der Geometrie häufig auf:

- Kugelvolumen: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$
- Verhältnis Kugelvolumen zu umschließendem Würfel: $\frac{4\pi}{3}/8 \approx 0.524$
Dichteste Kugelpackung: Maximale Packungsdichte: $\frac{\pi}{\sqrt{18}} \approx 0.7405$ Es bleiben also 26% "Lücken".

Mögliche Interpretation in FFGF: Wenn das Vakuum aus "Planck-Kugeln" oder toroidalen Strukturen besteht, die sich nicht perfekt packen lassen, entstehen geometrische Zwischenräume. Der Faktor $\frac{4}{3}$ könnte diese Packungsgeometrie kodieren.

3. Zeit-Masse-Dualität – Tiefere Mathematik

Die Herleitung: Aus $E = mc^2$ und $E = hf$ ergibt sich:

$$mc^2 = hf = \frac{h}{T}$$

Also:

$$m = \frac{h}{c^2 T}$$

Dimensionsanalyse:

- $[h] = \text{Js} = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$
- $[c^2] = \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$
- $[T] = \text{s}$

•

$$[m] = \frac{[h]}{[c^2][T]} = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}}{(\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2})(\text{s})} \quad (7)$$

$$= \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}}{\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}} = \text{kg} \quad (\text{erfüllt}) \quad (8)$$

Frequenzinterpretation: Wenn wir $f = \frac{1}{T}$ einsetzen:

$$m = \frac{hf}{c^2}$$

Dies ist die Compton-Beziehung in umgekehrter Form. Die Compton-Wellenlänge eines Teilchens ist:

$$\lambda_C = \frac{h}{mc}$$

Setzen wir die obige Beziehung $m = \frac{hf}{c^2}$ ein, erhalten wir:

$$\lambda_C = \frac{h}{\left(\frac{hf}{c^2}\right)c} = \frac{c}{f}$$

Dies zeigt, dass die Compton-Wellenlänge der Wellenlänge der Oszillation entspricht, die die Masse erzeugt. Was ist neu an der FFGF-Interpretation? Standard-QFT sagt: Teilchen haben eine Compton-Wellenlänge basierend auf ihrer Masse.

FFGF dreht es um: Die hochfrequente Oszillation im fraktalen Feld erzeugt die Masse.

4. Die Planck-Skala als effektive Grenze

Planck-Einheiten (aus $\hbar, G, c$):

$$\ell_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}} \approx 1.616 \times 10^{-35} \text{ m} \quad (9)$$

$$t_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^5}} \approx 5.391 \times 10^{-44} \text{ s} \quad (10)$$

$$m_P = \sqrt{\frac{\hbar c}{G}} \approx 2.176 \times 10^{-8} \text{ kg} \quad (11)$$

Die Lichtgeschwindigkeit daraus:

$$c = \frac{\ell_P}{t_P} \approx 2.998 \times 10^8 \text{ m/s} \quad (\text{erfüllt})$$

FFGF-Interpretation: In der FFGF werden diese Werte auf die Geometrie des fraktalen Gitters zurückgeführt. Die Planck-Länge ist der "Gitterabstand" der effektiven Theorie, die Planck-Zeit der "Takt" der kontinuierlichen Beschreibung. Unterhalb dieser Skala operiert die fundamentale T_0 -Granulation (siehe oben).

5. Vakuum-Energie und der Cutoff durch ξ

Das Katastrophen-Problem: Die Nullpunktenergie eines harmonischen Oszillators:

$$E_0 = \frac{1}{2} \hbar \omega$$

Summiert über alle Moden bis zur Planck-Frequenz:

$$\rho_{\text{vac}} \sim \int_0^{\omega_p} \omega^{D_f} d\omega \sim \omega_p^{D_f+1}$$

Für das heutige Universum ($D_f = 3 - \xi \approx 3$):

$$\rho_{\text{vac}}|_{D_f \approx 3} \sim \omega_p^4 \sim \left(\frac{c}{\ell_P}\right)^4$$

[S] Sonderfall frühes Universum ($t \rightarrow t_{\text{min}}, D_f = 2$):

$$\rho_{\text{vac}}|_{D_f=2} \sim \omega_p^3 \sim \left(\frac{c}{\ell_P}\right)^3$$

Das ergibt: $\rho_{\text{vac}} \sim 10^{113} \text{ J/m}^3$

Beobachtet: $\rho_{\text{dark energy}} \sim 10^{-9} \text{ J/m}^3$

Diskrepanz: Faktor 10^{122} (Die größte Fehlanpassung in der Physik)

FFGF-Ansatz mit ξ **[S]**: In einem fraktalen Raum mit $D_f = 3 - \xi$ passen nicht alle Moden:

$$\rho_{\text{eff}} = \rho_{\text{Planck}} \times (\xi)^n$$

Wo n ein Skalierungsexponent ist. Mit $\xi \sim 10^{-4}$ könnte man nach mehrfacher Skalierung (über 30 Größenordnungen vom Planck- zum kosmologischen Maßstab) tatsächlich einen drastischen Unterdrückungsfaktor erreichen.

Mathematisch:

$$(10^{-4})^{30} \sim 10^{-120}$$

Das läge nahe an der beobachteten Größenordnung; der Exponent n ist hier nicht hergeleitet.

6. Gravitationsbeziehung (implizit im Dokument)

Obwohl nicht explizit ausgeführt, deutet die FFGF an, dass Gravitation aus der Geometrie folgt:

$$\text{Einstein: } R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$

FFGF würde vorschlagen: Die Krümmung entsteht aus der lokalen Änderung von D_f :

$$D_f(r) = 3 - \xi(r)$$

Wo $\xi(r)$ von der Energiedichte abhängt. Hohe Massendichte $\rightarrow$ größeres $\xi \rightarrow$ stärkere Abweichung von $D = 3 \rightarrow$ stärkere "Krümmung".

.4 Die Mathematik der Torus-Geometrie (die im Dokument erwähnt wird) genauer betrachten

Warum der Torus?

Der Torus wird in der FFGF als geometrisch naheliegende Form für einen selbsterhaltenden Energiefluss in einem fraktalen Feld gewählt.

Topologische Eigenschaften:

- Geschlossen: Keine Ränder, Energie kann endlos zirkulieren
- Zwei unabhängige Kreise: Poloidale (kleine) und toroidale (große) Zirkulation
- Nicht-triviale Topologie: Genuswert $g = 1$ (ein "Loch")

Mathematische Beschreibung des Torus

Parametrische Gleichungen:

$$x(\theta, \phi) = (R + r \cos \theta) \cos \phi \quad (12)$$

$$y(\theta, \phi) = (R + r \cos \theta) \sin \phi \quad (13)$$

$$z(\theta, \phi) = r \sin \theta \quad (14)$$

Wobei:

- R = Hauptradius (Abstand vom Zentrum zur Röhrenmitte)
- r = Röhrenradius (Dicke der "Röhre")
- $\theta \in [0, 2\pi]$ = poloidaler Winkel (um die Röhre herum)
- $\phi \in [0, 2\pi]$ = toroidaler Winkel (um die Hauptachse)

Geometrische Größen:

- Oberfläche: $A = 4\pi^2 Rr$
- Volumen: $V = 2\pi^2 Rr^2$
- Verhältnis: $\frac{V}{A} = \frac{r}{2}$

Wichtig ist: Das Verhältnis hängt nur vom Röhrenradius ab.

Krümmung des Torus

Gaußsche Krümmung:

$$K(\theta) = \frac{\cos \theta}{r(R + r \cos \theta)}$$

Kritische Beobachtung:

- Auf der Innenseite ($\theta = 0$): $K > 0$ (positive Krümmung, wie eine Kugel)
- Auf der Außenseite ($\theta = \pi$): $K < 0$ (negative Krümmung, wie ein Sattel)
- Oben/unten ($\theta = \pm\pi/2$): $K = 0$

Der Torus hat also Bereiche mit unterschiedlicher Krümmung; diese Eigenschaft ist für die FFGF zentral.

Energiefluss im Torus (FFGF-Modell)

Das Dokument beschreibt einen poloidalen und toroidalen Fluss:

- Poloidaler Fluss (θ -Richtung):
 - Energie fließt durch die "Röhre" hindurch
 - Im Zentrum: Kontraktion (Einfluss)
 - Am Rand: Expansion (Ausfluss)
- Toroidaler Fluss (ϕ -Richtung):
 - Rotation um die Hauptachse
 - Erzeugt Drehimpuls
 - Stabilisiert die Struktur

Vektorfeld für den Energiefluss:

$$\vec{v}(\theta, \phi) = v_\theta \vec{e}_\theta + v_\phi \vec{e}_\phi$$

Wobei die Geschwindigkeiten von der lokalen Krümmung abhängen.

Verbindung zu $D_f = 3 - \xi$

Die fraktale Dimension beeinflusst die Torus-Struktur:

In einem perfekten 3D-Raum ($D = 3$) könnte ein Torus bis zu $r \rightarrow 0$ schrumpfen (Singularität).

Mit $D_f = 3 - \xi$ gibt es einen minimalen Röhrenradius:

$$r_{\min} \propto \frac{\ell_{\text{Planck}}}{\xi^{1/3}}$$

Mit $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$:

$$r_{\min} \sim \frac{\ell_{\text{Planck}}}{(10^{-4})^{1/3}} \sim \ell_{\text{Planck}} \times 10^{4/3} \sim 21 \times \ell_{\text{Planck}}$$

Interpretation: Die fraktale Struktur verhindert, dass der Torus zu einem Punkt kollabiert. Es gibt eine natürliche untere Grenze.

[S] Sonderfall frühes Universum ($t \rightarrow t_{\min}$, $D_f = 2$): Für $D_f = 2$ entfällt die dritte Raumdimension als Stabilisierungsreservoir. Der minimale Torus-Radius kollabiert auf die Planck-Skala selbst:

$$r_{\min}|_{D_f=2} \sim \ell_{\text{Planck}}$$

Dies ist die absolute untere Grenze – der Torus kann nicht kleiner als ein Planck-Längen-Radius werden. Das früheste Universum hatte damit eine maximal kompakte Torus-Topologie bei $r \sim \ell_p$.

Masse aus Torus-Geometrie

Die FFGF-These: Ein Teilchen (z.B. Proton) ist ein hochfrequent rotierender Torus auf Planck-Skala.

Drehimpuls im Torus: Für eine rotierende Masse im Torus:

$$L = 2\pi^2 R r^2 \rho \omega$$

Wobei:

- ρ = Energiedichte
- ω = Rotationsfrequenz

Masse aus Rotation: Wenn wir $E = mc^2$ mit der Rotationsenergie gleichsetzen:

$$E_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I \omega^2$$

Für den Torus ist das Trägheitsmoment:

$$I = \pi^2 R r^2 \left(R^2 + \frac{3r^2}{4} \right) \rho$$

Die Beziehung zur Zeit: Mit $\omega = \frac{2\pi}{T}$ und der früher abgeleiteten Beziehung $m = \frac{h}{c^2 T}$:

$$T = \frac{h}{mc^2}$$

Setzen wir dies für ein Proton ein ($m_p \approx 1.67 \times 10^{-27}$ kg):

$$T_p \approx \frac{6.6 \times 10^{-34}}{1.67 \times 10^{-27} \times 9 \times 10^{16}} \approx 4.4 \times 10^{-24} \text{ s}$$

Das ist die Compton-Zeit des Protons. In der FFGF rotiert der Torus mit dieser Frequenz.

Skalierung: Vom Proton zur Galaxie

Die fraktale Selbstähnlichkeit bedeutet:

Skala	R (Hauptradius)	r (Röhre)	Masse/System
Proton	$\sim 10^{-15}$ m	$\sim 10^{-16}$ m	1.67×10^{-27} kg
Atom	$\sim 10^{-10}$ m	$\sim 10^{-11}$ m	Elektronen in Orbitalen
Planet	$\sim 10^6$ m	$\sim 10^5$ m	Magnetfeld-Torus
Stern	$\sim 10^9$ m	$\sim 10^8$ m	Konvektionsströme
Galaxie	$\sim 10^{20}$ m	$\sim 10^{19}$ m	Spiralarme

Das Verhältnis R/r bleibt oft konstant (typisch $R/r \approx 3 - 10$), was in der FFGF als Ausdruck der Selbstähnlichkeit gelesen wird.

Warum ist der Torus stabil?

Energieminimum: Der Torus minimiert die Energie für ein gegebenes Volumen und eine gegebene Topologie:

$$E_{\text{total}} = E_{\text{Oberfläche}} + E_{\text{Krümmung}} + E_{\text{Rotation}}$$

Nach FFGF-Annahme ist der Torus für bestimmte Randbedingungen (konstanter Fluss, Drehimpuls) die stabilste Form; die zugehörige Variationsrechnung ist in diesem Dokument nicht ausgeführt [S].

Im fraktalen Feld: Die Dimension $D_f = 3 - \xi$ bedeutet, dass Energie "Widerstand" erfährt beim Fließen. Der Torus ist der Weg des geringsten Widerstands für zirkulierende Energie.

Verbindung zur Schwarzschild-Metrik

Wenn man die Kerr-Metrik (rotierendes Schwarzes Loch) betrachtet, findet man auch eine Torus-Struktur:

Ergosphäre: Der Bereich um ein rotierendes Schwarzes Loch, in dem nichts stillstehen kann, hat eine toroidale Form.

Die FFGF deutet das als Hinweis, dass das Schwarze Loch ein Torus auf einer größeren Skala ist [S].

.5 Verbindung zwischen Torus-Topologie und Quantenzahlen (Spin, Ladung)

Topologische Quantenzahlen aus der Torus-Geometrie – Detaillierte Herleitung

Die FFGF und t_0 -Theorie führen die fundamentalen Quantenzahlen der Elementarteilchen (Spin, elektrische Ladung und Farbladung) auf die topologische Struktur des Torus zurück. Der Torus wird dabei als stabile, naheliegende geometrische Form für geschlossene, selbst-konsistente Energieflüsse betrachtet. Alle Quantenzahlen entstehen aus den Eigenschaften geschlossener Flusslinien, die sich auf der Torus-Oberfläche oder durch den Torus hindurch winden müssen und sich exakt schließen, um stabile Konfigurationen zu bilden.

Die zentrale Idee ist, dass Teilchen nicht als Punktteilchen, sondern als topologisch stabile Wirbel- und Flussstrukturen im fraktal modifizierten Torus-Feld verstanden werden. Die Quantisierung ergibt sich in diesem Bild aus den Schließbedingungen dieser Flusslinien – ähnlich wie bei quantisierten magnetischen Flüssen oder beim Aharonov-Bohm-Effekt, jedoch auf fundamental-geometrischer Ebene.

1. Spin – Die Wicklungszahl $w = n_\phi/n_\theta$

Der Spin eines Teilchens entspricht der **Wicklungszahl** (winding number) der geschlossenen Flusslinien auf dem Torus. Diese wird definiert als das Verhältnis der Umdrehungen in den beiden nicht-trivialen Richtungen des Torus:

$$w = \frac{n_\phi}{n_\theta} \quad (15)$$

wobei

- n_ϕ die Anzahl der Umdrehungen in der **toroidalen Richtung** (um den Hauptradius R herum) ist,
- n_θ die Anzahl der Umdrehungen in der **poloidalen Richtung** (um den Röhrenradius r herum) ist.

Eine Flusslinie ist nur dann stabil, wenn sie sich nach einer ganzzahligen Anzahl von Windungen exakt schließt. Die einfachsten nicht-trivialen geschlossenen Bahnen ergeben sich bei rationalen Werten von w .

Die physikalische Zuordnung lautet:

- $w = 1$ (volle Umdrehung vor Schließung) → **Bosonen-Spin** (ganzzahlig: 0, 1, 2, ...)
- $w = 1/2$ (halbe Umdrehung vor Schließung) → **Fermionen-Spin** (halbganzzahlig: 1/2, 3/2, ...)

Diese topologische Definition bietet eine anschauliche Deutung des Spin-Statistik-Theorems: Fermionen benötigen zwei halbe Umdrehungen (720°), um wieder in den ursprünglichen Zustand zurückzukehren, während Bosonen bereits nach 360° identisch sind. Die minimale Wicklungszahl wird durch den Stabilitätsbedingung $r_{\min} \approx 21 \ell_{\text{Planck}}$ begrenzt; kleinere Werte führen zu instabilen Konfigurationen.

2. Elektrische Ladung – Quantisierter elektrischer Fluss durch den Torus

Die elektrische Ladung korreliert direkt mit der Anzahl der geschlossenen elektrischen Flusslinien, die den Torus **durchqueren** (d. h. von der inneren zur äußeren Region oder umgekehrt verlaufen).

Die Quantisierungsbedingung lautet:

$$\Phi = n \cdot \frac{h}{e} \quad (16)$$

wobei

- Φ der magnetische Fluss durch eine geeignete Schnittfläche des Torus ist,
- h die Planck-Konstante,
- e die Elementarladung,
- $n \in \mathbb{Z}$ die ganze Zahl der durchtretenden Flusslinien (positiv oder negativ je nach Richtung).

Physikalische Interpretation:

- $n = +1$ → Ladung $+e$ (z. B. Proton, Positron)
- $n = -1$ → Ladung $-e$ (z. B. Elektron)
- $n = 0$ → elektrisch neutral (z. B. Neutron, Neutrino, Photon)
- $n = +2, -2, \dots$ → höhere Ladungen (in der Theorie möglich, aber energetisch ungünstig oder instabil auf niedrigen Skalen)

Die Quantisierung ist topologisch geschützt, weil der Torus zwei nicht-kontrahierbare Schleifen besitzt (toroidal und poloidal). Der Fluss durch diese Schleifen ist invariant unter stetigen Deformationen – daher kann die Ladung nicht kontinuierlich variieren.

3. Farbladung – Topologische Verschlingung dreier Flussfäden

Die Farbladung (Quantenzahl der starken Wechselwirkung) entsteht aus der **topologischen Verschlingung** (linking number) von genau ****drei Flussfäden****, die sich umeinander und um den Torus winden. Diese drei Fäden repräsentieren die drei Farben der QCD: rot, grün, blau.

Die Verschlingungskonfiguration bestimmt die Farbeigenschaften:

- Drei verschiedene Farben (rot–grün–blau) in nicht-trivialer Verschlingung → **Quark** (Farbladung 1 in je einer Farbe)
- Drei gleiche Farben (z. B. rot–rot–rot) → **Antiquark** (Farbladung –1 in je einer Farbe)
- Eine Farbe + ihre Antifarbe (z. B. rot + antirot) → **Gluon** (Farbladung neutral, aber Farb-Antifarbe-Kombination)
- Alle drei Farben gleichzeitig ausgeglichen (rot + grün + blau) → **Baryon** (Farbladung insgesamt weiß/neutral)

Nach der Theorie sind genau ****acht**** nicht-triviale Verschlingungszustände der drei Fäden möglich (plus der triviale weiße Zustand). Diese acht Zustände werden den ****acht Generatoren der SU(3)-Farbsymmetrie**** zugeordnet; eine topologische Begründung der Eichgruppe $SU(3)_C$ der starken Wechselwirkung ist damit angedeutet, in diesem Dokument aber nicht ausgeführt **[S]**.

Parallele zum toroidalen Photon-Modell (Williamson & van der Mark, 1997)

In der Literatur existiert seit 1997 ein semi-klassischer Ansatz, der das Elektron als zirkulierendes, topologisch geschlossenes photonisches Gebilde mit toroidalem Charakter beschreibt. Der Originalartikel trägt den Titel:

Is the electron a photon with toroidal topology?

J. G. Williamson und M. B. van der Mark

Annales de la Fondation Louis de Broglie, Vol. 22, Nr. 2, 1997, S. 133–167

Der vollständige Text ist online verfügbar unter:

https://fondationlouisdebroglie.org/IMG/pdf/22_2_133.pdf

Eine sehr klare und didaktisch aufbereitete populärwissenschaftliche Erklärung dieses Modells findet sich in folgendem Video:

Is the Electron a Photon with Toroidal Topology?

YouTube-Video von *Physics Explained* (2021)

<https://www.youtube.com/watch?v=hYyngDEJL0A>

Obwohl dieses Modell unabhängig von der FFGF/ t_0 -Theorie entwickelt wurde, zeigt es strukturelle Parallelen zur hier vorgestellten Torus-Geometrie – insbesondere in der Ableitung von Ladung, Spin und magnetischem Moment aus einer geschlossenen, doppelt umlaufenden Feldkonfiguration.

Kernparallelen zur FFGF-Torus-Struktur

- **Torus-Topologie und doppelter Umlauf**

Im genannten Modell wird ein circular polarisiertes elektromagnetisches Feld über genau eine Compton-Wellenlänge λ_C zu einem geschlossenen Doppel-Loop (double helix / double loop) gefaltet. Dies entspricht der in der FFGF postulierten toroidalen + poloidalen Zirkulation: Die Energie fließt sowohl toroid (ϕ -Richtung, großer Kreis) als auch poloidal (θ -Richtung, um die Röhre). Der doppelte Umlauf (4π statt 2π) führt dort wie hier zu halbzahligem Spin ($w = 1/2$ in der Wicklungszahl-Definition der FFGF).

- **Elektrisches Feld und Ladung als topologische Eigenschaft**

Im toroidalen Modell zeigt der elektrische Feldvektor auf der Außenseite konsistent nach innen (Elektron) bzw. außen (Positron), weil die Feldrotation mit der Geometrie kommensurabel ist. Dies ist strukturell ähnlich zur FFGF-Herleitung: Die elektrische Ladung entsteht aus der quantisierten Anzahl geschlossener elektrischer Flusslinien, die den Torus durchqueren ($\Phi = n \cdot h/e$). Die Richtung (inward/outward) ist topologisch festgelegt und spiegelt die Orientierung der poloidalen/toroidalen Flusskomponenten wider.

- **Magnetisches Moment aus toroidaler Magnetfeld-Konfiguration**

Beide Ansätze leiten das magnetische Dipolmoment aus geschlossenen magnetischen Feldlinien ab, die parallel zur Torus-Oberfläche verlaufen (toroidales B_ϕ -Feld in der FFGF). Das netto Moment entlang der Torus-Achse entsteht aus der Asymmetrie der inneren Rotation – analog dazu folgt in der FFGF das intrinsische magnetische Moment des Elektrons ($\mu_e = e\hbar/(2m_e)$) aus der Rotationsenergie im Torus folgt.

- **Compton-Skala als intrinsische Größe**

Im externen Modell bestimmt die Compton-Wellenlänge $\lambda_C = h/(m_e c)$ die Länge des geschlossenen Pfads und damit die effektive Größe des Gebildes ($\sim \lambda_C/(4\pi)$ für den Kernradius). Dies stimmt überein mit der FFGF, in der die Compton-Zeit $T = h/(mc^2)$ die fundamentale Rotationsperiode des Torus vorgibt und die minimale stabile Röhrengroße $r_{\min} \sim 21 \ell_P$ durch die fraktale Korrektur ξ begrenzt wird. Beide Ansätze vermeiden damit die unendliche Selbstenergie eines Punktteilchens.

- **Zwei chirale Spin-Zustände**

Das toroidale Modell unterscheidet zwei nicht-superponierbare chirale Varianten (handedness), die sich durch 720° -Rotation erst wiederholen – analog dazu folgt in der FFGF der Spin-1/2 aus der Wicklungszahl $w = n_\phi/n_\theta = 1/2$ folgt und Fermionen zwei Umdrehungen benötigen, um in den Ausgangszustand zurückzukehren.

Unterschiede und Ergänzung durch die FFGF

Während das 1997er-Modell semi-klassisch bleibt und vor allem die Selbstkonfinement-Mechanismen (nichtlineare Effekte, topologische Stabilität) offen lässt, bietet die FFGF/ t_0 -Theorie einen weitergehenden Begründungsansatz:

- Die fraktale Dimensionsmodifikation $D_f = 3 - \xi$ soll den Kollaps unter $r_{\min} \approx 21 \ell_P$ verhindern und die Stabilität ohne zusätzliche nichtlineare Vakuum-Effekte erklären.
- Der Energiefluss ist explizit poloidal + toroidal und fraktal moduliert ($\vec{v}(\theta, \phi)$ abhängig von lokaler Krümmung $K(\theta)$).
- Die Quantenzahlen (einschließlich Farbladung) entstehen rein topologisch aus Verschlingungen und Wicklungszahlen – eine Verallgemeinerung, die über das reine Elektron-Modell hinausgeht.

- Die Masse wird auf die Trägheit der inneren T_0 -Strömung zurückgeführt, nicht allein auf eingeschlossene Feldenergie ($m = h/(c^2 T)$ mit T als Compton-Zeit).

Fazit

Die strukturellen Übereinstimmungen zeigen, dass die Idee eines toroidalen, selbstkonfigurierten photonischen Gebildes als Elektron bereits 1997 in ähnlicher Form formuliert wurde. Die FFGF/ t_0 -Theorie erweitert diesen Ansatz um die fraktale Geometrie, eine Zuordnung der Quantenzahlen zur Torus-Topologie und die skaleninvariante Selbstähnlichkeit bis zur kosmischen Struktur. Damit wird das Elektron nicht isoliert betrachtet, sondern als kleinstes stabiles Element eines universellen torsionsartigen Feldnetzwerks verstanden. Die Parallelen sind eine Einordnung dieses Dokuments, keine Stellungnahme von Williamson und van der Mark.

Weiterführende Dokumente im Repository:

- 006_T0_Teilchenmassen.pdf
- FFGFT_Narrative_Master_En.pdf

Torus-Geometrie im Quantencomputing

Die in der FFGF-Theorie verwendete toroidale Struktur lässt sich auf die Quanteninformationsverarbeitung übertragen. In Quantencomputing-Anwendungen (Quantum Computing in T0 Framework, 2025) manifestiert sich der Torus wie folgt:

1. **Qubit-Zustandsraum:** Qubits befinden sich auf der Torusoberfläche, wobei ihr Zustand durch die Position (z, r, θ) in lokalen Zylinderkoordinaten beschrieben wird.
2. **Lokale Approximation:** Für Einzel-Qubit-Operationen erlaubt der große toroidale Radius R eine zylindrische Approximation:

$$R \gg r \Rightarrow \text{Torus} \approx \text{Zylinder (lokal)}$$

3. **Globale Topologie:** Die Verschränkung mehrerer Qubits bewahrt die toroidale Topologie (Genus-1) und ermöglicht:
 - Ladungsquantisierung durch Fluss durch das Torus-Loch
 - Spinquantisierung durch Windungszahlen
 - Topologisch geschützte Quanteninformation
4. **Bell-Korrelationen:** Die im T0-Rahmen für Bell-Tests angesetzte ξ -Dämpfung wird auf die fraktale Modifikation der Torus-Geometrie zurückgeführt.

Quantitatives Beispiel:

Für ein Proton, das als Torus modelliert wird:

$$R_{\text{Proton}} \sim 10^{-15} \text{ m} \quad (\text{Hauptradius}) \quad (17)$$

$$r_{\text{Proton}} \sim 21 \ell_P \approx 10^{-34} \text{ m} \quad (\text{Schlauchradius}) \quad (18)$$

$$R/r \sim 10^{19} \quad (\text{Aspektverhältnis}) \quad (19)$$

Ein in dieser Struktur kodierte Qubit erfährt:

$$\text{Krümmungskorrektur} \sim \frac{r}{R} \sim 10^{-19} \ll \xi \sim 10^{-4}$$

Somit ist die zylindrische Approximation für Quantengatter gültig, während die toroidale Topologie für fundamentale Eigenschaften (Ladung, Spin, Verschränkungsstruktur) entscheidend bleibt.

.6 Torus-Geometrie in der Kosmologie – Skalierungsinvariante torsionale Strukturen

[S] Dieser Abschnitt gehört zum kosmischen Sektor, den der heutige Korpus bewusst ausklammert (P39); seine Aussagen sind spekulativ.

Ein weiterer Aspekt der Fundamental Fractal-Geometric Field Theory (FFGF) und der t_0 -Theorie ist die Annahme, dass die Torus-Geometrie über die Planck-Skala und die Skala der Elementarteilchen hinaus ****selbstähnlich und skaleninvariant**** bis zu den größten beobachtbaren kosmischen Strukturen fortgesetzt werden kann.

Die Theorie postuliert, dass auf jeder physikalischen Skala – von Protonen über Sterne und Schwarze Löcher bis hin zu Galaxien und dem großräumigen kosmischen Netz – die dominante Energie- und Impulsdynamik durch ****torsionsartige, wirbelförmige Flussstrukturen**** beschrieben werden kann, die topologisch einem Torus entsprechen. Diese Strukturen sind durch den Hauptradius R (toroidaler Großkreisradius) und den Röhrenradius r charakterisiert und werden durch das fraktale Dimensionsdefizit ξ modifiziert.

Skalenübergreifende torsionale Entsprechungen

Die folgende Übersicht fasst die wichtigsten kosmologischen Entsprechungen zusammen, wie sie in den Dokumenten beschrieben werden:

- **Elementarteilchen-Skala (Planck- bis Hadronenskala)**

$R \sim 10^{-15}$ m (Protonenradius), $r \sim 10^{-16}$ m bis $21 \ell_P$

Stabilisierter Energie-Wirbel ("Massetorus") mit Compton-Frequenz.

Poloidale und toroidale Strömungen generieren Ruhemasse, Spin und innere Quantenzahlen.

Primärquelle: 006_T0_Teilchenmassen.pdf

- **Stern- und Schwarzes-Loch-Skala**

$R \approx$ Schwarzschildradius $r_s = 2GM/c^2$

Rotierender Raumzeit-Wirbel entsprechend der Kerr-Metrik.

Die Akkretionsscheibe und die Ergosphäre bilden zusammen einen makroskopischen Torus, in dem kinetische Energie, Drehimpuls und gravitative Bindungsenergie zirkulieren. Der Torus soll die extremen Rotations- und Gravitationsfelder stabilisieren und die Existenz stabiler rotierender Schwarzer Löcher ohne zusätzliche exotische Materie erklären.

Primärquelle: 025_T0_Kosmologie_De.pdf

- **Galaktische Skala**

$R \sim 10^{20}$ m (typischer Radius des Bulge / zentraler Bereich)

$r \sim 10^{19}$ m (effektive Dicke der galaktischen Scheibe)

Großskalige filamentäre Wirbel im kosmischen Netz.

Die Spiralarme werden als stehende Dichtewellen innerhalb einer torsionalen Grundstruktur interpretiert.

Der gesamte galaktische Drehimpuls sorgt für die langfristige Stabilisierung der Torus-Konfiguration.

Die flache Rotationskurve und die beobachtete Verteilung der Sternengeschwindigkeiten sollen sich geometrisch aus der fraktalen Modifikation der Torus-Volumen- und Krümmungsverteilung ergeben – ohne zusätzliche Dunkle Materie.

Primärquellen: 025_T0_Kosmologie_De.pdf, FFGFT_Narrative_Master_En.pdf

- **Kosmologische Großstruktur-Skala (kosmisches Netz, Filamente, Void-Strukturen)**

$R \sim 10^{23}$ – 10^{24} m (Größenordnung der größten beobachteten Filamente und Supercluster)

$r \sim 10^{22}$ – 10^{23} m (Dicke der Filamente)

Das kosmische Netz wird als hierarchisches System verschachtelter torsionsartiger Wirbel interpretiert.

Die großräumigen Strukturen (Filamente, Wände, Voids) entsprechen den stabilen Knoten und Leerräumen eines riesigen, fraktal modulierten Torus-Netzwerks.

Die beobachtete Anisotropie (z. B. CMB-Dipol, Hubble-Spannung, großräumliche Strömungen) wird als Folge der asymmetrischen torsionsartigen Flusssdynamik gedeutet – ohne kosmische Expansion oder Λ CDM-Parameter.

Primärquellen: 039_Zwei-Dipole-CMB_En.pdf, 025_T0_Kosmologie_De.pdf

Kernprinzip: Skaleninvarianz und fraktale Selbstähnlichkeit

Die Torus-Geometrie ist in der FFGF/ t_0 -Theorie ****skaleninvariant****:

$$\frac{R}{r} \approx \text{konstant} \quad \text{über viele Größenordnungen hinweg}$$

(typische Werte liegen zwischen 5 und 50, abhängig von der betrachteten Skala).

Das fraktale Dimensionsdefizit $\xi = 4/3 \times 10^{-4}$ sorgt dafür, dass die effektiven geometrischen Größen (Oberfläche A_{frak} , Volumen V_{frak} , Krümmung K_{frak}) auf jeder Skala konsistent modifiziert werden – wodurch die Theorie eine einheitliche Beschreibung von Mikro- bis Makrokosmos anstrebt.

Kosmologische Implikationen – ohne Dunkle Materie und ohne Expansion

Die Theorie stellt folgende Thesen auf **[S]**:

- Galaxienrotationskurven ergeben sich rein aus der fraktal-torsionalen Geometrie (keine zusätzliche unsichtbare Masse nötig).
- Die Hubble-Spannung (Diskrepanz zwischen lokaler und CMB-basierter H_0) wird in Dokument 026 behandelt.
- Der CMB-Dipol und großräumliche Strömungen sind Manifestationen eines globalen torsionsartigen Flusses ("Zwei-Dipol-Modell").
- Das Universum ist statisch auf der größten Skala – Expansion ist nicht notwendig.

Diese Thesen sind ausführlicher behandelt in:

- 025_T0_Kosmologie_De.pdf
- FFGFT_Narrative_Master_En.pdf
- 039_Zwei-Dipole-CMB_En.pdf

Die Torus-Kosmologie stellt damit einen Versuch dar, die gesamte Hierarchie kosmischer Strukturen aus einer einzigen geometrischen Grundform (dem fraktal modifizierten Torus) abzuleiten – ein Ansatz, der sich bewusst von der metrisch-dynamischen Beschreibung der Allgemeinen Relativitätstheorie abgrenzt.

Zwei-Dipol-Modell im Detail

Das Zwei-Dipol-Modell ist ein zentrales Element der Fundamental Fractal-Geometric Field Theory (FFGF) und der t_0 -Theorie, das entwickelt wurde, um Anomalien in der Kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung (CMB) zu beschreiben. Es wird in den Repository-Dokumenten als geometrischer Ansatz präsentiert, der den beobachteten CMB-Dipol ohne kosmische Expansion oder dunkle Energie deutet **[S]**. Stattdessen wird der Dipol als Manifestation von zwei überlagernden torsionalen Flüssen interpretiert, die aus der fraktalen Torus-Struktur der Raumzeit entstehen. Die detaillierten Herleitungen finden sich primär in

039_Zwei-Dipole-CMB_En.pdf, ergänzt durch kosmologische Abschnitte in 025_T0_Kosmologie_De.pdf und FFGFT_Narrative_Master_En.pdf.

Einführung und Motivation

Der Standard- Λ CDM-Modell interpretiert den CMB-Dipol (eine Temperaturanisotropie von $\Delta T/T \approx 10^{-3}$) primär als kinematischen Effekt durch die Eigenbewegung der Milchstraße relativ zum CMB-Ruhsystem (mit $v \approx 370$ km/s). Allerdings gibt es anhaltende Diskrepanzen: Der Dipol scheint stärker und asymmetrischer zu sein als erwartet, und es korrespondiert nicht perfekt mit großräumigen Strömungen (z. B. Shapley-Attraktor, Laniakea-Supercluster). Zusätzlich trägt der Dipol zur Hubble-Spannung bei (H_0 -Diskrepanz zwischen lokalen und CMB-basierten Messungen von ca. 5σ).

Das Zwei-Dipol-Modell adressiert diese Probleme, indem es den Dipol als Überlagerung **zweier geometrischer Komponenten** modelliert:

- **Kinematischer Dipol:** Lokale Bewegungseffekte (ähnlich Standardmodell).
- **Intrinsischer geometrischer Dipol:** Fraktal-torsionale Asymmetrie der Raumzeit selbst, die aus der ξ -modifizierten Torus-Struktur entsteht.

Dieser Ansatz führt zu einem statischen Universum, in dem scheinbare Expansionseffekte geometrisch sind – ohne Big Bang oder dunkle Energie.

Modellbeschreibung

Das Modell basiert auf der Annahme, dass die Raumzeit auf kosmischer Skala eine **globale torsionale Struktur** besitzt, die selbstähnlich zur Torus-Geometrie auf kleineren Skalen (Elementarteilchen, Schwarze Löcher, Galaxien) ist. Der CMB-Dipol entsteht durch zwei überlagerte Pole:

1. **Lokaler Dipol:** Erzeugt durch die Bewegung der lokalen Gruppe (Milchstraße) in einem torsionalen Flussfeld. Dies entspricht dem Standard-Dipol, aber modifiziert durch fraktale Korrekturen.

2. **Globaler Dipol:** Ein intrinsischer Effekt der fraktalen Raumzeit, der aus der Asymmetrie des kosmischen Torus-Netzes resultiert. Der globale Fluss ist skaleninvariant und verbindet die Planck-Skala (ℓ_P) mit der Hubble-Skala (c/H_0).

Die Überlagerung der beiden Dipole soll die beobachteten Asymmetrien erklären: Der lokale Dipol dominiert auf kleinen Skalen, während der globale auf großen Skalen (z. B. in CMB-Multipolen) sichtbar wird.

Mathematischer Rahmen

Der Dipol-Moment wird als Vektorsumme modelliert:

$$\vec{D}_{\text{total}} = \vec{D}_{\text{kin}} + \vec{D}_{\text{geo}} \quad (20)$$

- **Kinematischer Dipol $\vec{D}_{\text{kin}}$:**

$$\Delta T(\hat{n}) = T_0 \frac{\vec{v} \cdot \hat{n}}{c} \Rightarrow D_{\text{kin}} \approx 3.35 \text{ mK}$$

(mit $T_0 \approx 2.725$ K, $v \approx 370$ km/s, $\hat{n}$ Blickrichtung).

- **Geometrischer Dipol $\vec{D}_{\text{geo}}$:** Er entsteht aus der fraktalen Modifikation der Raumzeit-Metrik:

$$D_{\text{geo}} \sim \xi \cdot \ln\left(\frac{L_{\text{Hubble}}}{\ell_P}\right) \cdot T_0 \approx 0.1 \text{ mK}$$

wobei $\xi = 4/3 \times 10^{-4}$ das Dimensionsdefizit ist, und der Logarithmus die Skalenhierarchie über ~ 60 Größenordnungen berücksichtigt.

Die Richtung des globalen Dipols richtet sich nach der Achse des kosmischen Torus-Flusses, der mit dem galaktischen Dipol um $\sim 48^\circ$ abweicht – womit das Modell die beobachtete Fehlausrichtung deutet.

$$H_0 \approx 66,2 \text{ km/s/Mpc} \quad (\text{siehe Dokument 026})$$

wobei R_{torus} der effektive kosmische Hauptradius ist.

Kosmologische Implikationen

- **Deutung der Hubble-Spannung [S]**: Lokale Messungen ($H_0 \approx 73 \text{ km/s/Mpc}$) sehen den kinematischen Dipol, CMB-Messungen ($H_0 \approx 67 \text{ km/s/Mpc}$) den geometrischen – die Diskrepanz entsteht aus der Überlagerung.

- **Statisches Universum [S]**: Keine Expansion nötig; Rotverschiebung z ergibt sich aus fraktaler Energieverlust:

$$z \approx \xi \cdot \ln(d/\ell_P)$$

(mit d Entfernung).

- **CMB-Anomalien [S]**: Das Modell deutet den Dipol, Quadrupol-Schwäche und Hemisphären-Asymmetrie als torsionale Effekte.

- **Quantitative Vorhersagen [S]**: Dipol-Amplitude $\Delta T \approx 3.36 \text{ mK}$ (passend zu Planck-Daten), Misalignment-Winkel 48° (passend zu Beobachtungen).

Kritische Analyse

Das Modell beschreibt mehrere Anomalien geometrisch, mit ξ als einzigem Parameter (plus den genannten Setzungen). Dennoch fehlt eine formale Herleitung aus Feldgleichungen (vergleiche zu Standard-Cosmology). Experimentelle Validierung steht aus; es weicht vom Λ CDM-Modell ab. Weitere Details in den Quellen.

.7 Elektromagnetische Felder in der Torus-Geometrie

Maxwell-Gleichungen auf dem Torus

In gekrümmten Koordinaten müssen die Maxwell-Gleichungen angepasst werden:

In Torus-Koordinaten (θ, ϕ, ψ) :

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (21)$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (22)$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (23)$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (24)$$

Der Nabla-Operator in Torus-Koordinaten ist komplexer:

$$\nabla = \frac{1}{h_\theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{1}{h_\phi} \frac{\partial}{\partial \phi} \vec{e}_\phi + \frac{1}{h_\psi} \frac{\partial}{\partial \psi} \vec{e}_\psi$$

Wo h_θ, h_ϕ, h_ψ die metrischen Faktoren sind.

Magnetfeldkonfiguration im Torus

- Poloidales Magnetfeld B_θ : Läuft um die Röhre herum. Entsteht durch toroidale Ströme.
 - Toroidales Magnetfeld B_ϕ : Läuft um die Hauptachse. Entsteht durch poloidale Ströme.
- Die Gesamtfeldkonfiguration:

$$\vec{B} = B_\theta(r, \theta)\vec{e}_\theta + B_\phi(r, \theta)\vec{e}_\phi$$

Stabilitätsbedingung (Kruskal-Shafranov)

Für einen stabilen Torus-Plasma (wie in Fusionsreaktoren) muss gelten:

$$q = \frac{rB_\phi}{RB_\theta} > 1$$

Dies ist der Sicherheitsfaktor q (safety factor).

In der FFGF wird angenommen, dass Elementarteilchen stabil sind, weil ihre Torus-Konfiguration $q > 1$ erfüllt.

Entstehung des magnetischen Moments

Ein rotierender Torus mit Ladung erzeugt ein magnetisches Dipolmoment:

$$\mu = I \times A = \left(\frac{Q}{T}\right) \times \pi r^2$$

Wobei:

- Q = Ladung
- T = Rotationsperiode
- r = Röhrenradius

Für ein Elektron:

$$\mu_e = \frac{e\hbar}{2m_e} = \text{Bohr-Magneton}$$

Dies ist das intrinsische magnetische Moment des Elektrons.

Elektromagnetische Selbstenergie

Die Energie, die im elektromagnetischen Feld eines Torus gespeichert ist:

$$E_{\text{em}} = \frac{\epsilon_0}{2} \int E^2 dV + \frac{1}{2\mu_0} \int B^2 dV$$

Für einen Torus mit Radius R und r :

$$E_{\text{em}} \propto \frac{e^2}{r} \times f\left(\frac{R}{r}\right)$$

Wo $f(R/r)$ ein geometrischer Faktor ist.

Diese Energie trägt zur Masse bei:

$$m_{\text{em}} = \frac{E_{\text{em}}}{c^2}$$

Ein Teil der Elektronenmasse ($\sim 0.1\%$) stammt von dieser elektromagnetischen Selbstenergie.

Verbindung zu ξ und D_f

In einem D_f -dimensionalen Raum lautet die allgemeine Coulomb-Kraft:

$$F \propto \frac{1}{r^{D_f-1}}$$

Standardphysik ($D = 3$):

$$F \propto \frac{1}{r^2}$$

Heutiges Universum, fraktaler Raum ($D_f = 3 - \xi$):

$$F \propto \frac{1}{r^{2-\xi}}$$

Für $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$:

$$F \propto \frac{1}{r^{1,9998667...}}$$

Auf großen Skalen führt dies zu einer winzigen Modifikation, die "Dunkle Energie"-Effekte erklären könnte [S].

[S] Sonderfall frühes Universum ($t \rightarrow t_{\min}$, $D_f = 2$):

$$F|_{D_f=2} \propto \frac{1}{r^1} = \frac{1}{r}$$

Am Anfang des Universums gab es kein $1/r^2$ -Gesetz, sondern ein lineares Einschlusspotential. Dies ist physikalisch äquivalent zum 2D-Coulomb-Potential und hatte fundamentale Auswirkungen auf die Strukturbildung in der Planck-Ära.

.8 Strömungsdynamik im Torus (Navier-Stokes auf gekrümmten Räumen)

Navier-Stokes in gekrümmten Koordinaten

Die Navier-Stokes-Gleichungen beschreiben die Strömung von Flüssigkeiten (oder in der FFGF: die Dynamik des Vakuum-"Fluids").

Standard-Form:

$$\rho \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} \right) = -\nabla p + \eta \nabla^2 \vec{v} + \vec{f}$$

In Torus-Koordinaten: müssen wir die kovariante Ableitung verwenden:

$$\rho \left(\frac{\partial v^i}{\partial t} + v^j \nabla_j v^i \right) = -\nabla^i p + \eta g^{ij} \nabla_j \nabla_k v^k + f^i$$

Wobei:

- g^{ij} = metrischer Tensor
- ∇_j = kovariante Ableitung
- η = Viskosität des Vakuum-Mediums

Metrischer Tensor für den Torus

Für einen Torus in Standardposition:

$$ds^2 = d\theta^2 + (R + r \cos \theta)^2 d\phi^2$$

Metrischer Tensor:

$$g = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (R + r \cos \theta)^2 \end{bmatrix}$$

Determinante:

$$\sqrt{g} = R + r \cos \theta$$

Geschwindigkeitsfeld im rotierenden Torus

Annahme: Stationäre Rotation mit konstanter Winkelgeschwindigkeit ω .

Poloidale Komponente:

$$v_\theta(r, \theta) = v_0 \sin(n\theta)$$

Wo n die Anzahl der Wirbel ist.

Toroidale Komponente:

$$v_\phi(r, \theta) = \omega(R + r \cos \theta)$$

Wirbelstärke (Vorticity)

Die Wirbelstärke ist:

$$\vec{\omega} = \nabla \times \vec{v}$$

In Torus-Koordinaten:

$$\omega_r = \frac{1}{h_\theta h_\phi} \left[\frac{\partial(h_\phi v_\phi)}{\partial \theta} - \frac{\partial(h_\theta v_\theta)}{\partial \phi} \right]$$

Für einen stabilen Torus-Wirbel: Die Wirbelstärke muss überall positiv bleiben (keine Rückflüsse).

Energieerhaltung im Torus-Fluss

Die kinetische Energie der Strömung:

$$E_{\text{kin}} = \frac{\rho}{2} \int v^2 dV$$

Für einen Torus:

$$E_{\text{kin}} = \frac{\rho}{2} \times 2\pi^2 R r \times \langle v^2 \rangle$$

Dissipation durch Viskosität:

$$\frac{dE}{dt} = -\eta \int (\nabla \times \vec{v})^2 dV$$

Gleichgewicht: Wenn die Energiezufuhr (durch Vakuumfluktuationen auf Planck-Skala) die Dissipation ausgleicht, ist der Torus stabil.

Turbulenz und Stabilität

Die Reynolds-Zahl für einen Torus:

$$Re = \frac{\rho v R}{\eta}$$

Kritischer Wert: $Re_{\text{crit}} \approx 2300$

Für $Re < Re_{\text{crit}}$: Laminare Strömung (stabil)

Für $Re > Re_{\text{crit}}$: Turbulente Strömung (instabil)

In der FFGF: Die "Viskosität" η des Vakuums wird durch ξ bestimmt:

$$\eta \propto \frac{\hbar}{\ell_{\text{Planck}}^3 \times \xi}$$

Mit $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ ergibt sich eine sehr geringe Viskosität → das Vakuum verhält sich wie ein Superfluid.

Helmholtz-Zerlegung

Jedes Vektorfeld kann zerlegt werden in:

$$\vec{v} = \nabla\varphi + \nabla \times \vec{A}$$

- Potentialanteil ($\nabla\varphi$): Kompressible Strömung
- Wirbelanteil ($\nabla \times \vec{A}$): Inkompressible Rotation

Im Torus dominiert der Wirbelanteil; die FFGF sieht darin den Grund für die Stabilität.

Casimir-Effekt im Torus

In einem D_f -dimensionalen Raum skaliert der Casimir-Druck allgemein als:

$$P_{\text{Casimir}} \propto -\frac{\hbar c}{d^{D_f+1}}$$

Heutiges Universum ($D_f \approx 3$):

$$P_{\text{Casimir}} = -\frac{\pi^2 \hbar c}{240 d^4}$$

Wo d der Abstand ist (hier: Röhrenradius $2r$).

In der FFGF soll dieser Druck den Torus gegen Kollaps stabilisieren.

[S] Sonderfall frühes Universum ($t \rightarrow t_{\text{min}}$, $D_f = 2$):

$$P_{\text{Casimir}}|_{D_f=2} \propto -\frac{\hbar c}{d^3}$$

Der schwächere Abstandsexponent (d^{-3} statt d^{-4}) bedeutet, dass der Casimir-Druck in der Planck-Ära auf großen Abständen stärker und auf kleinen Abständen schwächer wirkte als heute – mit direkten Folgen für die Torus-Stabilität am Anfang des Universums.

Verbindung zur Zeit-Masse-Dualität

Die effektive Strömungsgeschwindigkeit im Torus auf Planck-Skala beträgt:

$$v \sim \frac{\ell_{\text{Planck}}}{t_P} = c$$

Dies entspricht der Lichtgeschwindigkeit und ist mit der Deutung verträglich, dass

$$c$$

als effektive Geschwindigkeit aus der Planck-Skala hervorgeht.

Auf der fundamentalen T_0 -Skala (sub-Planck) gilt jedoch:

$$v_0 \sim \frac{\Lambda_0}{t_0} = \frac{\xi \cdot \ell_{\text{Planck}}}{t_0}$$

wobei

$$t_0$$

die sub-Planck-Zeit (2GE) ist. Die Masse entsteht aus der Trägheit dieser inneren Strömung auf T_0 -Granulationsebene.

Klärung: Effektive Planck-Skala vs. fundamentale T_0 -Skala

Zur Vermeidung von Verwechslungen sei klargestellt: In dieser Analyse wird die **effektive Grenze** der kontinuierlichen Physik durch die **Planck-Länge**

$$\ell_P$$

und Planck-Zeit

$$t_P$$

beschrieben. Die minimale stabile Torus-Röhre liegt bei

$$r_{\min} \approx 21\ell_P$$

, also deutlich oberhalb von

$$\ell_P$$

.

Die **fundamentale T_0 -Skala** liegt jedoch **sub-Planck** und beschreibt die innere Granulation des fraktalen Feldes:

- Sub-Planck-Länge:

$$\Lambda_0 = \xi \cdot \ell_P \approx 1.333 \times 10^{-4} \cdot \ell_P \approx 2.15 \times 10^{-39}$$

m

- Charakteristische T_0 -Längen und -Zeiten:

$$r_0 = 2GE$$

,

$$t_0 = 2GE$$

(siehe Zeit_En.pdf und 010_T0_Energie_De.pdf)

Die Planck-Skala ist somit die **äußere Referenzgrenze** der effektiven Theorie, während

$$t_0$$

die **sub-Planck-Granulation** darstellt, auf der die fraktale Struktur wirklich operiert.

Fraktale Turbulenz

In einem allgemeinen D_f -dimensionalen Raum gilt für das Energiespektrum der Turbulenz:

$$E(k) \propto k^{-(D_f+2)/3}$$

Kolmogorov-Spektrum ($D = 3$):

$$E(k) \propto k^{-5/3}$$

Heutiges Universum, fraktales Spektrum ($D_f = 3 - \xi$):

$$E(k) \propto k^{-(5/3-\xi/3)}$$

Dies könnte in kosmischen Plasmastrukturen messbar sein.

[S] Sonderfall frühes Universum ($t \rightarrow t_{\min}$, $D_f = 2$):

$$E(k)|_{D_f=2} \propto k^{-4/3}$$

Der flachere Exponent $-4/3$ bedeutet, dass in der Planck-Ära Energie weniger effizient auf kleine Skalen kaskadierte – ein deutlicher Unterschied zur heutigen kosmischen Turbulenz.

.9 Gesamtsynthese: Die drei Aspekte zusammen

- Strömungsdynamik erzeugt stabile Wirbel (Torus-Form)
 - Elektromagnetische Felder entstehen aus der Rotation geladener Wirbel
 - Quantenzahlen sind topologische Eigenschaften der Verschlingung
- Alles hängt zusammen durch:
- Die fraktale Dimension $D_f = 3 - \xi$
 - Die Planck-Zeit t_0 als fundamentaler Takt
 - Die Torus-Geometrie als (in der FFGF angenommene) stabilste Form