


Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет Информационных технологий и
программирования

Расчетно-графическая работа
«Дифференциальные уравнения»
Специальные разделы высшей математики

Выполнили:

Бобков Артем
Грибов Артем
Комашко Александр
Насонов Петр
Орлов Максим

Группа:

М3100 

Преподаватель:

Далевская Ольга Петровна

2023/2024 г.

Содержание

Задание 1. Дифференциальные модели первого порядка	3
Задание 2. Графическое решение ДУ первого порядка	4
Задание 3. ДУ второго порядка	6
Задание 4. Системы ДУ. Устойчивость.	7

Задание 1. Дифференциальные модели первого порядка

Условие.

В задачах проведите исследование:

1. Составьте математическую модель задачи: введите обозначения, выпишите данные, в задаче В сделайте чертеж, составьте дифференциальное уравнение и запишите начальные условия.
 2. Решите аналитически составленную задачу Коши.
 3. Изобразите семейство интегральных кривых и решение задачи Коши.
 4. Запишите ответ
- A. В электрическую цепь с сопротивлением $3/2$ Ом в течение двух минут равномерно вводится напряжение (от нуля до 120 В). Кроме того, автоматически вводится индуктивность, так что число, выражающее индуктивность цепи в генри, равно числу, выражающему ток в амперах. Найдите зависимость тока от времени в течение первых двух минут опыта.
- B. Найти такую кривую, проходящую через точку $(0, -2)$, чтобы угловой коэффициент касательной в любой ее точке равнялся ординате этой точки, увеличенной на три единицы

Решение.

- A. It is empty but you can fill it!

Ответ: It is empty but you can fill it!

- B. It is empty but you can fill it!

Ответ: It is empty but you can fill it!

Задание 2. Графическое решение ДУ первого порядка

Условие.

В задачах проведите исследование:

1. Изучите по источникам метод изоклин (например, здесь: Романко, В. К. Курс дифференциальных уравнений и вариационного исчисления — URL:<https://e.lanbook.com/book/152035>).
2. Постройте приближенно семейство интегральных кривых данного ДУ методом изоклин.
3. Решите задачу аналитически. Изобразите точное решение.
4. Сравните точное и приближенное решение.

$$y' = \frac{y}{x+y}$$

Решение.


1. Метод изоклин состоит в следующем:

- Строится достаточно густая сетка изоклин для различных значений k и на каждой изоклине изображаются небольшие отрезки с наклоном k .
- Начиная из точки (x_0, y_0) , поводится линия, которая, будет пересекать каждую изоклину под углом, заданным полем направлений. Полученная таким образом кривая и будет приближенным изображением интегральной кривой уравнения, проходящей через точку (x_0, y_0) .

2. Изоклины, которые задает это уравнение, описываются уравнением $\frac{y}{y+x} = k \iff y = \frac{kx}{k-1}$ - множество прямых, пересекающихся в начале координат

Прямые в 1 и 3 четвертях задают наклон кривой $k \in (0; 1)$, во 2 и 4 четвертях - наклон $k \in (-\infty; 0) \cup (1; \infty)$.

Используя компьютерные технологии (язык программирования Python и библиотека для изображения графиков matplotlib), построим несколько изоклин и 3 интегральные кривые, которые они задают:



3. Решим дифференциальное уравнение:

$$y' = \frac{y}{x+y}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} \cdot \frac{1}{1 + \frac{y}{x}}$$

$$\frac{dy}{dx} = t \cdot \frac{1}{1+t}$$

$$t'x + t = t \cdot \frac{1}{1+t}$$

$$t'x = \frac{-t^2}{1+t}$$

$$\frac{(1+t)dt}{-t^2} = \frac{dx}{x}$$

$$\frac{dt}{-t^2} + \frac{tdt}{-t^2} = \frac{dx}{x}$$


$$d\frac{1}{t} + \left(-\frac{1}{2}d\ln|t^2|\right) = d\ln|x|$$

$$\frac{1}{t} + (-\ln|t|) = \ln|x| + C$$

$$\frac{x}{y} - \ln\left|\frac{y}{x}\right| = \ln|x| + C$$

$$\frac{x}{y} - \ln|y| = C$$

4. Построим в Geogebra уравнение выше с 3 разными константами:



Как можем заметить, метод изоклин дает довольно точное изображение того, как ведет себя семейство интегральных кривых

Задание 3. ДУ второго порядка

Условие.

Пружинный маятник движется по закону:

$$y'' + p(t)y' + q(t)y = f(t)$$

1. Запишите однородное уравнение движения маятника. Выясните, почему движение описывается уравнением такого вида (каков физический смысл коэффициентов левой части уравнения).
2. Установите характер движения (периодический, аperiodический) при данных $p(t)$ и $q(t)$.
3. Найдите ФСР ЛОДУ и убедитесь в ее линейной независимости с помощью вронскиана.
4. Найдите общее решение ЛОДУ.
5. Задайте начальные условия в момент $t_0 = 0$ и найдите удовлетворяющее им частное решение ЛОДУ. Изобразите закон движения в системе координат.
6. Составьте линейное неоднородное дифференциальное уравнение (ЛНДУ) с правой частью $f(t)$. Выясните физический смысл функции $f(t)$.
7. Найдите решение ЛНДУ, удовлетворяющее начальным условиям. Изобразите закон движения в системе координат.
8. Сделайте вывод о влиянии на движение функции $f(t)$.

$$p(t) = 4, q(t) = 5, f(t) = t^2 e^{2t}$$

Решение.

It is empty but you can fill it!

Ответ: It is empty but you can fill it!

Задание 4. Системы ДУ. Устойчивость.

Условие.

Дана система ДУ:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -2x + 5y, \\ \frac{dy}{dt} = 2x + y \end{cases}$$

1. Найдите общее решение системы.
2. Изобразите на фазовой плоскости семейство интегральных кривых $y = y(x)$.
3. Исследуйте решение системы на устойчивость при $t \rightarrow +\infty$.
4. Определите характер особой точки.

Решение.

1. Решение ДУ

Решим через метод Эйлера (через характеристическое уравнение).

В общем наше решение будет выглядеть как система функций вида:

$$\begin{cases} x(t) = \omega_1 C_1 e^{\lambda_1 t} + \omega_2 C_2 e^{\lambda_2 t} \\ y(t) = \mu_1 C_1 e^{\lambda_1 t} + \mu_2 C_2 e^{\lambda_2 t} \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} -2 & 5 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2-\lambda & 5 \\ 2 & 1-\lambda \end{vmatrix}$$

$$(-2-\lambda)(1-\lambda) - 2 \cdot 5 = 0 \Rightarrow \lambda^2 + \lambda - 12 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = -4, 3$$

$$(a) \lambda_1 = -4 \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} \Rightarrow \omega_1 = -\frac{5}{2} \mu_1$$

(возьмем $\mu_2 = 1$, тогда $\omega_1 = -\frac{5}{2}$).

$$(b) \lambda_2 = 3 \begin{vmatrix} -5 & 5 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} \Rightarrow \omega_2 = \mu_2$$

(возьмем любое число, к примеру: 1).

Тогда наша система выглядит так:


$$\begin{cases} x(t) = -\frac{5}{2} C_1 e^{-4t} + C_2 e^{3t} \\ y(t) = C_1 e^{-4t} + C_2 e^{3t} \end{cases}$$

2. Фазовая плоскость

Т.к. собственные числа характеристического уравнения действительные и разных знаков то фазовая плоскость будет состоять как бы из гипербол. Поэтому нам нужно найти векторы асимптот. Каждый такой вектор x_i можно найти через уравнение

$$\begin{vmatrix} -2-\lambda_i & 5 \\ 2 & 1-\lambda_i \end{vmatrix} \cdot x_i = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Таким образом: $x_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}, x_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$



3. Устойчивость: Т.к. корни характеристического уравнения действительные числа одного знака, то положение равновесия которое у нас получится - седло.
4. Тип особой точки: $(0, 0)$ - седло