

Intégration sur un segment

M. GUILLERON, UNC

2021

Dans ce chapitre, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou \mathbb{C} .

ξ se lit xi, ω se lit omega, μ se lit mu et ν se lit nu.

1 Fonction en escalier

Définition 1. Soient $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a < b$.

Soit $(\xi_i)_{0 \leq i \leq n}$ une famille de réels.


$(\xi_i)_{0 \leq i \leq n}$ est appelé une subdivision de $[a, b]$ ssi

$$a = \xi_0 \leq \xi_1 \leq \dots \leq \xi_n = b.$$

Définition 2. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{K}$.

f est dite en escalier si il existe une subdivision $(\xi_i)_{0 \leq i \leq n}$ de $[a, b]$ telle que f soit constante sur chacun des intervalles $]\xi_i, \xi_{i+1}[$ ($0 \leq i \leq n-1$).

Une telle subdivision est dite adaptée ou subordonnée à f .



Exemple 1.

Cette fonction f est en escalier ($a = -2$ et $b = 8$), avec par exemple $n = 4$ et $(\xi_0, \xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4) = (-2, 0, 1, 3, 8)$.

On peut aussi prendre $n = 6$ et $(\xi_0, \xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4, \xi_5, \xi_6) = (-2, -1, 0, 1, 3, 6, 8)$: cette subdivision reste adaptée à f .

Remarque 1. Si $(\xi_i)_{0 \leq i \leq n}$ est adaptée, toute subdivision plus fine $(\mu_j)_{0 \leq j \leq m}$ (ce qui signifie $\{\xi_i, 0 \leq i \leq n\} \subset \{\mu_j, 0 \leq j \leq m\}$) est encore adaptée.

Proposition 1. Notons $\mathcal{E}_{sc}([a, b], \mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions en escalier à valeurs dans \mathbb{K} et $\mathcal{F}([a, b], \mathbb{K})$ l'espace vectoriel des fonctions définies sur $[a, b]$ à valeurs dans \mathbb{K} .

$\mathcal{E}_{sc}([a, b], \mathbb{K})$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}([a, b], \mathbb{K})$.

Démonstration

$\mathcal{E}_{\text{sc}}([a, b], \mathbb{K})$ est non vide car il contient la fonction constante $x \mapsto 1$ ($(\xi_0, \xi_1) = (a, b)$ est une subdivision adaptée).

Soient $f, g \in \mathcal{E}_{\text{sc}}([a, b], \mathbb{K})$ et soit $\lambda \in \mathbb{K}$.

On pose $(\xi_i)_{0 \leq i \leq n}$ et $(\omega_j)_{0 \leq j \leq m}$ des subdivisions adaptées à f et g .

Soit $(\mu_k)_{0 \leq k \leq p}$ la suite des éléments de $\{\xi_i, 0 \leq i \leq n\} \cup \{\omega_j, 0 \leq j \leq m\}$ rangés dans l'ordre croissant.

C'est une subdivision adaptée à f et à g (car plus fine que les subdivisions initiales).

On peut alors en déduire que $f + \lambda g$ est en escalier.

2 Définition de l'intégrale

2.1 Intégration des fonctions en escalier

Propriété-définition 1. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{K}$ en escalier.

Soit $(\xi_i)_{0 \leq i \leq n}$ une subdivision adaptée à f .

Pour tout i entier entre 0 et $n-1$, on pose λ_i l'unique valeur prise par f sur $] \xi_i, \xi_{i+1} [$.

La quantité $\sum_{i=0}^{n-1} (\xi_{i+1} - \xi_i) \lambda_i$ ne dépend pas du choix de la subdivision $(\xi_i)_{0 \leq i \leq n}$ adaptée à f et est

appelée intégrale de f sur $[a, b]$ et notée $\int_a^b f$, $\int_{[a,b]} f$, $\int_a^b f(x) dx$ ou $\int_{[a,b]} f(x) dx$.

Démonstration

Soient $(\xi_i)_{0 \leq i \leq n}$ et $(\omega_j)_{0 \leq j \leq m}$ deux subdivisions adaptées à f .

Soit $(\mu_k)_{0 \leq k \leq p}$ définie comme ci-dessus.

Notons ν_k la valeur prise par f sur $] \mu_k, \mu_{k+1} [$.

Montrons que $\sum_{i=0}^{n-1} (\xi_{i+1} - \xi_i) \lambda_i = \sum_{k=0}^{p-1} (\mu_{k+1} - \mu_k) \nu_k (*)$.

Fixons $i \in [0, n-1]$.

Fixons $a_i, a_{i+1} \in [0, p-1]$ tels que $\xi_i = \mu_{a_i} < \mu_{a_i+1} < \dots < \mu_{a_{i+1}} = \xi_{i+1}$.

Remarquons que $\forall k \in [a_i, a_{i+1} - 1]$, $\mu_k = \lambda_i$.

D'où :

$$\begin{aligned} (\xi_{i+1} - \xi_i) \lambda_i &= (\mu_{a_{i+1}} - \mu_{a_{i+1}-1}) \lambda_i + (\mu_{a_{i+1}-1} - \mu_{a_{i+1}-2}) \lambda_i + \dots + (\mu_{a_i+1} - \mu_{a_i}) \lambda_i \\ &= \sum_{k=a_i}^{a_{i+1}-1} (\mu_{k+1} - \mu_k) \nu_k. \end{aligned}$$

En sommant sur i , on obtient bien (*).

En refaisant le même raisonnement avec $\sum_{j=0}^{m-1} (\omega_{j+1} - \omega_j) \times$ valeur prise par f sur $] \omega_j, \omega_{j+1} [$, on obtient l'égalité voulue.

Propriétés 1. L'intégration des fonctions en escalier est :

1. linéaire : $\forall f, g$ en escalier, $\forall \lambda \in \mathbb{K}$

$$\int_a^b (f + \lambda g) = \int_a^b f + \lambda \int_a^b g.$$

2. positive : Pour toute fonction en escalier f à valeurs dans \mathbb{R}_+ , $\int_a^b f \geq 0$.

3. croissante Pour toutes fonctions en escalier f et g vérifiant $\forall x \in [a, b], f(x) \leq g(x)$,

$$\int_a^b f \leq \int_a^b g.$$

Idée de la démonstration

1. Prendre une subdivision adaptée à f et g simultanément.
2. Découle directement de la définition.
- 3.

$$\int_a^b g - \int_a^b f = \int_a^b (g - f) \text{ par linéarité}$$

≥ 0 par positivité.

Proposition 2. Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$ avec $a < b < c$.

Soit $f : [a, c] \rightarrow \mathbb{R}$.

f est en escalier sur $[a, c]$ ssi elle l'est sur $[a, b]$ et sur $[b, c]$, auquel cas :

$$\int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f \text{ (Relation de Chasles).}$$


Démonstration : Se référer aux définitions.

2.2 Intégration des fonctions continues par morceaux à valeurs réelles

Définition 3. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$.

f est dite continue par morceaux (c.p.m.) sur $[a, b]$ ssi il existe une subdivision de $[a, b]$ $(\xi_i)_{0 \leq i \leq n}$ dite adaptée à f telle que pour tout $i \in \llbracket 0; n-1 \rrbracket$ f est continue sur $]\xi_i, \xi_{i+1}[$ et admet des limites finies à droite en ξ_i et à gauche en ξ_{i+1} .

Autrement dit, $f|_{]\xi_i, \xi_{i+1}[}$ admet une prolongement continue \tilde{f}_i sur $[\xi_i, \xi_{i+1}]$.



Exemple 2.

La fonction f ci-dessus est continue par morceaux sur $[a, b] = [-2, 8]$.

Une subdivision adaptée est $(\xi_0, \xi_1, \xi_2, \xi_3) = (-2, 1, 3, 8)$.

Proposition 3. (Théorème d'approximation des fonctions c.p.m. par des fonctions en escalier)

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue par morceaux. Soit $\epsilon > 0$.

Il existe des fonctions en escalier φ et ψ telles que

1. $\varphi \leq f \leq \psi$

$$2. \psi - \varphi \leq \epsilon$$


Démonstration

- Premier cas : f continue

Par le théorème de Heine, f est uniformément continue sur le segment $[a, b]$.

Ainsi $\exists \delta > 0$ tel que $\forall x, y \in [a, b] \quad |x - y| < \delta \Rightarrow |f(y) - f(x)| < \epsilon$.

Soit $(\xi_i)_{0 \leq i \leq n}$ une subdivision dont le pas, égal à $\max\{\xi_{i+1} - \xi_i, 0 \leq i \leq n-1\}$, est inférieur ou égal à δ .



Exemple 3.

Ici, $(\xi_0, \xi_1, \xi_2, \xi_3) = (1, 3, 6, 8)$.

On a représenté en rouge la courbe représentative de φ et en vert la courbe représentative de ψ .

Définissons φ par :

Pour tout i de $\llbracket 0, n-1 \rrbracket$, sur $] \xi_i, \xi_{i+1} [$, $\varphi = cte_i = \min f_{[\xi_i, \xi_{i+1}]}$

En les ξ_i , $\varphi(\xi_i) = f(\xi_i)$.

Remarque 2. $\min f_{[\xi_i, \xi_{i+1}]}$ existe car une fonction continue sur un segment est bornée et atteint ses bornes.

Définissons ψ par :

Pour tout i de $\llbracket 0, n-1 \rrbracket$, sur $] \xi_i, \xi_{i+1} [$, $\psi = cte_i = \max f_{[\xi_i, \xi_{i+1}]}$.

En les ξ_i , $\psi(\xi_i) = f(\xi_i)$.

Par construction, $\varphi \leq f \leq \psi$.

De plus, pour tout $i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$,

$\exists x_i \in [\xi_i, \xi_{i+1}]$ tel que $f(x_i) = \min f_{[\xi_i, \xi_{i+1}]}$.

$\exists y_i \in [\xi_i, \xi_{i+1}]$ tel que $f(y_i) = \max f_{[\xi_i, \xi_{i+1}]}$.

Comme $\xi_i \leq x_i \leq \xi_{i+1}$ et $-\xi_{i+1} \leq -y_i \leq -\xi_i$,

$\xi_i - \xi_{i+1} \leq x_i - y_i \leq \xi_{i+1} - \xi_i$,

d'où $|x_i - y_i| \leq \xi_{i+1} - \xi_i \leq \delta$.

Ainsi

$$\begin{aligned} \max f_{[\xi_i, \xi_{i+1}]} - \min f_{[\xi_i, \xi_{i+1}]} &= f(y_i) - f(x_i) \\ &\leq |f(y_i) - f(x_i)| \\ &\leq \epsilon. \end{aligned}$$

Donc, sur $] \xi_i, \xi_{i+1} [$, $\psi - \varphi \leq \epsilon$.

En les ξ_i , $\psi(\xi_i) - \varphi(\xi_i) = f(\xi_i) - f(\xi_i) = 0$.

Donc $\psi - \varphi \leq \epsilon$ sur $[a, b]$.

- Deuxième cas : f cpm quelconque

Soit $(\mu_j)_{0 \leq j \leq m}$ une subdivision adaptée à f .

Par le premier cas, il existe des fonctions $\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_{m-1}$ et $\psi_0, \psi_1, \dots, \psi_{m-1}$ en escalier sur $[\mu_0, \mu_1], [\mu_1, \mu_2], \dots, [\mu_{m-1}, \mu_m]$ telle que, pour tout $j \in \llbracket 0, m-1 \rrbracket$, sur $[\mu_j, \mu_{j+1}]$, $\varphi_j \leq \tilde{f}_j \leq \psi_j$ et $\psi_j - \varphi_j \leq \epsilon$.

Il suffit de poser $\varphi = \varphi_j$ sur $]\mu_j, \mu_{j+1}[$ et $\psi = \psi_j$ sur $]\mu_j, \mu_{j+1}[$ ($0 \leq j \leq m-1$) ainsi que $f(\mu_j) = \varphi(\mu_j) = \psi(\mu_j)$ ($0 \leq j \leq m$).

Propriété-définition 2. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ c.p.m.

Notons $E^- = \{\varphi \text{ en escalier telle que } \varphi \leq f\}$ et $E^+ = \{\psi \text{ en escalier telle que } \psi \geq f\}$.

Notons $I^-(f) = \sup\{\int_a^b \varphi, \varphi \in E^-\}$ et $I^+(f) = \inf\{\int_a^b \psi, \psi \in E^+\}$.

Alors $I^-(f) = I^+(f) \in \mathbb{R}$.

On appelle intégrale de f sur $[a, b]$ cette valeur commune.

Démonstration

Soit $A^- = \{\int_a^b \varphi, \varphi \in E^-\}$ et $A^+ = \{\int_a^b \psi, \psi \in E^+\}$.

A^- est non vide (appliquer la proposition précédente avec ϵ quelconque) et majoré par tout élément de A^+ par croissance de l'intégrale.

A^+ étant non vide, A^- est majoré.

Ainsi, $I^-(f)$ appartient à \mathbb{R} , comme borne supérieure d'une partie non vide majorée de \mathbb{R} .

De plus, comme $I^-(f)$ est plus petit que tout majorant de A^- , $I^-(f)$ est plus petit que tout élément de A^+ , donc $I^-(f)$ est un minorant de A^+ .

$I^-(f)$ est donc plus petit que le plus grand des minorant de A^+ , d'où

$$I^-(f) \leq I^+(f).$$

Soit $\epsilon > 0$. Soient φ, ψ comme dans la proposition précédente.

$$\text{Alors } \int_a^b \psi \leq \int_a^b (\varphi + \epsilon) = \int_a^b \varphi + \int_a^b \epsilon = \int_a^b \varphi + \epsilon(b-a).$$

$$\text{Or } \psi \in E^+ \text{ donc } I^+(f) \leq \int_a^b \psi.$$

$$\varphi \in E^- \text{ donc } I^-(f) \geq \int_a^b \varphi.$$

$$\text{Ainsi } I^+(f) \leq \int_a^b \psi \leq I^-(f) + \epsilon(b-a).$$

$$\text{Donc } I^-(f) = I^+(f) \text{ (sinon on aurait une contradiction en choisissant } \epsilon \in]0; \frac{I^+(f) - I^-(f)}{b-a}[).$$

Proposition 4. L'intégration est fonctions c.p.m. est :

1. linéaire.
2. positive.
3. croissante.
4. additive par rapport au segment d'intégration (relation de Chasles).

Démonstration

1. Soient $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ c.p.m., soit $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$\text{Montrons que } \int_a^b (f + g) - \int_a^b f - \int_a^b g = 0.$$

Remarque 3. On vérifie que l'espace des fonctions continues par morceaux est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions de $[a, b]$ dans \mathbb{R} .

Soit $\epsilon > 0$.

Soient $\varphi_1, \psi_1, \varphi_2, \psi_2$ en escalier telles que $\varphi_1 \leq f \leq \psi_1, \varphi_2 \leq g \leq \psi_2, \psi_1 - \varphi_1 \leq \epsilon$ et $\psi_2 - \varphi_2 \leq \epsilon$.

Alors $\varphi_1 + \varphi_2 \leq f + g \leq \psi_1 + \psi_2$.

Ainsi :

$$\begin{aligned} \int_a^b (\varphi_1 + \varphi_2) &\leq \int_a^b (f + g) \leq \int_a^b (\psi_1 + \psi_2) = \int_a^b \psi_1 + \int_a^b \psi_2 \text{ (linéarité de l'intégrale pour les fonctions en escalier)} \\ &\leq \int_a^b \varphi_1 + (b-a)\epsilon + \int_a^b \varphi_2 + (b-a)\epsilon \end{aligned}$$

$$\text{Or } \int_a^b \varphi_1 \leq \int_a^b f \text{ et } \int_a^b \varphi_2 \leq \int_a^b g.$$

$$\text{Ainsi } \int_a^b (f + g) \leq \int_a^b \varphi_1 + \int_a^b \varphi_2 + 2(b-a)\epsilon$$

$$- \int_a^b f \leq - \int_a^b \varphi_1$$

$$- \int_a^b g \leq - \int_a^b \varphi_2$$

D'où, en sommant ces encadrements :

$$\int_a^b (f + g) - \int_a^b f - \int_a^b g \leq 0 + 2(b-a)\epsilon,$$

$$\text{d'où } \int_a^b (f + g) - \int_a^b f - \int_a^b g \leq 0 \text{ (car sinon, on obtient une contradiction pour } \epsilon \in]0, \frac{\int_a^b (f + g) - \int_a^b f - \int_a^b g}{2(b-a)}[).$$

$$\text{De même, on montre que } \int_a^b (f + g) - \int_a^b f - \int_a^b g \geq 0.$$

$$\text{Donc } \int_a^b (f + g) - \int_a^b f - \int_a^b g = 0.$$

Si $\lambda \geq 0$, $\lambda\varphi_1 \leq \lambda f \leq \lambda\psi_1$

$$\text{D'où : } \lambda \int_a^b \varphi_1 = \int_a^b \lambda\varphi_1 \leq \int_a^b \lambda f \leq \int_a^b \lambda\psi_1 = \lambda \int_a^b \psi_1 \leq \lambda \int_a^b \varphi_1 + \epsilon(b-a)$$

$$\text{De plus : } -\lambda \int_a^b \psi_1 \leq -\lambda \int_a^b f \leq -\lambda \int_a^b \varphi_1$$

En sommant ces encadrements, on obtient :

$$-\lambda\epsilon(b-a) \leq \int_a^b \lambda f - \lambda \int_a^b f \leq \lambda\epsilon(b-a).$$

$$\text{Ceci étant vrai pour tout } \epsilon > 0, \text{ on en déduit que } \int_a^b \lambda f - \lambda \int_a^b f = 0.$$

On effectue un raisonnement similaire dans le cas $\lambda < 0$.

2. Si $f \geq 0$, la fonction nulle est une fonction en escalier minorant f .

$$\text{D'où : } \int_a^b f \geq \int_a^b 0 = 0.$$

3 Propriétés de l'intégrale des fonctions cpm réelles

3.1 Inégalité de la moyenne

Proposition 5. Soient $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a < b$.

Soient $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ c.p.m.

$$\left| \int_a^b fg \right| \leq \left(\sup_{[a,b]} |f| \right) \int_a^b |g|.$$

Démonstration

Existence de $\sup |f|$.

Soit $(\xi_i)_{0 \leq i \leq n}$ une subdivision adaptée à f .

$\forall i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ $f|_{[\xi_i, \xi_{i+1}]}$ se prolonge par une fonction continue \tilde{f}_i sur $[\xi_i, \xi_{i+1}]$.

Pour tout i , $|\tilde{f}_i|$ admet un maximum M_i car elle est continue et $[\xi_i, \xi_{i+1}]$ est un segment.

Ainsi, $|f|$ est majorée par $\max(M_0, M_1, \dots, M_{n-1}, |f(\xi_0)|, |f(\xi_1)|, \dots, |f(\xi_n)|)$, donc admet une borne supérieure dans \mathbb{R} (et on peut prouver que cette borne supérieure est le max décrit précédemment).

$$-\left(\sup_{[a,b]} |f| \right) |g| \leq fg \leq \left(\sup_{[a,b]} |f| \right) |g|.$$

Par croissance de l'intégrale, on en déduit :

$$-\left(\sup_{[a,b]} |f| \right) \int_a^b |g| \leq \int_a^b fg \leq \int_a^b \left(\sup_{[a,b]} |f| \right) |g| = \left(\sup_{[a,b]} |f| \right) \int_a^b |g|.$$

D'où :

$$\left| \int_a^b fg \right| \leq \sup_{[a,b]} |f| \int_a^b |g|.$$

Cas particulier ($f = 1$) $\left| \int_a^b g \right| \leq \int_a^b |g|.$

$$g = 1 : \left| \int_a^b f \right| \leq \sup_{[a,b]} |f| \int_a^b 1 = \sup_{[a,b]} |f| (b-a).$$

D'où :

$$\frac{1}{b-a} \left| \int_a^b f \right| \leq \sup_{[a,b]} |f|.$$

3.2 Cas de nullité de l'intégrale d'une fonction continue positive

Proposition 6. *L'intégrale (sur $[a, b]$ avec $a < b$) d'une fonction continue positive est nulle ssi la fonction est identiquement nulle (sur $[a, b]$).*

Remarque 4. *On peut remplacer « positive » par « de signe constant ».*

Démonstration


\Leftarrow : Trivial.

\Rightarrow : Raisonnons par contraposée.

Supposons que f soit non identiquement nulle (et que f est positive continue) et montrons que

$$\int_a^b f \neq 0.$$

Il existe $x_0 \in [a, b]$ tel que $f(x_0) \neq 0$.



Exemple 4.

Ici,

$x_0 = 5$, $f(x_0) = 2$ et $\frac{f(x_0)}{2} = 1$.

On va minorer l'intégrale de f par l'aire du rectangle, ce qui montrera qu'elle est strictement positive donc non nulle.

f étant continue, il existe $\delta > 0$ tel que $f(x) \geq \frac{f(x_0)}{2}$ pour tout $x \in [a, b]$ tel que $|x - x_0| \leq \delta$.

(il suffit que $|f(x) - f(x_0)| \leq \epsilon$ avec $\epsilon = \frac{f(x_0)}{2}$).

Quitte à diminuer δ , on peut supposer que $[x_0 - \delta, x_0 + \delta] \subset [a, b]$, sauf si $x_0 \in \{a, b\}$.

Ainsi, pour $x_0 \neq a$ et $x_0 \neq b$:

$$\begin{aligned} \int_a^b f &= \int_a^{x_0-\delta} f + \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f + \int_{x_0+\delta}^b f \text{ (Chasles)} \\ &\geq 0 + 2\delta \frac{f(x_0)}{2} + 0 \\ &> 0 \end{aligned}$$

Si $x_0 = a$:

$$\begin{aligned} \int_a^b f &= \int_a^{a+\delta} f + \int_{a+\delta}^b f \text{ (Chasles)} \\ &\geq \delta \frac{f(x_0)}{2} + 0 \\ &> 0 \end{aligned}$$

On raisonne de même si $x_0 = b$.

Dans tous ces cas, $\int_a^b f \neq 0$.

3.3 Inégalité de Cauchy-Schwarz

Proposition 7. Soient $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a < b$.

Soient $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ c.p.m.

Alors $\left| \int_a^b fg \right| \leq \sqrt{\int_a^b f^2} \sqrt{\int_a^b g^2}.$

Cas d'égalité Si f et g sont continues :

$$\left| \int_a^b fg \right| = \sqrt{\int_a^b f^2} \sqrt{\int_a^b g^2} \Leftrightarrow f \text{ et } g \text{ sont colinéaires.}$$

Démonstration : cf algèbre.


3.4 Sommes de Riemann

Définition 4. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$.

Soit $\xi = (\xi_i)_{0 \leq i \leq n}$ une subdivision de $[a, b]$.

Soit $\omega = (\omega_i)_{0 \leq i \leq n-1}$ une famille de réels telle que $\forall i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, \omega_i \in [\xi_i, \xi_{i+1}]$.

On note $S(f, \xi, \omega) = \sum_{i=0}^{n-1} (\xi_{i+1} - \xi_i) f(\omega_i)$, nombre qu'on appelle somme de Riemann associée à f, ξ, ω .



Exemple 5.

Ici, $(\xi_0, \xi_1, \xi_2, \xi_3) = (1, 3, 6, 8)$.

$(\omega_0, \omega_1, \omega_2) = (2, 4, 7)$.

$S(f, \xi, \omega)$ correspond à l'aire du domaine colorié en rouge.

Proposition 8. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue.

Soit $\epsilon > 0$.

Il existe $\delta > 0$ tel que pour toute subdivision $\xi = (\xi_i)_{0 \leq i \leq n}$ de $[a, b]$ de pas inférieur à δ , pour toute famille $\omega = (\omega_i)_{0 \leq i \leq n-1}$ telle que $\forall i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, \omega_i \in [\xi_i, \xi_{i+1}]$:

$$|S(f, \xi, \omega) - \int_a^b f| \leq \epsilon.$$

Autre énoncé :

Si (u_n) est une suite de sommes de Riemann associée à une suite de subdivisions dont le pas tend vers 0, alors (u_n) converge vers $\int_a^b f$.

Démonstration (de la première forme)

$$\begin{aligned}
|S(f, \xi, \omega) - \int_a^b f| &= \left| \sum_{i=0}^{n-1} (\xi_{i+1} - \xi_i) f(\omega_i) - \sum_{i=0}^{n-1} \int_{\xi_i}^{\xi_{i+1}} f \right| \\
&= \left| \sum_{i=0}^{n-1} [(\xi_{i+1} - \xi_i) f(\omega_i) - \int_{\xi_i}^{\xi_{i+1}} f] \right| \\
&\leq \sum_{i=0}^{n-1} |(\xi_{i+1} - \xi_i) f(\omega_i) - \int_{\xi_i}^{\xi_{i+1}} f|
\end{aligned}$$


Pour $i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$:

$$\int_{\xi_i}^{\xi_{i+1}} f \leq \max_{f|_{[\xi_i, \xi_{i+1}]}} \int_{\xi_i}^{\xi_{i+1}} 1.$$

Ainsi :

$$(\xi_{i+1} - \xi_i) \min_{[\xi_i, \xi_{i+1}]} f \leq \int_{\xi_i}^{\xi_{i+1}} f \leq (\xi_{i+1} - \xi_i) \max_{[\xi_i, \xi_{i+1}]} f.$$

Notons α_i un des éléments de $[\xi_i, \xi_{i+1}]$ où $f|_{[\xi_i, \xi_{i+1}]}$ atteint son min et β_i un des éléments de $[\xi_i, \xi_{i+1}]$ où $f|_{[\xi_i, \xi_{i+1}]}$ atteint son max.



Exemple 6.

Ici, $\xi_i = 1$, $\xi_{i+1} = 8$, $\omega_i = 4$, $\alpha_i = 5$ et $\beta_i = 3$.

$$(\xi_{i+1} - \xi_i)(f(\omega_i) - f(\beta_i)) \leq (\xi_{i+1} - \xi_i)f(\omega_i) - \int_{\xi_i}^{\xi_{i+1}} f \leq (\xi_{i+1} - \xi_i)(f(\omega_i) - f(\alpha_i)).$$

Ainsi :

$$|(\xi_{i+1} - \xi_i)f(\omega_i) - \int_{\xi_i}^{\xi_{i+1}} f| \leq (\xi_{i+1} - \xi_i) \max(f(\omega_i) - f(\alpha_i), f(\beta_i) - f(\omega_i)).$$

Or f , étant continue sur le segment $[a, b]$, y est uniformément continue par le théorème de Heine. Ainsi, $\exists \delta > 0$ tel que

$$\forall x, y \in [a, b], |y - x| \leq \delta \Rightarrow |f(y) - f(x)| \leq \frac{\epsilon}{b - a}.$$

Si le pas de ξ est inférieur à δ , alors $\forall i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$:

$$|\omega_i - \alpha_i| \leq \delta \text{ et } |\omega_i - \beta_i| \leq \delta.$$

D'où :

$$\begin{aligned} |S(f, \xi, \omega) - \int_a^b f| &\leq \sum_{i=0}^{n-1} (\xi_{i+1} - \xi_i) \times \frac{\epsilon}{b-a} \\ &\leq \frac{\epsilon}{b-a} \times (\xi_1 - \xi_0 + \xi_2 - \xi_1 + \dots + \xi_n - \xi_{n-1}) \\ &\leq \frac{\epsilon}{b-a} \times (\xi_n - \xi_0) \text{ (somme télescopique)} \\ &\leq \frac{\epsilon}{b-a} \times (b-a) = \epsilon. \end{aligned}$$

Exemple 7. Déterminons $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}$.

Soit $n \in \mathbb{N}$, $n > 0$.

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{n(1 + \frac{k}{n})} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \text{ avec } f : x \mapsto \frac{1}{1+x} \\ &= S(f, \xi, \omega). \end{aligned}$$

avec $\xi = (0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, \frac{n}{n} = 1)$ et $\omega = (\frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, \frac{n}{n} = 1)$.

Ainsi : $\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f$ car le pas de ξ , égal à $\frac{1}{n}$, tend vers 0 et f est continue sur $[0, 1]$.

De plus, $\int_0^1 \frac{dx}{1+x} = [\ln(1+x)]_0^1 = \ln(2)$.

Conclusion : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \ln(2)$.

3.5 Intersion des bornes

Définition 5. Pour $a > b$, et $f : [b, a] \rightarrow \mathbb{R}$ c.p.m., on pose :

$$\boxed{\int_a^b f = - \int_b^a f},$$

et pour $a = b$, $\int_a^a f = 0$.

Proposition 9. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ (I intervalle de \mathbb{R}) continue par morceaux sur tout segment de I . Soit $a, b, c \in I$.

Alors

$$\int_a^b f + \int_b^c f = \int_a^c f \text{ (Chasles).}$$

4 Intégration et dérivation

4.1 Primitives

Définition 6. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ (I : intervalle non trivial).

Une fonction $F : I \rightarrow \mathbb{K}$ est appelée une primitive de f ssi $F' = f$.

Proposition 10. Si f admet une primitive F_0 sur un intervalle I , l'ensemble de toutes ses primitives est $\{F_0 + \lambda, \lambda \in \mathbb{K}\}$.

Démonstration :

Soit $F : I \rightarrow \mathbb{K}$.

$$\begin{aligned} F \text{ primitive de } f &\Leftrightarrow F \text{ dérivable et } F' = f \\ &\Leftrightarrow F \text{ dérivable et } (F - F_0)' = 0 \\ &\Leftrightarrow F - F_0 = \text{cte} = \lambda \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Remarque 5. Si I n'est pas un intervalle, le résultat est faux.

Par exemple, $\{ \text{primitives de } x \mapsto \frac{1}{x} \text{ sur } \mathbb{R}^* \} = \{ x \mapsto \begin{cases} \ln(x) + \lambda_1 & \text{si } x > 0 \\ \ln(-x) + \lambda_2 & \text{si } x < 0 \end{cases}, (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{K}^2 \}$.

4.2 Théorème d'existence de primitives pour une fonction continue

Proposition 11. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue sur un intervalle non trivial I .

$$\begin{array}{ccc} F & : & I \rightarrow \mathbb{R} \\ \text{Soit } a \in I \text{ et} & & x \mapsto \int_a^x f(t)dt \end{array}$$

Alors F est l'unique primitive de f s'annulant en a .

Corollary 1. Toute fonction continue sur un intervalle non trivial admet une infinité de primitives.

Démonstration de la proposition

$F(a) = 0$ et il existe au plus une primitive de f s'annulant en a puisque de telles primitives diffèrent d'une constante, nulle en a donc nulle partout.

Montrons que F est dérivable et que $F' = f$.

Soient $x_0 \in I$, $h \in \mathbb{R}$ tel que $x_0 + h \in I$.

$$\begin{aligned} F(x_0 + h) - F(x_0) &= \int_a^{x_0+h} f(t)dt - \int_a^{x_0} f(t)dt \\ &= \int_{x_0}^{x_0+h} f(t)dt \\ &= \int_{x_0}^{x_0+h} f(x_0)dt + \int_{x_0}^{x_0+h} (f(t) - f(x_0))dt \\ &= hf(x_0) + \int_{x_0}^{x_0+h} (f(t) - f(x_0))dt \end{aligned}$$

Pour $h \neq 0$:

$$\begin{aligned}
\left| \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} - f(x_0) \right| &= \left| \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} (f(t) - f(x_0)) dt \right| \\
&\leq \frac{1}{|h|} \int_J |f(t) - f(x_0)| \text{ où } J = [x_0, x_0 + h] \cup [x_0 + h, x_0] \\
&\leq \frac{1}{|h|} \sup_{t \in J} |f(t) - f(x_0)| \int_J 1 \\
&\leq \frac{1}{|h|} \sup_{t \in J} |f(t) - f(x_0)| |h| \\
&\leq \sup_{t \in J} |f(t) - f(x_0)|.
\end{aligned}$$

Or, comme $f(t) \xrightarrow[t \rightarrow x_0]{} f(x_0)$ par continuité de f , $\sup_{t \in J} |f(t) - f(x_0)| \xrightarrow[h \rightarrow 0]{} 0$.

Ainsi $\frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} - f(x_0) \xrightarrow[h \rightarrow 0]{} 0$ par le théorème de l'encadrement.

Donc F est dérivable en x_0 et $F'(x_0) = f(x_0)$.

4.3 Intégration à l'aide d'une primitive

Proposition 12. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue.

Soit F une primitive de f .

Soient $a, b \in I$.

Alors $\boxed{\int_a^b f = F(b) - F(a) \text{ noté } [F]_a^b.}$

Démonstration

$$\begin{aligned}
G &: I \rightarrow \mathbb{R} \\
\text{Soit } x &\mapsto \int_a^x f(t) dt.
\end{aligned}$$

G est une primitive de f , donc $\exists \lambda \in \mathbb{R}$ tel que $F = G + \lambda$.

$$\begin{aligned}
F(b) - F(a) &= G(b) + \lambda - (G(a) + \lambda) \\
&= G(b) - G(a) \\
&= \int_a^b f
\end{aligned}$$

Corollary 2. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ de classe \mathcal{C}^1 .

Soit $a \in I$.

Alors $\forall x \in I, \boxed{f(x) = f(a) + \int_a^x f'(t) dt.}$

Démonstration : $\int_a^x f'(t) dt = [f]_a^x = f(x) - f(a)$ car f est une primitive de f' .

4.4 Intégration par parties

Proposition 13. Soient $u, v : I \rightarrow \mathbb{R}$ de classe \mathcal{C}^1 .

Soient $a, b \in I$.

$$\boxed{\int_a^b u'v = [uv]_a^b - \int_a^b uv'.}$$

Démonstration : $\int_a^b u'v + \int_a^b uv' = \int_a^b (uv)' = [uv]_a^b.$

4.5 Changement de variables

Proposition 14. Soit $f : J \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur un intervalle non trivial J .

Soit $\varphi : I \rightarrow J$ de classe C^1 sur I (intervalle non trivial).

Soient $a, b \in I$.

$$\int_a^b (f \circ \varphi)(t) \varphi'(t) dt = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) dx.$$

Démonstration :

$$\begin{aligned} \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) dx &= [F(x)]_{x=\varphi(a)}^{x=\varphi(b)} \text{ où } F \text{ désigne une primitive de } f \\ &= F(\varphi(b)) - F(\varphi(a)) \\ &= [(F \circ \varphi)(t)]_{t=a}^{t=b} \\ &= \int_a^b (F \circ \varphi)'(t) dt \\ &= \int_a^b (F' \circ \varphi)(t) \times \varphi'(t) dt \\ &= \int_a^b (f \circ \varphi)(t) \times \varphi'(t) dt \end{aligned}$$

Remarque 6. Dans la pratique, on confond la variable x et la fonction φ et on remplace dx par :

- $\varphi'(t)dt$ en maths
- $\frac{dx}{dt}dt$ en physique.

Exemple 8. Changements de variables affines $x = \varphi(t) = \lambda t + \mu (\lambda \neq 0)$.

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = \int_{\frac{\alpha-\mu}{\lambda}}^{\frac{\beta-\mu}{\lambda}} f(\lambda t + \mu) \lambda dt$$

On a posé : $\begin{cases} x = \lambda t + \mu \\ dx = \lambda dt \end{cases}$

Cas particulier :

1. $\lambda = -1, \mu = 0$.

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = \int_{-\alpha}^{-\beta} f(-t) d(-t)$$

On a posé : $\begin{cases} x = -t \\ dx = -dt \end{cases}$

Si f est impaire et que $\alpha = -\beta$,

$$\int_{-\beta}^{\beta} f(x)dx = \int_{\beta}^{-\beta} (-f(t))(-dt) = - \int_{-\beta}^{\beta} f(t)dt.$$

$$D'où : 2 \int_{-\beta}^{\beta} f(x)dx = 0.$$

2. $\lambda = 1$, μ quelconque.

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx = \int_{\alpha-\mu}^{\beta-\mu} f(t+\mu)dt$$

$$On a posé : \begin{cases} x = t + \mu \\ dx = dt \end{cases}$$

$$Si f est \mu\text{-périodique}, \int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx = \int_{\alpha-\mu}^{\beta-\mu} f(t)dt.$$

Exemple 9. Soient $a, b > 1$.

$$Calculer I = \int_a^b \frac{\ln(x)^{\beta}}{x} dx. (\beta \neq -1)$$

$$On fait le changement de variable : \begin{cases} u = \ln(x) \\ du = \frac{dx}{x} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} I &= \int_{\ln(a)}^{\ln(b)} u^{\beta} du \\ &= \left[\frac{u^{\beta+1}}{\beta+1} \right]_{x=\ln(a)}^{x=\ln(b)} \text{ car } \beta \neq -1 \\ &= \frac{\ln(b)^{\beta+1} - \ln(a)^{\beta+1}}{\beta+1} \end{aligned}$$

Remarque 7. On pouvait aussi écrire $\frac{(\ln(x))^{\beta}}{x} = \frac{d}{dx} \left(\frac{\ln(x)^{\beta+1}}{\beta+1} \right)$.

(le théorème de changement de variable équivaut au théorème de dérivation de fonctions composées).

Mais il est plus facile d'écrire 10 changements de variables successifs que de reconnaître la dérivée d'une composée de 11 fonctions.

4.6 Formule de Taylor avec reste intégral

Proposition 15. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ de classe \mathcal{C}^{n+1} .

Soient $a, b \in I$.

$$Alors \boxed{f(b) = f(a) + f'(a)(b-a) + f''(a)\frac{(b-a)^2}{2} + f'''(a)\frac{(b-a)^3}{6} + \dots + f^{(n)}(a)\frac{(b-a)^n}{n!} + \int_a^b f^{(n+1)}(t)\frac{(b-t)^n}{n!}dt.}$$

Démonstration :

Récurrence sur n et intégration par parties.

Soit $P(n) : \ll$ la formule est vraie à l'ordre n pour les fonctions $\mathcal{C}^{n+1} \gg$.

Vérifions $P(0)$.

Si f est \mathcal{C}^{0+1} on a bien

$$f(b) = f(a) + \int_a^b f'(t)\frac{(b-t)^0}{0!}dt.$$

Soit $n \in \mathbb{N}$.

Supposons $P(n)$.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ de classe \mathcal{C}^{n+2} .

Par hypothèse de récurrence :

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b-a) + f''(a)\frac{(b-a)^2}{2} + f'''(a)\frac{(b-a)^3}{6} + \dots + f^{(n)}(a)\frac{(b-a)^n}{n!} + \int_a^b f^{(n+1)}(t)\frac{(b-t)^n}{n!}dt.$$

Dans la dernière intégrale, nous allons dériver $f^{(n+1)}(t)$ et primitiver $\frac{(b-t)^n}{n!}$.

$$\begin{aligned} \int_a^b f^{(n+1)}(t)\frac{(b-t)^n}{n!}dt &= \left[-\frac{(b-t)^{n+1}}{(n+1)!}f^{(n+1)}(t)\right]_a^b - \int_a^b -\frac{(b-t)^{n+1}}{(n+1)!}f^{(n+2)}(t)dt \\ &= -0 + \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!}f^{(n+1)}(a) + \int_a^b \frac{(b-t)^{n+1}}{(n+1)!}f^{(n+2)}(t)dt \end{aligned}$$

Donc $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion : $\forall n \in \mathbb{N}, P(n)$.

Remarque 8. *L'intérêt est d'obtenir des encadrements plus précis.*

Exemple 10. $f = \exp$, $a = 0$, $b = 1$.

$$\exp(1) = \exp(0) + \exp'(0)(1-0) + \exp''(0)\frac{(1-0)^2}{2!} + \dots + \exp^{(n)}(0)\frac{(1-0)^n}{n!} + \int_0^1 e^t \frac{(1-t)^n}{n!}dt$$

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} + \int_0^1 e^t \frac{(1-t)^n}{n!}dt$$

$$\text{On pose : } R_n = \int_0^1 e^t \frac{(1-t)^n}{n!}dt.$$

Majorons R_n .

$$\begin{aligned} R_n &\leq \int_0^1 e \frac{(1-t)^n}{n!}dt \text{ car } \forall t \in [0, 1], e^t \leq e^1 = e \text{ puisque } \exp \text{ croît} \\ &\leq e \left[-\frac{(1-t)^{n+1}}{(n+1)!} \right]_0^1 \\ &\leq e \left[-0 + \frac{1}{(n+1)!} \right]. \end{aligned}$$

Ainsi, $e \approx 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!}$, à $\frac{e}{(n+1)!}$ près.

4.7 Inégalité de Taylor-Lagrange

Proposition 16. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ ou \mathbb{C} de classe \mathcal{C}^{n+1} .

Soient $a, b \in I$.

$$f(b) = f(a) + f'(a)\frac{b-a}{1!} + \dots + f^{(n)}(a)\frac{(b-a)^n}{n!} + R_n$$

$$\text{avec } \boxed{|R_n| \leq \sup_{[a,b] \cup [b,a]} |f^{(n+1)}| \times \frac{|b-a|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Démonstration

Cas $a \leq b$:

$$\begin{aligned}
R_n &= \left| \int_a^b f^{(n+1)}(t) \frac{(b-t)^n}{n!} dt \right| \\
&\leq \sup_{[a,b]} |f^{(n+1)}| \times \int_a^b \left| \frac{(b-t)^n}{n!} \right| dt \text{ (inégalité de la moyenne)} \\
&\leq \sup_{[a,b]} |f^{(n+1)}| \times \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} dt \\
&\leq \sup_{[a,b]} |f^{(n+1)}| \times \left[-\frac{(b-t)^{n+1}}{(n+1)!} \right]_a^b \\
&\leq \sup_{[a,b]} |f^{(n+1)}| \times \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!}
\end{aligned}$$

Cas $a \geq b$:

$$\begin{aligned}
R_n &= \left| \int_a^b f^{(n+1)}(t) \frac{(b-t)^n}{n!} dt \right| \\
&\leq \sup_{[b,a]} |f^{(n+1)}| \times \int_b^a \left| \frac{(b-t)^n}{n!} \right| dt \text{ (inégalité de la moyenne)} \\
&\leq \sup_{[b,a]} |f^{(n+1)}| \times \int_b^a \frac{(t-b)^n}{n!} dt \\
&\leq \sup_{[b,a]} |f^{(n+1)}| \times \left[\frac{(t-b)^{n+1}}{(n+1)!} \right]_b^a \\
&\leq \sup_{[b,a]} |f^{(n+1)}| \times \frac{(a-b)^{n+1}}{(n+1)!} \\
&\leq \sup_{[b,a]} |f^{(n+1)}| \times \frac{|b-a|^{n+1}}{(n+1)!}.
\end{aligned}$$

Exemple 11. $f = \sin$, $n = 4$, $a = 0$, $b = x$.

$$\sin(x) = \sin(0) + \sin'(0)x + \sin''(0) \times \frac{x^2}{2} + \sin'''(0) \times \frac{x^3}{6} + \sin^{(4)}(0) \times \frac{x^4}{24} + R_4, \text{ c'est-à-dire}$$

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + R_4 \text{ avec } |R_4| \leq \sup_{[0,x] \cup [x,0]} |\sin^{(5)}| \times \frac{|x|^5}{5!} \leq \frac{|x|^5}{120}.$$

5 Intégration des fonctions à valeurs complexes

5.1 Définition de l'intégrale

Définition 7. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ continue par morceaux.

On appelle intégrale de f :

$$\boxed{\int_a^b f = \int_a^b \operatorname{Re}(f) + i \int_a^b \operatorname{Im}(f).}$$

Remarque 9. f est c.p.m. ssi $\operatorname{Re}(f)$ et $\operatorname{Im}(f)$ sont c.p.m.

5.2 Propriétés

On retrouve les propriétés usuelles : Linéarité, relations de Chasles, intégration par parties, changement de variables ($\int (f \circ \varphi) \varphi'$ avec φ à valeurs réelles et f à valeurs complexes).

La positivité et la croissance n'ont plus de sens.

Démontrons l'inégalité

$$\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f| \quad (a < b).$$

On pose $\int_a^b f = \rho e^{i\theta}$.

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f \right| &= \rho = e^{-i\theta} \int_a^b f \\ &= \int_a^b e^{-i\theta} f \\ &= \operatorname{Re} \int_a^b e^{-i\theta} f \quad (\rho \text{ est réel, donc } \rho = \operatorname{Re}(\rho)) \\ &= \int_a^b \operatorname{Re}(e^{-i\theta} f) \quad \text{par définition de l'intégrale} \\ &\leq \int_a^b |e^{-i\theta} f| \quad \text{car } \forall z \in \mathbb{C}, \operatorname{Re}(z) \leq |z| \text{ et car l'intégrale est croissante} \\ &= \int_a^b |f| \end{aligned}$$

Remarque 10. On a utilisé $\operatorname{Re} \int f = \int \operatorname{Re} f$.

De même : $\operatorname{Im} \int f = \int \operatorname{Im} f$.

Sommes de Riemann : même résultat que pour les fonctions de \mathbb{R} dans \mathbb{R} .

Intégrales et primitives, intégrations par parties, formule de Taylor avec reste intégral, inégalité de Taylor-Lagrange : mêmes résultats.