

CORPS DES NOMBRES RÉELS

- On désigne par \mathbb{N} l'ensemble des entiers naturels:

$$\mathbb{N} = \{ 0, 1, 2, 3, \dots \}.$$

- On désigne par \mathbb{Z} l'ensemble des entiers relatifs

$$\mathbb{Z} = \{ \dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots \}.$$

- L'ensemble \mathbb{Q} des nombres rationnels est l'ensemble des nombres x représentés par la «fraction» $\frac{p}{q}$, avec p appartenant à \mathbb{Z} et q appartenant à $\mathbb{Z} \setminus \{ 0 \}$.

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z} \text{ et } q \in \mathbb{Z} \setminus \{ 0 \} \right\}.$$

Nous admettrons que, devant les insuffisances du corps \mathbb{Q} , on a su définir un nouveau corps appelé «corps des nombres réels» et noté \mathbb{R} , contenant \mathbb{Q} comme sous-corps et encore muni d'une relation d'ordre prolongeant celle définie sur \mathbb{Q} . Nous allons en énumérer les propriétés et montrer qu'elles se retrouvent aussi dans d'autres ensembles.

2.1 STRUCTURES

Il y a tout d'abord un groupe de formule purement algébriques relatives aux deux opérations fondamentales ; elle s'appliquent aux nombres rationnels, aux nombres réels et aux nombres complexes et expriment que, muni de ces deux opérations, \mathbb{R} ou \mathbb{C} est, comme \mathbb{Q} , un *corps* comme on dit en algèbre.

§1 La structure de groupe commutatif

Soit E un ensemble. Une **loi de composition interne** sur E est une application de $E \times E$ dans E .

Si \star est le symbole de l'opération, à tous éléments x et y de E on associe par l'opération leur **composé** $x \star y$.

- L'opération \star sur E est **associative** lorsqu'elle vérifie pour tous x, y, z de E :

$$(x \star y) \star z = x \star (y \star z).$$

- L'opération \star sur E est **commutative** lorsqu'elle vérifie pour tous x, y de E :

$$x \star y = y \star x.$$

- Un élément e de E est **neutre** pour l'opération \star lorsque pour tout x de E , on a

$$e \star x = x \text{ et } x \star e = x.$$

Si la loi \star est commutative, les deux conditions sont équivalentes.

Test 1

1. Justifier que la soustraction est une loi de composition interne sur \mathbb{R} .
2. Est-elle associative? Est-elle commutative?

Soit E un ensemble muni d'une loi associative \star et pourvue d'un élément neutre e .

- Soit x un élément de E . On dit que y est **symétrique** de x lorsque

$$x \star y = e \quad \text{et} \quad y \star x = e.$$

- On dit que la loi \star confère à E une structure de **groupe** lorsque tout élément de E possède un symétrique pour cette opération.
- Si E est un groupe pour la loi \star supposée commutative, on dit que E est un **groupe commutatif** ; on dit aussi que E est un groupe **abélien**.

Exemple 2

Pour l'addition, \mathbb{R} possède la structure de groupe commutatif.

- Dans \mathbb{R} , l'élément neutre pour l'addition est 0.
- Le symétrique de x pour l'addition est l'opposé, noté $-x$.
- On note simplement $a - b$ pour $a + (-b)$.

Test 3

1. Montrer que la multiplication \times est une loi de composition interne sur \mathbb{R}^* . Est-elle associative?
2. Montrer que \mathbb{R}^* possède un élément neutre pour \times . Donner sa valeur.
3. Tout élément de \mathbb{R}^* possède-t-il un inverse pour \times ?
4. Que peut-on déduire des questions précédentes?

Test 4

Les couples suivants sont-ils des groupes?

1. $(\mathbb{N}, +)$.
2. (\mathbb{C}, \times) .
3. (\mathbb{Z}, \times) .

§2 La structure de corps

- L'opération \star est **distributive** par rapport à l'opération \circ lorsqu'elle vérifie pour tous x, y, z

$$(x \circ y) \star z = (x \star z) \circ (y \star z) \quad \text{et} \quad z \star (x \circ y) = (z \star x) \circ (z \star y).$$

- Soit E un ensemble muni de deux lois de composition interne appelées addition et multiplication. On dit que ces deux lois confèrent à E la structure d'**anneau** lorsque l'addition confère à E la structure de groupe commutatif et que la multiplication est associative, munie d'un élément neutre, et distributive par rapport à l'addition. Cet anneau est dit **commutatif** lorsque la multiplication est commutative.
- Soit \mathbb{K} un anneau commutatif. On dit que \mathbb{K} est un **corps** lorsque les éléments neutres pour les deux opérations sont distincts et que tout élément non nul de \mathbb{K} possède un inverse.

Lorsque \mathbb{K} est un corps, on note \mathbb{K}^* l'ensemble des éléments non nuls de \mathbb{K} : c'est un groupe pour la multiplication.

§3 Le corps des nombres réels

Axiome 5

L'ensemble \mathbb{R} est muni d'une première loi de composition interne, l'**addition** notée « $+$ », qui possède les propriétés suivantes:

- L'addition des nombres réels est **associative**

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, (x + y) + z = x + (y + z).$$

On note cette somme $x + y + z$.

- L'ensemble \mathbb{R} des nombres réels possède un **élément neutre pour l'addition**. Cet élément est noté 0:

$$\forall x \in \mathbb{R}, x + 0 = 0 + x = x.$$

- Pour tout nombre réel x , il existe un nombre réel x' tel que $x + x' = 0$ (x' est unique).

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists x' \in \mathbb{R}, x + x' = 0.$$

Le nombre x' est noté $-x$ et est appelé l'**opposé** de x .

- La loi de composition interne « $+$ » est **commutative** dans \mathbb{R} :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x + y = y + x.$$

L'ensemble \mathbb{R} est muni d'une second loi de composition interne, la **multiplication**, notée ou bien « \times » ou bien, plus simplement par juxtaposition. À tout couple (x, y) de nombres réels, cette loi fait correspondre le nombre réel $z = x \times y = xy$.

- La multiplications des nombres réels est **associative**.

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x(yz) = (xy)z = xyz.$$

- Le nombre réel 1, qui est différent de 0, est neutre pour la multiplication.

$$\forall x \in \mathbb{R}, x \times 1 = 1 \times x = x.$$

- Tout nombre réel *sauf* 0 admet un inverse pour la multiplication.

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \exists x' \in \mathbb{R}, xx' = x'x = 1.$$

x' est appelé l'**inverse** de x ; on le note $\frac{1}{x}$ ou x^{-1} .

- La multiplication dans \mathbb{R} est une opération **commutative**.

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, xy = yx.$$

De plus, ces propriétés sont liées par la propriété de **distributivité** de la la multiplication par rapport à l'addition :

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x.(y + z) = x.y + x.z \text{ et } (x + y).z = x.z + y.z.$$

Ainsi, le triplet $(\mathbb{R}, +, .)$ est un corps.

Notation

$$\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Définition 6

Dans l'ensemble \mathbb{R} des nombre réels, l'opération réciproque de l'addition est définie par l'application

$$\begin{aligned} \mathbb{R} \times \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ (a, b) &\mapsto b + (-a) \end{aligned}.$$

On note cette loi de composition interne par le signe « $-$ », et on l'appelle la **soustraction**.

Remarque

1. La loi « $+$ » est associative. La loi « $-$ » n'est pas associative.
2. La loi « $+$ » est commutative. La loi « $-$ » n'est pas commutative.

3. La loi «+» admet dans \mathbb{R} un élément neutre. La loi «-» n'admet pas dans \mathbb{R} d'élément neutre.

Définition 7

L'opération réciproque de la multiplication est la **division**, définie sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$ par

$$\begin{aligned} \mathbb{R} \times \mathbb{R}^* &\rightarrow \mathbb{R} \\ (a, b) &\mapsto a \times \frac{1}{b} \end{aligned} .$$

Le **quotient** x de a par b est noté $x = \frac{a}{b} = a/b$.

Théorème 8

La nullité du produit de deux nombres réels implique celle d'un facteur au moins:

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, xy = 0 \iff (x = 0 \text{ ou } y = 0) .$$

Plus généralement, pour qu'un produit de facteurs soit nul, il faut et il suffit que l'un au moins des facteurs soit nul.

Démonstration. Supposons $x = 0$, puisque $x = 0 = 0 + 0 = x + x$,

$$xy = (x + x)y = xy + xy$$

et donc

$$xy - (xy) = 0 = xy + xy - (xy) = xy.$$

Ainsi $xy = 0$. En supposant $y = 0$, on aurait démontré de même que $xy = 0$.

Réciproquement, supposons

$$x \neq 0 \text{ et } xy = 0;$$

le nombre x , n'étant pas nul, admet un inverse $\frac{1}{x}$; xy étant nul, on a

$$\frac{1}{x} (xy) = \frac{1}{x} \times 0 = 0;$$

le premier membre devient par associativité:

$$\left(\frac{1}{x} \times x \right) \times y = 1 \times y = y.$$

On a donc $y = 0$. En supposant $y \neq 0$ et $xy = 0$, on aurait démontré de même que $x = 0$. ■

Exemple 9

Déterminer les réels $x \in \mathbb{R}$ vérifiant

$$x^2 - 5x + 6 = 0.$$

On peut écrire

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3).$$

Ainsi

$$x^2 - 5x + 6 = 0 \iff (x - 2)(x - 3) = 0$$

$$\iff x - 2 = 0 \text{ ou } x - 3 = 0$$

2.2 RELATION D'ORDRE SUR \mathbb{R}

§1 Ordre total sur \mathbb{R}

Définition 10

L'ensemble \mathbb{R} est muni d'une relation notée \leq . Cette relation entre deux réels, $x \leq y$, ou $y \geq x$, se lit « x est inférieur ou égal à y », « x est au plus égal à y », « y est supérieur ou égal à x », « y est au moins égal à x ».

Cette relation englobe le cas d'égalité; pour l'exclure on utilise la relation $x < y$ qui se lit « x est strictement inférieur à y », ou « y est strictement supérieur à x ».

$$x < y \iff x \leq y \text{ et } x \neq y.$$

On a donc

$$x \leq y \iff x < y \text{ ou } x = y.$$

Notation

$$\begin{aligned} \mathbb{R}_+ &= \{ x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0 \} & \mathbb{R}_- &= \{ x \in \mathbb{R} \mid x \leq 0 \} & \mathbb{R}^\star &= \{ x \in \mathbb{R} \mid x \neq 0 \} \\ \mathbb{R}_+^\star &= \{ x \in \mathbb{R} \mid x > 0 \} & \mathbb{R}_-^\star &= \{ x \in \mathbb{R} \mid x < 0 \} \end{aligned}$$

Proposition 11

On dit que la relation \leq est une **relation d'ordre total** sur \mathbb{R} , ce qui signifie que

- La relation \leq sur \mathbb{R} est **réflexive**:

$$\forall x \in \mathbb{R}, x \leq x.$$

- La relation \leq sur \mathbb{R} est **antisymétrique**:

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (x \leq y \text{ et } y \leq x) \implies x = y.$$

- La relation \leq sur \mathbb{R} est **transitive**:

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, (x \leq y \text{ et } y \leq z) \implies x \leq z.$$

- La relation \leq sur \mathbb{R} est **totale**:

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x \leq y \text{ ou } y \leq x.$$

Test 12

- La relation $<$ sur \mathbb{R} est-elle réflexive?
- La relation $<$ sur \mathbb{R} est-elle transitive?
- La relation $<$ sur \mathbb{R} est-elle totale?
- ☕ La relation $<$ sur \mathbb{R} est-elle antisymétrique?

§2 Compatibilité de l'ordre et des opérations

On a les trivialités fort utiles suivantes.

Proposition 13

1. Pour comparer deux nombres réels, on peut étudier le signe de leur différence.

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x \leq y \iff y - x \geq 0.$$

2. La relation d'ordre sur \mathbb{R} est compatible avec l'addition.

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x \leq y \iff x + z \leq y + z.$$

3. La relation d'ordre sur \mathbb{R} est compatible avec la multiplication par les réels positifs.

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, (z \geq 0 \text{ et } x \leq y) \implies xz \leq yz.$$



Nous n'insisterons jamais assez sur le piège tendu par l'assertion 13.3. En effet, on voit encore des gens affirmer

$$\frac{a}{b} \leq 1 \implies a \leq b,$$

sans prendre garde au signe de b .

Lemme 14

Soit $x \geq 0$ et $y \geq 0$, alors

$$x \leq y \iff x^2 \leq y^2 \quad \text{et} \quad x < y \iff x^2 < y^2.$$

En d'autres termes, on dit que la fonction $x \mapsto x^2$ est strictement croissante sur $[0, +\infty[$.

Démonstration. Si $x \leq y$, alors

$$\begin{aligned} x \times x &\leq x \times y && \because x \geq 0 \\ &\leq y \times y && \because y \geq 0. \end{aligned}$$

Si $x \leq y$ est faux, c'est-à-dire $y < x$, alors nécessairement $x > 0$ et

$$\begin{aligned} y \times y &\leq x \times y && \because y \geq 0 \\ &< x \times x && \because x > 0. \end{aligned}$$

c'est-à-dire $x^2 \leq y^2$ est faux.

Les assertions $(x \leq y)$ et $(x^2 \leq y^2)$ ont donc même valeur de vérité, on peut donc écrire

$$x < y \iff x^2 < y^2.$$

La seconde équivalence se prouve de manière analogue (ou plus rapidement avec un peu de logique). ■

§3 Valeur absolue

Définition 15

Pour $x \in \mathbb{R}$, on appelle **valeur absolue** de x le réel

$$|x| = \max \{ x, -x \} = \begin{cases} -x & x \leq 0 \\ x & x \geq 0 \end{cases}$$

Proposition 16

Soient x, y des réels et $a \in \mathbb{R}_+$.

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. On a $x \geq 0$; de plus
$x = 0$ si et seulement si $x = 0$. 2. $xy = x \cdot y$;
en particulier $-x = x$. 3. $x = y \iff (x = y \text{ ou } x = -y)$. 4. $x \leq a \iff -a \leq x \leq a$. 5. $x < a \iff -a < x < a$. | <ol style="list-style-type: none"> 6. $\sqrt{x^2} = x$ et $x ^2 = x^2$. 7. Si $x \neq 0$, alors $\left \frac{y}{x} \right = \frac{ y }{ x }$. 8. Si $n \in \mathbb{N}$, alors $x^n = x ^n$. 9. $\max(x, y) = \frac{1}{2}(x + y + x - y)$. 10. $\min(x, y) = \frac{1}{2}(x + y - x - y)$. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Il est important de savoir manipuler les inégalités avec valeurs absolues, par exemple

$$|x - a| \leq \epsilon \iff a - \epsilon \leq x \leq a + \epsilon$$

$$|x| \geq M \iff x \geq M \text{ ou } x \leq -M.$$

Remarque

Géométriquement, $|x - a|$ représente la distance entre x et a sur la «droite des réels».

Proposition 17



Inégalité triangulaire

Soient $x, y \in \mathbb{R}$. Alors

$$|x + y| \leq |x| + |y|$$

De plus, $|x + y| = |x| + |y|$ si et seulement si $xy \geq 0$.

Étant donné $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, une récurrence immédiate montre que l'on a toujours l'inégalité

$$\left| \sum_{k=1}^n x_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |x_k|.$$

Corollaire 18

Soient $x, y \in \mathbb{R}$. Alors

$$||x| - |y|| \leq |x \pm y| \leq |x| + |y|$$

§4 Axiome d'Archimède

Proposition 19

Caractère archimédien de \mathbb{R}

Pour tout réel x , il existe un entier $n \in \mathbb{Z}$ tel que $n > x$.

Démonstration. Si $x = n_0, \alpha_1 \alpha_2 \dots \geq 0$, alors on vérifie facilement que $n = n_0 + 1$ convient. Si $x = -n_0, \alpha_1 \alpha_2 \dots < 0$, alors $n = -n_0$ (ou même 0) convient. ■

§5 Partie entière

Définition 20

Soit $x \in \mathbb{R}$. Il existe un unique $n \in \mathbb{Z}$ tel que

$$n \leq x < n + 1.$$

On l'appelle **partie entière** de x et on le note $\lfloor x \rfloor$ ou $E(x)$.

Remarque

- La double inégalité $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$ s'écrit également

$$x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x.$$

- La partie entière de x est donc le plus grand entier inférieur ou égal à x . Autrement dit,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{Z}, (n \leq x \implies n \leq \lfloor x \rfloor).$$

Exemples 21

1. $\lfloor \pi \rfloor =$	3. $\lfloor 12 \rfloor =$	5. $\lfloor -23.8 \rfloor =$
2. $\lfloor 1.345 \rfloor =$	4. $\lfloor -5 \rfloor =$	6. $\lfloor 11.8 \rfloor =$



La partie entière n'est ni «l'entier sans la virgule», ni «l'entier le plus proche».

Proposition 22

1. La partie entière d'un réel est un entier

$$\forall x \in \mathbb{R}, \lfloor x \rfloor \in \mathbb{Z}.$$

2. Les nombres entiers sont les seuls égaux à leurs parties entières

$$\forall x \in \mathbb{R}, \lfloor x \rfloor = x \iff x \in \mathbb{Z}.$$

3. $\forall x \in \mathbb{R}, \forall m \in \mathbb{Z}, \lfloor x + m \rfloor = \lfloor x \rfloor + m.$

§6 Partie entière supérieure

Remarque

En informatique, on utilise fréquemment la **partie entière supérieure**, notée $\lceil x \rceil$, caractérisée par

$$\lceil x \rceil \in \mathbb{Z} \quad \text{et} \quad \lceil x \rceil - 1 < x \leq \lceil x \rceil$$

On a donc

$$\lceil x \rceil = \begin{cases} \lfloor x \rfloor + 1 & : x \notin \mathbb{Z} \\ \lfloor x \rfloor & : x \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

§7 Valeur approchée d'un réel

Rappel

Un nombre décimal est un nombre rationnel de la forme $\frac{a}{10^p}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $p \in \mathbb{N}$. L'ensemble des nombres décimaux se note \mathbb{D} .

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $p \in \mathbb{N}$. On a

$$\lfloor x \times 10^p \rfloor \leq x \times 10^p < \lfloor x \times 10^p \rfloor + 1$$

D'où, en divisant chaque membre par 10^p on trouve

$$\frac{\lfloor x \times 10^p \rfloor}{10^p} \leq x < \frac{\lfloor x \times 10^p \rfloor}{10^p} + \frac{1}{10^p}.$$

Proposition 23

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $p \in \mathbb{N}$. Alors

1. $\frac{\lfloor x \times 10^p \rfloor}{10^p}$ est un nombre décimal approchant x à 10^{-p} près par défaut.
2. $\frac{\lfloor x \times 10^p \rfloor + 1}{10^p}$ est un nombre décimal approchant x à 10^{-p} près par excès.

On peut donc approcher n'importe quel nombre réel aussi près que l'on souhaite par des nombres décimaux.¹

Exemple 24

Le nombre de Neper $e = 2.7182818284590 \dots$ peut être successivement encadré par

$2 \leq e < 3$	valeurs approchées à 10^0 près par défaut et par excès.
$2.7 \leq e < 2.8$	valeurs approchées à 10^{-1} près par défaut et par excès.
$2.71 \leq e < 2.72$	valeurs approchées à 10^{-2} près par défaut et par excès.
$2.718 \leq e < 2.719$	valeurs approchées à 10^{-3} près par défaut et par excès.
$2.7182 \leq e < 2.7183$	valeurs approchées à 10^{-4} près par défaut et par excès.

¹En anticipant la notion de suite, on dit souvent que tout nombre réel est limite d'une suite de rationnels.

§8 Densité

Proposition 25

- Si x et y sont deux réels tels que $x < y$, alors il existe un nombre rationnel, et même un nombre décimal z , tel que $x < z < y$.
- Si x et y sont deux réels tels que $x < y$, alors il existe un nombre irrationnel, tel que $x < z < y$.

§9 Partie bornée

Définition 26

Soit A une partie de \mathbb{R} .

- On dit qu'un réel M est un **majorant** de A si

$$\forall x \in A, x \leq M.$$

On dit alors que la partie A est **majorée**.

- On dit qu'un réel m est un **minorant** de A si

$$\forall x \in A, m \leq x.$$

On dit alors que la partie A est **minorée**.

- Une partie majorée et minorée est dite **bornée**.

La valeur absolue permet de caractériser facilement les parties bornées de \mathbb{R} .

Proposition 27

Une partie A de \mathbb{R} est bornée si et seulement si

$$\exists \mu \in \mathbb{R}_+, \forall x \in A, |x| \leq \mu.$$

Exemple 28

- \mathbb{R} _____.
- $[0, 1]$ _____.
- $]0, 1]$ _____.

Remarque

- Lorsqu'il existe, le maximum (resp. minimum) de A est un majorant (resp. minorant) de A .
- Lorsque M majore A , tout réel $M' \geq M$ majore aussi A .
- Lorsque m minore A , tout réel $m' \leq m$ minore aussi A .

§10 Plus grand élément, plus petit élément

Définition 29

Soit A une partie de \mathbb{R} .

- On dit que a est le **plus grand élément** de A ou le **maximum** de A si

$$a \in A \quad \text{et} \quad \forall x \in A, x \leq a \quad .$$

Lorsqu'il existe, le plus grand élément de A se note $\max(A)$.

- On dit que a est le **plus petit élément** de A ou le **minimum** de A si

$$a \in A \quad \text{et} \quad \forall x \in A, a \leq x \quad .$$

Lorsqu'il existe, le plus petit élément de A se note $\min(A)$.

L'ensemble A n'admet pas nécessairement de plus grand élément. Néanmoins, si il existe, c'est le **seul** élément de A ayant cette propriété ; car si on a aussi $x \leq b$ pour tout $x \in A$, alors $a \leq b$ et $b \leq a$, d'où $b = a$.

Proposition 30

Soit $x \in \mathbb{R}$, alors

$$\lfloor x \rfloor = \max \{ n \in \mathbb{Z} \mid n \leq x \} .$$

2.3 LE PREMIER DEGRÉ

Voici quelques rappels au sujet de problèmes du premier degré.

§1 L'équation $ax + b = 0$

On considère l'équation $ax + b = 0$ où $a, b \in \mathbb{R}$ et l'inconnue est $x \in \mathbb{R}$. On note \mathcal{S} l'ensemble des solution de cette équation.

- Si $a \neq 0$, l'équation a une solution unique $-b/a$.

$$ax + b = 0 \iff x = -\frac{b}{a}.$$

On a $\mathcal{S} = \{ -b/a \}$.

- Si $a = 0$,
 - si $b \neq 0$, l'équation n'a pas de solution. On a $\mathcal{S} = \emptyset$.
 - si $b = 0$, tout nombre réel en est solution. On a $\mathcal{S} = \mathbb{R}$.

§2 Système linéaire « 2×2 »

Commençons par deux équations très simples,

$$2x - y = 1 \quad (2.1)$$

$$x + y = 5. \quad (2.2)$$

Nous pouvons interpréter ce système *par lignes* ou *par colonnes*.

La première approche consiste à s'intéresser séparément à chaque équation (les *lignes*). L'équation $2x - y = 1$ est représentée par une droite dans le plan (Oxy). La seconde équation $x + y = 5$ est représentée par une seconde droite.

La seconde approche est de s'intéresser aux *vecteurs colonnes* du membre de gauche qui produisent le vecteur du membre de droite. Les deux équations s'écrivent sous forme d'une seule *équation vectorielle* :

$$x \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Le problème est alors de trouver la combinaison de vecteurs du membre de gauche qui produit le vecteur du membre de droite.

Les vecteurs $(2, 1)$ et $(-1, 1)$ sont représentés en gras. Les inconnues sont les scalaires x et y qui multiplient les vecteurs colonne. L'idée est d'additionner 2 fois la colonne 1 et 3 fois la colonne 2. Géométriquement, on trouve un parallélogramme. De manière algébrique, cela produit le bon vecteur $(1, 5)$, second membre de notre équation. Ce qui confirme la solution $x = 2, y = 3$.

Définition 31

Le **déterminant du système**

$$\begin{cases} ax + by = u \\ cx + dy = v \end{cases}$$

est le réel $ad - bc$, noté $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$.

Théorème 32

On considère le système

$$\begin{cases} ax + by = u \\ cx + dy = v \end{cases}$$

1. Si $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0$, alors le système admet une et une seule solution.

2. Si $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = 0$, alors

- le système admet aucune solution
- ou bien le système admet une infinité de solutions.

Exemples 33

Résoudre les systèmes suivants

$$1. \begin{cases} -3x + y = 9 \\ 4x - 3y = -17 \end{cases}.$$

$$2. \begin{cases} -3x & +y & = 9 \\ 6x & -2y & = -1 \end{cases} .$$

$$3. \begin{cases} -3x & +y & = 9 \\ 6x & -2y & = -18 \end{cases} .$$

2.4 PUISSANCES, RACINES

§1 Puissances entières

Définition 34

- Pour tout $a \in \mathbb{R}$, $a^0 = 1$.
- Pour tout $a \in \mathbb{R}$, et $n \in \mathbb{N}^*$, $a^n = a \cdot a \dots a$ (n facteurs).
- Pour tout $a \in \mathbb{R}^*$, et $n \in \mathbb{N}^*$, $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.

Proposition 35

Pour tous $a, b \in \mathbb{R}$ et $p, q \in \mathbb{N}$:

- | | |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. $a^p \cdot a^q = a^{p+q}$; | 6. $a^p / b^p = (a/b)^p$; |
| 2. $a^p / a^q = a^{p-q}$; | 7. $a > 1$ et $p < q \implies a^p < a^q$; |
| 3. Si $a \neq 0$, $a^{-p} = 1/a^p = (1/a)^p$; | 8. $0 < a < 1$ et $p < q \implies a^p > a^q$; |
| 4. $(a^p)^q = a^{pq}$; | 9. $p > 0$ et $0 < a < b \implies a^p < b^p$; |
| 5. $a^p b^p = (ab)^p$; | 10. $p < 0$ et $0 < a < b \implies a^p > b^p$. |

Ceci reste valable pour $a, b \in \mathbb{R}^*$ et $p, q \in \mathbb{Z}$.

Proposition 36

Pour tous $a, b \in \mathbb{R}$,

$$a^2 = b^2 \iff |a| = |b| \iff (a = b \text{ ou } a = -b).$$

§2 Racines

Définition 37

Étant donnée $a \in \mathbb{R}_+$, il existe un réel positif unique dont le carré est égale à a . On l'appelle la **racine carrée arithmétique** de a et on la note \sqrt{a} .

Plus généralement, pour tout $a \in \mathbb{R}_+$ et $n \in \mathbb{N}^*$, $\sqrt[n]{a}$ ou $a^{1/n}$ est l'unique réel positif b tel que $b^n = a$.

Proposition 38

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\sqrt{x^2} = |x|$.
2. Pour tous $a \geq 0$ et $b \geq 0$, $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$.
3. Pour tous $a \geq 0$ et $b > 0$, $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$.

§3 Second degré

Dans les rappels ci-dessous, $a, b, c \in \mathbb{R}$ et $a \neq 0$.
On considère l'équation

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad x \in \mathbb{R}. \quad (\text{E})$$

On pose $\Delta = b^2 - 4ac$; ce nombre est appelé le **discriminant** du trinome.

- Si $\Delta > 0$, (E) a deux solutions $\frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $\frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$;
- Si $\Delta = 0$, (E) a une et une seule solution $\frac{-b}{2a}$;
- Si $\Delta < 0$, (E) n'a pas de solutions.

Signe du trinome $ax^2 + bx + c$

- Si $\Delta > 0$:

x	$\frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$	$\frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$
$ax^2 + bx + c$	$\text{sgn}(a)$	$\text{sgn}(a)$

- Si $\Delta = 0$:

x	$\frac{-b}{2a}$
$ax^2 + bx + c$	$\text{sgn}(a)$

- Si $\Delta < 0$: partout le signe de a .

Pour résumé: $ax^2 + bx + c$ a le signe de a , sauf éventuellement entre ses racines.