

BORNE SUPÉRIEURE DANS \mathbb{R} 

Richard Dedekind (1831-1916)

L'ensemble des nombres réels \mathbb{R} sur lequel est fondé toute l'analyse est à la fois proche de notre intuition géométrique, puisqu'on se le représente comme l'ensemble des points d'une droite idéale, et dans le même temps assez difficile à appréhender. Cela est peut-être dû au fait que dans la pratique, nous ne manipulons que des nombres rationnels. Par conséquent, ces nombres irrationnels, dont le développement décimal est infini et très complexe, échappent à notre intuition. Pourtant, on ne peut s'en dispenser pour faire des mathématiques, et ce d'autant plus que la presque totalité de l'ensemble des réels est formée par les irrationnels (dans un sens qui sera précisé dans la suite du cours).

Historiquement, il semblerait que la découverte des nombres irrationnels soit le fait de Pythagore et de son école, et qu'à l'époque elle jeta un trouble certain. Par la suite, une

théorie déjà assez élaborée des nombres réels positifs fut donnée par Eudoxe de Cnide au IV-ième siècle avant JC, et présentée par Euclide dans le livre V de ses *Éléments*.

Au début du X-ième siècle, un même mot, celui de *adad* (nombre), apparaît dans les mathématiques arabes, aussi bien dans la désignation des nombres rationnels (*al-addad al-muntiqā*) que dans celle des nombres irrationnels (*al-addad al-summa*), montrant ainsi que les algébristes arabes voient une unité dans ces nombres. Les mathématiciens arabes Abu Kamil, Al-Samaw'al, Al-Karagi, élargissent alors le calcul aux nombres irrationnels et tendent à s'affranchir de la vision géométrique des nombres (longueurs, aires, volumes) qui est celle des Grecs, pour aller vers une vision plus arithmétique : on passe des grandeurs incommensurables aux nombres irrationnels.

Cependant, il fallut attendre le XIX-ième siècle pour qu'on dispose de constructions formelles et rigoureuses de ces nombres, abandonnant tout recours à la géométrie. Comme nous le verrons dans les chapitres suivants concernant les fonctions, une réforme de l'analyse tendant vers une plus grande rigueur s'amorce au XIX-ième siècle, sous l'impulsion de Cauchy, Bolzano et Weierstrass. Toujours est-il qu'au milieu du XIX-ième siècle, aucune théorie vraiment satisfaisante des nombres n'a encore été proposée, aucun fondement logique de «l'arithmétique» n'est disponible.

C'est en particulier pour des raisons pédagogiques (pour construire son cours de calcul différentiel à l'université de Berlin sur des bases rigoureuses) que Weierstrass décide de combler cette lacune. En 1863, il propose une construction de la droite réelle. En 1872, deux autres constructions du même type sont publiées, une première due à Cantor et Heine, et une seconde due à Dedekind (*Stetigkeit und irrationale Zahlen*).

Concernant la première d'entre elles, Méray a, dès 1869, fait paraître une construction des réels qui en est assez proche. Pour la seconde, Dedekind a en fait conçu cette théorie dès 1858, et, là encore, c'est par une réflexion trouvant son origine dans des questions d'enseignement qu'il y est conduit¹. La préface de *Stetigkeit und irrational Zahlen*, dont suit ici un extrait, en témoigne.

Les considérations qui font l'objet de ce court essai datent de l'automne 1858. Je me trouvais alors professeur à l'École polytechnique fédérale de Zurich, obligé pour la première fois d'exposer les éléments du calcul différentiel et je ressentis à cette occasion, plus vivement encore qu'auparavant, combien l'arithmétique manque d'un fondement véritablement scientifique. À propos du concept d'une grandeur variable qui tend vers une valeur limite fixe et notamment pour prouver le théorème que toute grandeur qui croît constamment, mais non au-delà de toute limite, doit nécessairement tendre vers une valeur limite, je cherchai refuge dans les évidences géométriques. [...] Mon sentiment d'insatisfaction était alors si puissant que je pris la ferme décision de réfléchir jusqu'à ce que j'aie trouvé un fondement purement arithmétique et parfaitement rigoureux des principes de l'analyse infinitésimale.

Ainsi de plusieurs manières équivalentes, le corps des nombres réels était construit rigoureusement à partir de celui des rationnels, eux-mêmes construits à partir des entiers. C'est donc avec l'axiomatisation des entiers naturels par Peano en 1889 que l'édification de cette «tour» de nombres, partant de \mathbb{N} et allant à \mathbb{R} , s'appuyait enfin sur des bases logiques, rigoureuses, purement arithmétiques et indépendantes de tout recours à des «évidences» géométriques.

¹Notons à ce propos que c'est aussi de la volonté d'écrire un ouvrage didactique, qui rompt avec les livres faisant autorité en analyse au début du XX-ième siècle et soit fondé sur une parfaite rigueur, qu'est né Nicolas Bourbaki.

3.1 MAJORANT, MINORANT

§1 Partie bornée

Définition 1

Soit A une partie de \mathbb{R} .

- On dit qu'un réel M est un **majorant** de A si

$$\forall x \in A, x \leq M.$$

On dit alors que la partie A est **majorée**.

- On dit qu'un réel m est un **minorant** de A si

$$\forall x \in A, m \leq x.$$

On dit alors que la partie A est **minorée**.

- Une partie majorée et minorée est dite **bornée**.

La valeur absolue permet de caractériser facilement les parties bornées de \mathbb{R} .

Proposition 2

Une partie A de \mathbb{R} est bornée si et seulement si

$$\exists \mu \in \mathbb{R}_+, \forall x \in A, |x| \leq \mu.$$

Exemple 3

- \mathbb{R} n'est ni minoré ni majoré.
- $[0, 1]$ est majorée par 5, minorée par 0, son maximum est 1, son minimum est 0.
- $]0, 1]$ est majorée par 5, minorée par 0, son maximum est 1 et n'a pas de minimum est 0.

Remarque

- Lorsqu'il existe, le maximum (resp. minimum) de A est un majorant (resp. minorant) de A .
- Lorsque M majore A , tout réel $M' \geq M$ majore aussi A .
- Lorsque m minore A , tout réel $m' \leq m$ minore aussi A .

§2 Plus grand élément, plus petit élément

Définition 4

Soit A une partie de \mathbb{R} .

- On dit que a est le **plus grand élément** de A ou le **maximum** de A si

$$a \in A \quad \text{et} \quad \forall x \in A, x \leq a.$$

Lorsqu'il existe, le plus grand élément de A se note $\max(A)$.

- On dit que a est le **plus petit élément** de A ou le **minimum** de A si

$$a \in A \quad \text{et} \quad \forall x \in A, a \leq x.$$

Lorsqu'il existe, le plus petit élément de A se note $\min(A)$.

L'ensemble A n'admet pas nécessairement de plus grand élément. Néanmoins, si il existe, c'est le **seul** élément de A ayant cette propriété ; car si on a aussi $x \leq b$ pour tout $x \in A$, alors $a \leq b$ et $b \leq a$, d'où $b = a$.

Proposition 5

Soit $x \in \mathbb{R}$, alors

$$\lfloor x \rfloor = \max \{ n \in \mathbb{Z} \mid n \leq x \}.$$

3.2 THÉORÈME DE LA BORNE SUPÉRIEURE

§1 Borne supérieure

C'est la propriété cruciale de \mathbb{R} .

Définition 6

Soit A une partie de \mathbb{R} . Si l'ensemble des majorants de A admet un plus petit élément, celui-ci est appelé **la borne supérieure de A** et on la note $\sup A$.

On admet la propriété fondamentale suivante

Théorème 7

Toute partie non vide et majorée de \mathbb{R} admet une borne supérieure.

Exemples 8

1. L'ensemble \mathbb{N} n'a pas de borne supérieure dans \mathbb{R} .
2. La borne supérieure de $[0, 1]$ est 1, c'est aussi son plus grand élément.
3. La borne supérieure de $[0, 1[$ est 1, mais $[0, 1[$ n'a pas de plus grand élément.

Exemple 9

Il existe un réel positif x tel que $x^2 = 2$.

Remarque

Il est faux que toute partie non vide majorée de \mathbb{Q} admet une «borne supérieure» dans \mathbb{Q} . Par exemple avec $A = \{ x \in \mathbb{Q} \mid x^2 < 2 \}$. L'ensemble des rationnels qui majore A est $[\sqrt{2}, +\infty[\cap \mathbb{Q}$: il n'a pas de plus petit élément dans \mathbb{Q} .

Exemple 10

Soit

$$A = \left\{ -\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\} = \left\{ -1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \dots \right\}$$

Alors A n'a pas de plus grand élément et $\sup(A) = 0$.

Test 11

Soit A et B deux parties non vides de \mathbb{R} . On suppose que $A \subset B$ et que B est majorée. Alors A est majorée et $\sup A \leq \sup B$.

§2 Borne inférieure

Définition 12	Soit A une partie de \mathbb{R} . Si l'ensemble des minorants de A admet un plus grand élément, celui-ci est appelé la borne inférieure de A et on la note $\inf A$.
Théorème 13	<i>Toute partie non vide et minorée de \mathbb{R} admet une borne inférieure.</i>
Test 14	Soit A et B deux parties non vides de \mathbb{R} . On suppose que $A \subset B$ et que B est minorée. Alors A est minorée et $\inf A \geq \inf B$.
Test 15	Soit A une partie non vide majorée de \mathbb{R} . On pose $B = \{-x \mid x \in A\}$. Alors B est minorée et $\inf B = -\sup A$.

3.3 LES DIX TYPES D'INTERVALLES DE \mathbb{R}

§1 Parties convexes de \mathbb{R}

Définition 16	<p>Une partie A de \mathbb{R} est convexe lorsque tout segment dont les extrémités sont deux éléments de A est inclus dans A, c'est-à-dire</p> $\forall (x, y) \in A^2, [x, y] \subset A.$ <p>ou encore</p> $\forall (x, y) \in A^2, \forall z \in \mathbb{R}, x \leq z \leq y \implies z \in A.$
Test 17	<p>Soit a et b deux réels tels que $a \leq b$. Montrer que</p> $[a, b] = \{ (1 - \lambda)a + \lambda b \mid \lambda \in [0, 1] \}.$

§2 Caractérisation des parties convexes

La propriété de la borne supérieure ou inférieure permet de distinguer les parties convexes de \mathbb{R} en dix types distincts selon qu'il existe ou non un majorant ou un minorant, ainsi qu'un plus grand ou plus petit élément.

Théorème 18	<p>Caractérisation des parties convexes de \mathbb{R} <i>Les parties convexes de \mathbb{R} sont les suivantes, les bornes a et b étant des nombres réels.</i></p>
--------------------	--

- Les *intervalles ouverts*, de la forme

$$]a, +\infty[= \{ x \in \mathbb{R} \mid a < x \}$$

$$]-\infty, b[= \{ x \in \mathbb{R} \mid x < b \}$$

$$]a, b[=]-\infty, b[\cap]a, +\infty[= \{ x \in \mathbb{R} \mid a < x < b \}$$

$$]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}$$

- Les *intervalles fermés*, de la forme

$$[a, +\infty[= \{ x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \}$$

$$]-\infty, b] = \{ x \in \mathbb{R} \mid x \leq b \}$$

$$[a, b] =]-\infty, b] \cap [a, +\infty[= \{ x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b \}$$

$$]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}$$

Les intervalles de la forme $[a, b]$ fermés et bornés sont aussi appelés **segments**.

- Les intervalles de la forme

$$]a, b] = \{ x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b \}$$

$$[a, b[= \{ x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b \}$$

Ces intervalles ne sont ni ouverts, ni fermés.

- L'ensemble vide : \emptyset .

Remarque

- Noter que si $b < a$, alors $]a, b[= [a, b] = \emptyset$. Si $a = b$, on a $[a, a] = \{ a \}$.
- Par ailleurs, \mathbb{R} et \emptyset sont des intervalles ouverts et fermés.
- En ce qui concerne la signification précise des symboles $+\infty$ et $-\infty$ utilisés ci-dessus ou ailleurs, il doit être précisé que
 1. ∞ par lui-même n'a aucune signification, bien que *certaines phrases le contenant* signifient quelquefois quelque chose.
 2. Chaque fois qu'une phrase ou notation contenant le symbole ∞ signifiera quelque chose, ce sera seulement parce que nous aurons antérieurement attaché une signification à cette phrase particulière au moyen d'une *définition spécifique*.

Corollaire 19

Toute intersection d'intervalles est un intervalle.

3.4 LA DROITE ACHEVÉE $\overline{\mathbb{R}}$

Notation

On note $\overline{\mathbb{R}}$ l'ensemble $\mathbb{R} \cup \{ -\infty, +\infty \}$ appelé droite numérique achevée.

Notation à ne pas confondre avec l'adhérence de \mathbb{R} dans \mathbb{R} qui est \mathbb{R} !

§1 Prolongement de la relation \leq , de l'addition, de la multiplication

Définition 20

On étend à $\overline{\mathbb{R}}$ la relation \leq de la façon suivante

$$\forall x \in \mathbb{R}, -\infty < x < +\infty.$$

Définition 21

On prolonge l'addition de \mathbb{R} de la façon suivante

$$\forall x \in \mathbb{R}, x + (+\infty) = (+\infty) + x = +\infty$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, x + (-\infty) = (-\infty) + x = -\infty$$

$$(+\infty) + (+\infty) = +\infty$$

$$(-\infty) + (-\infty) = -\infty$$

Par contre, nous ne donnerons aucun sens aux expressions

$$(+\infty) + (-\infty) \quad \text{et} \quad (-\infty) + (+\infty).$$

Définition 22

On prolonge la multiplication de \mathbb{R} de la façon suivante

$$\forall x \in \overline{\mathbb{R}} \setminus \{0\}, x \times (+\infty) = (+\infty) \times x = \begin{cases} +\infty & \text{si } x > 0 \\ -\infty & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

$$\forall x \in \overline{\mathbb{R}} \setminus \{0\}, x \times (-\infty) = (-\infty) \times x = \begin{cases} -\infty & \text{si } x > 0 \\ +\infty & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Nous posons également

$$\frac{1}{+\infty} = 0$$

$$\frac{1}{-\infty} = 0.$$

Par contre, nous ne donnerons aucun sens aux expressions

$$0 \times (\pm\infty), \quad (\pm\infty) \times 0, \quad \frac{\pm\infty}{\pm\infty}, \quad \frac{x}{0}$$

§2 Borne supérieure dans $\overline{\mathbb{R}}$

Théorème 23

Toute partie de $\overline{\mathbb{R}}$ possède une borne supérieure dans $\overline{\mathbb{R}}$, éventuellement $\pm\infty$.

Exemples 24

1. Si A est une partie non vide et majorée de \mathbb{R} , sa borne supérieure dans \mathbb{R} et dans $\overline{\mathbb{R}}$ coïncide.
2. Toute partie de $\overline{\mathbb{R}}$ est majorée par $+\infty$.

3. Si A est une partie non majorée de \mathbb{R} , elle est toutefois majorée dans $\overline{\mathbb{R}}$ par $+\infty$. On peut alors écrire

$$\sup(A) = +\infty.$$

4. L'ensemble vide admet tout élément de $\overline{\mathbb{R}}$ pour majorant dans $\overline{\mathbb{R}}$. Or $\overline{\mathbb{R}}$ admet $-\infty$ pour plus petit élément (dans $\overline{\mathbb{R}}$). Donc la borne supérieure de \emptyset dans $\overline{\mathbb{R}}$ est $-\infty$.

Théorème 25

Toute partie de $\overline{\mathbb{R}}$ possède une borne inférieure dans $\overline{\mathbb{R}}$, éventuellement $\pm\infty$.

§3 Intervalles de $\overline{\mathbb{R}}$

Définition 26

Pour $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$ avec $a \leq b$, on définit les **intervalles**

$$[a, b] = \left\{ x \in \overline{\mathbb{R}} \mid a \leq x \leq b \right\}$$

$$]a, b[= \left\{ x \in \overline{\mathbb{R}} \mid a < x < b \right\}$$

$$[a, b[= \left\{ x \in \overline{\mathbb{R}} \mid a \leq x < b \right\}$$

$$]a, b] = \left\{ x \in \overline{\mathbb{R}} \mid a < x \leq b \right\}$$

Définition 27

Une partie A de $\overline{\mathbb{R}}$ est convexe lorsque

$$\forall (x, y) \in A^2, [x, y] \subset A.$$

Théorème 28

Les parties convexes de $\overline{\mathbb{R}}$ sont exactement les intervalles de $\overline{\mathbb{R}}$.