

Chapter 5 Fonctions logarithmes, exponentielles, puissances

5.1 Rappel sur les fonctions polynomiales

5.2 Logarithmes, exponentielles

Solution 5.1

Cette équation est définie pour $x \in D = \mathbb{R} \setminus \{-1, -1/2\}$.

$$\begin{aligned}\ln|x+1| - \ln|2x+1| &\leq \ln 2 \iff \ln|x+1| \leq \ln|2x+1| + \ln 2 \\ &\iff \ln|x+1| \leq \ln(2|2x+1|) \\ &\iff |x+1| \leq 2|2x+1| && \text{car } \ln \text{ est strictement croissante} \\ &\iff (x+1)^2 \leq 4(2x+1)^2 \\ &\iff 15x^2 + 14x + 3 \geq 0 && \text{en développant.}\end{aligned}$$

Le polynôme $15X^2 + 14X + 3$ a pour discriminant 16 et pour racines $-3/5$ et $-1/3$. Son coefficient dominant étant positif, il est à valeurs positive «à l'extérieur des racines».

Conclusion

En prenant en considération l'ensemble de définition D , l'inéquation

$$\ln|x+1| - \ln|2x+1| \leq \ln 2.$$

a pour ensemble de solutions

$$S =]-\infty, -1[\cup]-1, -\frac{3}{5}[\cup \left[-\frac{1}{3}, +\infty[.$$

Solution 5.2

Solution 5.3

Solution 5.4

1. $e^{3 \ln 5} = 5^3 = 125$.
2. $e^{-2 \ln 3} = 3^{-2} = 1/9$.
3. Pour $x > 0$, $2 \ln(e^{x/2}) - 2e^{\ln(x/2)} = 2 \frac{x}{2} - 2 \frac{x}{2} = 0$.

Remarquez que l'expression de gauche n'est définie que pour $x > 0$ alors que celle de droite aurait un sens pour tout $x \in \mathbb{R}$.

4. Pour $x \neq 1$, $e^{2 \ln|x-1| - 3 \ln(x^2+1)} = \frac{(x-1)^2}{(x^2+1)^3}$.

Remarquez que l'expression de gauche n'est définie que pour $x \neq 1$ alors que celle de droite aurait un sens pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Solution 5.5

Solution 5.6

Compte tenu du fait que l'on a $e^{2x} = (e^x)^2$ et que e^x est positif quel que soit x , il apparaît que l'équation proposée admet autant de solutions que le système suivant:

$$\begin{cases} e^x = u \\ f(u) = u^2 - 4mu + 2m + 2 = 0 \\ u > 0. \end{cases}$$

Pour que l'équation $f(u) = 0$ ait des racines, il faut et il suffit que l'on ait

$$\begin{aligned} \Delta &= 16m^2 - 8m - 2 = 8(2m^2 - m - 1) \\ &= 8(m - 1)(2m + 1) \geq 0, \end{aligned}$$

d'où

$$m \leq -\frac{1}{2} \quad \text{ou} \quad m \geq 1.$$

Comme, d'autre part, le produit et la somme des racines, u_1 et u_2 , de cette équation (en supposant la condition précédente remplie) ont respectivement pour valeur $P = 2(m+1)$ et $S = 4m$, on voit immédiatement apparaître les conclusions suivantes, relatives à l'équation proposée:

- Pour $m < -1$, on a $u_1 < 0 < u_2$ (quitte à échanger u_1 et u_2) ; seule u_2 est acceptable et donne $e^x = u_2$, d'où $x = \ln u_2$.
- Pour $-1 \leq m < 1$, l'équation $f(u) = 0$ a deux racines négatives (si $-1 \leq m \leq -\frac{1}{2}$) ou n'en a aucune (si $-\frac{1}{2} < m < 1$) ; dans les deux cas, l'équation proposée n'a pas de solution.
- Pour $m > 1$, on a $0 < u_1 < u_2$; donc deux valeurs pour x sont solutions de l'équation proposée, à savoir $x_1 = \ln u_1$ et $x_2 = \ln u_2$.
- Lorsque $m = 1$, on a $u_1 = u_2 = 2$ et l'équation proposée admet une seule solution : $x = \ln 2$.

Solution 5.7

La fonction f est clairement définie et dérivable sur \mathbb{R} et

$$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = \frac{-(-e^{-x})}{(1 + e^{-x})^2} = \frac{e^{-x}}{(1 + e^{-x})^2} > 0.$$

La fonction f est donc strictement croissante sur \mathbb{R} .

De plus,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0.$$


donc

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

Les droites

$$\mathcal{A}_1 : y = 0 \quad \text{et} \quad \mathcal{A}_2 : y = 1$$

sont asymptote à la courbe de f .



Solution 5.8

L'équation $(E) : 8^{6x} - 3 \times 8^{3x} - 4 = 0$ est définie pour $x \in \mathbb{R}$ et on a

$$8^{6x} - 3 \times 8^{3x} - 4 = 0 \iff (8^{3x})^2 - 3(8^{3x}) - 4 = 0.$$

Or le polynôme $X^2 - 3X - 4$ a pour discriminant $25 = 5^2$, et pour $X \in \mathbb{R}$,

$$X^2 - 3X - 4 = 0 \iff X = -1 \text{ ou } X = 4.$$

Finalement,

$$8^{6x} - 3 \times 8^{3x} - 4 = 0 \iff 8^{3x} = -1 \text{ ou } 8^{3x} = 4$$

La première relation est impossible ; et puisque \ln est injective,

$$8^{6x} - 3 \times 8^{3x} - 4 = 0 \iff 8^{3x} = 4 \iff 3x \ln 8 = \ln 4 \iff 9x \ln 2 = 2 \ln 2 \iff x = \frac{2}{9}.$$

Conclusion

L'équation $8^{6x} - 3 \times 8^{3x} - 4 = 0$ admet une unique solution qui est $\frac{2}{9}$.

Solution 5.9

Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$.

$$a^{x^2-x} \leq e^{x-1} \iff (x^2 - x) \ln a \leq x - 1 \iff (\ln a)x^2 - (\ln a + 1)x + 1 \leq 0.$$

- Si $a = 1$, $(E) \iff x \geq 1$. L'ensemble solution de (E) est alors $\mathcal{S} = [1, +\infty[$.
- Si $a \neq 1$, le trinôme du second degré $(\ln a)x^2 - (\ln a + 1)x + 1$ a pour discriminant $(\ln a)^2 + 2 \ln a + 1 - 4 \ln a = (\ln a)^2 - 2 \ln a + 1 = (\ln a - 1)^2$; ses racines sont donc

$$\frac{\ln a + 1 - \ln a + 1}{2 \ln a} = \frac{1}{\ln a} \quad \text{et} \quad \frac{\ln a + 1 + \ln a - 1}{2 \ln a} = 1.$$

- Si $0 < a < 1$, alors $\ln a < 0$ et l'ensemble solution de (E) est $\mathcal{S} =]-\infty, 1/\ln a] \cup [1, +\infty[$.
- Si $a > 1$, alors $\ln a > 0$ et l'ensemble solution de (E) est $\mathcal{S} = [1, 1/\ln a]$ si $1 < a < e$ et $\mathcal{S} = [1/\ln a, 1]$ si $a > e$.

Solution 5.10

1. En fait, c'est une question de cours!!!

Pour tout $a \in \mathbb{R}_+^*$, la fonction $\varphi_a : x \mapsto a^x = e^{x \ln a}$ est dérivable et on a

$$\varphi'_a(x) = (\ln a)e^{x \ln a} = (\ln a)a^x$$

qui est du signe de $\ln a$. Nous distinguons alors trois cas.


- Si $a = 1$, φ_a est constante égale à 1.
- Si $a > 1$, φ_a est strictement croissante et

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{x \ln a} = \lim_{u \rightarrow -\infty} e^u = 0$$

car $\lim_{x \rightarrow -\infty} x \ln a = -\infty$. De manière similaire,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x \ln a} = \lim_{u \rightarrow +\infty} e^u = +\infty$$

D'où le tableau de variations

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$\varphi'_a(x)$		$+$	$+$
$\varphi_a(x)$			


- Si $0 < a < 1$, φ_a est strictement décroissante et


$$\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{x \ln a} = \lim_{u \rightarrow +\infty} e^u = +\infty$$

car $\lim_{x \rightarrow -\infty} x \ln a = +\infty$. De manière similaire,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x \ln a} = \lim_{u \rightarrow -\infty} e^u = 0.$$

D'où le tableau de variations

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$\varphi'_a(x)$		$-$	$-$
$\varphi_a(x)$			



2. L'étude précédente montre que l'application $f : x \mapsto 2^x + 3^x$ est strictement croissante sur \mathbb{R} ; l'application f est donc injective. Or $f(1) = 2^1 + 3^1 = 5$, donc

$$2^x + 3^x = 5 \iff f(x) = 5 \iff f(x) = f(1) \iff x = 1.$$

Conclusion

L'équation $2^x + 3^x = 1$ admet pour ensemble solution $\mathcal{S} = \{ 1 \}$.

Solution 5.11

1. f définie et dérivable sur $]0, +\infty[$.

variations:

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		+	0 -
$f(x)$	$-\infty$	\nearrow	$1/e \searrow -\infty$

2. Puisque \ln est injective,

$$a^b = b^a \iff b \ln(a) = a \ln(b) \iff \frac{\ln(a)}{a} = \frac{\ln(b)}{b} \iff f(a) = f(b).$$

D'après le tableau de variation, f ne peut prendre qu'au plus deux fois la même valeur et, si c'est le cas, une fois sur $]1, e[$ et l'autre fois sur $]e, +\infty[$.

Nécessairement $1 < a < e < b$ et comme a est entiers, il ne peut valoir que 2.

Reste à trouver b tel que $f(b) = \ln(2)/2$: on trouve facilement $b = 4$.

Solution 5.13

1. L'équation est définie pour $x > -1/3$. Alors

$$\begin{aligned}
 2\log_4(x+1) + \log_4(x+3) &= \log_4(6x+2) + 1/2 \\
 \Leftrightarrow 4^{2\log_4(x+1) + \log_4(x+3)} &= 4^{\log_4(6x+2) + 1/2} && \because x \mapsto 4^x \text{ est injective} \\
 \Leftrightarrow (x+1)^2(x+3) &= (6x+2) \times 2 \\
 \Leftrightarrow x^3 + 5x^2 + 7x + 3 &= 12x + 4 \\
 \Leftrightarrow x^3 + 5x^2 - 5x - 1 &= 0 \\
 \Leftrightarrow (x-1)(x^2 + 6x + 1) &= 0 && \because 1 \text{ est solution apparente} \\
 \Leftrightarrow x = 1 \text{ ou } x = -3 - 2\sqrt{2} \text{ ou } x = -3 + 2\sqrt{2}.
 \end{aligned}$$

Or $-3 - 2\sqrt{2} \leq -1/3$, donc l'ensemble-solution est

$$\mathcal{S} = \{ 1, 2\sqrt{2} - 3 \}.$$

2. L'équation est définie pour $x > 0$. Posons $X = \ln x$. Nous cherchons tout d'abord à résoudre l'équation $2X^3 - 9X^2 - 2X + 9 = 0$ d'inconnue $X \in \mathbb{R}$.

Une solution apparente est $X = 1$, on peut écrire

$$2X^3 - 9X^2 - 2X + 9 = (X - 1)(2X^2 - 7X - 9).$$

Le discriminant de $2X^2 - 7X - 9$ est $121 = 11^2$, ses racines sont donc $\frac{7-11}{4} = -1$ et $\frac{7+11}{2} = \frac{9}{2}$.

Finalement,

$$\begin{aligned}
 2\ln^3 x - 9\ln^2 x - 2\ln x + 9 = 0 &\Leftrightarrow \ln x = 1 \text{ ou } \ln x = -1 \text{ ou } \ln x = \frac{9}{2} \\
 &\Leftrightarrow x = e \text{ ou } x = e^{-1} \text{ ou } x = e^{9/2}.
 \end{aligned}$$

Conclusion

L'ensemble solution de l'équation $2\ln^3 x - 9\ln^2 x - 2\ln x + 9 = 0$ est $\mathcal{S} = \{ 1/e, e, e^{9/2} \}$.

3. L'équation est définie si $1 - x > 0$ et $4 - 2x > 0$, c'est-à-dire pour $x < 1$.

Soit $x < 1$. Puisque \ln est injective

$$\ln(1 - x) = \ln(4 - x) \Leftrightarrow 1 - x = 4 - 2x \Leftrightarrow x = 3.$$

La dernière assertion étant toujours fausse (on a $x < 1$), l'équation n'admet pas de solution.

Solution 5.14

1. L'inéquation est définie pour $x \in \mathbb{R}$. Puisque \ln est strictement croissante

$$3^x \leq 2^x \Leftrightarrow x \ln 3 \leq x \ln 2 \Leftrightarrow x(\ln 3 - \ln 2) \leq 0 \Leftrightarrow x \leq 0.$$

L'ensemble solution est $\mathcal{S} =]-\infty, 0]$.

2. L'inéquation est définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ (on a $2^x + 1 \geq 1$). L'application $x \mapsto 2^x = e^{x \ln 2}$ est strictement croissante car $\ln 2 > 0$. D'où

$$\begin{aligned} \log_2(2^x + 1) < x + 1 &\iff 2^x + 1 < 2^{x+1} \iff 1 < 2 \times 2^x - 2^x \\ &\iff 1 < 2^x \iff 0 < x \ln 2 \iff 0 < x. \end{aligned}$$

L'inéquation $\log_2(2^x + 1) < x + 1$ a pour ensemble solution $\mathcal{S} =]0, +\infty[$.

3. L'inéquation $x^{(x^2)} \leq (x^2)^x$ est définie pour $x > 0$ ($x^{(x^2)} = \exp(x^2 \ln x)$). On a alors,

$$\begin{aligned} x^{(x^2)} \leq (x^2)^x &\iff x^2 \ln x \leq x \ln x^2 && \because \ln \text{ est strictement croissante} \\ &\iff x^2 \ln x \leq 2x \ln x \\ &\iff x \ln x \leq 2 \ln x && \because x > 0 \\ &\iff (x - 2) \ln x \leq 0. \end{aligned}$$

Résumons à l'aide d'un tableau de signes :

x	0	1	2	$+\infty$
$x - 2$	-	-	0	+
$\ln x$	-	0	+	+
$(x-2) \ln x$	+	0	-	+

L'ensemble solution de l'inéquation $x^{(x^2)} \leq (x^2)^x$ est donc $\mathcal{S} = [1, 2]$.

Solution 5.15

1. On a $7^0 = 1$, $7^1 = 7$, $7^2 = 49$, $7^3 = 343$, $7^4 = 2401$, $7^5 = 16807$, $7^6 = 117649$, $7^7 = 823543, \dots$

Ainsi,

$$50^0 < 7^p < 50^1 \iff 1 < 7^p < 50 \iff p \in \{0, 1, 2\}$$

d'où $I_0 = 3$.

De même,

$$50^1 < 7^p < 50^2 \iff 50 < 7^p < 2500 \iff p \in \{3, 4\}$$

d'où $I_1 = 2$.

Enfin,

$$50^2 < 7^p < 50^3 \iff 2500 < 7^p < 125000 \iff p \in \{5, 6\}$$

d'où $I_2 = 2$.

2. Supposons $50^n < 7^p < 50^{n+1}$. La fonction \ln est strictement croissante, on a donc

$$n \ln 50 < p \ln 7 < (n + 1) \ln 50$$

d'où

$$n \frac{\ln 50}{\ln 7} < p < (n + 1) \frac{\ln 50}{\ln 7}$$

Or l'intervalle $\left[n \frac{\ln 50}{\ln 7}, (n + 1) \frac{\ln 50}{\ln 7} \right]$ a pour longueur $\frac{\ln 50}{\ln 7}$ et $2 < \frac{\ln 50}{\ln 7} < 3$; il contient donc 2 ou 3 entiers. C'est-à-dire $I_n = 2$ ou $I_n = 3$.

5.3 Fonctions puissances

Solution 5.17

Cette équation est définie pour $x \in]0, +\infty[$.

On peut penser à passer sous forme exponentielle, mais cela ne simplifie pas grand chose. Ou alors faire un changement d'inconnue ($X = x^{1/12}$ par exemple) mais on ne sait pas résoudre l'équation $X^3 + 2X^{20} - 3 = 0$.

Néanmoins, ce permet de remarquer que $x = 1$ est une solution apparente de l'équation $x^{1/4} + 2x^{5/3} = 3$. Nous allons montrer que c'est la seule solution.

Pour $x > 0$, posons $f(x) = x^{1/4} + 2x^{5/3}$. La fonction f est strictement croissante sur $]0, +\infty[$ car c'est la somme de deux fonctions (usuelles) strictement croissantes (on peut également dériver f et trouver $f'(x) = \frac{1}{4}x^{-3/4} + \frac{10}{3}x^{2/3} > 0$).

La fonction f est donc injective : l'équation $f(x) = 3$ a donc zéro ou une solution. Puisque $f(1) = 3$, on en déduit.

Conclusion

L'équation $x^{1/4} + 2x^{5/3} - 3 = 0$ a pour unique solution $x = 1$.

Solution 5.18

Soit $x \in]0, +\infty[$.

$$\begin{aligned} x^{(x^x)} &= (x^x)^x \iff x^x \ln(x) = x \ln(x^x) && \because \ln \text{ est injective} \\ &\iff x^x \ln(x) = x^2 \ln(x) \\ &\iff x^x = x^2 \text{ ou } \ln(x) = 0 \\ &\iff x \ln(x) = 2 \ln(x) \text{ ou } x = 1 && \because \ln \text{ est injective} \\ &\iff x = 2 \text{ ou } x = 1. \end{aligned}$$

Conclusion

L'ensemble des solutions de l'équation $x^{(x^x)} = (x^x)^x$ dans $]0, +\infty[$ sont est

$$\mathcal{S} = \{ 1, 2 \}.$$

Solution 5.19

1. L'équation $(E) : e^{3x} - 5e^{2x} - 6e^x = 0$ est définie pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Puisque $e^x \neq 0$, $(E) \iff e^{2x} - 5e^x - 6 = 0$.

L'équation $X^2 - 5X - 6 = 0$ a pour discriminant 49 et pour solutions $X = -1$ et $X = 6$. Finalement,

$$\begin{aligned} (E) &\iff e^x = -1 \text{ ou } e^x = 6 \\ &\iff x = \ln 6 && \because e^x > 0. \end{aligned}$$

Conclusion

L'équation (E) a pour unique solution 6.

2. L'inéquation $(E) : e^{x^2} e^x < e^6$ est définie pour $x \in \mathbb{R}$.

Puisque \exp est strictement croissante,

$$(E) \iff e^{x^2+x} < e^6 \iff x^2 + x < 6 \iff x^2 + x - 6 < 0.$$

Or le trinôme $x^2 + x - 6$ a pour racine -3 et 2 et pour coefficient dominant 1 . Il prend donc des valeurs < 0 si, et seulement si $x \in]-3, 2[$.

Conclusion

L'ensemble solution de l'inéquation $e^{x^2} e^x < e^6$ est $] - 3, 2[$.

3. L'équation $(E) : x^{\sqrt{x}} = (\sqrt{x})^x$ est définie pour $x > 0$.

Soit $x > 0$.

$$\begin{aligned} x^{\sqrt{x}} = (\sqrt{x})^x &\iff \sqrt{x} \ln x = x \ln \sqrt{x} && \because \ln \text{ est injective} \\ &\iff \sqrt{x} \ln x = \frac{1}{2} x \ln x \\ &\iff \ln x = 0 \text{ ou } \sqrt{x} = \frac{1}{2} x \\ &\iff \ln x = 0 \text{ ou } \sqrt{x} = 0 \text{ ou } 2 = \sqrt{x} \\ &\iff x = 1 \text{ ou } x = 0 \text{ ou } x = -4 \text{ ou } x = 4 \\ &\iff x = 1 \text{ ou } x = 4 && \because x > 0 \end{aligned}$$

Conclusion

Les solutions de (E) sont 1 et 4 .

4. L'équation $2^{(x^3)} = 3^{(x^2)}$ est définie pour $x \in \mathbb{R}$. Chaque membre est à valeurs dans \mathbb{R}_+^* et la fonction \ln est injective, d'où

$$2^{(x^3)} = 3^{(x^2)} \iff x^3 \ln 2 = x^2 \ln 3 \iff x^2 = 0 \text{ ou } x \ln 2 = \ln 3 \iff x = 0 \text{ ou } x = \frac{\ln 3}{\ln 2}.$$

Conclusion

Les solutions de l'équation $2^{(x^3)} = 3^{(x^2)}$ sont 0 et $\log_2(3)$.

5. La fonction \log_a n'a de sens que pour $a > 0$ avec $a \neq 1$; dans ce cas, elle est définie sur \mathbb{R}_+^* .

L'équation $\log_a x = \log_x a$ est donc définie sur $D =]0, 1[\cup]1, +\infty[$.

$$\begin{aligned} \log_a x = \log_x a &\iff \frac{\ln x}{\ln a} = \frac{\ln a}{\ln x} \\ &\iff (\ln x)^2 = (\ln a)^2 \iff \ln x = \ln a \text{ ou } \ln x = -\ln a \iff x = a \text{ ou } x = \frac{1}{a}. \end{aligned}$$

Conclusion

Les solutions de l'équation $\log_a x = \log_x a$ sont a et $\frac{1}{a}$.

6. L'équation $\log_3 x - \log_2 x = 1$ est définie pour $x > 0$.

$$\begin{aligned} \log_3 x - \log_2 x = 1 &\iff \frac{\ln x}{\ln 3} - \frac{\ln x}{\ln 2} = 1 \\ &\iff \frac{\ln 2 \ln x - \ln 3 \ln x}{\ln 3 \ln 2} = 1 \iff \ln \frac{2}{3} \ln x = \ln 3 \ln 2 \iff x = e^{\frac{\ln 3 \ln 2}{\ln(2/3)}}. \end{aligned}$$

Conclusion

L'équation $\log_3 x - \log_2 x = 1$ admet une unique solution qui est $e^{\frac{\ln 3 \ln 2}{\ln(2/3)}}$.

7. Soit $n \in \mathbb{N}$. L'équation (E) : $2^x + 2^{x+1} + \dots + 2^{x+n} = 3^x + 3^{x+1} + \dots + 3^{x+n}$ est définie pour tout $x \in \mathbb{R}$.

On a

$$2^x + 2^{x+1} + \dots + 2^{x+n} = 2^x \frac{1 - 2^{n+1}}{1 - 2} = 2^x (2^{n+1} - 1) \quad (1)$$

$$\text{et } 3^x + 3^{x+1} + \dots + 3^{x+n} = 3^x \frac{1 - 3^{n+1}}{1 - 3} = 3^x \frac{3^{n+1} - 1}{2}. \quad (2)$$

Puisque \ln est injective,

$$\begin{aligned} (E) &\Leftrightarrow 2^x (2^{n+1} - 1) = 3^x \frac{3^{n+1} - 1}{2} \\ &\Leftrightarrow x \ln 2 + \ln (2^{n+1} - 1) = x \ln 3 + \ln(3^{n+1} - 1) - \ln 2 \\ &\Leftrightarrow \ln (2^{n+2} - 2) - \ln (3^{n+1} - 1) = x(\ln 3 - \ln 2) \\ &\Leftrightarrow x = \frac{\ln(2^{n+2} - 2) - \ln(3^{n+1} - 1)}{\ln 3 - \ln 2}. \end{aligned}$$

Solution 5.20

Solution 5.21

5.4 Fonctions hyperboliques

Solution 5.23

Mettre le membre de droite sous forme exponentielle et développer brutalement...

Solution 5.29

- Soit $x \in \mathbb{R}$,

$$\operatorname{sh} x = m \Leftrightarrow \frac{e^x - e^{-x}}{2} = m \Leftrightarrow e^x - e^{-x} = 2m \Leftrightarrow e^x - 2m - e^{-x} = 0$$

Or $e^x \neq 0$, d'où, en multipliant par e^x la dernière égalité,

$$\operatorname{sh} x = m \Leftrightarrow e^{2x} - 2me^x - 1 = 0.$$

Or le polynôme $X^2 - 2mX - 1$ a pour discriminant $4m^2 + 4 = 4(m^2 + 1) > 0$ et pour racine

$$m - \sqrt{m^2 + 1} < 0 \quad \text{et} \quad m + \sqrt{m^2 + 1} > 0.$$

On a donc

$$\operatorname{sh} x = m \Leftrightarrow e^x = \underbrace{m - \sqrt{m^2 + 1}}_{<0} \text{ ou } e^x = m + \sqrt{m^2 + 1}$$

$$\Leftrightarrow x = \ln \left(m + \sqrt{m^2 + 1} \right).$$

Conclusion

Pour tout $m \in \mathbb{R}$, l'équation $\operatorname{sh} x = m$ admet pour unique solution $x = \ln(m + \sqrt{m^2 + 1})$.
L'application sh est donc bijective et

$$\begin{aligned} \operatorname{sh}^{-1} : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \end{aligned} .$$

- Soit $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} \operatorname{ch} x = m &\iff \frac{e^x + e^{-x}}{2} = m \iff e^x + e^{-x} = 2m \\ &\iff e^x - 2m + e^{-x} = 0 \iff e^{2x} - 2me^x + 1 = 0. \end{aligned}$$

Or le polynôme $X^2 - 2mX + 1$ a pour discriminant $4m^2 - 4 = 4(m^2 - 1)$.

- Si $m < 1$, l'équation $\operatorname{ch} x = m$ n'a pas de solution (on le savait).
- Si $m = 1$, l'équation $\operatorname{ch} x = 1$ a une seule solution $x = 0$ (on le savait aussi).
- Si $m > 1$, alors le polynôme $X^2 - 2mX + 1$ a pour racine

$$m - \sqrt{m^2 - 1} > 0 \quad \text{et} \quad m + \sqrt{m^2 - 1} > 0.$$

On a donc

$$\begin{aligned} \operatorname{ch} x = m &\iff e^x = m - \sqrt{m^2 - 1} \text{ ou } e^x = m + \sqrt{m^2 - 1} \\ &\iff x = \ln(m - \sqrt{m^2 - 1}) \text{ ou } x = \ln(m + \sqrt{m^2 - 1}). \end{aligned}$$

L'équation $\operatorname{ch} x = m$ admet deux solutions si $m > 1$, qui sont $x = \ln(m \pm \sqrt{m^2 - 1})$.

Conclusion

L'application ch n'est donc pas bijective.

Solution 5.30 *Fonction argument tangent hyperbolique*

5.5 Fonctions hyperboliques réciproques