




## Tarea 2 - TALF

Jorge Contreras 201573547-6  
Juan Pablo Jorquera 201573533-6

### 1. Pregunta 1

Primero realizamos el AFD de la tabla para poder trabajar sobre él.



#### 1.1. Parte (a)


Primero hacemos la tabla correspondiente al autómata.

q1	X					
q2	O	X				
q3	X	O	X			
q4	X	X	X	X		
q5	X	X	X	X	O	
q6	X	O	X	O	X	X
	q0	q1	q2	q3	q4	q5


Tabla 1: Tabla de equivalencias

Luego continuamos eliminando los que son equivalentes:


- Eliminar q2:




- Eliminar q5:



- Eliminar q3:



- Eliminar  $q_6$ :




### 1.2. Parte (b)


- Tomando  $q_0$  y  $q_1$ : la palabra “b” distingue a ambos, ya que quedan en distinto estado de aceptación.
- Tomando  $q_0$  y  $q_4$ : simplemente “a” los distingue.
- Tomando  $q_1$  y  $q_4$ : “ab” los distingue.

### 1.3. Parte (c)

- Primero normalizamos para tener un nodo de entrada y de salida claros.




- Luego eliminamos el nodo “basura” que se encuentra.






- Eliminamos q4.



- Finalmente eliminamos q0.



#### 1.4. Parte (d)

Corresponde al lenguaje que comienza con una o más “b” y, si lo sigue una “a”, se repite el proceso con “b” nuevamente.

## 2. Pregunta 2

Si tomamos  $L_B = LL_bL$  donde  $L_b = \{b\}$ , claramente  $L_B$  y  $L_b$  son regulares al ser parte L. Por otro lado tenemos que:

$$L' \Leftrightarrow L_B - L_b \quad (1)$$

Usando propiedades de conjuntos tenemos:

$$L' \Leftrightarrow L_B - L_b \Leftrightarrow L_B \cap L_b^c \quad (2)$$

Donde por propiedades de clausura se sabe que como  $L_b$  es regular, entonces  $L_b^c$  también es regular. De igual forma, se deduce que la intersección de ambos lenguajes regulares  $L_B$  y  $L_b^c$  es regular, por lo que  $L'$  también es regular.



### 3. Pregunta 3

#### 3.1. Parte (a)

Sea  $w = a^n b^{n-1}$ ,  $w \in L_1$   
 $w = xyz$ , con  $|xy| \leq n$  ;  $|y| \geq 1$ .

Necesariamente  $x$  e  $y$  están dentro de  $a^n$ , Así:

$$x = a^p, p \geq 0.$$

$$y = a^q, q \geq 1.$$

$$z = a^{n-p-q} b^{n-1}.$$

Aplicamos Teorema del Bombeo,  $k$  veces  $y$ .

$$xy^k z = a^{n+q(k-1)} b^{n-1}.$$

Para que la palabra pertenezca a  $L_1$  se debe cumplir que:

$$|n+q(k-1) - (n-1)| \leq 42$$

$$|q(k-1) - 1| \leq 42$$

Elegimos  $k=50$ , quedando

$$|49q - 1| \leq 42$$

Como  $q \geq 1$ , lo anterior es una contradicción y por lo tanto el lenguaje  $L_1$  NO es regular.

#### 3.2. Parte (b)

Sea  $w = a^n c a^n$ ,  $w \in L_2$   
 $w = xyz$ , con  $|xy| \leq n$  ;  $|y| \geq 1$ .

Necesariamente  $x$  e  $y$  están dentro de  $a^n$ , Así:

$$x = a^p, p \geq 0.$$

$$y = a^q, q \geq 1.$$

$$z = a^{n-p-q} c a^n.$$

Aplicamos Teorema del Bombeo,  $k$  veces  $y$ .

$$xy^k z = a^{n+q(k-1)} c a^n.$$

Para que la palabra pertenezca a  $L_2$  se debe cumplir que:

$$n+q(k-1) = n$$

$$q(k-1) = 0$$

Elegimos  $k=2$ , quedando



$$q = 0$$

Pero  $q \geq 1$ , por lo cual la palabra no pertenece al lenguaje y así demostramos que  $L_2$  NO es regular.

### 3.3. Parte (c)

Como pudimos generar un autmata para el lenguaje,  $L_3$  es regular.

### 3.4. Parte (d)

Sea  $w = a^{2n}b^{2n-1}, w \in L_4$

$w = xyz$ , con  $|xy| \leq 2n$  ;  $|y| \geq 1$ .

Necesariamente  $x$  e  $y$  están dentro de  $a^{2n}$ , Así:

$$x = a^p, p \geq 0.$$

$$y = a^q, q \geq 1.$$

$$z = a^{2n-p-q}b^{2n-1}.$$

Aplicamos Teorema del Bombeo,  $k$  veces  $y$ .

$$xy^kz = a^{2n+q(k-1)}b^{2n-1}.$$

Para que la palabra pertenezca a  $L_4$  se debe cumplir:

$$(1)$$

$$2n+q(k-1) \geq 2n-1$$

$$q(k-1) \geq -1$$

Elegimos  $k=0$ , quedando

$$-q \geq -1$$

$$q \leq 1$$

Pero  $q \geq 1$ , existiendo así una contradicción.

$$(2)$$

$$2n+q(k-1) \text{ es par}$$

Elegimos  $k = 1/q + 1$

$$2n+q(1/q + 1 - 1)$$

$$2n+1$$

Lo cual siempre es impar.

Como no se cumple ni (1) ni (2), podemos asegurar que el lenguaje  $L_4$  NO es regular



#### 4. Pregunta 4

4.1. Parte (a)

4.2. Parte (b)

4.3. Parte (c)

#### 5. Pregunta 5

5.1. Parte (a)

5.2. Parte (b) \*

---

\* Los nombres de los nodos fueron puestos como etiquetas para evitar problemas de visibilidad. asdasd



### 5.3. Parte (c)

El estado inicial ( $q_0q_1q_2q_3$ ) del AFD es de aceptación, lo que significa que acepta la palabra vacía. Como sabemos que la expresión regular acepta “ab”, “aab” o “aba” tantas veces como se requiera, para llegar al segundo estado ( $q_4q_5q_6$ ) se requiere de una “a”, y como “a” no pertenece a la expresión regular, este no es un estado de aceptación. Luego, Si se ingresa una “b” se llega a una palabra aceptada por la expresión, por lo cual es estado de aceptación ( $q_0q_1q_2q_3q_7q_9$ ), si en su defecto se elige “a”, se llega a un estado de no aceptación ( $q_8$ ), ya que “aa” no pertenece a la expresión.

Siguiendo ahora desde el estado  $q_0q_1q_2q_3q_7q_9$  con “a” se llega al siguiente estado ( $q_0q_1q_2q_3q_4q_5q_6q_{11}$ ) donde sí hay aceptación dado que se formaría “aba”, la cual pertenece a la expresión, desde este estado si se elige “b” se vuelve al nodo  $q_0q_1q_2q_3q_4q_7q_9$ , generando un ciclo, porque se repite la expresión “ab” dos veces, siendo esto aceptado. Si por el contrario se opta por “a” se llega al estado  $q_4q_5q_6q_8$  que no es de aceptación dado que “abba” no pertenece a la expresión regular.

Desde  $q_8$  se puede llegar a  $q_0q_1q_2q_3q_{10}$  con “b”, formando la palabra “aab” que pertenece a la expresión, por esto es que es estado de aceptación.

El estado  $q_4q_5q_6q_8$  no es de aceptación, tal como se mencionó anteriormente, y eligiendo “a” se va al estado  $q_8$  que es el estado de basura, eligiendo en cambio “b” se llega al estado  $q_0q_1q_2q_3q_7q_9q_{10}$  que es de aceptación ya que al llegar a él se forma la palabra “abaab” que es la concatenación de “ab” y “aab”, lo cual es aceptado. Desde este se llega nuevamente al estado  $q_0q_1q_2q_3q_4q_5q_6q_{11}$  mediante “a”, y es nuevamente estado de aceptación dado que la palabra al llegar sería “abaaba” que es “aba” dos veces, lo cual es aceptado.

Estando todos los estado ya descritos, las demás posibles interacciones y ciclos se deben sólo a que la expresión regular que finaliza con \*, significando que se puede hacer el mismo proceso infinitas veces.