

DIAGNÓSTICO TARDÍO DE INFECCIÓN POR VIH: MAYOR PREVALENCIA EN MIGRANTES. ESTUDIO OBSERVACIONAL EN UN HOSPITAL GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

García Martín, Astudilla Francisco, Scapellato Pablo.

Especialidad: Infectología

Introducción

El diagnóstico tardío(DTa) de la infección VIH condiciona el acceso tardío de las personas al tratamiento. Muchos estudios muestran que la frecuencia de DTa, es superior en poblaciones vulnerables como los migrantes.

Objetivos

Comparar la prevalencia de DTa de infección por VIH(DxVIH) en migrantes internacionales con la de los argentinos.

Materiales y métodos

Estudio retrospectivo, observacional.

Se incluyeron las personas mayores de 16 años, asistidas en el hospital Santojanni, entre 01-2017 y 31-12-2022 con DxVIH hecho en el mismo periodo.

Definiciones:

DTa: recuento de CD4(CD4)<350/mm³ o enfermedad marcadora de SIDA(EnfSIDA) al DxVIH.
Enfermedad avanzada(DEnf): CD4<200/mm³ o EnfSIDA al DxVIH

Diagnóstico temprano(DTe): clasificación A1 de los CDC al DxVIH.

Migrante: no nacido en Argentina.

Excluidos: pacientes con diagnóstico previo y/o diagnosticados sin registro de CD4.

Se calcularon la mediana de CD4 y la prevalencia de DTa, DEnf y DTe en migrantes y argentinos. Se realizó Test de Fisher para comparar proporciones. Se asumió diferencia significativa con $p<0,05$.

Resultados

Asistimos 273 personas, 75 migrantes y 198 argentinos.

Los migrantes presentaron significativamente menor mediana de CD4 y DTe en comparación con los Argentinos. Además presentaron una tendencia a un mayor DTa y DEnf(Tabla 1). Aunque, cuando realizamos el análisis interanual, encontramos que, si excluimos aquellos pacientes diagnosticados en 2017, los migrantes, además, presentaron significativamente una mayor proporción de DEnf($p= 0,049$).

Tabla 1: análisis pacientes 2017-2022

| Variable | Migrantes (n=75) | Argentinos (n=198) | RR(IC95) | p |
|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| CD4; Mediana | 263(88 - 420) | 328(150-531) | | 0,0106 |
| DEnf;n(%) | 33(44) | 63(31,8) | 1,38(0,99–1,91) | 0,066 |
| DTa;n(%) | 51(68) | 109(55,05) | 1,23(1,01–1,50) | 0,055 |
| DTe;n(%) | 10(13,3) | 59(29,7) | 0,44(0,24–0,82) | 0,0049 |

Conclusiones

Los migrantes accedieron al diagnóstico en peor condición que los argentinos durante 2017-2022. Conocer este dato es imprescindible para mejorar el acceso al diagnóstico de esta población vulnerable. Se deberá observar si esta tendencia desde el 2017 continúa a lo largo de los años.

Trabajo de Investigación/Epidemiológico