

CONSUMO DE TABACO EN PERSONAS CON VIH ASISTIDAS EN EL CONSULTORIO EXTERNO DE INFECTOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION FRANCISCO SANTOJANNI

AUTORES: Bottaro Edgardo¹, Loprete Lucrecia², Scapellato Pablo¹.

- 1. Infectología, Hospital General de Agudos D F Santojanni**
- 2. Neumonología, Hospital General de Agudos D F Santojanni**

INTRODUCCION: El mayor riesgo cardiovascular de las personas con VIH (PCVIH) requiere de un adecuado enfoque de los factores de riesgo. El tabaquismo es, según la literatura, más prevalente entre PCVIH que en la población general, aunque en Argentina (prevalencia de tabaquismo 22%) ese dato es desconocido. Ya que los infectólogos devinieron en médicos de cabecera de las PCVIH, creemos necesario generar datos para mejorar el manejo de comorbilidades clásicamente desvinculadas de la infectología.

OBJETIVOS: Describir las características del consumo de tabaco en PCVIH asistentes al hospital General de Agudos D F Santojanni (HGADFS).

MATERIALES Y METODOS: Se administró una encuesta a PCVIH asistentes al consultorio externo de Infectología del HGADFS entre el 22-07-2022 y el 28-09-2023. Las respuestas se registraron en una planilla. Se calcularon frecuencias, proporciones y medianas. Se analizó mediante tablas de 2x2 y chi-2 (EPI-info 7.2.2.6). Se aplicaron los tests de Fagerström (dependencia) y Richmond (motivación).

RESULTADOS: Se entrevistaron 282 PCVIH (148 varones). El consumo de tabaco comenzó a los (mediana; RIC 25-75) 17 (14-19) años; 75,2% fumó alguna vez y 41,1% fumaba al momento de la encuesta. El consumo actual de tabaco fue significativamente más prevalente entre mujeres [47,7% vs 34,5%; RR 1,39 (1,04-1,84); p=0,03] y entre quienes usan/usaron drogas recreativas [57,8% vs 30,6%; RR 1,89 (1,43-2,49); p<0,00001]. Fue mayor (aunque sin significación estadística) entre aquellos con instrucción inferior a terciario/universitario incompleto [43,7% vs 31,7%; RR 1,38 (0,92-2,06); p=0,13] y entre quienes consumían o habían consumido alcohol en exceso [47,9% vs 37,6%; RR 1,27 (0,96-1,68) p=0,12]; 32,4% mostró dependencia mediana/alta; 60,2% tenía baja motivación para cesación; 64,8% no recordaba haber recibido instrucción médica sobre tabaquismo.

CONCLUSIONES: La población estudiada mostró alta prevalencia de tabaquismo activo (duplicando la nacional). Un tercio mostró alta/mediana dependencia; casi dos tercios baja motivación para la cesación. La mayoría no recordaba haber recibido instrucción médica sobre tabaquismo. Esto refuerza la necesidad de encarar agresivamente el tabaquismo en PCVIH.

Trabajo de investigación/epidemiológico