

# Clase 3

## \_ \_ Ecuaciones Diferenciales Exactas

**Definición:** Se llama *diferencial total* de la función  $z = f(t, x)$  a la expresión

$$dz = \frac{\partial f}{\partial t} dt + \frac{\partial f}{\partial x} dx$$

**Ejemplo:** Sea la función  $z = f(t, y) = t^2 \sin 3y$  el diferencial total es

$$dz = df = 2t \sin 3y dt + 3t^2 \cos 3y dy$$

**Definición:** La ecuación diferencial

$$M(t, y) dt + N(t, y) dy = 0$$

es exacta si existe una función  $f(t, y)$  tal que

$$\frac{\partial f}{\partial t} = M(t, y) \text{ y } \frac{\partial f}{\partial y} = N(t, y)$$

**Ejemplo:** Veamos que la ecuación diferencial:

$$2t \sin 3y dt + 3t^2 \cos 3y dy = 0$$

es exacta, ya que existe una función  $f(t, y) = t^2 \sin 3y$  que cumple que:

- $\frac{\partial f}{\partial t} = 2t \sin 3y$  y
- $\frac{\partial f}{\partial y} = 3t^2 \cos 3y$

Cuando la ecuación diferencial  $M(t, y) dt + N(t, y) dy = 0$  es exacta, podemos escribirla de la forma:

$$\frac{\partial f}{\partial t} dt + \frac{\partial f}{\partial y} dy = 0$$

de donde se concluye que  $f(t, y) = C$  es la solución de la ecuación diferencial. Según esto,  $t^2 \sin 3y = C$  es la solución de la ecuación diferencial:

$$2t \sin 3y dt + 3t^2 \cos 3y dy = 0$$

El teorema que se enuncia a continuación proporciona un criterio para saber cuando una ecuación diferencial es exacta. Además, en la demostración se exhibe el procedimiento para encontrar la solución.

**Teorema:** *Criterio para una ecuación diferencial exacta.*

La ecuación diferencial

$$M(t, y) dt + N(t, y) dy = 0$$

es exacta, si y solo si

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial t}$$

Supongamos que la ecuación diferencial es exacta, existe  $f(t, y)$ , tal que

$$\frac{\partial f}{\partial t} = M(t, y) \text{ y } \frac{\partial f}{\partial y} = N(t, y)$$

Derivando parcialmente de manera que obtengamos derivadas parciales mixtas, obtenemos

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial t} = \frac{\partial M}{\partial y} \text{ y } \frac{\partial^2 f}{\partial t \partial y} = \frac{\partial N}{\partial t}$$

como las segundas derivadas parciales mixtas de  $f$  son iguales, concluimos que:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial t}$$

Debemos mostrar que existe una función  $f(t, y)$  que satisface las siguientes condiciones:

- a)  $\frac{\partial f}{\partial t} = M(t, y)$
- b)  $\frac{\partial f}{\partial y} = N(t, y)$

De la condición **a)**, integrando parcialmente con respecto a  $t$ , obtenemos

$$f(t, y) = \int M(t, y) dt + g(y) \quad (3.1)$$

Integrar con respecto a una variable es el proceso inverso de derivar parcialmente con respecto a esa variable, en ambos casos las demás variables permanecen constantes. En 3.1  $g(y)$  se toma como la constante de integración.

Aplicando la condición **b)** a la función  $f(t, y)$  obtenida en 3.1 se tiene

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \int M(t, y) dt + g'(y) = N(t, y)$$

De aquí se concluye que

$$g'(y) = N(t, y) - \int \frac{\partial M}{\partial y} dt$$

el miembro derecho de esta igualdad no depende de  $t$ , pues su derivada parcial con respecto a  $t$  se anula. En efecto:

$$\frac{\partial N}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial t} \int \frac{\partial M}{\partial y} dt$$

que se reduce a

$$\frac{\partial N}{\partial t} - \frac{\partial M}{\partial y} = 0$$

Por lo tanto,  $g'(y)$  no contiene términos en  $t$ , de modo que por integración directa, obtenemos  $g(y)$ . Así hemos encontrado la función  $f(t, y)$  que se mostraba en 3.1.

Encontrada la función  $f(t, y)$  se escribe sencillamente  $f(t, y) = C$  solución de la ecuación diferencial exacta.

**Ejemplo:** Hallar la solución general de la ecuación diferencial

$$(ty^2 + \sin t) dt + (t^2y + 2e^{-y}) dy = 0$$

**Solución:** Primero verifiquemos que la ecuación **diferencial es exacta**, para ello identificamos

$$\bigcirc M(t, y) = ty^2 + \sin t \text{ entonces } \frac{\partial M}{\partial y} = 2ty$$

$$\bigcirc N(t, y) = t^2y + 2e^{-y} \text{ entonces } \frac{\partial N}{\partial t} = 2ty$$

Según el criterio del teorema la ecuación diferencial es exacta.

Existe entonces, una función  $f(t, y)$ , tal que

1.  $\frac{\partial f}{\partial t} = ty^2 + \sin t$
2.  $\frac{\partial f}{\partial y} = t^2y + 2e^{-y}$

De (1) obtenemos por integración parcial con respecto a  $t$

$$\int \frac{\partial f}{\partial t} = \int (ty^2 + \sin t) dt$$

$$f(t, y) = \frac{t^2y^2}{2} - \cos t + g(y)$$

este resultado lo derivamos parcialmente con respecto a  $y$

$$\frac{\partial}{\partial y} (f(t, y)) = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{t^2y^2}{2} - \cos t + g(y) \right)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = t^2y + g'(y)$$

igualamos a la condición (2)

$$t^2y + 2e^{-y} = t^2y + g'(y)$$

$$g'(y) = 2e^{-y}$$

para encontrar  $g(y)$  se integra directamente

$$\int g'(y) dy = \int 2e^{-y} dy$$

$$g(y) = -2e^{-y} + C$$

por lo tanto la función  $f(t, y)$  está definida como

$$f(t, y) = \frac{t^2y^2}{2} - \cos t + g(y)$$

$$= \frac{t^2y^2}{2} - \cos t - 2e^{-y} + C$$

donde

$$f(t, y) = \frac{t^2y^2}{2} - \cos t - 2e^{-y} + C$$

es la solución de la ecuación diferencial.

**Ejemplo:** Hallar una función  $M(t, y)$  de tal manera que la ecuación diferencial

$$M(t, y) dt + (2ye^t + y^2e^{3t}) dy = 0$$

sea exacta.

**Solución:** Para que la ecuación diferencial sea exacta se debe cumplir que

$$\begin{aligned}\frac{\partial M}{\partial y} &= \frac{\partial N}{\partial t} \\ \frac{\partial M}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial t} (2ye^t + y^2e^{3t}) \\ \frac{\partial M}{\partial y} &= 2ye^t + 3y^2e^{3t}\end{aligned}$$

integremos con respecto a  $y$  para obtener  $M$

$$\begin{aligned}\int \frac{\partial M}{\partial y} dy &= \int (2ye^t + 3y^2e^{3t}) dy \\ M(t, y) &= y^2e^t + y^3e^{3t} + g(t)\end{aligned}$$

Por lo tanto la función  $M(t, y)$  que hace la ecuación diferencial sea exacta es

$$M(t, y) = y^2e^t + y^3e^{3t} + g(t)$$

## 3.1 Transformar Ecuaciones a Ecuaciones Exactas

Existen ecuaciones de primer orden que no son exactas, pero que se pueden llevar a exactas multiplicándolas por un factor apropiado, llamdo **factor integrante**.

Supongamos que  $M(t, y) dt + N(t, y) dy = 0$  no exacta. Si el cociente

$$\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial t}}{N} \quad (3.2)$$

es una función de  $t$ , digamos  $f(t)$ , entonces  $e^{\int f(t) dt}$  es un factor integrante que convierte en exacta la ecuación.

De igual manera, si el cociente

$$\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial t}}{M}$$

es una función de  $y$ , digamos  $g(y)$ , entonces  $e^{-\int g(y)dy}$  es un factor integrante de la ecuación.

La forma cómo se obtuvo el factor integrante .

**Ejemplo:** Resolver la ecuación diferencial lineal:

$$y' + p(t)y = q(t)$$

**Solución:** Reescribiendo la ecuación tenemos

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dt} + p(t)y &= q(t) \\ \frac{dy}{dt} &= q(t) - p(t)y \\ dy &= [q(t) - p(t)y] dt \\ dy &= -[p(t)y - q(t)] dt \\ [p(t)y - q(t)] dt - dy &= 0\end{aligned}$$

Se observa que

- $M(t, y) = p(t)y - q(t)$
- $N(t, y) = 1$

Esta ecuación no es exacta, ya que

$$\begin{aligned}\frac{\partial M}{\partial y} &\neq \frac{\partial N}{\partial t} \\ p(t) &\neq 0\end{aligned}$$

Aplicando la fórmula para obtener el factor integrante con respecto a  $N$  se tiene

$$\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial t}}{N} = \frac{p(t) - 0}{1} = p(t)$$

encontes el factor integrante es  $e^{\int p(t)dt}$  que al multiplicar la ecuación diferencial

$$y'e^{\int p(t)dt} + p(t)ye^{\int p(t)dt} = q(t)e^{\int p(t)dt}$$

ecuación que se transforma en

$$\frac{d}{dt} \left[ y e^{\int p(t) dt} \right] = q(t) e^{\int p(t) dt}$$

e integrando en ambos lados se obtiene la solución implícita:

$$y e^{\int p(t) dt} = \int q(t) e^{\int p(t) dt} + C$$

luego

$$y = e^{-\int p(t) dt} \left[ \int q(t) e^{\int p(t) dt} + C \right]$$

**Ejemplo:** Hallar la solución de la ecuación diferencial:

$$3y' + y - 3 = 0$$

**Solución:** Reescribiendo la ecuación se tiene

$$3 \frac{dy}{dt} = 3 - y$$

se divide y se multiplica por 3 y  $dt$  respectivamente

$$dy = \left( 1 - \frac{y}{3} \right) dt$$

$$\left( \frac{y}{3} - 1 \right) dt + dy = 0$$

De esta ecuación se tiene

$$\bigcirc M(t, y) = \frac{y}{3} - 1 \text{ entonces } \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{1}{3}$$

$$\bigcirc N(t, y) = 1 \text{ entonces } \frac{\partial N}{\partial t} = 0$$

Como

$$\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial t}$$

se debe aplicar la fórmula para determinar el factor integrante

$$\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial t}}{N} = \frac{\frac{1}{3} - 0}{1} = \frac{1}{3}$$

entonces el factor integrante será  $e^{\int \frac{1}{3} dt} = e^{\frac{1}{3}t}$ . Luego se multiplica la ecuación diferencial por el factor de integración

$$3y' + y - 3 = 0$$

$$y' + \frac{1}{3}y = 1$$

$$y' e^{\frac{1}{3}t} + \frac{1}{3} y e^{\frac{1}{3}t} = e^{\frac{1}{3}t}$$

que se transforma en

$$\frac{d}{dt} \left[ y e^{\frac{1}{3}t} \right] = e^{\frac{1}{3}t}$$

integrando en ambos lados

$$y e^{\frac{1}{3}t} = 3e^{\frac{1}{3}t} + C$$

$$y = 3 + C e^{-\frac{1}{3}t}$$

**Ejemplo:** Resolver la ecuación diferencial

$$y' - \frac{1}{t}y = t^2$$

**Solución:** Se debe reescribir la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = t^2 + \frac{1}{t}y$$

$$dy = \left[ t^2 + \frac{1}{t}y \right] dt$$

$$- \left[ t^2 + \frac{1}{t}y \right] dt + dy = 0$$

$$\left[ t^2 + \frac{1}{t}y \right] dt - dy = 0$$

Tenemos que

$$\bigcirc M(t, y) = t^2 + \frac{1}{t}y \text{ entonces } \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{1}{t}$$

$$\bigcirc N(t, y) = -1 \text{ entonces } \frac{\partial N}{\partial t} = 0$$

Como

$$\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial t}$$

se aplica la fórmula para calcular el factor de integración

$$\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial t}}{N} = \frac{\frac{1}{t} - 0}{-1} = -\frac{1}{t}$$

el factor de integración es

$$e^{-\int \frac{1}{t} dt} = e^{-\ln|t|}$$

$$= e^{\ln|t^{-1}|} = t^{-1} = \frac{1}{t}$$



multiplicamos la ecuación diferencial por el factor de integración

$$y' \frac{1}{t} - \frac{1}{t} \cdot \frac{1}{t} y = \frac{1}{t} t^2$$

$$\frac{d}{dt} \left[ y \cdot \frac{1}{t} \right] = t$$

integramos en ambos lados

$$\int \frac{d}{dt} \left[ y \cdot \frac{1}{t} \right] = \int t dt$$

$$y \cdot \frac{1}{t} = \frac{t^2}{2} + C$$

$$y = \frac{t^3}{2} + tC$$

**Ejemplo:** Hallar la solución de la ecuación diferencial

$$(y + \cos t) dt + (t + ty + \sin t) dy = 0$$

**Solución:** Se tiene que

$$\bigcirc M(t, y) = y + \cos t \text{ entonces } \frac{\partial M}{\partial y} = 1$$

$$\bigcirc N(t, y) = t + ty + \sin t \text{ entonces } \frac{\partial N}{\partial t} = 1 + y + \cos t$$

Cómo

$$\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial t}$$

entonces se aplica la fórmula para determinar el factor integrante

$$\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial t}}{M} = \frac{1 - (1 + y + \cos t)}{y + \cos t}$$

$$= \frac{1 - 1 - y - \cos t}{y + \cos t}$$

$$= \frac{-(y + \cos t)}{(y + \cos t)} = -1$$

El factor integrante es

$$e^{-\int -1 dy} = e^y$$

multiplicamos la ecuación diferencial por el factor de integración

$$e^y (y + \cos t) dt + e^y (t + ty + \sin t) dy = 0$$

$$(ye^y + e^y \cos t) dt + (e^y t + te^y y + e^y \sin t) dy = 0$$

ahora

$$\bigcirc M(t, y) = ye^y + e^y \cos t \text{ entonces } \frac{\partial M}{\partial y} = e^y + ye^y + e^y \cos t$$

$$\bigcirc N(t, y) = e^y t + te^y y + e^y \sin t \text{ entonces } \frac{\partial N}{\partial t} = e^y + ye^y + e^y \cos t$$

La ecuación se convirtió en una ecuación diferencial exacta, por lo tanto existe una función  $f(t, y) = C$  tal que

$$\bigcirc \frac{\partial f}{\partial t} = ye^y + e^y \cos t$$

$$\bigcirc \frac{\partial f}{\partial y} = te^y + te^y y + e^y \sin t$$

Se integra parcialmente

$$\int \frac{\partial f}{\partial t} = \int (ye^y + e^y \cos t) dt$$

$$f(t, y) = yte^y + e^y \sin t + g(y)$$

luego se deriva la función  $M$  con respecto a  $y$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = te^y + yte^y + e^y \sin t + g'(y)$$

la cual igualamos a la función  $N(t, y)$

$$te^y + te^y y + e^y \sin t = te^y + te^y y + e^y \sin t + g'(y)$$

$$g'(y) = 0$$

por integración  $g(y) = k$  entonces la solución de la Ecuación Diferencial es

$$yte^y + e^y \sin t = C$$