GOBIERNO DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

aemet Agencia Estatal de Meteorología

Resumen mensual climatológico julio 2026

Departamento de Producción


Área de Climatología y Aplicaciones Operativas

Temperatura

Julio este año ha tenido un carácter extraordinariamente cálido, con una temperatura media en la España peninsular de 25,7 °C, lo cual supone que se supera en 2,6 °C la temperatura media de julio promediada en el periodo de referencia 1991-2020. Es, junto con el del año 2022, el julio más cálido desde el comienzo de la serie en 1961. De los diez julios más cálidos de la serie, ocho han ocurrido en este siglo XXI.

	Temperatura media		
	T media (°C)	**Anomalía (°C)**	**Carácter**
España peninsular	25,7	+2,6	Extremadamente cálido
Baleares	28,1	+3,0	Extremadamente cálido
Canarias	23,5	+1,2	Muy cálido

Este mes la temperatura ha tenido un carácter extremadamente cálido en la práctica totalidad del tercio norte de la Península y en su costa mediterránea; en el resto de la misma ha sido predominante el carácter muy cálido. En Baleares la temperatura ha sido extremadamente cálida, mientras que en Canarias según las zonas ha sido cálida o muy cálida.




EC = Extremadamente cálido. T > Tmax. La temperatura sobrepasa el valor máximo registrado en el periodo de referencia 1991-2020.
MC = Muy cálido: P80 < T ≤ Tmax. La temperatura se encuentra en el intervalo correspondiente al 20 % de los años más cálidos.
C = Cálido: P60 < T ≤ P80.
N = Normal: P40 < T ≤ P60.
F = Frío: P20 < T ≤ P40.
MF = Muy frío: Tmin ≤ T ≤ P20. La temperatura se encuentra en el intervalo correspondiente al 20 % de los años más fríos.
EF = Extremadamente frío. T < Tmin. La temperatura no alcanza el valor mínimo registrado en el periodo de referencia 1991-2020.

FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Las anomalías térmicas han llegado a ser de alrededor de +5 °C en áreas del norte de Navarra y de Aragón. Por otra parte, en La Rioja, País Vasco, el interior de Cataluña y Galicia la temperatura media ha sido unos 4 °C por encima de lo normal. En el resto de esas comunidades, así como en Asturias, Cantabria, Comunitat Valenciana, Murcia, este de Castilla-La Mancha, la mayor parte de Castilla y León, así como en parte de Madrid y de Andalucía la anomalía ha

estado en torno a +3 °C. Solamente ha estado en torno a +1 °C en la frontera de Extremadura con Portugal y áreas del noroeste de Andalucía; en el resto de la Península, la anomalía ha sido de unos +2 °C. En el norte de Mallorca ha llegado a unos +4 °C, mientras que en el resto de Baleares ha estado en torno a los +3 °C. En Canarias ha variado entre +1 °C y +2 °C según las zonas.



FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La media de las temperaturas máximas de junio se ha situado 3,3 °C por encima de su valor normal, mientras que la de las mínimas estuvo 2,1 °C por encima de la media, por lo que la media de la oscilación térmica diaria estaría 1,2 °C por encima de su valor normal en un mes de junio.

Quedándonos solo con las estaciones principales, en 33 de ellas la temperatura media del mes de julio ha sido la más alta desde el comienzo de su respectiva serie; en 31 se ha superado la temperatura media mensual de las máximas y en 21 la temperatura media de las mínimas; incluso en 16 estaciones principales se han dado los tres casos a la vez. Estas estaciones se encuentran en la costa cantábrica, depresión del Ebro y mitad norte de la costa mediterránea. Por ejemplo, en A Coruña, cuya serie se remonta a 1931, se han superado este año las tres marcas anteriores, todas ocurridas en el año 2006, en 0,8 °C la temperatura media mensual y en 0,7 °C la media de las máximas y de las mínimas. Durante prácticamente todo el mes las temperaturas han sido excepcionalmente altas, únicamente entre el 25 y 27 las temperaturas diurnas y nocturnas bajaron hasta valores normales o algo frescos, suponiendo un breve respiro entre las olas de calor. Este mes de julio se han registrado dos olas de calor que han afectado a la práctica totalidad de la Península. La primera ocurrió entre los días del 2 al 24, siendo además de las más duraderas de la serie con 23 días, solo superada por la primera ola del verano de 2015 que duró 26 días. Además, el valor de la anomalía media de la ola, de 4,0 °C, también es de los más altos, concretamente el cuarto de la serie. La segunda ola de este mes comenzó el día 28 y se extendió hasta agosto.

Entre las estaciones principales las temperaturas más altas de este mes han ocurrido en Murcia, donde se alcanzaron 44,2 °C el día 23, en Granada/Aeropuerto con 43,9 °C el día 22, los mismos que se midieron en Alcantarilla/Base Aérea el día 15, y en Granada/Base Aérea con 43,2 °C el día 21. En siete estaciones principales se ha alcanzado la temperatura más alta en un día de julio de sus respectivas series.


Las temperaturas mínimas más bajas registradas en las estaciones principales han sido los 7,1 °C registrados en el Puerto de Navacerrada, los 8,1 °C de Burgos/Aeropuerto, los 8,3 °C de Molina de Aragón y los 8,9 °C de Valladolid/Aeropuerto; todas ellas se registraron el día 26. En dieciséis de las ochenta y seis estaciones principales la temperatura mínima del mes ha sido la más alta desde que se tienen registros.

Precipitación

El mes de julio de 2026 ha tenido carácter extremadamente seco en cuanto a precipitaciones, con un valor de precipitación media sobre la España peninsular de 4,3 mm, valor que representa el 26 % del valor normal del mes del periodo de referencia 1991-2020. Se ha tratado del mes de julio más seco de la serie desde 1961.

	Precipitación		
	P (mm)	**Porcentaje (%)**	**Carácter**
España peninsular	4,3	26	Extremadamente seco
Baleares	1,9	34	Seco
Canarias	1,7	189	Húmedo

El carácter de la precipitación fue predominantemente seco o muy seco en gran parte de la Península. El carácter muy seco se extendió por amplias zonas del tercio norte, especialmente por el valle del Ebro y el nordeste peninsular, así como por sectores de Galicia y de la meseta norte. El carácter seco predominó en buena parte del centro y oeste peninsular y en extensas áreas de Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía. Asimismo, se registraron zonas de carácter extremadamente seco en el valle del Ebro, en Cataluña y en los Pirineos. Las precipitaciones tuvieron un carácter normal principalmente en zonas del sur y sureste peninsular y, de forma más dispersa, en áreas del interior y del norte. El carácter húmedo quedó restringido a áreas aisladas del centro y sureste peninsular. En Baleares el carácter de la precipitación fue variable, entre normal y muy seco, con áreas secas y húmedas en Mallorca, mientras que en Canarias predominó el carácter normal, con carácter húmedo en El Hierro y muy húmedo en La Gomera y el norte de Fuerteventura.




EH = Extremadamente húmedo. PR > PR_{max}. La precipitación sobrepasa el máximo registrado en el periodo de referencia 1991-2020.
MH = Muy húmedo: P_{80} < PR ≤ PR_{max}. La precipitación se encuentra en el intervalo del 20 % de los años más húmedos.
H = Húmedo: P_{60} < PR ≤ P_{80}.
N = Normal: P_{40} < PR ≤ P_{60}.
S = Seco: P_{20} < PR ≤ P_{40}.
MS = Muy seco: PR_{min} ≤ PR ≤ P_{20}. La precipitación se encuentra en el intervalo del 20 % de los años más secos.

ES = Extremadamente seco. PR < PR_{min}. La precipitación no alcanza el mínimo registrado en el periodo de referencia 1991-2020.

FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Las precipitaciones diarias más elevadas registradas en estaciones principales durante el mes de julio fueron en Santiago de Compostela/Aeropuerto, con 51,8 mm el día 11; Girona/Aeropuerto, con 38,0 mm, Bilbao/Aeropuerto, con 21,3 mm y Hondarribia-Malkarroa, con 13,0 mm, todas ellas el día 25; Santander, con 11,8 mm el día 16; Madrid/Cuatro Vientos, con 11,7 mm el día 7; Getafe, con 10,6 mm el día 7; Ponferrada, con 10,6 mm el día 24; Murcia, con 9,0 mm el día 23; Ávila, con 8,8 mm el día 10; y Logroño/Aeropuerto, con 8,6 mm el día 9.


En cuanto a las precipitaciones mensuales acumuladas, los valores más altos se observaron en Santiago de Compostela/Aeropuerto, con 52,2 mm; Girona/Aeropuerto, con 38,0 mm; Santander/Aeropuerto, con 30,2 mm; Bilbao/Aeropuerto, con 29,4 mm; Ponferrada, con 22,0 mm; Hondarribia-Malkarroa, con 21,6 mm; Oviedo, con 20,0 mm; Donostia/San Sebastián, Igeldo, con 17,3 mm; Asturias/Aeropuerto, con 14,9 mm; y Logroño/Aeropuerto, con 13,6 mm.




FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Finalmente, en las siguientes figuras se representan los mapas de precipitación acumulada decenal. Estas figuras permiten analizar con detalle la distribución espacial de las precipitaciones a lo largo de cada decena del mes e identificar las áreas con mayores acumulados. La escala de colores facilita la interpretación rápida de los episodios pluviométricos más significativos y su extensión geográfica.


Precipitación acumulada (mm) 1-10 julio



Precipitación acumulada (mm) 11- 20 julio



Precipitación acumulada (mm) 21-31 julio



NOTA importante: *Desde enero de 2023 se ha empezado a utilizar en la producción climatológica de AEMET los valores Normales Climatológicos Estándares para el período 1991-2020, elaborados en el Área de Climatología y Aplicaciones Operativas de AEMET, de conformidad con las directrices marcadas por la OMM en su Resolución 16 (Cg-17).*

NOTA*: En septiembre de 2020 se pasó a utilizar como valores de referencia para la vigilancia del clima en España los valores medios en el territorio peninsular español de las rejillas mensuales y anuales de temperatura y precipitación descritas en las notas técnicas 31 y 32 de AEMET (periodo de referencia: 1981-2010). Este cambio de metodología puede dar lugar a diferencias significativas con los resultados que se obtenían a partir de los valores de referencia anteriormente utilizados.*

NOTA*: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.*

©AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma

Precipitación por cuencas

El mes de julio presentó un carácter extremadamente seco tanto en la vertiente atlántica como en la vertiente mediterránea, con unas precipitaciones estimadas del 35 % y del 16 % de los valores normales del periodo 1991-2020, respectivamente.

En la vertiente atlántica, el mes resultó muy seco en todas las cuencas salvo en la cuenca del Guadalquivir que resultó seco. Ninguna de las cuencas de esta vertiente alcanzó la mitad de su valor normal.

Por otra parte, en la vertiente mediterránea el mes resultó extremadamente seco en las cuencas del Pirineo Oriental y del Ebro, muy seco en la cuenca del Júcar y seco en las cuencas del Sur y del Segura. Al igual que en la vertiente atlántica, todas las cuencas registraron precipitaciones por debajo de sus valores normales.

CUENCAS	PM	PE	% P	CA	PA	% PA
NORTE Y NOROESTE	42,4	19,3	46	MS	1237,9	97
DUERO	20,2	4,5	23	MS	561,7	101
TAJO	11,0	1,8	16	MS	650,3	115
GUADIANA	5,4	0,1	2	MS	551,0	111
GUADALQUIVIR	3,2	0,3	10	S	704,8	125
SUR	2,0	0,1	5	S	504,6	102
SEGURA	5,8	1,8	32	S	357,4	103
JÚCAR	15,2	2,2	14	MS	451,7	97
EBRO	32,7	4,5	14	ES	521,6	91
PIRINEO ORIENTAL	40,1	5,5	14	ES	706,1	110
VERTIENTE ATLANTICA	14,2	4,9	35	ES	721,4	107
VERTIENTE MEDITERRANEA	21,4	3,3	16	ES	503,3	95
MEDIA PENINSULAR	18,7	4,3	23	ES	640,4	104

FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.


PM = Precipitación media 1991-2020.
PE = Precipitación media estimada del mes.
% P = % con respecto a la media 1991-2020.
CA = Carácter de la precipitación estimada del mes.
EH = Extremadamente húmedo.
MH = Muy húmedo.
H = Húmedo.
N = Normal.
S = Seco.
MS = Muy seco.
ES = Extremadamente seco
PA = Precipitación estimada acumulada desde 1º de octubre.
% PA = % con respecto a la media 1991-2020 de las precipitaciones acumuladas.

Las posibles variaciones en PA, PE y SPI se deben al recálculo de la precipitación con un número mayor de estaciones

Índice de Precipitación Estandarizado

El índice de precipitación estandarizado (SPI) acumulado de 12 meses (desde el 1 de agosto de 2025) es negativo en las cuencas del Ebro, del Norte y Noroeste, del Júcar y del Duero, y positivo en el resto de cuencas. Respecto al mes anterior, el SPI ha disminuido en todas las cuencas. Al finalizar el mes, el SPI toma valores comprendidos entre -1,0 (Ebro) y 0,7 (Guadalquivir).


SPI 12 meses – jul/26



Insolación

La insolación acumulada a lo largo del mes de julio fue superior en más de un 10 % al valor normal (período de referencia 1991-2020) en el tercio norte peninsular y en gran parte de Canarias. En el resto fue normal.

El valor máximo de insolación se observó en Cáceres con 415 horas, seguido de Salamanca/Aeropuerto con 412 horas; mientras que el valor mínimo se registró en Asturias/Aeropuerto con 196 horas acumuladas.



FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Viento

Las rachas máximas de viento destacadas del mes de julio en estaciones principales correspondieron a Izaña con 88 km/h, Zaragoza/Aeropuerto con 83 km/h, Cádiz con 80 km/h, Gran Canaria/Aeropuerto con 78 km/h, Almería/Aeropuerto con 76 km/h, Lanzarote/Aeropuerto con 74 km/h, Tenerife Sur/Aeropuerto con 72 km/h y Burgos/Aeropuerto con 70 km/h.