



# TABLA DE LAXANTES



Fármacos orales, soluciones rectales y enemas de limpieza

## 1 FÁRMACOS ORALES

| Tipo de laxante                                                                                                   | Nombre comercial                 | Composición / ejemplo                       | Mecanismo de acción                                                      | Posología y vía                                                      | Riesgos médicos                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>LUBRICANTES / EMOLIENTES</b> | <b>Hodernal Emuliquen Simple</b> | Parafina líquida (aceite vegetal)           | Capa que ablanda las heces y la lubrica                                  | Oral<br>15 mL/24 h                                                   |  Aspiración, neumonía lipóidea, menor absorción de vitaminas A, D, E, K                                                     |
|  <b>OSMÓTICOS</b>                | <b>Duphalac</b>                  | Lactulosa                                   | Atrae agua que aumenta el peristaltismo                                  | Oral 15–45 mL/día                                                    |  Meteorismo, diarrea, alteraciones hidroelectrolíticas;                                                                     |
|                                                                                                                   | <b>Oponaf</b>                    | Lactitol                                    |                                                                          | Oral 20 g/día                                                        |                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                   | <b>Omnilax</b>                   | Macrogol 4000                               |                                                                          | Oral 1–2 sobres/día                                                  |  Citrafleet puede causar deshidratación grave, IRA, hipoNa/hipoK.                                                           |
|                                                                                                                   | <b>Movicol</b>                   | Macrogol 3350 + electrolitos                |                                                                          | Oral 1–3 sobres/día                                                  |                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                   | <b>Citrafleet</b>                | Ácido cítrico + óxido de magnesio           |                                                                          | Oral 2 sobres según pauta                                            |                                                                                                                                                                                                                |
|  <b>FORMADORES DE VOLUMEN</b>  | <b>Plantago</b>                  | Plantago ovata                              | Forma masa intestinal                                                    | Oral<br>1 sobre/8–12 h                                               |  Riesgo de bezoar si poca agua; requiere hidratación                                                                      |
|  <b>PAMORA</b>                 | <b>Rizmoic Relistor Moventig</b> | Naldemedina<br>Metilnaltrexona<br>Naloxegol | Antagonista opioides que mejora el estreñimiento sin quitar la analgesia | Rizmoic oral 0,2 mg/24 h<br>Relistor 1 amp/48 h<br>Moventig 1 comp/d |  Dolor abdominal, diarrea, riesgo de perforación gastrointestinal, precaución si obstrucción o alto riesgo de perforación |
|  <b>PROCINÉTICOS</b>           | <b>Pantomicina</b>               | Eritromicina                                | Agonista receptores de motilina                                          | IV/oral<br>100–250 mg/8 h                                            |  Arritmias, QT largo; ECG obligatorio; precaución con K o Mg bajos                                                        |

## 2 SOLUCIONES RECTALES

| Tipo de laxante                                                                                                             | Nombre comercial          | Composición / ejemplo                                                  | Mecanismo de acción                                                | Posología y vía                    | Riesgos médicos                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ESTIMULANTES RECTALES</b>            | <b>Dulcolaxo</b>          | Bisacodilo                                                             | Estimula motilidad intestino                                       | Rectal<br>1 supositorio 10 mg/24 h |  Cólicos, irritación rectal                       |
|  <b>OSMÓTICOS / HUMECTANTES RECTALES</b> | <b>Micralax Clisteran</b> | Citrato de sodio (osmótico) + sorbitol y acetato de sodio (humectante) | Atrae agua y reblandece las heces por acción osmótica y humectante | Rectal<br>1 cánula/24 h            |  Irritación local, diarrea, evitar uso prolongado |

## 3 ENEMAS DE LIMPIEZA

| Tipo                                                                                                                       | Composición habitual                                                   | Uso clínico habitual                  | Clave práctica                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Agua jabonosa</b>                   | 1.000 mL de agua templada a 37 °C + 27 mL de jabón de Castilla líquido | Estreñimiento, preparación intestinal | Irritación leve; estimula el peristaltismo.                                   |
|  <b>Aceite</b>                          | Aceite mineral 100%, volumen habitual 120 mL                           | Impactación fecal, heces duras        | Lubricante y emoliente; facilita desimpactación                               |
|  <b>Lactulosa (Duphalac®)</b>           | 300 mL de lactulosa + 700 mL de agua                                   | Estreñimiento                         | Efecto osmótico; retener 30–60 min si tolera.                                 |
|  <b>Enema Cassen (fosfato de sodio)</b> | 250 mL del preparado comercial                                         | Estreñimiento                         | Tiempo de acción 5 minutos; estimulador del peristaltismo y ablanda las heces |

### GRUPOS FARMACOLÓGICOS

 Procínéticos

 PAMORA

 Lubricantes/emolientes

 Estimulantes

 Osmóticos

 Formadores de volumen



**PRECAUCIONES GENERALES:**  
revisar interacciones, función renal y electrolitos antes de intensificar tratamiento.



**ANTES DE INDICAR ENEMAS:**  
valorar impactación fecal, íleo u obstrucción. Administrar soluciones templadas y lentamente.



CONSULTAR FICHA TÉCNICA EN CIMA-AEMPS