Informe salida de campo: Hongos de la Reserva de Yotoco

Oct 21, 2026 · @Juan david

Juan David Rojas Villafañe
Ingeniería Agronómica · Facultad de Ciencias Agropecuarias
Asignatura: Hongos y Oomicetos (2026-2S)
Docentes: Carlos Alberto Huertas Davey y Eyder Daniel Gómez López
Fecha de la salida: 20 de octubre de 2026
Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira

1. Introducción

La salida fue un recorrido por los senderos de la Reserva Forestal Bosque de Yotoco, área de bosque administrada por la Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira, para reconocer, a ojo macro, la diversidad de hongos presentes y entender su papel en el ecosistema y en el agro. El docente organizó la jornada en una introducción teórica y un recorrido por estaciones, donde se observaron, tocaron, olieron y fotografiaron especímenes.

Objetivos de la salida

1. Reconocer los grandes grupos de hongos y su relación simbiótica con las plantas.
2. Identificar los caracteres morfológicos básicos de los basidiomicetos en campo.
3. Relacionar los hongos con los campos de acción del ingeniero agrónomo: alimentación, industria, medicina, fitopatología y biodiversidad.

La salida se realizó el 20 de octubre de 2026, con los profesores Carlos Alberto Huertas Davey y Eyder Daniel Gómez López, como práctica de la asignatura Hongos y Oomicetos.

2. Marco conceptual

2.1 Grupos y simbiosis

El recorrido se centró en los **basidiomicetos**, con referencias a **ascomicetos** y **glomeromicotas**. Muchos de estos hongos forman micorrizas: asociaciones donde el micelio entrega agua y nutrientes a la raíz a cambio de carbohidratos.

- **Micorriza arbuscular (Glomeromycota):** presente en la mayoría de las plantas cultivadas. El café depende casi de forma obligada de ella cuando los nutrientes no están disponibles cerca de la raíz.
- **Ectomicorriza obligada:** el pino no crece sin su hongo. Las primeras siembras en Colombia fracasaron con semilla; prosperaron cuando las plántulas llegaron con suelo y micorriza. Por eso las plantaciones forestales inoculan.
- Estos hongos no se cultivan solos en medio artificial: el inóculo se obtiene del suelo de la rizosfera de la planta hospedera.

2.2 Morfología del basidiocarpo

Los caracteres que se observan en campo para identificar un basidiomiceto son:

Estructura	Qué es	Variación que sirve para identificar
Píleo (sombrero)	Parte superior del carpóforo	Forma, color, textura, ausente en orellanas
Himenio	Cara inferior donde se forman los basidios	Láminas o poros (poliporos)
Láminas	Placas radiales bajo el píleo	Libres, adheridas o irregulares al pie
Estípite (pie)	Soporte del píleo	Liso, escamoso, central o lateral
Anillo	Resto del velo en el pie	Presente o ausente
Volva	Base abultada del pie	Presente o ausente
Micelio	Red de hifas en el sustrato	Visible al arrancar el hongo

En el himenio los **basidios** producen las **basidiosporas**, unidades de dispersión que dan nombre al grupo. El olor (a tierra, papel mojado o fétido) también es un carácter diagnóstico.




Figura 1. Esquema del basidiocarpo · basado en los dibujos de clase

3. Los hongos como campo de acción del agrónomo

El mensaje central del docente fue que cada práctica debe tener un propósito: saber qué se aprende y dónde se aplica al salir de la universidad.

Área	Ejemplos del recorrido
Alimentación	Champiñón (*Agaricus*), presente en Colombia hace unos 50 años; orellanas (*Pleurotus*) silvestres con potencial gourmet por su perfil de sabor
Medicina	Hongos psicoactivos de uso ancestral, reservados al chamán, hoy investigados para tratamientos psiquiátricos
Industria y biotecnología	Enzimas fúngicas para detergentes, alcoholes y proteínas; hongos lignícolas como *Rigidoporus* como fuente de enzimas
Fitopatología	Llagas radicales que matan café y aguacate en la zona cafetera (*Rosellinia*, *Armillaria*)
Suelos y restauración	Empresas de inóculo micorrízico para recuperar suelos degradados; muy pocos especialistas en el mundo
Biodiversidad	Inventario de especies: en menos de 300 m de sendero se contaron unos 20 hongos

El recorrido también mostró la sucesión en la hojarasca: los actinomicetos (*Streptomyces*) llegan primero con su maquinaria enzimática y luego entran los hongos descomponedores. Al cierre, el docente insistió en leer el entorno completo: densidad de plantas, calidad del agua y drenaje.

4. Hongos observados en el recorrido

En el recorrido se tomaron cerca de 91 fotografías. De ellas se reconocieron, a nivel de género y solo por imagen, 32 géneros de hongos y 2 de mixomicetos. Predominan los basidiomicetos (31 géneros); el único ascomiceto fue Xylaria, que apareció en varias formas, incluida una amarilla. La mayoría pertenece al orden Agaricales y crece sobre madera en descomposición (figuras 2 y 3).

Las identificaciones son tentativas: se basan en fotografía, sin microscopía ni esporada. "Probable" indica que el género necesita confirmación.

Método de identificación. Cada fotografía se llevó a género con claves dicotómicas y guías de campo: Largent y Baroni (1988) para hongos con láminas, Ryvarden (2004) para poliporos y la guía de Franco-Molano et al. (2000) para setas de Colombia. La clasificación superior sigue a Wijayawardene et al. (2022) y, para Polyporales, a Justo et al. (2017). Los nombres válidos se verificaron en Index Fungorum y MycoBank, y su presencia en el país en el catálogo de Vasco-Palacios et al. (2021) y Franco-Molano et al. (2010). Como referencia regional se usaron los inventarios de macrohongos del Valle del Cauca de García Lemos y Bolaños (2010) y Soto-Medina y Bolaño-Rojas (2013).




Figura 2. Géneros por orden · conteo de la tabla 4.1, 32 géneros



Figura 3. Géneros por sustrato · conteo de la tabla 4.1, 32 géneros

4.1 Inventario por género

Filo	Clase	Orden	Familia	Género	Sustrato	Confianza
Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Agaricaceae	***Macrolepiota***	Suelo	Alta
Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Agaricaceae	***Lycoperdon***	Suelo	Alta
Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Agaricaceae	*Apioperdon*	Madera	Alta
Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Agaricaceae	*Leucocoprinus*	Suelo	Alta
Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Agaricaceae	*Leucoagaricus*	Hojarasca	Probable
Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Agaricaceae	*Cystolepiota*	Hojarasca	Probable

Filo	Clase	Orden	Familia	Género	Sustrato	Confianza
Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Psathyrellaceae	*Coprinellus*	Suelo	Probable
Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Marasmiaceae	*Marasmius*	Hojarasca	Alta
Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Omphalotaceae	*Gymnopus*	Hojarasca	Probable
Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Mycenaceae	*Mycena*	Madera	Alta
Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Mycenaceae	*Favolaschia*	Madera	Alta
Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Pleurotaceae	***Pleurotus***	Madera	Alta
Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Physalacriaceae	*Cyptotrama*	Madera	Alta
Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Physalacriaceae	*Armillaria*	Madera	Probable
Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Entolomataceae	*Entoloma*	Suelo	Alta
Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Hymenogastraceae	*Gymnopilus*	Madera	Probable
Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Pluteaceae	*Pluteus*	Hojarasca	Probable
Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Porotheleaceae	*Gerronema*	Madera con musgo	Probable
Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Schizophyllaceae	*Schizophyllum*	Madera	Probable
Basidiomycota	Agaricomycetes	Polyporales	Polyporaceae	***Polyporus*** s.l.	Madera	Alta
Basidiomycota	Agaricomycetes	Polyporales	Polyporaceae	*Lentinus*	Madera	Probable
Basidiomycota	Agaricomycetes	Polyporales	Polyporaceae	*Panus*	Madera	Probable
Basidiomyco	Agaricomycet	Polyporales	Polyporacea	*Trametes*	Madera	Alta

Filo	Clase	Orden	Familia	Género	Sustrato	Confianza
ta	es		e			
Basidiomycota	Agaricomycetes	Polyporales	Polyporaceae	*Ganoderma*	Base de árbol	Probable
Basidiomycota	Agaricomycetes	Polyporales	Meripilaceae	*Rigidoporus*	Madera	Probable
Basidiomycota	Agaricomycetes	Polyporales	Meruliaceae	*Cymatoderma*	Madera	Probable
Basidiomycota	Agaricomycetes	Hymenochaetales	Hymenochaetaceae	*Phellinus*	Madera	Probable
Basidiomycota	Agaricomycetes	Russulales	Auriscalpiaceae	*Artomyces*	Madera	Alta
Basidiomycota	Agaricomycetes	Auriculariales	Auriculariaceae	*Auricularia*	Madera	Alta
Basidiomycota	Agaricomycetes	Auriculariales	Auriculariaceae	*Exidia*	Madera	Probable
Basidiomycota	Dacrymycetes	Dacrymycetales	Dacrymycetaceae	*Dacryopinax*	Madera	Probable
Ascomycota	Sordariomycetes	Xylariales	Xylariaceae	***Xylaria***	Madera	Alta

En negrita, los géneros con ficha propia (4.2); la ficha del pedo de lobo usa *Apioperdon*, de la misma familia que *Lycoperdon*. Además se registraron mixomicetos, que no son hongos sino amebozoos: *Arcyria* y *Trichia* (Myxomycetes, Trichiales, Trichiaceae).

4.2 Fichas de los cinco hongos seleccionados

Se eligieron cinco géneros que ilustran los caracteres explicados por el docente: alimento (*Pleurotus*), poros (*Polyporus*), anillo y láminas (*Macrolepiota*), cuerpo sin pie ni láminas (*Apioperdon*) y un ascomiceto (*Xylaria*).



a) Pleurotus b) Polyporus s.l. c) Macrolepiota d) Apioperdon e) Xylaria

Figura 4. Géneros seleccionados: a) Pleurotus sobre tronco (foto A1); b) Polyporus s.l., himenio con poros (A4); c) Macrolepiota, estípite con anillo móvil (A5); d) Apioperdon con poro apical (A8); e) Xylaria con conidios (A11).

Ficha 1. *Pleurotus* (orellana silvestre)

Taxonomía: Fungi > Basidiomycota > Agaricomycetes > Agaricales > Pleurotaceae > *Pleurotus*

Caracteres de campo: píleo en forma de oreja, pie lateral o ausente, láminas decurrentes, crecimiento en repisas sobre madera muerta.

Relevancia: género comestible y cultivable; las cepas silvestres tienen potencial gourmet, como señaló el docente.

Ficha 2. *Polyporus* s.l. (poliporo)

Taxonomía: Fungi > Basidiomycota > Agaricomycetes > Polyporales > Polyporaceae > *Polyporus* s.l.

Caracteres de campo: himenio con poros en lugar de láminas, visibles en foto macro; pie corto y lateral; sobre rama caída.

Relevancia: degradador de madera; los poliporos son fuente de enzimas ligninolíticas.

Ficha 3. *Macrolepiota* (parasol)

Taxonomía: Fungi > Basidiomycota > Agaricomycetes > Agaricales > Agaricaceae > *Macrolepiota*

Caracteres de campo: pie largo y hueco con anillo móvil que se desliza; láminas libres que no tocan el pie; sobre suelo.

Relevancia: ilustra el anillo y la inserción de láminas. Se confunde con *Chlorophyllum*, que es tóxico, por lo que no debe consumirse sin identificación experta.

Ficha 4. *Apioperdon* (pedo de lobo)

Taxonomía: Fungi > Basidiomycota > Agaricomycetes > Agaricales > Agaricaceae > *Apioperdon* (antes incluido en *Lycoperdon*)

Caracteres de campo: cuerpo globoso sin píleo ni láminas; las esporas maduran dentro y salen por un poro apical; crece agrupado sobre madera.

Relevancia: ejemplo de basidiomiceto sin la morfología típica de sombrero y pie.

Ficha 5. *Xylaria* (dedos de muerto)

Taxonomía: Fungi > Ascomycota > Sordariomycetes > Xylariales > Xylariaceae > *Xylaria*

Caracteres de campo: estroma en forma de clava sobre pie negro; la capa blanca es la fase asexual (conidios); sobre madera en descomposición.

Relevancia: representante de los ascomicetos; participa en la descomposición de la madera.

5. Propuesta: catálogo digital fúngico libre de la reserva

Como propósito personal de la salida, y en diálogo con el docente, se propone digitalizar las imágenes de los hongos de la reserva en un catálogo de acceso libre. Responde al llamado del docente a tener un objetivo propio: la biodiversidad fúngica de la reserva está poco documentada y unos 20 hongos aparecieron en menos de 300 m.

Protocolo de captura por espécimen

1. Fotos en tres vistas: superior (píleo), inferior (láminas o poros) y lateral (pie, anillo, volva).
2. Una foto del hábitat y el sustrato (suelo, madera, hojarasca).
3. Escala de referencia en la imagen (regla o tarjeta de color).
4. Coordenadas GPS, fecha, estación del sendero y caracteres no visuales (olor, textura).

Contenido de cada ficha: nombre común, taxonomía hasta género, caracteres diagnósticos, sustrato, importancia (alimento, enzimas, patógeno, simbionte) y autor de la foto.

Acceso libre: imágenes con licencia Creative Commons (CC BY), registros subidos a un proyecto en iNaturalist para validación comunitaria y una versión web del catálogo. A futuro, el banco de imágenes etiquetadas puede servir para entrenar modelos de visión por computadora que apoyen la identificación en campo.

5.1 Primer registro con modelo 3D: CF-001, *Leucoagaricus* (prob.)

Como prueba del catálogo se hizo un modelo 3D del *Leucoagaricus* de la foto A19, a partir de esa sola foto y con herramientas libres en Python. El hongo se recortó del fondo con SAM (*Segment Anything*; Kirillov et al., 2023); la cara superior del píleo, que se ve como elipse por la perspectiva, se enderezó a un disco para usarla como textura; y el estípite con su anillo se reconstruyó girando su ancho, medido en la foto, alrededor de su eje. Una rama tapaba la base del pie, así que el modelo llega hasta ese punto.



Figura 5. De la foto al modelo 3D: a) foto de campo A19; b) recorte con SAM; c) modelo 3D, vista lateral; d) modelo 3D, vista inferior.

Campo	Registro
Código	CF-001
Determinación	*Leucoagaricus* sp. (probable), por fotografía
Píleo	Convexo a aplanado, fibrillas radiales rosado-vinosas sobre fondo crema,

Campo	Registro
	centro violáceo
Estípite	Central, anaranjado a café claro, con anillo membranoso blanco-crema
Sustrato	Hojarasca
Pendiente	Escala, GPS, esporada, olor y confirmación de los docentes

El modelo supone simetría radial y completa las partes que no se ven (aquí, las láminas), por eso sirve para ver la forma y los caracteres, no para medir. En la próxima salida se propone sumar fotogrametría (40 a 80 fotos alrededor de cada hongo) para modelos fieles.

El catálogo y su código están en acceso libre: jrojasvi-oss.github.io/catalogo-fungico-yotoco (repositorio: github.com/jrojasvi-oss/catalogo-fungico-yotoco).

6. Conclusiones

- Los hongos sostienen procesos clave del sistema: la micorriza condiciona el establecimiento de especies como el pino y la nutrición de cultivos como el café.
- La identificación en campo depende de pocos caracteres bien observados: himenio, pie, anillo, volva, sustrato y olor.
- Para el agrónomo los hongos abren campos concretos: alimentación, enzimas industriales, manejo de patógenos de raíz y restauración de suelos.
- Documentar la diversidad de la reserva con un catálogo libre, con fichas y modelos 3D como el del CF-001, convierte la salida en un insumo duradero para docencia e investigación.

Referencias

Brundrett, M. C., & Tedersoo, L. (2018). Evolutionary history of mycorrhizal symbioses and global host plant diversity. *New Phytologist*, *220*(4), 1108–1115. https://doi.org/10.1111/nph.14976

Franco-Molano, A. E., Aldana-Gómez, R., & Halling, R. E. (2000). *Setas de Colombia (Agaricales, Boletales y otros hongos): Guía de campo*. Colciencias; Universidad de Antioquia.

Franco-Molano, A. E., Corrales, A., & Vasco-Palacios, A. M. (2010). Macrohongos de Colombia II. Listado de especies de los órdenes Agaricales, Boletales, Cantharellales y Russulales (Agaricomycetes, Basidiomycota). *Actualidades Biológicas*, *32*(92), 89–114.

García Lemos, A., & Bolaños R., A. C. (2010). Macrohongos presentes en el bosque seco tropical de la región del Valle del Cauca, Colombia. *Revista de Ciencias*, *14*, 45–54.

Index Fungorum. (2026). *Index Fungorum*. Royal Botanic Gardens, Kew. https://www.indexfungorum.org

Justo, A., Miettinen, O., Floudas, D., Ortiz-Santana, B., Sjökvist, E., Lindner, D., Nakasone, K., Niemelä, T., Larsson, K.-H., Ryvarden, L., & Hibbett, D. S. (2017). A revised family-level classification of the Polyporales (Basidiomycota). *Fungal Biology*, *121*(9), 798–824. https://doi.org/10.1016/j.funbio.2017.05.010

Kirillov, A., Mintun, E., Ravi, N., Mao, H., Rolland, C., Gustafson, L., Xiao, T., Whitehead, S., Berg, A. C., Lo, W.-Y., Dollár, P., & Girshick, R. (2023). Segment anything. En *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)* (pp. 4015–4026). https://doi.org/10.1109/ICCV51070.2023.00371

Largent, D. L., & Baroni, T. J. (1988). *How to identify mushrooms to genus VI: Modern genera*. Mad River Press.

Larsson, E., & Jeppson, M. (2008). Phylogenetic relationships among species and genera of Lycoperdaceae based on ITS and LSU sequence data from north European taxa. *Mycological Research*, *112*(1), 4–22.

MycoBank. (2026). *MycoBank database*. Westerdijk Fungal Biodiversity Institute. https://www.mycobank.org

Ryvarden, L. (2004). *Neotropical polypores. Part 1: Introduction, Ganodermataceae & Hymenochaetaceae* (Synopsis Fungorum 19). Fungiflora.

Smith, S. E., & Read, D. J. (2008). *Mycorrhizal symbiosis* (3.ª ed.). Academic Press.

Soto-Medina, E., & Bolaño-Rojas, A. C. (2013). Hongos macroscópicos en un bosque de niebla intervenido, vereda Chicoral, Valle del Cauca, Colombia. *Biota Colombiana*, *14*(2). https://doi.org/10.21068/bc.v14i2.281

Vasco-Palacios, A. M., Franco-Molano, A. E., & Saavedra, B. S. (2021). *Diversity of Colombian macrofungi (Ascomycota – Basidiomycota)* (versión 1.2) [Conjunto de datos]. Universidad de Antioquia. https://doi.org/10.15472/o8vo29

Wijayawardene, N. N., Hyde, K. D., Dai, D. Q., Sánchez-García, M., Goto, B. T., Saxena, R. K., et al. (2022). Outline of Fungi and fungus-like taxa – 2021. *Mycosphere*, *13*(1), 53–453. https://doi.org/10.5943/mycosphere/13/1/2

Anexo A. Registro fotográfico

Se incluyen 70 fotografías del recorrido por la Reserva de Yotoco, numeradas A1 a A70 y ordenadas por género. Se descartaron los duplicados y una foto tomada en el campus, fuera de la reserva. "(prob.)" indica un género tentativo; "indet." indica que la foto no permite identificar el género.



A1. Pleurotus



A2. Pleurotus



A3. Polyporus s.l.



A4. Polyporus s.l.



A5. Macrolepiota



A6. Macrolepiota



A7. Macrolepiota



A8. Apioperdon



A9. Lycoperdon



A10. Lycoperdon



A11. Xylaria




A12. Xylaria




A13. Xylaria



A14. Xylaria (inmaduro)



A15. Xylaria (inmaduro)



A16. Xylaria (amarilla)




A17. Xylariales indet.



A18. Xylariales indet.



A19. Leucoagaricus (prob.)



A20. Leucoagaricus (prob.)



A21. Agaricaceae indet.




A22. Cystolepiota (prob.)



A23. Marasmius



A24. Marasmius




A25. Marasmius



A26. Marasmius



A27. Marasmius



A28. Marasmius



A29. Marasmius



A30. Gymnopus (prob.)



A31. Gymnopus (prob.)



A32. Mycena



A33. Mycena



A34. Favolaschia



A35. Cyptotrama



A36. Cyptotrama



A37. Armillaria (prob.)



A38. Armillaria (prob.)



A39. Armillaria (prob.)



A40. Gymnopilus (prob.)



A41. Pluteus (prob.)



A42. Gerronema (prob.)



A43. Schizophyllum (prob.)



A44. Lentinus (prob.)



A45. Lentinus (prob.)



A46. Lentinus (prob.)



A47. Panus (prob.)



A48. Panus (prob.)



A49. Trametes



A50. Trametes



A51. Trametes



A52. Trametes



A53. Polyporaceae indet.



A54. Ganoderma (prob.)



A55. Ganoderma (prob.)



A56. Rigidoporus (prob.)



A57. Cymatoderma (prob.)



A58. Cymatoderma (prob.)




A59. Artomyces




A60. Auricularia



A61. Auricularia



A62. Exidia (prob.)



A63. Dacryopinax (prob.)



A64. Indeterminado



A65. Indeterminado



A66. Posible mixomiceto



A67. Arcyria (mixomiceto)



A68. Trichia (mixomiceto)



A69. Mixomiceto indet.



A70. Madera en descomposicion

Tabla A1. Clasificación de las fotografías del anexo.

Fotos	Género	Familia	Orden	Grupo
A1–A2	*Pleurotus*	Pleurotaceae	Agaricales	Basidiomycota
A3–A4	*Polyporus* s.l.	Polyporaceae	Polyporales	Basidiomycota
A5–A7	*Macrolepiota*	Agaricaceae	Agaricales	Basidiomycota
A8	*Apioperdon*	Agaricaceae	Agaricales	Basidiomycota
A9–A10	*Lycoperdon*	Agaricaceae	Agaricales	Basidiomycota

Fotos	Género	Familia	Orden	Grupo
A11–A16	*Xylaria*	Xylariaceae	Xylariales	Ascomycota
A17–A18	Indeterminado	—	Xylariales	Ascomycota
A19–A20	*Leucoagaricus* (prob.)	Agaricaceae	Agaricales	Basidiomycota
A21	Indeterminado	Agaricaceae	Agaricales	Basidiomycota
A22	*Cystolepiota* (prob.)	Agaricaceae	Agaricales	Basidiomycota
A23–A29	*Marasmius*	Marasmiaceae	Agaricales	Basidiomycota
A30–A31	*Gymnopus* (prob.)	Omphalotaceae	Agaricales	Basidiomycota
A32–A33	*Mycena*	Mycenaceae	Agaricales	Basidiomycota
A34	*Favolaschia*	Mycenaceae	Agaricales	Basidiomycota
A35–A36	*Cyptotrama*	Physalacriaceae	Agaricales	Basidiomycota
A37–A39	*Armillaria* (prob.)	Physalacriaceae	Agaricales	Basidiomycota
A40	*Gymnopilus* (prob.)	Hymenogastraceae	Agaricales	Basidiomycota
A41	*Pluteus* (prob.)	Pluteaceae	Agaricales	Basidiomycota
A42	*Gerronema* (prob.)	Porotheleaceae	Agaricales	Basidiomycota
A43	*Schizophyllum* (prob.)	Schizophyllaceae	Agaricales	Basidiomycota
A44–A46	*Lentinus* (prob.)	Polyporaceae	Polyporales	Basidiomycota
A47–A48	*Panus* (prob.)	Polyporaceae	Polyporales	Basidiomycota
A49–A52	*Trametes*	Polyporaceae	Polyporales	Basidiomycota
A53	Indeterminado	Polyporaceae	Polyporales	Basidiomycota
A54–A55	*Ganoderma* (prob.)	Polyporaceae	Polyporales	Basidiomycota
A56	*Rigidoporus* (prob.)	Meripilaceae	Polyporales	Basidiomycota
A57–A58	*Cymatoderma* (prob.)	Meruliaceae	Polyporales	Basidiomycota
A59	*Artomyces*	Auriscalpiaceae	Russulales	Basidiomycota
A60–A61	*Auricularia*	Auriculariaceae	Auriculariales	Basidiomycota
A62	*Exidia* (prob.)	Auriculariaceae	Auriculariales	Basidiomycota
A63	*Dacryopinax* (prob.)	Dacrymycetaceae	Dacrymycetales	Basidiomycota

Fotos	Género	Familia	Orden	Grupo
A64–A65	Indeterminado	—	—	Fungi
A66	Indeterminado	—	—	Posible mixomiceto
A67	*Arcyria*	Trichiaceae	Trichiales	Mixomiceto (no es hongo)
A68	*Trichia*	Trichiaceae	Trichiales	Mixomiceto (no es hongo)
A69	Indeterminado	—	—	Mixomiceto (no es hongo)
A70	Madera en descomposición	—	—	Sustrato