BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2022-08-09 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 1 de 5. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Hemograma Completo
Material:
Sangue
Método:
Analisador Automatizado (Contagem por impedância e análise celular por citometria de fluxo)
SÉRIE VERMELHA
Valores de Referência
Hemácias
4,430
milhões/mm3
4,5 a 5,9 milhões/mm3
Hemoglobina
13,40
g/dL
13,5 a 17,5 g/dL
Hematócrito
39,40
%
41,0 a 53,0 %
V.C.M.
88,94
fL
80,0 a 98,0 fL
H.C.M.
30,25
pg
27,0 a 32,0 pg
C.H.C.M.
34,01
g/dL
31,0 a 35,0 g/dL
R.D.W. (CV)
13,30
%
11,5 a 14,5 %
R.D.W. (SD)
43,40
fL
38,6 a 49,1 fL
SÉRIE BRANCA
LEUCÓCITOS
5,53
milhares/mm3
5,0 a 10,0 milhares/mm3
(%)
milhares/mm3
Blastos
0,00
0,00
Ausentes
Pro-mielócitos
0,00

0,00
Ausentes
Mielócitos
0,00
0,00
Ausentes
Metamielócitos
0,00
0,00
Ausentes
Neutrófilos Bastonetes
2,00
0,11
0 a 3 % (Até 830/mm3)
Neutrófilos Segmentados
42,30
2,34
35 a 75 % (1.520 a 4.980/mm3)
Eosinófilos
3,10
0,17
0 a 3 % (30 a 400/mm3)
Basófilos
1,10
0,06
0 a 1 % (Até 80/mm3)
Linfócitos típicos
40,30
2,23
20 a 50 % (900 a 3.400/mm3)
Linfócitos atípicos
0,00
0,00
Ausentes
Monócitos
11,20
0,62
2 a 10 % (240 a 680/mm3)
Células Indiferenciadas
0,00
0,00
Ausentes
PLAQUETAS
200,0
milhares/mm3
140 a 400 milhares/mm3
M.P.V.
11,40
fL
7,5 a 11,5 fL
Data/Hora Coleta:
09/08/2022 - 16:05:20
Data/Hora Liberação:
11/08/2022 - 11:06:57
* Amostra processada pelo analisador automático Sysmex Série-X.

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2022-08-09 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 2 de 5. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Ferritina Sérica.....:
22,7
ng/mL
Material :
Sangue
Método :
Quimioluminescência (CLIA)
V.R.:
Critérios para definição de Deficiência de Ferro (ASH/2026):
1) Crianças de 9 meses a 4 anos: Deficiência se Ferritina < 20,0 ng/mL
2) Adultos em geral: Deficiência se Ferritina < 30,0 ng/mL
3) Presença de sintomas ou condições específicas: Gestantes, fadiga crônica, queda de cabelo, menstruação excessiva, síndrome das pernas inquietas: Deficiência se Ferritina < 50 ng/mL.
4) Presença de Inflamação (Proteína C Reativa ou VHS elevados), Câncer ou Doença Infecciosa: Deficiência se Ferritina < 100,0 ng/mL ou se Índice de Saturação da Transferrina < 20%.
Referência: Blood Adv. 2026 Aug 24:bloodadvances.2025015950. doi: 10.1182/bloodadvances.2025015950. American Society of Hematology 2026 guidelines for diagnosis of iron deficiency. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42747316/.
Anteriores:
Data/Hora Coleta:
09/08/2022 - 16:05:19
Data/Hora Liberação:
11/08/2022 - 00:39:00
Dosagem de Ferro .....:
73
ug/dL
Material :
Sangue
Método :
Colorimétrico
V.R.:
49 - 181 ug/dL
Anteriores:
Data/Hora Coleta:
09/08/2022 - 16:05:19
Data/Hora Liberação:
11/08/2022 - 00:38:30

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2022-08-09 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 3 de 5. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Capacidade de Fixação do Ferro e Saturação da Transferrina
Material :
Sangue
Metodo :
Colorimétrico - Ferrozine® (Goodwin modificado)
Capacidade Total de Ligação do Ferro (TIBC):
376
µg/dL
VR:
250 a 410 µg/dL
Capacidade Livre de Ligação do Ferro:
448,8
µg/dL
VR:
140 a 280 µg/dL
Índice de Saturação da Transferrina.....:
16,27
%
VR:
20 a 50 %
Data/Hora Coleta:
09/08/2022 - 16:05:19
Data/Hora Liberacao:
11/08/2022 - 00:38:30
Dosagem de Transferrina .....:
2,92
g/L
Material :
Sangue
Método :
Imunoturbidimetria
V.R.:
Homens: 1 a 14 anos....: 1,86 a 3,88 g/L Mulheres: 1 a 14 anos..: 1,80 a 3,91 g/L
14 a 60 anos....: 1,74 a 3,64 g/L 14 a 60 anos..: 1,80 a 3,82 g/L
Acima de 60 anos....: 1,63 a 3,44 g/L Acima de 60 anos..: 1,73 a 3,60 g/L
Coeficiente de variacao biologica: 3,0%
Erro Total permitido: 3,8%
Fonte: www.westgard.com
Anteriores:
Data/Hora Coleta:
09/08/2022 - 16:05:19
Data/Hora Liberação:
11/08/2022 - 11:06:57

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2022-08-09 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 4 de 5. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Dosagem de Vitamina B12 (Cobalamina):
288,0
pg/mL
Material :
Sangue
Método :
Quimioluminescência (CLIA)
V.R.:
Mediana Intervalo
(pg/mL) (pg/mL)
Normal : 382 211-911
Deficiente : 160 32-246
Anteriores:
Data/Hora Coleta:
09/08/2022 - 16:05:19
Data/Hora Liberação:
11/08/2022 - 00:38:30

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2022-08-09 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 5 de 5. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Pesquisa de Sangue Oculto nas Fezes (com dieta):

Positivo

Material :

Fezes

Método :

Método de Meyer

V.R.:

Negativo

A pesquisa de sangue nas fezes encontra aplicação em várias situações, sendo muito utilizado como “acompanhamento” em casos de câncer colorretal, que afeta o cólon e o

reto. Mas nem todo sangue presente nas fezes é causado por câncer. Várias outras condições podem levar à presença do mesmo, entre elas: hemorróidas, fissura anal, pólipos,

úlcera péptica, colite ulcerativa, refluxo gastroesofágico, doença de Crohn, além do uso de aspirina e alguns antinflamatórios.

O resultado do teste é grandemente afetado pela maneira como é feita a preparação para a coleta da amostra, por isso é muito importante seguir cuidadosamente as instruções.

A coleta não deve ser realizada em casos de: 1. Diarréia 2. Colite 3. Constipação 4. Diverticulite 5. Úlcera 6. Hemorróida 7. Período menstrual. Estes alimentos não devem ser

ingeridos por um período de 72 horas antes da coleta: Carne vermelha, beterraba, brócolis, couve-flor, nabo, rabanete. Assim como a ingestão de vitamina C, anti-inflamatórios,

corticoides, Ácido Acetil Salicílico (AAS) e compostos de ferro.

Anteriores:

Data/Hora Coleta:

10/08/2022 - 09:58:34

Data/Hora Liberação:

11/08/2022 - 11:06:57