BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2025-03-06 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 1 de 7. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

GLICOSE JEJUM
Material :
Soro
Metodo :
Glicose Oxidase- GOD-Trinder
RESULTADO:
79
mg/dL
Valor de
Referência:
60 a 99 mg/dL - Glicemia de Jejum normal
100 a 125 mg/dL - Glicemia de Jejum alterada
= OU > a 126 mg/dL - Criterio diagnostico para o Diabetes Mellitus, sendo necessaria confirmacao em nova amostra, num dia subsequente.
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 5,6%
Erro Total Permitido:.....: 6,96%
FONTE: James Westgard - EUA
VALOR DE REFERENCIA PARA GESTANTES (2º e 3º TRIMESTRE DE GESTACAO):
Menor que 92 mg/dL
1º trimestre de gestacao: seguir os valores de referencia para a populacao geral
OBSERVAÇAO: A ADA (American Diabets Association) e o grupo de estudo HAPO americano, estabeleceram no ano de 2008, os novos criterios para o diagnostico de Diabetes gestacional. As gestantes devem ser submetidas ao Teste oral de Tolerancia a Glicose (TOTG), entre a 24a e 28a semanas de gestaçao, com 75 gramas de Glicose Anidra, dosagens nos tempos:Jejum, 1 hora pos sobrecarga e 2 horas pos sobrecarga. Um ou mais valores alterados determinam o diagnostico de diabetes gestacional.
Nota: O achado de glicemia casual (sem cumprir o tempo exigido para o jejum) superior ou igual a 200 mg/dL, e criterio diagnostico. Neste caso, tambem e necessario a confirmaçao em nova amostra, num dia subsequente.
Fonte: ADA (American Diabetes Association). Classification and Diagnosis of Diabetes: Standands of Medical care in Diabetes - 2019.
Anteriores:
Data/Hora Coleta:
06/03/2025 - 08:18:57
Data/Hora Liberacao:
06/03/2025 - 16:18:04

05/09/23
08:11:11
12/03/24
07:10:00
19/06/24
07:54:39
25/07/24
08:45:10
25/11/24
08:17:01
06/03/25
08:18:57
0
50

100
150
200
99 67 71
102 106 79

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2025-03-06 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 2 de 7. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

UREIA
Material :
Soro
Metodo :
Cinetico UV
RESULTADO
51
mg/dl
Valor de
Referencia :
ADULTOS.....: 17 a 43 mg/dL
RECEM NASCIDOS..: 8,4 a 25,8 mg/dL
BEBES/CRIANCAS..: 10,8 a 38,4 mg/dL
Especificacoes de Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 12,1%
Erro Total Permitido.....: 15,55%
FONTE: James Westgard - EUA
Data/Hora Coleta:
06/03/2025 - 08:18:57
Data/Hora Liberacao:
06/03/2025 - 17:15:24

23/06/23
07:30:00
25/07/24
08:45:10
25/11/24
08:17:01
06/03/25
08:18:57
0
20
40
60
80
35
65
42
51

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2025-03-06 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 3 de 7. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

CREATININA SERICA
Material :
Soro
Metodo :
Cinetico UV
RESULTADO
1,70
mg/dL
Valor de referência:
HOMENS INFERIOR A 50 ANOS 0,84 A 1,25 mg/dL
HOMENS SUPERIOR A 50 ANOS 0,81 A 1,44 mg/dL
MULHERES 0,66 A 1,09 mg/dL
RECEM NASCIDOS 0,5 A 1,2 mg/dL
INFANTIL 0,4 A 0,7 mg/dL
CRIANCA 0,5 A 1,2 mg/dL
RITMO DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR
Metodo :
CÁLCULO PELA FORMULA CKD-EPI (2021)
Resultado
45
mL/min/1,73m2
Vr:
Adulto maior de 18 anos: > 90 mL/min/1,73 m2
NOTA:
- Valores acima de 90 mL/min/1,73m2 são liberados como superior a 90 mL/min/1,73m2.
- Após os 40 anos de idade, espera-se uma redução de cerca de 1 mL/min do Ritmo de Filtração Glomerular (RFG) por ano.
- A estimativa do RFG não deve ser utilizada em indivíduos hospitalizados com concentrações de creatinina instáveis, principalmente pacientes com Insuficiência Renal Aguda.
- O uso da estimativa de RFG também não é recomendado em indivíduos com dietas vegetarianas ou que fazem uso de suplementos de creatina, em extremos de massa muscular (amputados, paraplégicos, desnutridos, fisiculturistas), e em gestantes.
- Fonte da Fórmula CKD-EPI 2021: Miller WG et al. National Kidney Foundation Laboratory Engagement Working Group Recommendations for Implementing the CKD-EPI 2021 Race-Free Equations for Estimated Glomerular Filtration Rate: Practical Guidance for Clinical Laboratories.
Clin Chem. 2022:68(4):511-520.
- O uso recente de dipirona podem ocasionar discreta redução nos níveis de creatinina dosada pelo método Enzimático.
Data/Hora Coleta:
06/03/2025 - 08:18:57
Data/Hora Liberacao:
06/03/2025 - 17:15:24

05/09/23
08:11:11
12/03/24
07:10:00
19/06/24
07:54:39
25/07/24
08:45:10

25/11/24
08:17:01
06/03/25
08:18:57
0
0,5
1
1,5
2
2,5
1,56 1,48 1,51 1,70 1,60 1,70

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2025-03-06 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 4 de 7. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

POTASSIO
Material :
Soro
Metodo :
ION SELETIVO
RESULTADO
4,4
mEq/L
Valor de
Referencia :
3,9 5,0 mEq/L
Especificacoes de Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 4,6%
Erro Total Permitido.....: 5,61%
FONTE: James Westgard - EUA
Data/Hora Coleta:
06/03/2025 - 08:18:57
Data/Hora Liberacao:
06/03/2025 - 17:15:24

05/09/23
08:11:11
12/03/24
07:10:00
19/06/24
07:54:39
25/07/24
08:45:10
25/11/24
08:17:01
06/03/25
08:18:57
3
4
5
6
7
4,4 3,9 4,2 4,3 4,3 4,4

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2025-03-06 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 5 de 7. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

ACIDO URICO
Material :
Soro
Metodo :
Colorimetrico (Enzimatico-Trinder)
RESULTADO
6,8
mg/dl
Valor de
Referencia :
HOMENS 3,5 A 7,2 mg/dL
MULHERES 2,6 A 6,0 mg/dL
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 8,6%
Erro Total Permitido.....: 11,97%
FONTE: James Westgard - EUA
NOTA:
- Pacientes em tratamento para gota, recomenda-se níveis séricos de ácido urico
abaixo de 6 mg/dL.
Data/Hora Coleta:
06/03/2025 - 08:18:57
Data/Hora Liberacao:
06/03/2025 - 17:15:24

MICROALBUMINURIA
Material :
Urina Recente
Metodo :
TURBIDIMETRIA
Resultado:
8,72
mg/g creatinina
Valor de
Referencia :
Inferior a 30 mg/g creatinina.
Nota:
- Valores falsamente baixos podem ocorrer em pacientes com macroproteinuria.
Data/Hora Coleta:
06/03/2025 - 08:32:38
Data/Hora Liberacao:
06/03/2025 - 17:15:24

23/06/23
07:30:00
05/09/23
08:11:11
12/03/24
07:10:00
19/06/24
07:54:39
25/07/24
08:45:10

25/11/24
08:17:01
06/03/25
08:18:57
2
4
6
8
10
6,8
7,6 5,9 5,3
8,3
5,9
6,8

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2025-03-06 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 6 de 7. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

HEMOGLOBINA GLICADA (HBA1C)
Material :
Sangue Total
Metodo :
HPLC (CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA PERFORMANCE)
RESULTADO:
7,6
%
Valor de referência:
MENOR QUE 5,7%
DIABETES MELLITUS:
PRÉ-DIBETES - 5,7% A 6,4%
DIAGNÓSTICO - IGUAL OU MAIOR QUE 6,5%
BOM CONTROLE - MENOR QUE 7%
GLICEMIA MÉDIA ESTIMADA-
RESULTADO:
171,4
mg/dL
Valor de referência:
NOTA:
- O diagnóstico de diabetes mellitus deve ser confirmado pela repetição do teste em outro dia, a menos que haja hiperglicemia inequívoca com descompensação metabólica aguda ou sintomas clássicos de diabetes mellitus. American Diabetes Association. Diabetes Care, Vol. 34, hemoglobina S. 1, January 2011. O mÈtodo utilizado nesta dosagem de glicada esta certificado pelo NGSP (National Glycohemoglobin Standardization Program-USA).
- O valor da glicemia média estimada não deve ser utilizado na avaliação de indivíduos não diabéticos.
Data/Hora Coleta:
06/03/2025 - 08:18:47
Data/Hora Liberacao:
06/03/2025 - 17:15:24

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2025-03-06 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 7 de 7. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

25-HIDROXIVITAMINA D
Material :
Soro
Metodo :
QUIMIOLUMINESCÊNCIA
RESULTADO:
18,1
ng/mL
VR :
DEFICIENTE : INFERIOR A 20,0 ng/mL
ADEQUADO PARA A POPULAÇÃO GERAL: ENTRE 20,0 E 60,0 ng/mL
IDEAL (GRUPOS DE RISCO) : DE 30,0 a 60,0 ng/mL
RISCO DE INTOXICAÇÃO : SUPERIOR A 100,0 ng/mL
NOTA:
- Grupos de risco: idosos, pós cirurgia bariátrica, gestantes, osteomalácia, osteoporose, paciente com história de quedas e fraturas, hiperparatiroidismo secundário, uso de drogas que interferem no metabolismo da vitamina D, diabetes mellitus tipo 1, câncer, doença renal crônica e síndromes de má-absorção.
Data/Hora Coleta:
06/03/2025 - 08:19:08
Data/Hora Liberacao:
07/03/2025 - 07:47:55

VITAMINA B12
Material :
Soro
Metodo :
QUIMIOLUMINESCÊNCIA
RESULTADO:
1.083
pg/mL
VR :
De 172 a 890 pg/mL
NOTA:
- Atenção para os novos valores de referência devido à reformulação do ensaio. Pacientes em acompanhamento com esse teste deverão ter seus valores realinhados.
Data/Hora Coleta:
06/03/2025 - 08:19:08
Data/Hora Liberacao:
07/03/2025 - 13:30:50